



J. CHS PULS  
Pharmacies & Droguiste  
place de la Calandre N°4  
GAND.

16<sup>e</sup>

*He*

*10/10*

*Acc 17720*

BIBLIOTHEEK GENT



00080944

gle









Nach der Natur von Prof. Brand

Vom Waldgärtner bewohnte Kiefern am Schützenhause bei Neustadt-Eberswalde.

Stich von Brand

# Die Forst-Insecten

oder

## Abbildung und Beschreibung

der in den Wäldern Preussens und der Nachbarstaaten als schädlich oder nützlich  
bekannt gewordenen Insecten;

In systematischer Folge und mit besonderer Rücksicht auf die Vertilgung der Schädlichen.

---

Im Auftrage des Chefs der zweiten Abtheilung des Königl. Preufs. Haus - Ministeriums  
Herrn Geheimen Staats - Ministers von Ladenberg Excellenz  
herausgegeben

VON

**JULIUS THEODOR CHRISTIAN RATZBURG,**

Dr. der Medicin und Chirurgie und berechtigtem Arzte, Professor der Naturwissenschaften an der Königlich Preussischen höheren Forst - Lehranstalt, der Kaiserlich Leopoldinisch-Carolinischen Akademie der Naturforscher, der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur zu Breslau, der Kaiserlichen naturforschenden Gesellschaft zu Moskau an wie der naturforschenden Gesellschaft zu Emden, der Gesellschaft zur Beförderung der Waldwirtschaft in Rußland zu St. Petersburg, der Münchener ökonomischen Gesellschaft zu München, der Hofelendischen medicinischen Gesellschaft zu Berlin, des Apotheker - Vereins für das nördliche Deutschland, des entomologischen Vereins zu Stuttgart und der société des Sciences Physiques, Chimiques et Arts agricoles et Industriels de France wirklichen, correspondirenden und Ehrenmitgliede.

---

### Erster Theil. Die Käfer.

---

Mit 22 theils in Kupfer gestochenen theils lithographirten Tafeln  
und vielen Holzschnitten.

Zweite mit Zusätzen und Berichtigungen vermehrte Auflage.



Berlin, 1839.

In der Nicolai'schen Buchhandlung.

---

Gedruckt in der Druckerei der Königl. Akademie  
der Wissenschaften.

R493



Seiner Excellenz

dem Königlich Preussischen Geheimen Staats-Minister und Chef der zweiten  
Abtheilung des Königlichen Haus-Ministeriums, Ritter des rothen Adler-Ordens  
erster Klasse mit Eichenlaub

Herrn von Ladenberg

seinem hochverehrten Chef

widmet dieses Werk in tiefer Verehrung

der Verfasser.



## Vorrede zur ersten Ausgabe.

---

Bei der Aufmerksamkeit, die der Bewirthschaftung der Forsten gegenwärtig gewidmet wird, konnte es nicht unbeachtet bleiben, wie wichtig der Schutz der Forsten gegen schädliche Insecten ist. Besonders machte sich in den letzten, der Vermehrung schädlicher Forst-Insecten ungewöhnlich günstigen Jahren bei der Verwaltung der Königl. Preuss. Forsten die Nothwendigkeit fühlbar, auf eine allgemeinere und gründlichere Weise, besonders durch Benutzung der Fortschritte, welche die beobachtende Naturgeschichte in den letzten Zeiten gemacht hat, dem Übel zu begegnen.

Bald nach seinem Dienst-Antritte als Chef der, die Ober-Aufsicht über die Königl. Forsten führenden zweiten Abtheilung des Königl. Haus - Ministeriums, erkannte daher Se. Excellenz der Hr. Geheime Staats-Minister von Ladenberg das Bedürfnis, den Königl. Forst-Beamten einen Leitfaden an die Hand zu geben, der sie umfassender und gründlicher als die bis jetzt vorhandenen Schriften mit den Lebensweisen der Forst-Insecten und den daraus herzuleitenden Maassregeln, die ihrer Vermehrung Grenzen setzen können, bekannt machte und die vereinzelt werthvollen Beobachtungen und Erfahrungen zusammenstellte, welche sich in der neuesten Zeit den aufmerksamen Forst-Beamten dargeboten hatten.

Ich erhielt mit Allerhöchster Genehmigung Seiner Majestät des Königs von Seiner Excellenz dem Herrn Geheimen Staats-Minister von Ladenberg den Auftrag, ein solches Werk über die wichtigen Forst-Insecten zu verfassen und davon so viele Exemplare für Rechnung der Staats-Kasse abzuliefern, daß jedem dirigirenden, inspicirenden und verwaltenden Forst-Beamten ein Exemplar zugefertigt werden könnte. Neben der Bewilligung der erforderlichen Vorschüsse zu den Kosten der Herausgabe, erging an sämtliche Königl. Forstbeamte die Aufforderung, mir ihre Beobachtungen und Erfahrungen über die wichtigen Forst-Insecten mit-

zuthellen; der Herr Ober-Landforstmeister Reufs und Herr Geheime Medizinal-Rath Lichtenstein unterzogen sich der speciellen Prüfung des Planes und Anschlags, und so ging ich vor zwei Jahren an die Arbeit, deren ersten, die Käfer enthaltenden Theil, ich hiermit übergebe.

Wenn das Werk zunächst dazu bestimmt ist, die Forst-Beamten, die schon seit längerer Zeit in den practischen Dienst eingetreten und den Fortschritten in diesem Theil der Wissenschaft nicht gefolgt sind, zu unterrichten, und solchen, die früher in demselben wohlbewandert, die Kennzeichen der oft sehr ähnlichen Arten im Laufe vieler Jahre, in welchen die schädlichen Insecten manchmal in den Forsten nicht bemerkbar werden, sich nicht gegenwärtig erhalten haben, ein Mittel zu gewähren, sich das früher Gelernte stets wieder in das Gedächtnis zurückzurufen, so wird es außer diesem bei der wissenschaftlichen Einrichtung, die ich ihm zu geben mich bemüht habe, zugleich den Lehrlingen Gelegenheit darbieten, sich schon auf den Revieren für die entomologischen Studien auf den Lehr-Anstalten vorzubereiten, oder, wenn sie solche Anstalten nicht besuchen, die nöthigsten allgemeinen entomologischen Kenntnisse aus demselben zu schöpfen.

Zur Lösung dieser Aufgabe, deren Schwierigkeit die Sachverständigen würdigen werden, bedurfte es außerordentlicher Mittel. Die wichtigsten: die erforderlichen Fonds und practische Beiträge, wurden, wie schon erwähnt, durch die Verwaltung der Königl. Forsten gewährt. Nur mit Hülfe dieser Geldmittel war es möglich, den Abbildungen die nöthige Genauigkeit und dem Werke überhaupt die Ausstattung zu geben, welche es als Pflögling der höchsten Behörde haben mußte. Eben so wichtig waren mir die Beiträge, welche in den, stets durch eingesandte Exemplare der Insecten selbst belegten Berichten Königl. Preussischer Forst-Beamten bestehen. Aber auch Preussische Privatbeamte und viele Forstmänner und Naturforscher des benachbarten, nur politisch, nicht geographisch geschiedenen Auslandes theilten mir mit größter Bereitwilligkeit werthvolle Beobachtungen mit. Indem ich allen diesen Herren meinen verbindlichsten Dank sage und sie um Fortdauer dieses nützlichen Verkehrs, dem sich noch recht viele Andere anschließen mögen! angelegentlich bitte, erlaube ich mir, sie — soweit ich ihre schriftlichen Beiträge bis jetzt benutzen konnte — am Schlusse dieser Vorrede namentlich aufzuführen und darauf bei meinen Citaten im Text, besonders wegen des Beobachtungsortes, zu verweisen.

Zu jenen außerordentlichen Mitteln rechne ich ganz vorzüglich noch die, über meinen Dank erhabene, persönliche Mitwirkung durch Rath und That, deren ich mich von mehreren ausgezeichneten Männern erfreute. Vor allen muß ich hier wieder die Herren Reufs und Lichtenstein nennen. Herr Geheimerath Lichtenstein stand mir mit zuvorkommender Güte in den unzähligen schwierigen Geschäften bei, die mich um so mehr belastet haben wür-

den, als ich nicht immer selbst am Orte der Herausgabe sein konnte. Welchen Beistand ich in practischer Beziehung gehabt habe, wird Jeder ermessen, der weiß: daß ich mit einem der ersten Forstmänner unsrer Zeit, Herrn Ober-Forstrath Pfeil, in amtlicher Verbindung stehe; noch besonders muß ich anführen: daß ich auch die Benutzung forstwissenschaftlicher Schriften, welche kaum in einer andern Bibliothek vollständiger beisammen sein dürften, als in der seinigen, ihm verdanke. Die Sammlungen der Berliner Museen, welche mir die Herren Geheimenräthe Lichtenstein und Klug gütigst öffneten, erhielten für mich noch einen ganz besondern Werth dadurch, daß der Custos derselben, Hr. Dr. Erichson, die aufopferndste Freundschaft für mich bewies. Die wichtigsten Synonym-Berichtungen, welche ich demselben verdanke, sind gehörigen Ortes erwähnt. Unter den wenigen Naturforschern, welche die Naturgeschichte im Walde treiben, ist Hr. Saxesen in Clausthal der, mit welchem ich mich am häufigsten berathen habe. Mündlich und schriftlich hat er mir die schätzenswerthesten Mittheilungen gemacht. Eine Menge schöner und geistreich aufgefälschter Zeichnungen haben von ihm, als einem Naturforscher, doppelten Werth. Die höchst schwierig vergrößert darzustellenden Käfer auf Taf. VII. (von Hrn. Grüzmacher meisterhaft gestochen) und Taf. X. (von Hrn. Grape in Göttingen ausgeführt) sind sämmtlich von ihm gezeichnet, so wie auch die Fraßgegenstände auf Taf. VI. und Taf. XIX., und Fig. 1-3. auf Taf. VIII.; eben so die Entwicklungszustände Fig. 17 c, 12 b' auf Taf. I.; Fig. 11 b, 11 b' und G, 8 b und c auf Taf. IV.; Fig. 4 b und c, 3 b' und G auf Taf. V. und Fig. 1-14., 19-24. auf Taf. XIV. Die meisten übrigen Entwicklungszustände so wie die sämmtlichen Zergliederungen habe ich, und zwar meist mikroskopisch, selbst gezeichnet.

Ferner muß ich dankbar des Beistandes erwähnen, den mir ausgezeichnete, zum Theil nur für dies Fach arbeitende Künstler — Hr. Wienker jetzt der älteste unter ihnen — geleistet haben. Der Vergleich der verschiedenen Manieren, in denen sie arbeiten, wird jeden Künstler interessieren. Durch den Tod S. Weber's (die beiden classischen Bostrichen-Platten waren seine letzten Arbeiten!) haben wir einen harten Verlust erlitten, es hat sich aber ein hoffnungsvoller, junger Künstler, Hr. Hugo Troschel, Schüler Buchhorn's, für dies Fach wieder gefunden. Auch hat mir Hr. Grüzmacher mit seinem Gehülfen Hrn. Nikolay kräftigen Beistand geleistet. Die Tafeln selbst liefern die besten Zeugnisse. Die Steintafeln zeichnete Hr. Mützell, einer unsrer genialsten Landschaftler, und die Holzstöcke schnitt Hr. Vogel. Das Colorit besorgte Hr. Portraitmaler Meister mit der schon aus älteren Werken (z. B. Hayne's Arzneigewächsen) bekannten Genauigkeit.

Hinsichtlich der Einrichtung des Werkes habe ich noch Mehreres zu erinnern:

- 1) Daß ich die Insecten in systematischer Folge abhandle, wird man gewiß billigen. Diese Anordnung befördert nicht nur die Kenntniß der Insecten an sich, sondern sie ist auch



die einzige brauchbare, wenn es sich darum handelt, ein Insect, dessen Lebensweise noch nicht ganz bekannt ist, nach seinen Formen aufzusuchen. Die Anordnungen ähnlicher Werke nach der forstlichen Bedeutung der Insecten, nach den Nahrungspflanzen u. s. f., lassen hier ganz im Stich. Übrigens bin ich auch den Wünschen Derer, welche dennoch die letzteren Eintheilungen vorziehen, dadurch entgegengekommen: daß ich vorn zwei Übersichten nach der forstlichen Bedeutung und nach den Nahrungspflanzen, selbst nach den einzelnen bedrohten Theilen der Bäume, wie sie bisher noch nicht existirten, gebe. In diese ist nichts ohne eigne Prüfung oder zuverlässige Autorität aufgenommen. Die Übersicht II. dient zugleich als Inhalts-Verzeichniß. Ein vollständiges Register, auch für deutsche Namen und Synonymen, werde ich am Schlusse des Werkes geben.

- 2) Die Zahl der aufgenommenen Insecten möchte Manchem zu groß scheinen. Man darf aber nicht etwa bloß nach Einer Gegend urtheilen: ein Forstinsecten-Werk für Preußen reicht über den größten Theil von Deutschland. Auch fordert der Zweck des Werkes, daß alles von Praktikern Besprochene zu neuer Prüfung vorgelegt und alles in den oben gedachten amtlichen Berichten Erwähnte erläutert werde. Wem die Zahl der Arten zu groß ist, der darf sich nur an die Übersichten halten, wo er gewiß auf den ersten Blick das Gewünschte herausfindet und dann das Übrige unbeachtet lassen kann. Für so manche Schwierigkeit glaube ich den practischen Forstmann dadurch entschädigt zu haben: daß ich die Bestimmung vieler Arten durch genaue Beschreibung und Abbildung ihres so leicht kenntlichen Frafes sehr erleichterte, daß ich zu jeder Familie und größeren Gattung analytische Tabellen einrichtete, eine das Aufsuchen der einzelnen Materialien erleichternde typographische Einrichtung traf, u. s. f.
- 3) Charakteristik und Beschreibung habe ich überall, wo die Unterscheidung schwierig oder wichtig ist, ausführlicher, da hingegen, wo ein Blick auf die Abbildung hinreicht, kürzer gegeben. Nur einige sehr bekannte Insecten, z. B. Maikäfer, Kiefern-Rüsselkäfer u. a., habe ich recht ausführlich beschrieben, weil ich voraussetzte, daß manche Forstleute ihr ganzes entomologisches Studium nach diesem Werke machen müssen, und wünschte, daß auch sie eine ausführliche Beschreibung zu entwerfen lernten. Die Beschreibungen der Larven (wegen welcher stets das Allgemeine auf S. 15 und 112 zu vergleichen ist) sind überall am ausführlichsten, weil man sie noch in keinem Werke ordentlich findet (werden doch z. B. in ganz neuen Schriften wissenschaftlicher Entomologen die Borkenkäfer-Larven noch als sechsbeinig beschrieben!) und weil gerade auf die früheren Zustände, in denen das Insect allein wächst und am

Längsten lebt, das Meiste ankommt. Die im Texte angegebenen Zolle (") und Linien (") sind Pariser (12 Theile Preufs. entsprechen ungefähr  $11\frac{1}{3}$  Theilen Pariser). Die Länge ist von den Augen bis zum After und die Breite an der breitesten Stelle des Thieres genommen. Bei den Rüssellängen ist die Krümmung nicht mitgemessen. — Meine Citate in der Synonymie geben meist nur die Namen der Schriftsteller an und nicht die Titel ihrer Werke, weil der Forstmann diese doch nicht nachsieht.

And.	heißt	Andersch	Hllw.	heißt	Hellwig
Crtz.	-	Creutzer	Ill.	-	Illiger
Dej.	-	Déjean	Kn.	-	Knoch
Dftschm.	-	Dufschmid	Kug.	-	Kugelann
Er.	-	Erichson	Linn.	-	Linné
Fabr.	-	Fabricius	Marsh.	-	Marsham
Grm.	-	Germar	Meg.	-	Megerle
Gra.	-	Gravenhorst	Müll.	-	Müller
Gyll.	-	Gyllenhal	Ol.	-	Olivier
Hrt.	-	Hartig	Schh.	-	Schönherr
Hb.	-	Herbst.	Ulr.	-	Ulrich.

- 4) Die Abbildungen sind zum Theil vergrößert, namentlich sämtliche Zergliederungen, so wie auch solche ganze Insecten, welche zu klein sind, als daß man sie mit dem Grabstichel ordentlich ausdrücken könnte. Diesen letztern ist immer eine Linie oder ein Umriss, welche die natürliche Länge bezeichnen, beigefügt, bei den wichtigsten zum Überflus auch noch das Insect selbst in natürlicher Größe, welches dann auch vorzugsweise colorirt ist. Colorirt sind alle ausgebildete Insecten, Larven und Puppen, welche nicht weiß erscheinen, ausgenommen, wenn sie (wie z. B. die Borkenkäfer, bei denen überdiß die Farben den hier so wichtigen Stich verdeckt hätten) in Farben so sehr variiren, daß man deren mehrere hätte geben müssen (wie es auch bei den wichtigsten geschehen).
- 5) Bei der Bezeichnung der Figuren auf den Kupfertafeln gab ich den Entwicklungszuständen und den Zergliederungen immer die Ziffer der Art, zu welcher sie gehören und setzte dann einen lateinischen oder griechischen, großen oder kleinen Buchstaben hinzu. Dieser ist dann überell (bei verschiedenen Arten) für denselben Theil derselbe geblieben, so daß man, nach Erlernung der Bedeutung derselben, ohne Text die Bilder verstehen kann.

a bedeutet Lefze des Käfers  
 α - - - der Larve

b bedeutet Oberkiefer oder Flügeldecke des  
 Käfers

b

ß	bedeutet Oberkiefer der Larve	A	bedeutet die Seitenansicht des Käfers oder
c	- Unterkiefer des Käfers		einzelner Vorderkörpertheile
γ	- - der Larve	B	- die ganze Larve von der Seite
d	- Lippe des Käfers von außen	B'	- den vordern Theil der Larve
d'	- - - - innen	C	- die ganze Larve von oben
d''	- - - - der Seite	DE	- junge Lärchen
δ	- - der Larve	F	- Eier
e	- Fühler des Käfers	G	- Puppe von vorn
ε	- - der Larve	H	- - - hinten oder von der
g	- Fußglieder oder auch der eine		Seite
	oder andre Fußtheil des Käfers	O	- die Larve von unten (ganz oder
ζ oder κ	Kopf der Larve oder einige Theile		zum Theil)
	derselben von oben oder von unten	X	- Fraß der Larve.

Nur Taf. XII., XIII., XIV. machen eine Ausnahme, weil auf diesen nicht Larven, Puppen und Zergliederungen beisammen stehen konnten.

Möge denn dies Werk, welchem ich seit langer Zeit meine ganze Muse zuwendete und das ich auch ferner mit dem eifrigsten Fleiße fortführen und so bald wie möglich mit den beiden andern, etwas schwächern Theilen vervollständigen werde, denjenigen Nutzen stiften, welcher beabsichtigt wird.

Neustadt-Eberswalde, im April 1837.

*J. T. C. Ratzeburg.*

## Vorwort zur zweiten Ausgabe des ersten Bandes.

---

Noch ehe ich im Stande war, den zweiten Band erscheinen zu lassen, wurde eine zweite Ausgabe des ersten dringend verlangt. Ich dürfte hieraus zunächst nur entnehmen, daß ein Forstinsectenwerk mit zahlreicheren Abbildungen einem sehr großen Publicum Bedürfnis oder doch willkommen sei, namentlich auch vielen Naturforschern und wissenschaftlich gebildeten Landwirthen und Gärtnern. Zahlreiche günstige Beurtheilungen in zoologischen sowohl wie auch forstlichen und landwirthschaftlichen Journalen lassen mich glauben, daß auch die Art der Bearbeitung beifällig aufgenommen und daß zugleich allgemein anerkannt worden sei: wie bei der großen Kostspieligkeit des Unternehmens auch der für das Buch gestellte Preis ein sehr mäßiger genannt werden müsse.

Ich unterzog mich deshalb mit Vergnügen jenem Verlangen, so mühsam auch für mich die Erfüllung desselben damals war. Nur eben von einer größern Reise zurückgekehrt, in Mitten der Arbeiten zum zweiten Bande und mit zahlreichen Amtsgeschäften überhäuft, mußte ich an die neue Arbeit gehen. Dessen ungeachtet und obgleich kaum 2 Jahre seit dem ersten Erscheinen des Bandes vergangen sind, konnte ich mich doch nicht entschließen, ihn unverändert abdrucken zu lassen. Ich fing an, die Literatur wieder durchzugehen, wobei ich mit besonderer Freude das erfolgreiche entomologische Treiben der Engländer und Franzosen bemerkte, sammelte die vielen, schon wieder bei mir eingegangenen, schätzbaren Nachrichten meiner entomologischen Freunde und erkundigte mich bei andern nach neueren Beobachtungen. Bei dieser Gelegenheit fühle ich mich abermals verpflichtet, den gütigen Einsendern nicht bloß in meinem Namen zu danken, sondern auch im Namen des Publicums, dem sie damit so werthvolle Geschenke machen. Das Werk gestaltet sich dadurch immer mehr zu einem National-Unternehmen und ich fange an zu hoffen, es werde in dem Grade reichhaltig werden, daß auch später neue Erfahrungen sich daran anknüpfen mögen. Deshalb habe

ich die Einrichtung getroffen, die Zusätze der gegenwärtigen zweiten Ausgabe unter dem Titel „Veränderungen der zweiten Ausgabe“ besonders abdrucken zu lassen. Spätere Nachträge lassen sich dann unter den fortlaufenden Nummern geben und von Zeit zu Zeit kann ein Register oder eine Übersicht Alles so vereinigen, als wenn es neben einander stände. An den Platten habe ich glücklicher Weise nur sehr wenig zu ändern gefunden. Auch darüber ist das Nöthige in den Nachträgen bemerkt. Die Kupfer sind so gestochen, daß sie noch eine Ausgabe ohne merkliche Veränderungen aushalten.

Möge auch diese Ausgabe so nachsichtig aufgenommen werden wie die frühere.

Schließlich muß ich noch erwähnen, daß die Gelegenheit, Insecten im Allgemeinen und namentlich auch Forstinsecten gründlich zu studiren, sich immer mehr dadurch erweitert: daß präparirte Insecten käuflich in verschiedenen Gegenden von Deutschland zu haben sind, theils in einzelnen Stücken, theils in größern oder kleineren Sammlungen. Hr. Dr. Walzl in Passau in Baiern, Hr. Candidat Schlotthauer in Göttingen und Hr. Mechanicus Graff in Berlin erklären sich bereit, auf portofrei Anfragen nähere Auskunft darüber zu geben oder die gewünschten Gegenstände gleich zu übersenden. Die Preise sind im Ganzen von ihnen höchst billig gestellt, so daß man z. B. für 10 Thlr. schon eine recht hübsche kleine Sammlung der wichtigsten Forstinsecten erhalten würde.

Neustadt-Eberswalde, im Juli 1839.

*Ratzeburg.*

## Verzeichniss der in diesem Bande angeführten Schriften.

- Anhaltische Gartenbau-Zeitung m. Berücksichtigung d. Landwirtschaft v. Richter u. Naumann. Jahrg. 1. 1836. 4.  
*Annales de la société Royale d'horticulture de Paris. Tom. XIX-XXIII.*  
 Bechstein, Forstinsectologie. Gotha 1818. 8.  
 Behlen, Allgemeine Forst- und Jagdzeitung. Frankfurt a. M. 4.  
 Bouché, Naturgeschichte der schädlichen und nützlichen Garteninsecten. Berlin 1833. 8.  
 — Naturgeschichte d. Insecten, besonders in Hinsicht ihrer ersten Zustände. Lief. I. Berlin 1834. 8.  
 Brandt u. Ratsburg, Medizinische Zoologie. 2 Bände in 4. Berlin 1833.  
 Braunschweigisches Magazin. Stück 49. v. Jahre 1798.  
 Correspondenzblatt des Königl. Würtemb. landwirthschaftlichen Vereins.  
*Cours complet d'Agriculture ou dictionnaire universel d'Agriculture. T. XIII. Paris 1783. 4.*  
 Feistmantel, die Forstwissenschaft nach ihrem ganzen Umfange. 2 Abtheilungen. Wien 1835 in 8.  
 Frisch, Beschreibung von allerlei Insecten in Deutschland. Berlin 1766. 4.  
 Gleditsch, vier hinterlassene Abhandlungen, das practische Forstwesen betreffend. Berlin 1788. 8.  
 Gmelin, Abhandlung über die Wurmtrocknifs. Leipzig 1787. 8.  
 v. Haas, Beobacht. über die Rinden- oder Borkenkäfer m. einer Vorrede herausg. v. Köhler. Erlangen 1793. 8.  
 Hannöversches Magazin No. 35 vom 30sten April 1831. 4.  
 Hartig, Forstliches und forstnaturwissenschaftliches Conversationslexicon. Berlin 1834. 8.  
 — Forst- und Jagd-Archiv von und für Preussen. 8.  
 — Journal für das Forst- und Fischereiwesen. Stuttgart. 4.  
 — Jahresbericht üb. die Fortschritte der Forstwissenschaft und forstlichen Naturkunde i. d. Jahren 1836 u. 1837, nebst Originalabhandlungen.  
 Heer, *observationes entomologicae. Turici 1836. 8.*  
 Hegetschweiler in Denkschriften der allgem. Schweiz. Gesellschaft für die gesammte Naturwissenschaft. Bd. I. Abth. 2. Zürich 1833. 4.  
 Hennert, Über den Ranpenfraß und Windbruch in d. Königl. Preuss. Forsten in den Jahren 1791-1794. Leipzig 1798. 4. Aufl. 2.  
 Höss, Beschreibung der vorzüglichsten Forstinsecten und der bewährtesten Vertilgungsmittel (lithogr. ohne Jahreszahl).  
 Kollar, Naturgeschichte der schädlichen Insecten in Beziehung auf Landwirtschaft und Forstcultur. Wien 1837. 8.  
 Krünitz, öconomisch-technologische Bibliothek. Artik. „Maikäfer“ im 86ten Bande. Berlin 1802. 8.  
 Krutzsch, Geht der Borkenkäfer nur kranke oder geht er auch gesunde Bäume an? Dresden 1825. 8.  
 Liebig, Allgemeines Forst- und Jagd-Journal. Prag. 4. Jahrg. 1. von 1831.  
 v. Lincker, Der besorgte Forstmann, eine Zeitschrift. Bd. 1. Weimar 1798. 8.  
 London, the Gardeners Magazine. Vol. XII-XIV. (Darin die schönsten Abhandlungen von Westwood.)  
 — *Arboretum Britannicum* (ein Separat-Abdruck).  
 Pfeil, Neue vollst. Anleitung zur Behandlung, Benutzung und Schätzung der Forsten. Abth. 3. Forstschutz und Forstpolizeihre. Berlin 1811. 8.  
 — über Insectenschaden in den Waldern. Berlin 1827. 8.  
 — kritische Blätter. 8.

- Plieninger, der Maikäfer als Larve und als Käfer, eine gemeinfaßliche Belehrung über seine Verwüstungen und die Mittel gegen dieselben. Stuttg. und Tübingen 1834. 8.
- Preysler, Verzeichniß Böhmischer Insecten. Prag 1790. 4.
- Rösel, Monatliche Insectenbelustigungen. Nürnberg 1749. 4.
- Rossmäslers Forstinsecten. Leipzig 1834. 8.
- Rheingauer Weinbau. Frankfurt u. Leipzig 1765. 8.
- de la Rue, *Entomologie forestière*. Paris et Nancy 1838. 8.
- Schmidberger, Beiträge zur Obstbaumzucht und zur Naturgeschichte der den Obstbäumen schädlichen Insecten. Linz 1827-1836. 4 Hefte.
- kurzer, pract. Unterricht v. d. Erziehung der Obstbäume in Gartentöpfen. Linz 1828. 4.
  - leichtfaßlicher Unterricht v. d. Erziehung der Zwergbäume, mit einem entom. Anhang. Linz 1821. 8.
- v. Sierstorpff, über einige Insectenarten, welche den Fichten vorzüglich schädlich sind und über die Wurmtröcknuß der Fichtenwälder des Harzes. Helmstadt 1794. 8.
- über die forstmäßige Erziehung, Erhaltung und Benutzung der vorzüglichsten, inländischen Holzarten. Hannover 1813. 4.
- Sturm, Deutschlands Fauna in Abbild. u. d. Natur mit Beschreibungen. Nürnberg 1837. 8.
- Thiersch, die Forstkäfer oder vollständige Naturgeschichte der vorzüglichsten, den Gebirgsforsten schädlichen Insecten u. s. f. Stuttgart und Tübingen 1830. 4.
- Verhandlungen der Kaiserl. Leopoldinisch-Carolinischen Akademie der Naturforscher.
- Walter, Bemerkungen über die Verheerungen der Rüsselkäfer und einige Hülfsmittel zur Vertilgung derselben. Carlsbad 1826. 8.
- v. Wedekind, Neue Jahrbücher der Forstkunde. Heft 12. Darmstadt 1836.
- Wiegmann, die Krankheiten und krankhaften Mißbildungen der Gewächse. Braunschweig 1839. 8.

Schriftliche Beiträge für diesen Band verdanke ich folgenden, noch nicht in der Vorrede genannten Herren:

- Hrn. Dr. Apetz, Professor zu Altenburg.
- v. Berg, Königl. Hannöverschem Harz-Oberförster zu Lauterberg.
  - P. Fr. Bouché, Gartenbesitzer zu Berlin.
  - Borchmeyer, Grafl. Drost'schem Forstmeister zu Darfeld bei Münster.
  - Dr. v. Bulmerincq, Kaiserl. Russischem Hofrath, z. Z. in Deutschland.
  - Burckhardt, Königl. Hannöverschem Förster zu Bühren, Amts Münden am Solling.
  - v. Burgsdorf, Forstcandidaten, z. Z. in der Oberförsterei Juna bei Tilsit.
  - F. Eiber, Königl. Preufs. Oberförster zu Nenbrück bei Müllrose.
  - Eyber, Königl. Preufs. Oberförster zu Thale am Harze.
  - Dr. L. Fintelmann, in Schweden, früher Lehrer an der Akademie zu Mögelin.
  - Foertsch, Königl. Preufs. Oberförster zu Königshof bei Elbingerode im Harz.
  - Gadow, Königl. Oberförster zu Forsthaus Heinersdorf bei Schwedt.
  - Dr. Germar, Königl. Preufs. Professor zu Halle.
  - v. Glasenapp, Königl. Preufs. Obristlieutenant a. D. zu Freyenwalde.
  - Grafshoff, Königl. Preufs. Oberförster zu Schnöggersburg bei Magdeburg.
  - Haffelder, Privatförster in Kurland (durch die Kaiserl. Waldbau-Gesellschaft zu St. Petersburg eingesandt).
  - Dr. T. Hartig, Herzogl. Forstath u. Prof. in Braunschweig.
  - Dr. Heer, Prof. an der Universität Zürich.
  - Hennecke, Königl. Preufs. Oberförster zu Braunschweide im Harz.
  - Heyer, Stadtschreiber zu Lüneburg.
  - Kaboth, Königl. Preufs. Oberförster zu Dembio in Oberschlesien.
  - Kellner, Herzogl. Gothaischem Förster zu Zella im Thüringer Walde.
  - Klöckmann, Forstcandidat in Mecklenburg-Schwerin.
  - Lehmann, Grafl. Aronim'schem Forstmeister zu Boizenburg in der Uckermark.
  - Lehmann, Königl. Preufs. Oberförster zu Zinna im Regierungsbezirk Potsdam.
  - v. Löwenklau, Königl. Preufs. Regierungs- und Forstath zu Rheinsberg.
  - Lüdecke, Königl. Preufs. Oberförster zu Seyda auf Oberförsterei Annaburg im Herzogthum Sachsen.
  - Meix, Königl. Preufs. Oberförster auf Jagdschloß Boelland, Regierungsbezirk Oppeln.
  - Ménétries, Conservator am Kaiserl. Zoolog. Museum der Akademie zu St. Petersburg.
  - Meyer, Königl. Preufs. Forstmeister zu Sorau in der Lausitz.
  - v. Meyerinck, Königl. Preufs. Forstmeister zu Löderitz bei Dessau.
  - v. Pannowitz, Königl. Preufs. Oberforstmeister zu Oppeln.
  - Pape, Königl. Hannöv. Förster zu Lautenthal im Harz.
  - Pfeiffer, Königl. Preufs. Oberförster zu Corpellen, Forstinspection Osterode in Ostpreußen.
  - Peil, Forstcandidat, z. Z. in Falkenhagen bei Sinslow.
  - Dr. Plieninger, Königl. Würtemb. Professor zu Stuttgart.
  - Priem, Königl. Preufs. Oberförster zu Forsthaus Richlich, Forstrevier Schönlanke.



Hrn. Radzay, Königl. Preufs. Förster zu Sawade in Oberschlesien.

- Rafsmann, Königl. Preufs. Forstmeister, jetzt zu Königsberg in Pr., früher zu Creuznach.
  - v. Rottenberg, Königl. Preufs. Oberförster zu Carlsberg (Heuscheuer-Gebirge in Schlesien).
  - Schindler, Königl. Preufs. Forstinspector zu Posen.
  - Schlotthauber, Stud. Philos. zu Göttingen.
  - Schmidt, Königl. Preufs. Regierungsrath zu Stettin.
  - Dr. W. Schmidt, practischen Arzte zu Stettin.
  - Dr. Schott v. Schottendorf, Professor der Cameral- und Forstwissenschaft zu Tübingen.
  - Steinhoff, Königl. Hannöverschem Förster zu Amelth bei Sollinge bei Uslar.
  - Dr. Suffrian, Director der Schule zu Siegen im Feuerlande.
  - v. Thadden, Königl. Preufs. Oberforstmeister zu Stettin.
  - Thiersch, Königl. Sachs. Oberförster zu Eibenstock im Erzgebirge.
  - v. Türk, Königl. Preufs. Regierungs- und Schulrath zu Potsdam.
  - Utsch, Königl. Preufs. Oberförster zu Neunkirchen, Forstinspection Saarbrücken.
  - Dr. Waltil, Lehrer der Naturwissenschaften zu Passau in Bayern.
  - Warnkönig, Großherzogl. Badischem Förster zu Rippoldsau im Schwarzwalde.
  - v. Werder, Königl. Preufs. Feldjäger im Corps zu Pferde.
  - Zebe, Fürstl. Lichnowsky-Werdenberg'schem Oberförster zu Borotin in Oberschlesien.
  - Zimmermann, Königl. Preufs. Reviervorwalter zu Forsthaus Neuendorf bei Rheinsberg.
  - Zimmermann, interimistischem Oberförster zu Forsthaus Neuendorf bei Wittstock.
  - Zimmer, Förster zu Naschkau bei Düben.
-

## I n s e c t e n

sind sechsbeinige, wirbellose Thiere, welche durch Luftröhren athmen und die Geschlechtsöffnung am Ende des Körpers haben. Spinnen, Krebse, Kellerwürmer, Tausendfüsse u. s. w., welche Linné noch zu den Insecten rechnete, werden, da sie bald mehr Füße haben, bald durch Kiemen athmen, bald die Geschlechtsöffnung weiter vorn zeigen, jetzt nicht mehr dahin gezählt, bieten auch für den Forstmann wenig Bemerkenswerthes dar. Die Insectenkunde oder Kerflehre nennt man am Passendsten Entomologie (von *ἔντομον* und *λόγος*), und nicht Insectologie, weil dies ein aus zwei verschiedenen Sprachen entlehntes und zusammengesetztes Wort ist. Unter

## F o r s t i n s e c t e n

versteht man nicht etwa alle im Forste lebende Insecten, sondern nur diejenigen, welche auf das Gedeihen und die Brauchbarkeit der vom Forstmanne zu behandelnden Holzgewächse Einfluss haben. Die bisher über diesen Gegenstand erschienenen Schriften haben es so eingeführt und es ist auch so zweckmäßig, weil die Zahl wichtiger, zu beschreibender und abzubildender Gegenstände doch schon gross genug ist. Es bleiben also alle im Walde lebende, nicht zu den nutzbaren Hölzern und deren Nutzbarkeit in Beziehung stehende Insecten, mit Ausschluss einiger wenigen, täuschenden (s. unten), hier ausgeschlossen, selbst solche, welche nur an und in verwesenden Hölzern und Rinden vorkommen.

DIE FORSTINSECTEN-KUNDE BILDET EINEN THEIL DER INSECTEN-KUNDE UEBERHAUPT. Es giebt unter den Forstinsecten nicht blofs Insecten aus Einer Abtheilung sondern fast aus allen, d. h. nicht blofs Falter sondern auch Käfer, Aderflügler, Zweiflügler, Netzflügler, Geradflügler, Halbflügler und Ohnflügler; ferner nicht blofs aus der einen oder andern Familie oder Gattung dieser genannten, sondern oft aus vielen. Dennach kann das Studium der Forstinsecten nicht so ganz einseitig aufgefasst werden, sondern es bedarf allgemeiner Kenntnisse. Der Forstmann darf sich z. B. nicht auf die Kenntniss eines einzigen oder einiger weniger Borkenkäfer beschränken, sondern er mufs auch die aus allen bekannten Arten abstrahirten Kennzeichen (die Gattungs- und Familien-Charactere) kennen, um vorkommenden Falles auch eine bisher noch nicht als schädlich aufgeführte Art, der Gattung und Familie nach, ansprechen zu können. Dennoch wird sich dies Studium für ihn sehr vereinfachen dadurch, dafs er manche Familien und Gattungen, theils ganz theils halb, unberücksichtigt lassen kann, indem vieljährige Erfahrung sie als ganz unschädlich dargestellt hat, ja viele sich schon *a priori* als unschädliche ergeben. Die im Wasser und im Miste lebenden Insecten fallen sämmtlich aus. Eben so fast alle Tagfalter, weil sie bisher immer nur auf Kräutern gefunden wurden und es ihnen gewifs nie einfallen wird, auf Waldbäume zu gehen. Ebenso ein großer Theil der sonst so vieles Schädliche bergenden Rüsselkäfer u. s. f. Dagegen sind ganze Familien und Gattungen

wie die Familie der *Xylophaga* und die Gattungen *Bostrichus*, *Hylesinus*, *Eccoptogaster*, *Platypus*, die Gattung *Lophyrus* unter den Blattwespen u. s. f. durch und durch schädlich und nicht eine einzige Art lebt anders wo, als auf Hölzern. Man sieht schon aus diesen wenigen Beispielen, dafs die Forstinsecten eigne Rücksichten erfordern und daas man für sie mit einem vereinfachten System, mit einer vereinfachten Kunstsprache wird auskommen können. Dafs hier alle Auseinandersetzungen, welche blofs einen wissenschaftlichen Werth haben, wegfallen müssen, versteht sich von selbst, dafs also hier nicht von der verschiedenen Deutung und den verschiedenen Namen der Insectentheile, nicht von den verschiedenen Grundsätzen der Systematik u. s. f. die Rede sein kann, um so weniger als wir jetzt ein treffliches Buch haben, die Entomologie von Burmeister, in welchem Jeder, der das Bedürfnis fühlt, sich Belehrung holen kann. Ja wir müssen hier noch ausdrücklich hinzusetzen, dafs die Forstinsecten-Kunde sich über manche Vorschriften der wissenschaftlichen Entomologie hinwegsetzen darf, wenn sie dadurch eine Erleichterung des Studiums herbeiführt. Sie darf z. B. den Farben, weil sie von Jedem am leichtesten verstanden werden, einen grössern Werth einräumen als sie sonst haben, indem sie sonst nur als Artenkennzeichen benutzt werden dürfen. Sie darf Eintheilungen von der Lebensweise hernehmen, Charactere die nicht bei Forstinsecten vorkommen, unberücksichtigt lassen u. s. f. Wenn wir nun auch Kunstsprache und Eintheilung vereinfacht genannt haben, so ist damit natürlich nicht eine willkürliche Abänderung aller Sätze der wissenschaftlichen Entomologie gemeint. Wir müssen die meisten Theile der Insecten wie jene benennen, die Haupteintheilungen wie jene aufstellen u. s. f. und es wird daher nöthig, hier schon im Allgemeinen zu reden von der

CHARACTERISTIK DER FORSTINSECTEN. Wir geben diese nach der Verschiedenheit des Insects im ausgebildeten Zustande und in den frühern Zuständen, ohne uns hierbei aber schon auf die Abbildungen zu beziehen, welche erst bei der Characteristik der Ordnungen citirt werden, wo sie Jeder nachsehen könnte, der sie jetzt schon gebrauchen wollte.

Das ausgebildete Insect (Fliege Oken) zeigt beständig 3 Hauptabschnitte des Körpers: Kopf, Rumpf, Hinterleib, so wie auch stets Beine und allermeist Flügel. Am Kopfe (*caput*) unterscheiden wir zuerst gewisse, ziemlich willkürlich angenommene Gegenden wie die Seiten desselben als Wangen (*genae*) und die Oberseite: deren hinterster (oft durch Äugelchen bezeichneter) Theil Scheitel (*vertex*), deren mittelster (zwischen den grossen Augen liegender) Theil Stirn (*frons*) und deren vorderster (an die Mundtheile grenzender) oft durch eine Naht getrennter und eigenthümlich gebildeter Theil Kopfschild (*clypeus*) genannt wird; alsdann von der Natur wirklich gesonderte, bewegliche und unbewegliche Theile, wie die Augen, die Fühler und die Mundtheile. Die Augen (*oculi*) dienen dem Insect wirklich zum Sehen, wie jeder weifs und wie sich anatomisch aus den grossen, starken Sehnerven abnehmen läfst, obgleich wir den Prozeß nicht so bestimmt physiologisch und physikalisch erklären können wie bei den Wirbelthieren. Alle Insecten haben die beiden allgemein bekannten, grossen, facetirten oder zusammengesetzten Augen (*oculi compositi*) und viele auch noch 2-3 kleine, nicht facetirte Augen auf dem Scheitel (Äugelchen oder Nebenaugen oder glatte Augen, *oculi simplices* s. *ocelli*). Die Fühler oder Fühlhörner (*antennae*) dienen dem Insect zum Erforschen besonderer Eigenschaften der Umgebungen, vielleicht auch, wie dies jedoch durchaus noch nicht von den Physiologen und Anatomen hat erwiesen werden können, zum Hören. Sie sind stets nur 2 an der Zahl und stehen vorn und an den Seiten des Kopfes, vor oder zwischen den Augen. Sie sind stets gegliedert, haben aber bald nur wenige, bald sehr viele Glieder, wie sie denn auch hinsichtlich der Länge und anderer Bildungen ausserordentlichen Verschiedenheiten unterworfen sind und willkommene Gattungs- und Familien-Unterschiede geben. Im Wesentlichen sind sie borstenförmig (*setaceae*) wenn sie sich so allmählig wie eine Schweinsborste zuspitzen, oder fadenförmig (*filifor-*

mes) wenn sie am Ende nicht dünner werden und aus walzigen oder etwas kegelförmigen Gliedern bestehen, oder perlschnurförmig (*moniliformes*) wenn sie kuglige Glieder haben, oder gesägt (*serratae*) wenn ein Winkel so wie der Zahn an einer Säge vorspringt, oder gekämmt oder doppelt gekämmt (*pectinatae vel bipectinatae*) wenn die Zähne der einen Seite oder beider in lange Strahlen auslaufen, oder langhaarig (*plumosae*) wenn die Glieder mit Büscheln langer Haare besetzt sind, oder keulenförmig (*clavatae*) wenn die letzten Glieder allmählig dicker werden, oder geknöpft (*capitatae*) wenn sie sehr plötzlich anschwellen, oder geblättert (*perfoliatae*) wenn die letzten Glieder einen Kammsahnähnlichen oder blattartig breiten Fortsatz bekommen. Auch nennt man sie grade (*a. rectae*) im Gegensatz gegen gekrümmte oder gebrochene (*a. fractae*) welche ein längeres erstes (Schaft-) Glied haben und im (oft rechten) Winkel gegen dieses gerichtete folgende (Geißel-) Glieder. Die Mundtheile oder Fresswerkzeuge (*instrumenta cibaria*) dienen zum Kosten, Aufnehmen und Zerkleinern der Nahrung, so wie auch oft dazu den abzulegenden Eiern eine Aufnahme durch Benagen zu bereiten. Sie bestehen aus mehreren größern oder kleinern Theilen, welche in 4 mehr oder weniger deutlich über einander befindlichen Lagen geordnet sind und den Eingang des Darmcanals von allen Seiten umschließen. Von oben nach unten heißen sie: 1) Lefze oder Oberlippe (*labrum s. labium superius*) ein unpaariger an oder unter dem Kopfschilde liegender, meist flacher, lederartiger, behaarter, oder auch gewimperter Theil. 2) Oberkiefer oder Fresszangen (*mandibulae*) zwei horizontal sich gegen einander bewegende, meist sehr kräftige und hornige, spitze, gekrümmte Theile. 3) Unterkiefer (*maxillae*) zwei ebenfalls oft sich horizontal gegen einander bewegende, aber weichere Theile, deren jeder etwa in der Mitte seines Außenrandes einen Taster, (Unterkiebertaster, *palpus maxillaris*) trägt, welcher ein Fühler im Kleinen zu sein scheint. Bei vielen Insecten sieht man, daß der Unterkiefer aus mehreren Theilen, welche durch mehr oder weniger deutliche Nähte angedeutet werden, gebildet ist. Der wichtigste, allein nur beim Kauen oder Saugen thätige ist die Lade (*mala*), welche öfters in zwei Lappen getheilt ist, deren äußerer dann oft Ähnlichkeit mit einem Taster (bei *Chrysomela*) bekömmt und bei den Laufkäfern auch wirklich zu einem wahren innern 2-gliedrigen Taster wird. Hr. Erichson bemerkt, daß man die Unterkiefer-Lade nicht als ein einziges, in zwei Lappen getheiltes Stück betrachten müsse, sondern richtiger als zwei wesentlich getrennte Theile (äußere und innere Lade), von denen der eine oder andere wohl mitunter ganz fehlt und von denen der innere stets ungliedert ist, der äußere dagegen aus zwei, mehr oder weniger deutlichen Segmenten besteht, die bei *Carabus* u. a., wo er überhaupt tasterförmig ist, auch als zwei Glieder erscheinen. 4) Lippe oder Unterlippe (*labium s. labium inferius*) ein wieder unpaariger, den Mund von unten schließender Theil, welcher die größten Mannigfaltigkeiten darbietet und daher noch nicht ganz übereinstimmend bei den Schriftstellern behandelt wird. Hier daher nur so viel: Sie besteht meist aus einem mehr hornigen Theile, der Stütze (*fulcrum*), und einem mehr häutigen oder fleischigen, der Zunge (*lingula*), an welche dann nach innen noch sehr häufig sich ein Paar Lappen, die Nebenzungen (*paraglossae*) anlegen, deren allgemeinere Verbreitung erst durch H. Erichson nachgewiesen ist. An der Grenze von Stütze und Zunge, entweder an Seitenrande oder an der Außenfläche stehen ein Paar, ebenfalls gegliederte Taster (Lippentaster, *palpi labiales*). Endlich lehnt sich die Lippe an einen hornigen, mit dem Kehlrande in Verbindung stehenden Theil, das Kinn (*mentum*) welches man gewöhnlich als zur Lippe gehörig betrachtet. Es ist oft sehr große, einen festen Schutz den sämtlichen Mundtheilen gewährend, und bietet mannigfache, selbst für Gattungsunterschiede benutzte Bildungen. — Nun ist aber noch wohl zu bemerken: daß wenn die genannten Mundtheile deutlich getrennt und frei beweglich sind (wie z. B. bei allen in diesem Theile beschriebenen Forstinsecten) man sie beißen de nennt, und daß, wenn die einen oder die andern mehr oder weniger fest mit einander verbunden sind (z. B. zu einem

Schnabel, einem Rollrüssel, einem Saugrüssel, einem Schöpfrüssel) wobei gewöhnlich die Taster undeutlich werden oder zum Theil ganz schwinden, man sie saugende nennt. Der zweite Hauptabschnitt, der Rumpf (*truncus*) besteht wieder aus mehreren (ebenfalls sehr verschiedenen von den Schriftstellern dargestellten) mehr oder weniger fest mit einander verbundenen Theilen: dem meist auch wieder aus 2 Stücken (*Pro- et Mesothorax*) zusammengesetzten Halsschilde (*thorax*), dem Schildchen (*scutellum*) und dem Hinterstücke (*Metathorax*). Die Oberseite derselben nennt man auch wohl Rücken (*dorsum*), die Unterseite Brust (*pectus*). Diese und noch subtilere Unterscheidungen werden aber bei den Forstinsecten selten nöthig und man kommt gewöhnlich mit den Ausdrücken Halsschild und Schildchen aus. Zu den beweglichen Theilen des Rumpfes gehören die Flügel und die Beine. Die Flügel (*alae*) sind besonders wichtig, weil sie die hauptsächlichsten Ordnungscharactere bei Linné abgeben, und auch für die Bestimmung von Familien und Gattungen, selbst der Arten gebraucht werden. In der Regel haben die Forstinsecten 2 Paare: ein vorderes oder nach seiner Lage in der Ruhe das obere und dann ein hinteres oder unteres. Zuweilen fehlt das hintere ganz oder wird durch kleine Rudimente angedeutet, zuweilen fehlen sie beide, und zwar entweder nur einem Geschlecht (meist dem Weibchen) oder beiden. Nach der verschiedenen Zahl und Substanz derselben — ob sie fest oder häutig sind — werden wir die Ordnungsscharactere gebildet sehen, so wie auch von der Aderung der Flügel n. a. w. erst später im Einzelnen geredet werden wird. Den beim Fluge nach vorn gewendeten Rand derselben nennt man Vorderrand und den dem vorigen entgegengesetzten, freilich nie ganz parallelen, sondern immer etwas mehr nach innen gewendeten den Innenrand und den die beiden vorigen verbindenden den Hinterrand (der wohl besser der Aufsenrand heißen könnte). Die Stelle an der Basis des Vorderrandes nennt man Schulter, den vom Vorder- und Hinterrande gebildeten Winkel Vorderwinkel und den vom Hinter- und Innenrande gebildeten Hinterwinkel. Die Beine (*pedes*) bestehen aus 4 gegen einander beweglichen Theilen: Hüfte (*coxa*), Schenkel (*femur*), Schiene (*tibia*), Fuß (*tarsus*). An der Basis des Schenkels findet sich noch ein besonderes Stück, der Schenkelhöcker (*trochanter*), so wie auch an diesem wie an den andern Theilen noch mancherlei, später im Einzelnen zu erwähnende Bildungen sich zeigen. Der Fuß besteht immer aus mehreren, frei beweglichen Gliedern, deren letztes ein Paar gekrümmte zum Festhalten an Zweigen und Blättern dienende, Haken (*unguiculi*) und zwischen diesen oft noch die sogenannten Söhlchen (*plantulae*) zeigt. Endlich besteht der dritte Hauptabschnitt, der Hinterleib (*abdomen*), wieder aus mehreren Abschnitten, den Hinterleibsringen (4-8 an der Zahl), welche aus einer obern und untern Hälfte bestehen. An der Seite, dem Einschnitte (*incisura*), liegen gewöhnlich die Lufthöhlen (*stigmata*), durch welche das Insect den im Innern verzweigten Luft- oder Athemröhren (*tracheae*) Luft zuführt. Diese Hinterleibsringe zeigen mancherlei Verschiedenheiten, sowohl ihrer Gestalt nach, wie auch der Anheftung an den *Metathorax* nach: — der ganzen Breite nach ansitzend heisst der Hinterleib: verwachsen (*connatum*), und nur mittelst einer kleinen Stelle verbunden: sitzend (*sessile*) oder gestielt (*petiolatum*) — so wie auch nach den neben After und Geschlechtsöffnung befindlichen längern oder kürzern Fortsätzen — den zum Verwunden oder zum Eierablegen, oder gewissen Aussonderungen zum Auswege, oder bei der Begattung zum Festhalten, dienenden Zangen, Röhren, Stacheln, Bohrern, Legeröhren. — Schließlich ist hier von dem ausgebildeten Insect noch zu bemerken, daß es öfters mannigfaltig in der Größe und in der Farbe abändert. Gewöhnlich sind die frisch ausgeschlüpften Exemplare heller, die ältern dunkeler. Die Männchen sind meist kleiner als die Weibchen, jedoch kommen auch zufällig große Männchen und kleine Weibchen vor. Dann glauben die Laien, der Käfer, der Schmetterling oder die Fliege wachse noch. Dieser Irrthum darf hier wohl nicht weiter bekämpft werden. Aber auch in andern Eigenschaften sehen wir Männchen und Weibchen häufig abweichen, und dann wird

man oft verleitet, sie für verschiedene Arten zu halten, wenn man sie nicht in der Begattung trifft. Dergleichen Geschlechtsverschiedenheiten finden sich bei dem einen Insect an diesem, bei dem andern an jenem Theile, am Häufigsten an den Fühlern, welche beim Männchen schöner sind, d. h. länger, gekümmter u. s. f. als bei dem Weibchen. Zuweilen bemerkt man dagegen gar keine äußere Geschlechtsverschiedenheiten und dann muß man die Begattung beobachten oder die Geschlechtstheile selbst durch eine Section entblößen, was selbst bei den kleinsten Thieren, wie den Borkenkäfern, nicht gar zu schwer ist, indem man nach einiger Übung schon durch einen Druck zwischen den Nägeln das, was nöthig ist, sieht; bei dem Weibchen treten dann nämlich Eier hervor oder man sieht, wenn man ein Mikroskop hat, auch die eigenen Anhänge der Legeröhre dicht vor ihrer Mündung. Bei dem Männchen wird man noch mehr versichert, indem die heraustretende Ruthe meist lang und bornig und von einem Paare Klappen begleitet ist. Unter dem Mikroskop sieht man auch ziemlich leicht den langen Samen-Abführungsgang, so wie auch die Anhänge der sogenannten Samenblasen und selbst zuweilen die kleinen, weichen kugligen Hoden.

Die früheren Zustände sind die des Eies, der Larve und der Puppe. Die Eier bieten die geringste Mannigfaltigkeit, desto mehr die Larven, welche daraus hervorkriechen und die aus diesen sich entwickelnden Puppen. Beide sind entweder einander ähnlich oder gänzlich unähnlich. Ersteres charakterisirt die Insecten mit unvollkommener Metamorphose (*insecta ametabola*), letzteres die mit vollkommener Metamorphose (*insecta metabola*). Diese Unterscheidung ist sehr wichtig, weil eine Haupteintheilung der Insecten darauf gegründet wird, die auch selbst dem Forstmanne die wichtigern Insecten von den unwichtigern unterscheiden hilft. Die wichtigern Forstinsecten wie Käfer, Falter, Aderflügler und Zweiflügler sind nämlich durchgängig *Metabola* und die übrigen größtentheils *Ametabola*. Im Wesentlichsten unterscheiden sie sich so: Während bei den *Ametabolis* die Puppe der Larve sehr ähnlich ist und so gut wie diese sich bewegt und frisst, so ist dies bei den *Metabolis* nicht der Fall. Diese sind bei Weitem die wichtigsten und mannigfaltigsten und von ihnen soll auch vor allem hier die Rede sein. Ihre Larven haben stets einen gegliederten, allermeist langgestreckten, selten kürzern und gedrungenern Leib, weshalb sie der Laie auch nicht ganz unpassend Wurmern vergleicht. Ihre Glieder, 12 an der Zahl, heißen, nach der Analogie der Hinterleibsringe der ausgebildeten Insecten, Ringe. Sie bestehen, wie jene, aus einer obern und untern Hälfte und haben auch meist nahe dem Einschnitte die Luftlöcher, deren man hier gewöhnlich 9 Paare antrifft. Aufser diesen 12 Ringen haben die Larven meistens auch noch einen Kopf, der jedoch dem des vollkommenen Insects selten ähnlich ist, indem Augen und Fühler entweder ganz fehlen oder, wenn sie vorhanden sind, ganz anders erscheinen. Auch die Mundtheile derselben weichen häufig ganz von denen des ausgebildeten Insects ab, besonders wenn dieses saugende hat. Noch veränderlicher ist die Gegenwart der Beine; in den meisten Ordnungen finden wir Larven mit und ohne Beine. Wenn sie fehlen, so bemerkt man entweder gar keine Spur oder an der Stelle derselben kleine, behaarte Wülste. Sind sie vorhanden, so nennt man die 6 ersten Brustbeine und die folgenden Bauchbeine. Die ersteren sind stets gegliedert, die letztern meist nicht. Nach der Zahl dieser Beine so wie nach der Gegenwart oder Abwesenheit eines Kopfes kann man die meisten und wichtigsten Forstinsecten schon im Larvenzustande erkennen. So sind alle bein- und kopflose Larven (vorzugsweise Maden genannt) Zweiflügler oder Aderflügler, die mit einem Kopfe versehen beinlosen (auch wohl noch Maden genannt) oder 6-beinigen (zum Theil Engerlinge) Käfer oder Holzwespen, die 10- bis 16-beinigen (Raupe) Falter und die 18- bis 22-beinigen (Afterraupen) Blattwespen u. s. f. Auch ausserdem zeigen die Larven noch große Mannigfaltigkeit in der Form, Oberfläche, Behaarung und Farbe der Ringe, in der besondern Beschaffenheit des letzten Ringes, in der Stellung der Luftlöcher u. s. f. Die Puppen der *Metabola* zeigen schon alle Theile des vollkommenen Insects, nur in anderer Lagerung, anderer

Consistenz und anderer Farbe und Behaarung, und zwar entweder alle sehr deutlich, wie vom Bildhauer ausgearbeitet (geweißelte Puppen), oder nur einige und auch diese nicht ganz deutlich (maskirte Puppen), beide können nackte oder verhüllte sein, je nachdem sie frei liegen oder noch von einer Hülle (*folliculus*, *cocon*) umschlossen sind.

**VORKOMMEN.** Die meisten Forstinsecten kommen nur auf und in gewissen Hölzern vor und finden sich daher nur in den Gegenden, wo diese sind, ja meistens nur da, wo diese in Beständen wachsen. Auch dürften unter ihnen nur wenige sein, die auf ein kleines Vorkommen beschränkt sind. Von den meisten wissen wir es bereits, daß sie fast durch das ganze nördliche Europa und selbst durch einen Theil des mittlern vorkommen.

**LEBENSWEISE.** In der Lebensart der Forstinsecten zeigt sich die größte Mannigfaltigkeit und wir können an ihnen alle an den Insecten überhaupt so sehr bewunderten Eigentümlichkeiten wahrnehmen, Grund genug, ihnen für immer die Aufmerksamkeit der Forstmänner zu sichern. Es ist dabei besonders auf folgende Punkte zu achten. 1) Die Zeit des Erscheinens in den verschiedenen Zuständen. Der Forstmann muß genau wissen, zu welcher Zeit das Insect in dem einen oder andern Zustande da ist, weil es gewöhnlich nur in dem einen oder andern angreifbar ist. Gewöhnlich durchläuft es alle 4 Zustände einmal im Jahre, oder mit andern Worten, es macht alljährlich eine Brut — sogenannte einfache Generation, — oder es durchläuft sie mehrere Male, macht 2-3 Bruten — sogenannte zwei- bis dreifache Generation, — oder endlich es braucht zur Ausbildung einer Brut mehrere Jahre — mehrjährige Generation. — Wahrscheinlich haben mehr Insecten eine mehrjährige Generation, als wir gewöhnlich annehmen, worüber noch spätere, sorgfältige Beobachtungen entscheiden müssen (s. deshalb die neuen Beobachtungen über *Anobium emarginatum* und *Curculio glandium*). Höchstwahrscheinlich wird diese dann, wenn wir z. B. inmitten des Sommers bei Insecten mit vermeintlicher einfacher Generation neben vollkommen ausgebildeten Insecten noch halbwüchsige Larven finden, die dann natürlich schon im vorigen Jahre gesetzt sind und erst im nächsten Jahre ausschlüpfen. Hier muß ich noch der von mir angenommenen anderthalbigen Generation erwähnen. Es kommt nämlich vor, daß Insecten entweder immer, oder nur in 2 auf einander folgenden für sie günstigen Jahren, 3 Bruten machen, d. h. es dauert die erste Brut vom Frühjahr bis zum Nachsommer des ersten Jahres, die zweite von da bis zum Vorsummer, und die dritte alsdann bis zum Herbst des zweiten Jahres. In diesem Falle findet man bald Larven bald Puppen im Winter. Zur Zeit eines großen Frafes kommt es aber auch vor, daß die Insecten gar keine bestimmte Periode halten und daß wir zu jeder Zeit Larven finden. Alsdann ist also beständige Aufmerksamkeit nöthig und es genügt nicht, in einem Raupenkalender oder in einem Buche wegen der Entwicklungszeiten nachzusehen und danach Maßregeln treffen zu wollen. 2) Der Ort, an welchem sich das Insect, und zwar wieder in verschiedener Entwicklung findet, ist eben so sehr zu beachten, weil nicht an jedem das Thier erreicht werden kann. Nur so lange es sich an oder unter der Erde, oder an den untern Baumgegenden findet, kann man es bequem vertilgen. 3) Auch der Fraß ist zu beachten. Bei allen schädlichen Forstinsecten (vielleicht nur mit Ausnahme der Spanischen Fliegen) werden die Larven durch ihren Fraß schädlich, bei den meisten Käfern und einigen Halblüglern und Geradflüglern auch zuweilen das ausgebildete Insect. Dabei ist es höchst wichtig, nicht bloß die Nahrungspflanze zu kennen, sondern auch die befallenen einzelnen Theile oder Systeme derselben, so wie auch selbst die Jahreszeit, zu welcher der Fraß Statt findet. Danach treten die wichtigsten Modificationen der forstlichen Bedeutung ein. Auch schon deshalb wird diese Beobachtung belohnen, weil man durch sie größtentheils zum Namen des Insects, wenn man dasselbe noch nicht kennen sollte, gelangen könnte. In ihrem Fraße sind sie nämlich eben so charakteristisch wie in der Bildung ihrer Fühler, Flügel u. s. f. Auch die nützlichen Insecten sind entweder bloß im Larven-

oder auch im ausgebildeten Zustande auf die Zerstörung der schädlichen Insecten angewiesen. Wohl zu beachten ist, daß der Nutzen dieser Insecten auch wieder sehr geschmälert werden kann, indem sie sich einander selbst verzehren. Die Raubkäfer fressen nicht bloß schädliche Raupen, sondern auch ihre eigenen Larven und die in den Raupen und Puppen befindlichen Larven und Puppen der Ichneumoniden, wogegen sich letztere dadurch rächen, daß sie wiederum Raubkäfer-Larven, in welchen sie ihre Bruten haben, zerstören. Diese merkwürdigen Erscheinungen, von denen ich noch nirgends mit Bestimmtheit reden gehört habe, beobachtete ich im vergangenen Herbst bei einem Raupenfraße der *Bombyx Pini*. Dadurch wird aber doch der Nutzen dieser Thiere nicht ganz aufgehoben, indem diese gegenseitige Befindung erst dann merklich eintritt, wenn der Raupenfraß schon so bedeutend geworden ist, daß er von selbst anhört. Vielleicht ist darin eine weise Einrichtung der Natur zu erkennen und sie erspart einem großen Theile jener Thiere den Hungertod! Davon mehr im Einzelnen. 4) Die Menge, in welcher die Insecten erscheinen. Diese ist bei einigen immer beschränkt, bei andern nur in gewissen Jahren. Manche fehlen in keinem Jahre ganz und erscheinen dann plötzlich in ungeheurer Anzahl. Darüber muß man nothwendig die Erfahrung befragen, denn wenn man nach der Seltenheit der Raupen der Nonne und der Forleule, nach der Seltenheit gewisser Borkenkäferarten, wie wir sie oft genug in gewissen Jahren beobachten, auf Unschädlichkeit derselben schließen wollte, würde man sich sehr täuschen. Sie nehmen plötzlich Überhand und werden zur schrecklichsten Geißel. 5) Auch die Beweglichkeit der Forstinsecten ist sehr zu berücksichtigen: ob sie als vollkommene Insecten bloß laufen oder auch fliegen, und ob sie dann weite Flüge unternehmen oder nicht, ob zu allen oder nur zu gewissen Zeiten, ob sie ferner als Larven sehr beweglich sind oder nicht u. dergl. Danach richtet sich die Aufmerksamkeit, welche man auf sie auf größeren Strecken zu richten hat, die Rücksichten, welche man bei Anlegung von Fanggräben und Verschüttung derselben zu nehmen hat u. dergl. Obgleich bei dem einen oder andern Insect noch andere Eigenthümlichkeiten in der Lebensweise hervortreten, so gehören diese doch mehr zum speciellen Theile, und wir gehen von der Betrachtung der wichtigsten allgemeinen Sätze über zu der daraus hervorgehenden

FORSTLICHEN BEDEUTUNG. Das Erste und Allgemeinste, welches hier in Betracht kommt, ist die schon beim Fraße erwähnte Schädlichkeit oder Nützlichkeit, namentlich ist dort von den nützlichen Insecten schon etwas ausführlicher geredet. Hier nur noch von den schädlichen, d. h. solchen, welche den normalen Zustand der Holzgewächse auf irgend eine Art verändern. Dies können sie im höhern oder geringern Grade durch übergroße Vermehrung, oder Verletzung mehr oder weniger wichtiger Theile. Geschieht es in einem so geringen Grade, daß Wuchs und Brauchbarkeit des Holzes nicht gefährdet werden, oder daß gar nur verwesende Theile von ihnen befallen werden, so sind sie gleichgültige. Geschieht es in höhern Grade, so daß entweder die technische Brauchbarkeit der Stämme leidet (technisch schädlich) oder daß wohl gar der Wachsthum der Bäume leidet (physiologisch schädlich), so können sie sein: unmerklich schädlich, wenn sie bloß Klaffer- (Brenn-) Hölzer in Menge befallen, oder an lebenden in so geringer Menge fressen, daß kein fühlbarer Schaden durch sie erwächst; oder merklich schädlich, wenn sie schon in so großer Anzahl erscheinen oder bei geringerer Anzahl doch so wichtige Gewächstheile befallen und so gefährlich verwunden, daß der Zuwachs merklich leidet oder junge zarte Stämmchen wohl gar eingehen: oder endlich sehr schädlich, wenn sie in so ungeheurer Menge erscheinen und so wichtige Theile der Gewächse befallen, daß diese danach bald in Menge eingehen. Diese Abstufung der Schädlichkeit, welche Hr. Saxesen, wie er mir mittheilte, in seiner Schrift über die Insecten der Harzfichte gebrauchen wird, und die ich mit geringen Abänderungen angenommen habe, bietet gegen die frühere Eintheilung der Forstinsecten in mehr oder minder schädliche wesentliche Vortheile, indem man mit Hilfe der-



selben sich bestimmter und eben so kurz über die forstliche Bedeutung der Insecten aussprechen kann. Hr. Saxen wird dazu noch die zufälligen ziehen als solche, welche sich an einer Holzart sehen lassen, zu der sie unsers Wissens in keiner Beziehung stehen, und dann noch zweifelhafte als solche, deren Lebensweise überhaupt noch nicht in den wesentlichsten Punkten aufgeklärt ist. In diesem Werke kann nur von den sehr schädlichen und merklich schädlichen die Rede sein, und nur dann von unmerklich schädlichen und gleichgültigen, wenn sich aus Gründen ein Vorrücken derselben auf eine höhere Stufe der Wichtigkeit vermuthen läßt, oder wenn sie als täuschende bekannt geworden sind. So nenne ich solche, deren Treiben leicht mit dem eines merklich oder sehr schädlichen Insects verwechselt werden könnte und die den Forstmann daher leicht verleiten, Mafsregeln gegen sie ohne Noth und zum Nachtheile des Forstes zu ergreifen. Solche Insecten, die aber blofs in großer Menge im Walde umherfliegen, wie verschiedene kleine Falter oder Fliegen, deren Larven sich oft zu Millionen von den nicht Holzigen Gewächsen ernähren, können nicht mit zu den täuschenden gerechnet werden; sonst würde ihre Anzahl, im Verhältnifs zu der nothwendigen Raumbeschränkung eines Forstinsecten-Werkes, zu groß. Sie würden reichlich ein eignes Werk füllen. Nach Ermessen der forstlichen Bedeutung der Insecten schreiten wir nun, mit Berücksichtigung der Eigenthümlichkeiten in der Lebensweise derselben, zur

**BEGEGNUNG UND AUFFINDUNG.** Es wird hier zwar das Wichtigste schon im Allgemeinen angedeutet, allein es ist nöthig dasselbe durch die im zweiten Theile vorkommenden sehr ausführlich beschriebenen Beugungsmittel, welche sich besonders auf die Falter beziehen, zu vervollständigen. Die Falter sind eben diejenigen Forstinsecten, gegen welche die meisten Mittel in Anwendung gebracht werden. Den schädlichen Forstinsecten sind zwar schon eine Menge Feinde gesetzt, nicht blofs in den schon erwähnten nützlichen Insecten, sondern auch in allerlei andern Thieren, besonders Vögeln und kleinen Säugethieren, selbst einigen Amphibien, auch hilft die Natur wohl durch meteorische und climatische Einflüsse, besondere Witterungserscheinungen, welche besonders in den Häutungsperioden sehr wirksam werden können, und dergleichen, dennoch ist diese Naturhülfe oft nicht ausreichend, oder würde zu spät kommen, wenn der Mensch nicht eingriffe durch Vorbauung und Vertilgung. Es ist der verderblichste Grundsatz, Alles der Natur überlassen zu wollen, und zu glauben: was dieser nicht möglich sei, könne der Mensch auch nicht erzwingen; was von Bäumen eingehen solle, werde doch eingehen, weil es krank sei, wenn es von Insecten befallen werde, und dergleichen. Die Geschichte der Borkenkäferverheerungen lehrt, wie wir später sehen werden, dafs man bei diesen Grundsätzen ungeheuer eingebüßt hat und bei entgegengesetzten seine Bestände erhält; denn, wenn es auch wahr ist, dafs alle Insecten kränklüche Pflanzen lieber anheilen als gesunde, so ist es doch eben so wahr, dafs sie die gesunden lieber anfallen als verborgenen und dafs man sie so weit nicht kommen lassen darf. Im Forste hat man dies zu oft gesehen, und es bedarf daher auch weiter keiner Beweise, wenn auch von vielen Theoretikern das Gegentheil angenommen und mit Gründen scharfsinnig vertheidigt worden ist. Solche Erfahrungen, wie man sie beim Borkenkäfer gemacht hat, überleben uns aller Gegentheorien. Man mufs sich also unablässig bemühen, den schädlichen Insecten zweckmäfsig zu begegnen, und darin ist dem Scharfsinne des practischen Forstmannes noch weites Feld offen. Je mehr wir in der richtigen Erkenntniß der Insecten fortschreiten und uns gegenseitig verstehen, in dem Mafse werden wir auch derselben mehr Herr werden. In diesem Punkte fühle ich, wird diese Schrift auch besonders der Vervollständigung bedürfen, und ich werde nicht unterlassen, wenn ich am Leben bleibe, diese zu sammeln und von Zeit zu Zeit in kleinen Textnachträgen nachzuliefern. Im Allgemeinen begegnen wir den schädlichen Forstinsecten durch Verhütungs- und Vertilgungs-Maafsregeln. Erstere sollen die noch nicht vorhandene aber drohende Gefahr abwenden, letztere die schon wirklich eingetretene nach Kräften beseitigen, um doch wenigstens,

wenn in den eignen Revieren nicht mehr zu helfen ist, die Pflicht gegen die Nachbarn zu erfüllen. Ofters fallen beide zusammen, dann z. B. wann wir Rüssel- und Borkenkäfer, wenn sie noch nicht zu sehr Überhand genommen haben, an gewisse Gegenstände anlocken, darin vernichten und dadurch ihre weitere Verbreitung verhüten. Solche Gegenstände sind besonders die sogenannten Fangbäume. Man hatte längst erfahren, daß viele Insecten, besonders Käfer, am liebsten an solche Bäume gehen, in denen die Säfte anfangen zu stocken, also an gedrückte, geworfene und selbst gefällte. Daher fällt man absichtlich im Frühjahr oder im Sommer hier und da Stämme, besonders unterdrückte Stangen, weil diese ohnehin unbrauchbar, den Insecten aber gerade die liebsten sind, und warf sie hin. Die ausliegenden Käfer versammelten sich hier alsbald aus der ganzen Gegend, bohrten sich ein und legten ihre Eier unter der Rinde ab. Man wartete dann, nach Maafsgabe der Entwicklungsdauer eines jeden Insects, den Larvenzustand ab und verbrannte oder entrindete dann die Bäume. Den rechten Zeitpunkt darf man natürlich nicht verpassen, denn, vergiftet man die Fangbäume und läßt die Käfer ausfliegen, so hat man die Hecke nur noch begünstigt. Einige Aufmerksamkeit ist dabei nöthig. Bisher hat man nur Nadelhölzer als Fangbäume benutzt, es fragt sich aber, ob für gewisse Insecten nicht auch Laubbölzer benutzt werden könnten, z. B. für *Eccoptogaster*. Nach der Analogie der Fangbäume hat man später auch mit andern Fangegegenständen glückliche Versuche angestellt, namentlich mit Bündeln von Nadelholzweigen und mit Fichtenrindenstücken, welche im Reviere zerstreut ausgelegt werden. Die Insecten, welche sich darin und darunter gern versammeln, werden dann täglich eingesehen und vertilgt. Reine Verhütungs- oder Vorbauungs-Maafregeln sind dagegen folgende: Zuerst, wie sich von selbst versteht, die Erziehung gesunder Bestände, dann das Reinhalten des Reviers von allerlei Gegenständen, welche die Vermehrung der Insecten unbemerkt begünstigen. Theils hat dies der Forstmann in seiner Gewalt, theils aber auch, wie es scheint, nicht; indessen ist der Zweck doch so hoch wichtig, daß man zur Erreichung desselben alle Mittel anwenden mußte und schon mancherlei Opfer bringen könnte. Es unterliegt nämlich nicht dem geringsten Zweifel, daß viele Insecten, namentlich Käfer, wie wir bei den Borken- und Rüsselkäfern sehen werden, zuerst und am liebsten in den ungerodet gebliebenen Stöcken, wie auch in allerlei Abfällen der Nadelhölzer, Ästen, Zweigen, Rindenstücken und dergl., ja manche nur ganz allein in diesen brüten. Benutzen wir ihnen also diese Brutplätze, so muß ihre Vermehrung natürlich unterdrückt werden. Wenn sie auch nicht ganz eingehen, so werden sie doch immer nur kümmerlich bestehen, weil sie in so geringer Menge den gesunden Stämmen durchaus nichts anhaben können. Das Weitere bei *Curculio Pini*, *Bostrichus bidens* u. s. w. Hier nur noch im Allgemeinen: daß man aus einigen, nicht mit dem erwünschten Erfolge gekrönten, Versuchen auch die Unzulänglichkeit des Stockrodens hat abnehmen wollen. Dadurch, meine ich, soll man sich durchaus nicht abschrecken lassen, solche Versuche zu wiederholen und sie ganz besonders so weit wie möglich auszudehnen. Einige Hundert Morgen gerodet, wollen noch nichts sagen, da die so leicht beweglichen Rüsselkäfer von sehr entfernten Revieren überfliegen oder sich wohl gar auf einzelne, unbeachtet gebliebene Stöcke in desto größerer Menge ziehen. Man mußte daher auch auf diese die größte Aufmerksamkeit richten und Prämien auf die Auffindung solcher vergessenen setzen. Nicht unbemerkt darf ich hier aber lassen, daß auch Holzplätze als Brutplätze schädlicher Insecten zu betrachten sind und ganz besonders auf diesen wieder die Stockholzklaftern. Man mußte diese also immer, so viel wie möglich, von Revieren fern halten. Daß das längere Stehenbleiben von Deputathölzern im Reviere wirklich nachtheilige Folgen für dasselbe gehabt hat, meldete man schon mehrere Male. Zweitens wird man auch öfters Insectenfräfs durch die Auswahl der Kulturmethoden verhindern können. Es ist häufig beobachtet, daß das Anlegen von Pflanzlöchern die Maikäfer in den weichen Boden lockte, daß das Auspflanzen im Schatten erwachsener junger Kiefern besonders häufige Insectenangriffe auf diese herbeiführte u. s. f. Aber auch drittens zur Verhin-

derung von Insectenangriffen auf schon gefällte Stämme, besonders werthvolle Nntzhölzer, kaun etwas gethan werden durch frühzeitiges Entrinden, durch Fällung zur rechten Zeit und dergleichen im Einzelnen zu erwahnende Vorsichtsmaafsregeln. Herr D. Fintelmann will durch Versuche, die er nach häufigerer Wiederholung bekannt machen wird, gefunden haben, dafs manche Insecten an umgekehrte, d. h. mit dem Zopfende nach unten gestellte Hölzer nicht gehen. Zu den Vorbaunungsmitteln würden auch die sogenannten Raupenzwinger gehören. Da ich sie aber für unwirksam und kostspielig halte und hier viele Theorien zu bekämpfen sind, so verspare ich sie bis zum dritten Theile, wo sie bei Gelegenheit der Ichneumonien weitläufig berücksichtigt werden sollen. Zur Begründung der hier ausgesprochenen Meinung nur so viel: Noch nie haben sie, so viele man deren anlegte, den erwünschten Erfolg gehabt, ja man hat immer wieder, wenn trotz Raupenzwingern Raupenfrass drohte, in der Verzweiflung zu andern Mitteln schreiten müssen. Endlich darf hier nicht unerwähnt bleiben, dafs auch die Erziehung gemischter Bestände als Schutz gegen schädliche Insecten empfohlen worden ist, und gewifs nicht mit Unrecht. Nadelhölzer leiden erfahrungsmäfsig viel mehr von Insecten als Laubhölzer, und grofse Nadelholzbestände wieder mehr als einzelne Horste, wahrscheinlich weil die Nadelholzinsecten, die meistens streng an ihren Frass halten, gern unmittelbar von einem Baume zum andern gehen und die Unterbrechungen nicht leiden, auch in solchen, die Vögel mehr herbeilockenden, Gegenden mehr kurz gehalten werden. Bisher hat man aber wenig darauf geachtet, wohl auch nicht durch diese Rücksicht sich leiten lassen können. Im Gegentheil breiten sich die Nadelholzanlagen und mit ihnen auch die schädlichsten Insecten immer mehr aus, selbst in den südlichsten Gegenden unsres Vaterlandes, wo man früher den Borkenkäfer und Rüsselkäfer kaum kannte. Unter den reinen Vertilgungsmaafsregeln nimmt das Sammeln den ersten Platz ein. Viele der schädlichsten Insecten, namentlich Maikäfer, Falter und Blattwespen, werden immer nur auf diese Weise wirksam vertilgt werden können. Man sollte meinen, dazu wäre weiter kein Insecten-Studium nöthig. Dennoch ergibt sich bald, dafs dem nicht so ist und dafs dies Sammeln immer mit Rücksicht auf die Lebensweise des Insects unternommen werden mufs. Manche Insecten sammelt man nur leicht im Larven- und im Puppenzustande, andere zerstört man schon als Eier, andere erst im ausgebildeten Zustande. Beim Einsammeln der ruhenden Larven, der Puppen und Eier, wenn dieses vom Schutzbeamten einmal mit Berücksichtigung von Ort und Zeit bestimmt ist, findet sich das Übrige ziemlich von selbst, d. h. die nöthigen Hölzer oder eisernen Geräthe zum Aufscharen des Moores, zum Zerdrücken oder Abkratzen der Eier oder Puppen an den Bäumen u. s. f. (wovon jedoch beim Einzelnen so ausführlich wie möglich geredet werden soll), bildet sich ein jeder denkende Forstmann am liebsten nach eigener Angabe. Eben so läfst sich über das Anstellen der Arbeiter, über Beaufsichtigung derselben u. A. wenig Allgemeines sagen. Eine Hauptsache ist dabei, einen tüchtigen Vorarbeiter zu haben oder wie sie bei uns sagen, einen Gewerker. Ein solcher müfste auch auf Revidieren, die vorzugsweise von Insectenfrass zu leiden haben, wie in Fichtengebirgsforsten, beständig umhergehen und auf beginnenden Insectenfrass achten. Über das Einsammeln der aufsen an den Hölzern fressenden Insecten, sowohl der Larven als auch der ausgebildeten Insecten, namentlich der Käfer, würde hier noch ein Wort im Allgemeinen nöthig sein. Man kann diese nämlich mit der leichtesten Mühe herunterstürzen und auffangen, dadurch nämlich, dafs man plötzlich an den Stamm oder Zweig mit einer Axt oder auch nur mit einem Stocke schlägt. Sie werden dadurch, selbst wenn sie sonst sehr fest sitzen, und selbst vom stärksten Winde nicht heruntergeworfen werden, plötzlich erschreckt und lassen los. Viele fallen sogar schon bei der leisesten Berührung, namentlich Rüssel- und Blattkäfer, und bei diesen mufs man sich in Acht nehmen, nicht den Zweig vor dem Unterhalten des Fangapparates zu berühren, weil sie sonst ins Gras fallen, und nicht leicht wieder aufgefunden werden. Zu solchen Fangapparaten hat man auf den Boden auszubreitende leinene Tücher vorgeschlagen. Das ist aber mül-

sam. Man spanne lieber ein solches Tuch nach Art eines Regenschirmes aus und halte oder lege dies unter die abzuklopfenden Äste. Die Wirksamkeit eines solchen Schirms kennen die Sammler sehr wohl, und man klopft in kurzer Zeit, selbst im schnellen Vorübergehen, eine Menge der verschiedensten Insecten, Raupen, Käfer, Wanzen u. s. w. von den Bäumen. Auf Culturen wäre dies, da junge Pflanzen immer am meisten leiden, gewiß oft recht anwendbar. Auf diese Weise wird man sich auch am leichtesten von der Gegenwart der Raupen in einem Reviere, da immer einzelne an den untersten Ästen fressen, überzeugen, und man könnte dies zum Recognosciren gebrauchen. Zu den wirksamsten Vertilgungsmitteln sind auch die Fanggräben, welche man bei den verschiedensten Insecten anwenden kann, zu zählen. Man darf nur die erste beste Grube, oder frische Gräben neben den Wegen im Forste, selbst wenn es keinen auffallenden Insectenfrass giebt, beobachten und man wird hier Raupen, Käfer, Wanzen, Alles bunt durcheinander finden. Es ist höchst sonderbar, daß selbst Käfer, welche fliegen können, wie *Curculio Pini*, sich nicht retten. Zum Theil gehen solche Insecten in Gräben, weil sie Frass darin suchen, oder weil sie von Sturm und Regen hingetrieben und geschwemmt werden, oder weil sie im eiligen Fortkriechen hineinfallen. Die Anlage solcher Gräben ist nach verschiedenem Zweck verschieden, also davon mehr im Einzelnen, besonders beim Rüsselkäfer und den Raupen. Auch das Eintreiben von Schweinen in befallene Orte wird mit Recht empfohlen, daraus daß man Schweine häufig brechen sieht, kann man aber noch keinesweges immer auf vorhandene schädliche Insecten schließen, denn wir haben einmal sehr deutlich in unsern Institutsforsten gesehen, daß die Schweine die Wurzeln gesunder, wüchziger Kiefern weit entblößten, ohne daß hier eine Spur von Insecten zu finden war. Überhaupt ist über dies Mittel im Einzelnen noch manches Einschränkende zu sagen. Alle übrigen Vertilgungsmittel sind nur in einzelnen Fällen anwendbar oder ganz unpractisch. Zu den unpractischen rechne ich selbst die Leuchtf Feuer, weil sie kostspielig und selbst nicht ohne Gefahr für den Forst sind und doch eigentlich nur die Schmetterlinge aus einem sehr geringen Umkreise anlocken. Dasselbe gilt vom Ausharken oder Ausbrennen des Mooses, und noch weniger gelten im Großen die zahlreichen vorgeschlagenen Mittel, welche, könnte man sagen, chemisch oder physikalisch wirken sollten, wie die Räucherungen, Bespritzungen, Beschießen, Behäufelungen u. s. w. der Bäume. Was nun noch die Recognoscirung des Forstes betrifft, von der ich schon redete, so darf diese auch nicht von ganz kenntnißlosen Menschen vorgenommen werden, wenigstens müßten die dazu gebrauchten Arbeiter vorher instruirte werden; denn, wenn man auch im Allgemeinen bald die Gegenwart eines schädlichen Insectes erkennen lernt, so erkennt man doch nicht eben so leicht die Art. Im Allgemeinen läßt sich hier nur sagen: man sehe immer zuerst nach den kränklichen Beständen mit schlechtem Boden, nach den gedrückten Stämmen, den am Rande der Schläge befindlichen Bäumen, in einzelnen Fällen selbst nach ganz gleichgültigen Gewächsen, auf denen aber die Insecten gern ihren Frass beginnen und dann auf andre nutzbare übergehen. Man beachte: daß die auswendig an Bäumen fressenden Insecten besonders an der Art des Frasses, so wie an dem herunterfallenden Kothe zu erkennen sind, die inwendig sich aufhaltenden dagegen an dem eigenthümlichen Frass an Wurzeln, Holz und Rinde, an dem Wurmehl und den Holzspänchen, welche an der Rinde in Flechten, Moosen und Spinnengeweben hängen, an dem eigenthümlichen Aussehen der Rinde und der Blätter, dem Harzausflusse u. s. f. Nun noch zum Schluß: Alle solche Schutz- und Vertilgungs-Anstalten sind mühsam und kostspielig, und werden es immer bleiben, selbst wenn man hier und da Verbesserungen und Erleichterungen finde, kommen aber gar nicht in Betracht gegen den dadurch erzielten Gewinn, daß man gutwüchsiges Holz in den besten Jahren rettet, die Mühe einer neuen Cultur und den ekelhaften Anblick des Frasses sich spart.

DIE NAMEN sind leider, wie Jeder weiß, oft das Verdrüßlichste. Hätte jedes Insect nur einen Namen, wie ein Mensch seinen Vor- und Zunamen, so wäre es noch ein Leichtes. Aber so ist es nicht,

sondern viele Insecten haben deren zwei, drei und zuweilen noch mehrere, ja, rechnen wir die deutschen hinzu, noch viel mehr. Die deutschen sind eigentlich die schlimmsten, denn sie sind nicht allein sehr mannigfaltig, sondern auch unsicher, weil sie vom gemeinen Manne, ja wohl gar zuweilen vom Holzhauer, ausgehen. Wie können wir aber von diesen verlangen, daß sie etwas bestimmt damit bezeichnen werden, wenn dies dem wissenschaftlich Gebildeten oft schon schwer wird? Daher kann man denn auch die Benennungen: „Borkenkäfer, schwarzer Wurm, grüne Raupe, Kienmotte“ u. s. f. kaum der Gattung nach, geschweige der Art nach deuten. Man thut daher wohl, wenn man diese auch nicht ganz entbehren kann, doch wenigstens nebenher die kunstgerechten fremden für die, doch nicht so sehr zahlreichen, Forstinsecten zu merken. Dafür kann der Forstmann aber auch verlangen, daß diese übereinstimmend gebraucht werden, wenigstens für Deutschland und die Nachbarländer. Hoffentlich werden diese Übereinstimmung gegenwärtige Abbildungen sehr fördern, welche mit Berücksichtigung aller jetzt bekannten, etwa eine Verwechselung zulassenden Insecten angefertigt worden sind. Erkennt man nun in denselben, mit Hülfe der im Texte befindlichen Beschreibungen, ein vorliegendes Insect, so kann man den darunter stehenden Namen auch sicher als den rechtmäßigsten annehmen. Die Auswahl dieser Namen ist nämlich so sorgfältig wie möglich angestellt. In allen kritischen Fällen sind die Bestimmungen des Berliner Museums, welchem die berühmtesten Entomologen Exemplare nebst Originalbestimmungen zusandten, so wie mehrere angesehene Privatsammlungen, namentlich des Hrn. Germar, zu Rathe gezogen. Hier nur noch etwas über die Grundsätze, von welchen man überhaupt ausgeht, wenn unter zwei verschiedenen Namen gewählt werden soll. Der Scharfsinn, welchen Linné auch als Entomolog zeigte, muß uns auf die von ihm gewählten Namen so viel wie möglich zurückführen. Oft sind diese ganz unzweideutig, zuweilen aber auch nicht, und dann sind sie, wenn nicht ganz besondere Umstände dagegen sprechen, zu verlassen. Wahrscheinlich hat er nämlich hier und da verschiedene einander sehr ähnliche Insecten, die man jetzt besser unterscheiden gelernt hat, unter Einem Namen aufgeführt und daher die Beschreibungen, die ohnedies bei ihm immer sehr kurz sind, auch unverständlich gemacht, oder er hat sehr nahe verwandte Arten (die ihm freilich vielleicht gar nicht bekannt waren), unbeachtet gelassen, so daß man nicht weiß: ob er diese oder jene meint. Zuweilen wirft man ihm dies aber auch mit Unrecht vor und achtet nicht genau genug auf alle seine Worte, die er zwar sparsam, aber alle sehr bezeichnend auswählte. So ist es z. B. mit dem berühmtesten Borkenkäfer, der höchstwahrscheinlich sein *typographus*, und nicht, wie andre wollen, etwas anderes ist (s. dort). So haben selbst Druckfehler in den verschiedenen Ausgaben seiner Werke Confusion veranlaßt (s. *Curculio Pini*). Dem berühmten Fabricius ist es aber zuweilen nicht besser ergangen, und so werden auch immer noch einzelne Mißverständnisse vorkommen. Am besten löst man diese durch Vergleichung mit den von den Auctoren selbst herrührenden Exemplaren, wie uns denn auch Hr. Erichson durch sorgfältiges Studium der Fabricius'schen Sammlung selbst einen großen Dienst geleistet hat. Wird ein und dasselbe Insect von verschiedenen Auctoren, die z. B. nichts von einander wußten, beschrieben und benannt, so gilt der Name dessen, der die Beschreibung zuerst drucken liefs. (Bechstein's Namen *Bostrichus abietiperda*, *Pinastri* u. dergl. müssen daher weichen.) Auch ungedruckte Namen müssen, wenn sie sich irgendwo neben dem Exemplare eines noch nicht gedruckt bestimmten Insects befinden und von einem competenten Auctor herrühren, respectirt werden. So habe ich mehrere Thiere, die ich für neu hielt, weil ich sie nirgends beschrieben fand, nach den handschriftlichen Bemerkungen neben den Exemplaren des Berliner Museums genannt. Wäre mir das Museum nicht bekannt gewesen, so hätte ich sie benannt und diesen gedruckten Namen hätte man dann später dem handschriftlichen vorziehen müssen. Hier dürfte noch, in Beziehung auf die Forstmänner, eine Regel aufgestellt werden müssen: Ist bei diesen ein Name, den die Entomologen für zweideutig halten, eingebürgert, so ändere man diesen ja nicht, wie

z. B. *Bostr. typographus*, *Curculio Pini* (s. dort), wenn auch noch so viel dagegen protestirt wird. Glaubt man bei Jemand anzustofsen, so umschreibe man solche etwas weiltäufiger und sage z. B. der schädlichste, größte Fichtenborkenkäfer und der größte, schädlichste Kiefernrüßelkäfer. Dann können keine Mißverständnisse eintreten. Überhaupt ist es in den Fällen, wenn man den Namen nicht gewiß weiß, oder in der Meinung steht, man habe etwas Neues, besser, eine genaue Beschreibung des Insects, mit Angabe der Lebensweise und mit Rücksicht auf andre, ähnliche, zu liefern, als sich mit der Angabe des Namens zu begnügen. Einen Namen zu machen, ist nicht schwer, aber wohl, seine Rechtmäßigkeit zu begründen.

**EINTHEILUNG.** Wie man überhaupt die Insecten auf die mannigfaltigste Weise, nach Art der übrigen Thiere und Pflanzen, eingetheilt hat, so könnte man auch die Forstinsecten eintheilen. Da aber selbst die Angabe dieser Eintheilungen hier ganz unpassend und abschreckend sein würde, so beschränken wir uns auf das schon von Linné gegebene und auch meist heut zu Tage noch gebrauchte System, dem wir nur noch eine Ordnung (die zweite) der Späteren hinzusetzen, und wir können uns um so eher damit begnügen, als die Fehler, welche man demselben vorgeworfen hat, beim Aufsuchen der Forstinsecten danach, nicht so merklich sind. Um indessen auch diesen, obgleich sie nie bedeutend werden könnten, zu begegnen und um auch das Bestimmen im Larven- und Puppenzustande, in vielen Fällen wenigstens der Ordnung nach möglich zu machen, fügen wir hier noch Folgendes hinzu. Die Ordnungen 1, 4, 5, 6, 7 haben vollkommene und die andern, mit sehr wenigen Ausnahmen, unvollkommene Metamorphose. In den Ordnungen 1, 2, 5 finden wir nur beißende Mundtheile, in 3, 4, 7 dagegen lauter saugende und in der 6<sup>ten</sup> und 5<sup>ten</sup> theils beißende, theils saugende. Findet man also z. B. einen ungeflügelten Schmetterling, so wird man ihn gewöhnlich zugleich in der Begattung mit einem geflügelten sehen, oder Larve und Puppe kennen, aus welcher er sich entwickelte, und ihn nun nicht zur Ordnung 8 bringen wollen. Ein zweiflügliger Käfer wird noch weniger irre leiten, denn meistens bemerkt man, da er die Oberflügel stets geschlossen trägt, gar nicht, daß unter ihnen weiter keine Flügel sind. Wäre dies auch nicht, so würden die sehr deutlichen beißenden Mundtheile doch nicht gestatten, ihn zur 7<sup>ten</sup> zu bringen. Ferner wird man die geflügelten Männchen der Blatt- und Schildläuse so wie Cicaden, obgleich sie nicht halbharte Oberflügel haben, wie es nach Linné's Ordnungscharacter sein müßte, nicht für *Hymenoptera* halten, weil ihnen deren Mundtheile fehlen oder die Metamorphose unvollkommen ist. Die Wanzen, obgleich sie den von Linné gegebenen Character der *Hemiptera* sehr deutlich zeigen, werden doch öfters, wegen der harten Oberflügel, für Käfer gehalten. Da darf man nur nach dem langen, dünnen, platt an die Brust gelegten Schnabel sehen, um gleich von seinem Irrthume zurückzukommen. Sollte man einige Käfer, welche mehr lederartige als hornige Vorderflügel zu haben scheinen, etwa für *Orthoptera* halten, so würde die Metamorphose davon abrathen.

Insecten	{ mit 1 Flügel	{ mit 1 Flügel	Vorder- und Hinterfl. von ungleicher Substanz	Vorderflügel hornig . . . . . 1. <i>Coleoptera</i> .
				Vorderflügel leder- oder pergamentartig 2. <i>Orthoptera</i> .
	{ mit 2 Flügel	{ mit 2 Flügel	Vorder- und Hinterflügel von gleicher Substanz	Vorderflügel halb hornig, halb häutig 3. <i>Hemiptera</i> .
				Flügel mit staubähnlichen Schuppen . 4. <i>Lepidoptera</i> .
{ ohne Flügel	{ mit 2 Flügel	{ mit 2 Flügel		Flügel mit engmaschigem Adernetze . . . . . 5. <i>Neuroptera</i> .
				mit weitläufig baumartig verzweigten Adern . 6. <i>Hymenoptera</i> .
				7. <i>Diptera</i> .
				8. <i>Aptera</i> .

## Erste Ordnung.

### Käfer oder Scheidenflügler, *Coleoptera* Linn. *Eleutherata* Fabr.



**C**HARACTERISTIK. Kann man einen zu bestimmenden Käfer zugleich nach der Flügelbildung, nach den Mundtheilen und der Metamorphose untersuchen, so wird man nie irren. Nie fehlen bei einem Forstkäfer die Flügel ganz, wenn sie auch ungewöhnlich kurz erscheinen sollten. Immer sind die obern (oder vordern) bedeutend härter als die untern, und überall von gleicher Substanz, in der Ruhe stets auf dem Rücken in einer Längsnaht zusammenstoßend. Zuweilen fehlen die untern, allein das bemerkt man meistens gar nicht, wenn man nicht ausdrücklich danach sieht. Die Mundtheile sind beißend, und wenn sie auch noch so klein sind, wie bei den Rüssel- und Borkenkäfern, so bleiben sie doch immer vollkommen getrennt und lassen sich mit Nadel oder Messer einzeln herausheben. Etwas weidlänfliger characterisiren wir sie noch kunstgerecht so: Vollkommenes Insect. Kopf meist mäßeig, sehr hart, hornig, zuweilen nach vorn in einen hornigen Fortsatz (Rüssel) verlängert. Stirn und Scheitel, meist auch Kopschild, deutlich gesondert. Nur 2 zusammengesetzte, nie unförmlich große Augen. Zuweilen auch (wie bei *Anthrenus* und *Attagenus*) ein einziges, bald auf der Mitte des Scheitels, bald an der Grenze der Stirn stehendes Nebenauge. Fühler allermeist mit 11, selten mit mehr oder weniger zahlreichen Gliedern, gerade oder gekniet, borsten-, faden-, oder perlschnurförmig, gesägt, geblättert, gekämmt oder keulenförmig, kurz, lang oder sehr lang. Mundtheile beißend. Letzte meist vorhanden, breit, lederartig oder hornig. Oberkiefer stets sehr stark, große oder zuweilen außerordentlich große. Unterkiefer an der Basis hornig, am Ende häutig oder lederartig, mit viergliedrigem, seltener dreigliedrigem Taster, neben welchem zuweilen noch ein innerer, zweigliedriger Taster, oder ein zweigliedriger, mehr oder weniger tasterähnlicher Lappen. Lippe klein, fleischig oder häutig, mit zwei vorn (oder unten) oder an den Seiten eingestügten, dreigliedrigen Tastern, oft auch mit Nebenzungen. Am Rumpfe immer nur Halsschild und Schildchen, welche hornig und vorragend sind, bemerkenswerth. Der Hinterleib seiner ganzen Breite nach mit dem Rumpfe verbunden, oben von den Flügeln verdeckt und daher hier weicher als an seiner untern freien Fläche, stets deutliche Ringe zeigend und öfter länglich als rundlich. Die Beine kräftig und hornig mit drei bis fünf, oft sehr breiten und unten (besonders bei einigen Männchen) weichen Fußgliedern und doppelten Haken. Flügel allermeist beide Paare vorhanden: das obere (oder vordere), immer bei Forstkäfern vorhandene, wenn auch zuweilen nur sehr kurze, meist sehr hart und hornartig, zuweilen aber auch lederartig (s. S. 13.), weich und sehr biegsam, jedoch stets überall gleich und in der Ruhe über den Rücken mit den Innenrändern an einander gelegt (eine Naht bildend). Die Oberfläche derselben durch Behaarung, Punktirung, Streifen, Gruben und dergleichen (Skulptur) mannigfach verschieden. Das untere (oder hintere) häutig, geädert, in der Ruhe durch eine Querfalte an der Spitze sich unter das obere einschlagend. — Larven. Kopf stets deutlich, d. h. ein dunkler

gefärbter, ziemlich großer, fast überall härterer Theil mit deutlichen, oder wenigstens der Anlage nach zu findenden, Fühlern. Da wo die Fühler undeutlich sind und scheinbar fehlen, suche man sie innerhalb des Endes der vom Scheitel herabsteigenden, anfangs in der Mittellinie befindlichen, später gabelig getheilten, durchsichtigen Linie (Gabellinie). Augen fehlen zwar oft, zeigen sich jedoch auch oft in Form von mehreren kleinen, im Kreise gestellten, glatten, gewölbten Augeln hinter den Fühlern, oder von einzelnen größeren Halbkugeln weiter hinten. Mundtheile stets deutlich und vollständig, d. h. aus Lezze, Oberkiefern, Unterkiefern nebst Tastern und Lippe bestehend, welcher letztern in sehr seltenen Fällen die Taster fehlen. Auch sind die Unterkiefertaster zuweilen doppelt, indem sich ein innerer Lappen der Lade löst. Der Leib der Larve linien- oder wenigstens lanzettförmig, sehr selten eiförmig oder wohl gar rundlich, stets aus 12 Ringen zusammengesetzt, welche entweder ziemlich gleich gebildet sind, oder deren drei erste kürzer und breiter als die übrigen sind, auch wohl andre Bildungen als die übrigen zeigen. Von den neun Luftlöchern liegt das erste am ersten oder zweiten Ringe, zuweilen scharf an der Grenze heider, das zweite am vierten und das neunte am elften. An den drei ersten Ringen finden sich oft drei Fußpaare, welche bald länger, bald kürzer sind und allermeist mit einem oder zwei Haken (ein- oder zweiklauige), selten ohne solche endigen. Die Haken sind denen des vollkommenen Insects gleich. Wo sich also vor denselben vier Glieder finden (wie bei den zweiklauigen), da können wir sie auch mit Fuß, Schiene, Schenkel, Hüfte parallelisiren. Damit stimmt denn auch überein, daß am drittletzten Gliede ein besonderes Stück, gleich dem Schenkelhöcker, sich findet. Bei den einklauigen dagegen sind nur drei Glieder vorhanden, und es findet sich der Schenkelhöcker am vorletzten Gliede. Hier würde also der Fuß ganz fehlen. Am After, welcher oft wie ein 13<sup>tes</sup> Glied lang hervorragt, sind noch hier und da auffallende Anhänge, welche bald durch ihre fußähnliche Bildung den Zweck der leichtern Fortbewegung, bald in ihrer haken-, zangen- oder pfriemförmigen Bildung einen Verteidigungs- oder Bohr-Apparat verrathen. Auch auf dem Rücken des Leibes sind noch hier und da auffallende warzen- oder höcker- oder zangenähnliche Theile. Am Häufigsten hat der erste Ring oder auch wohl noch die zwei folgenden, seltener auch alle übrigen Rückenschildchen. Nie sind die Larven ganz kahl, wie z. B. manche kopflose, aber auch nie so stark behaart, wie viele Schmetterlings-Larven. Sie sind meist weiß, mit Ausnahme des stets dunklern, braunen Kopfes und der Füße, Schilder, Haken u. s. w., seltener ganz dunkel oder bunt. — Die Puppe zeigt höchst deutlich den Kopf des Käfers mit allen seinen Theilen, so wie die darauf folgenden drei Abschnitte des Rumpfes (Halschild, Schildchen und Hinterstück), eben so den meist acht- bis neun-ringigen Hinterleib mit allerlei sonderbaren Afteranhängen. Mundtheile, Flügel, Füße und Fühler (welche letztere besonders in ihrer Lagerung hübsche Unterschiede geben) fließen gleichsam an der Unterseite des Körpers in der wundervollsten Symmetrie herunter. Die beiden ersten Fußpaare tragen Schenkel und Schienen, gewöhnlich auch die Fußglieder, ganz frei, das dritte aber, bei welchem meist nur Knie und Fußglieder zu sehen sind, gewöhnlich nicht. Selten sind die Puppen ganz kahl. Entweder bemerkt man an ihnen bloß feine Härchen, oder auch Borsten oder Dornhöcker, und zwar entweder an allen Theilen oder bloß am Kopfe, dem Halschild, den Kniegelenken, dem Rücken und After. Sie sind weiß oder mehr oder weniger gelb oder bräunlich, selten bunt.

**VORKOMMEN.** Wahrscheinlich am weitesten verbreitet, denn man findet im hohen Norden und auf hohen Gebirgen noch Borkenkäfer, wo wenige oder gar keine Raupen mehr sind. Meistens im Holze und unter der Rinde, seltner an Blättern, und noch seltner in der Erde.

**LEBENSWEISE.** Die schädlichen Forstkäfer zeigen hinsichtlich der Generation die größte Mannigfaltigkeit, d. h. sie zeigen sowohl eine einjährige und mehrjährige, wie auch zwei- bis dreifache. Meist leben Larve und Puppe an demselben Orte, zuweilen auch die Käfer, daher werden auch hier viel



häufiger als bei andern Insecten verschiedene Zustände schädlich. Oft sieht man indessen auch die Käfer auf Blumen und Bäumen schwärmend, während die Larven in Rinde, Holz oder Erde leben. In keiner Ordnung giebt es so viele Holz-, Rinden- und Wurzelfresser. Dagegen steht die Zahl der Laubfresser (welches sie meist nur als Käfer, selten auch als Larve benagen), besonders der Nadelfresser, sehr zurück. Frucht- und Markfresser giebt es ebenfalls mehrere unter ihnen. Daher bietet auch ihr Frass, da er an weniger vergänglichen Theilen stattfindet, viel Characteristisches und läßt sich in Sammlungen lange und gut bewahren. Die Menge, in welcher sie oft erscheinen, ist außerordentlich groß und übertrifft wahrscheinlich alles in der Art Gesehene. Viele unter ihnen werden nie selten. Bei den meisten bemerkt man viel häufiger das Gehen, als das Fliegen, wenn sie sich aber einmal aufmachen, fliegen sie auch sehr schnell und sicher, gewöhnlich in mehr gerader oder wenig gebogener Linie. Nur die Raubkäfer laufen sehr schnell und sicher, die meisten schädlichen träge und unsicher. In der Wärme sind sie sämtlich beweglicher, einige sogar äußerst flüchtig. Die nützlichen Forstkäfer verhalten sich in Hinsicht auf Frass, Aufenthaltort und Menge sehr verschieden. Die Generation scheint durchgehend einjährig zu sein. Ihre Menge ist auch öfters unglaublich groß.

**FORSTLICHE BEDEUTUNG.** In keiner Ordnung findet sich so viel Nützliches und Schädliches zugleich, weshalb diese auch unbezweifelt den ersten Platz einnimmt und sehr wichtig genannt werden kann. Nicht bloß dies berechtigt zu dem Ausspruche, sondern auch die Wichtigkeit der schädlichen. In keiner Ordnung haben wir nämlich wieder so viele sehr schädliche, so schnell und bestimmt tödende wie in dieser, eben weil die meisten Rinden- und Holzfresser sind und auch in lebende Bäume, ja, wenn sie in Menge vorhanden sind, auch in ganz gesunde gehen und diese durch wiederholte Angriffe krank machen und tödten. Sie sind die einzigen, welche auch Laubholz schnell und in Menge tödten. Sie sind die bösen Zerstörer unsrer Nadelholz-Culturen. Auch die Zahl der merklich schädlichen ist groß und eben so selbst der unmerklich schädlichen, welche wegen der Menge, in der sie häufig am Holze erscheinen, Besorgnisse, wenn auch ohne Grund, verursachen und daher häufig täuschende werden.

**BEGEGNUNG UND AUFFINDUNG.** Da die wenigsten schädlichen Käfer am Laube fressen und diese überdies meist nur klein sind, so giebt der Koth auch keine Kennzeichen, doch erkennt man sie an den Zerstörungen der Blätter. Diese werden meist zuerst auf der Fläche angefressen, während die Raupen und Afterraupen stets am Rande anfangen. Die im Baume lebenden hinterlassen viel bestimmtere Merkmale, als Wurmehl (s. d. Allgem.). Alle im Allgemeinen angeführte, praktische Begeugungsmittel sind auch hier anwendbar.

**EINTHEILUNG.** Man kann die Käfer sehr verschieden einteilen, ja dem Forstmanne stehen noch mehr Eintheilungen als Andern zu, d. h. nicht bloß nach dem Körperbau (morphologisches System), sondern auch nach der Lebensweise (biologisches System). Soviel Vorzüge nun das letztere auch auf den ersten Blick zu haben scheint, so darf es hier doch nicht zu sehr vorwalten, sondern nur da gebraucht werden, wo von dem Ungeübten die morphologischen Eintheilungsgründe schwer zu verstehen sein würden. Da wo diese leicht zu übersehen sind, wie z. B. die Zahl der Fußglieder, die Fühler- und Flügelbildung u. s. f., ziehen wir sie schon aus dem Grunde vor, und auch deshalb, weil man gewöhnlich noch nicht die ganze Lebensweise kennt, wenn man das Insect findet. Hinsichtlich der wichtigsten und ersten Eintheilung in nützliche und schädliche Käfer lassen sich jedoch beide Systeme vereinigen, indem alle nützliche auch nach morphologischer Reihenfolge zusammengestellt werden können, denen dann alle schädliche folgen. Alle merklich nützliche stehen nämlich unter den Trimeren und den ersten Familien der Pentameren, während alle übrigen Pentameren, Tetrameren und Heteromerer nur schädliche enthalten oder wenigstens nur zweifelhaft und unmerklich nützliche. Eine scheinbare Ausnahme macht *Corynetes* (s. *Clavicornia*).

Die morphologische Eintheilung nach Fußgliedern dürfte sich immer noch am meisten empfehlen, wird jetzt auch immer noch von den Entomologen am meisten gebraucht. Wenn man nur zählen kann und die beiden vordern Paare oder Beine ordentlich von den hintern unterscheidet, kann man sich nicht irren. Allerdings muß man dazu bei den kleinsten Käfern öfters die Loupe nehmen. Nähere Anweisung dazu bei den 4 Abtheilungen selbst.

## Erste Abtheilung. Dreigliedrige (*Trimer*).

An allen drei Paaren der Beine finden sich nur drei Fußglieder (Taf. I. Fig. 15g). Diese Abtheilung von Käfern ist die kleinste von allen, denn sie enthält selbst im weiteren Sinne nur wenige Gattungen. Die uns hier angehenden Arten gehören sämmtlich der Linné'schen Gattung *Coccinella* an.

Gattung: *Coccinella* Linn. Marienkäfer. (Taf. I. Fig. 15, 16.)

**NAMEN.** Die große Ähnlichkeit der meisten Arten untereinander, welche selbst den Entomologen zu schaffen macht, läßt erwarten, daß im Volke wenig Übereinstimmung in der Benennung der Art herrsche und daß bald die eine, bald die andre mit folgenden Namen belegt werden: *Johannis*-, *Marien*-, *Sonnen*- oder *Blattlaus*käfer, *Jungfer*-, *Frauen*- oder *Sonnenwendkäferlein*, *Herrgottskühelein*, *Halbkugel*- oder *runder Schildkäfer*, *vache à dieu* u. s. w.

**CHARACTERISTIK.** Die Coccinellen erscheinen sämmtlich stark gewölbt, die meisten sogar vollkommen halbkuglig, wenige etwas länger als breit. Die allermeisten sind ganz kahl und glänzend, wenige schwach behaart und matt. Sie gehören zu den kleinern Käfern, denn nur zwei bis drei Arten erreichen eine Länge von 4-5". Die Meisten sind durch schöne, zum Theil bunte, aber nicht metallische Farben ausgezeichnet (s. unten). Kunstgerecht characterisirt man sie so: Käfer. Kopf klein, Kopschild fest mit dem Kopfe verwachsen. Leuze (I. 15 a) quer abgerundet-viereckig, schwach zurückgedrückt, behaart. Oberkiefer (15 b) stark, kurz, stark gekrümmt, am Ende mit zwei scharfen Spitzen, an der Basis des Innenrandes mit einem stark vorspringenden gekrümmten Zahne. Unterkiefer (15 c) aus einem hornig festen, mehrere deutliche Nähte zeigenden Stamm und einer zweilappigen häutigen Lade bestehend. Beide Lappen ziemlich gleich groß, am freien Rande stark behaart, der innere fast rhomboidal, der äußere sichelförmig, deutlich zweigliedrig (also innerer Taster). Taster viergliedrig, dick, schwach behaart: das letzte Glied das längste und breiteste, beilförmig. Lippe (15 d) aus einem hornigen, fast viereckigen Theile (Kinn), und einem darauf sitzenden, fast herzförmigen Theil (Lippe) bestehend, dessen freier, häutiger Rand kaum zurückgedrückt ist. Taster dreigliedrig, mit sparsamen Haaren, das letzte Glied das längste, fast walzig. Augen entfernt, vorn und oben gebuchtet für die Einfügung des ersten Gliedes der kurzen Fühler, deren drei letzte Glieder beträchtlich anschwellen und am Ende abgestutzt sind. Halschild kurz, schmaler als die Flügeldecken, punktirt. Schildchen klein, dreieckig. Flügeldecken groß, den Hinterleib ganz deckend, punktirt und, so wie der Halschild, stark gewölbt. Unterseite flach, punktirt. Füße mäfsig. Von den drei Fußgliedern das dritte das längste und dünnste. Die Larve der gemeinsten Art (*C. 7-punctata*) (Taf. I. 15 c) ist 5" lang und 1,7" breit, lanzettförmig, vorn abgerundet, hinten spitz. Füße lang, schwarz, borstenhaarig und behaart. Kopf klein, ziemlich flach

C

mit sehr kleinen dreigliedrigen Fühlern, einer breiten, fleischigen Lipfe, unter welcher die starken, hornigen, schwarzen Oberkiefer versteckt liegen, Unterkiefer mit viergliedrigen Tastern und einer fleischigen Unterlippe mit dreigliedrigen Tastern. Der ganze Leib mit kurzen Borstenhaaren, welche auf dem Kopfe und der Oberseite des ersten Ringes zerstreut stehen, hier aber schon zum Theil, und auf den übrigen Ringen überall, sich auf, in Querreihen gestellte, Flecken sammeln. Diese sind mit kugelförmigen (eben die Haare tragenden) Höckern besetzt. Auf dem ersten Ringe bilden diese eine Art von Schild, auf dem zweiten und dritten zwei grössere und zwei kleinere, <sup>bei 12-jährigen</sup> und auf den folgenden 6 kleine für die Ober- und 6 für die Unterseite. Die mittlern und die meisten seitlichen sind schwärzlich, einige auch, so wie mehrere Flecke des ersten Ringes, orange. Grundfarbe der Oberseite grauschwarz, der Unterseite und des größten Theils des Kopfes schmutzig gelb. Die Puppe (15 G, 15 H) ist 3" lang, 2,5" breit. Das Hinterleibsende abgerundet ist die Puppe fast viereckig. Der Kopf ist unter den Vorderrand des fast horizontalen Halsschildes, der auch die Fühler deckt, zurückgezogen. Taster sehr stark vorragend, bis zum zweiten Fußpaare reichend. Die beiden ersten Fußpaare sehr genähert, aus- und vorwärts gerichtet. Das dritte, bis auf das Kniegelenk, ganz verborgen. Fußglieder fast gar nicht zu sehen. Unterflügel nur wenig die Oberflügel überragend. Hinterleib mit der Spitze an Blättern u. s. w. befestigt. Körper ganz kahl, ziemlich hart und glänzend, orange mit vielen schwarzen Flecken. Zur Verwandlungszeit klebt sich die Larve mit dem letzten Ringe, mittelst einer ausgesonderten klebrigen Masse an die Blätter an, und krümmt dann den ganzen Körper, besonders den Kopf, etwas gegen die Unterseite, so daß sie einen Buckel macht. Der ganze Kopf zieht sich etwas unter den ersten Ring zurück. Die Höcker werden kleiner, und die Haare schwinden. Dann platzt die Larvenhaut auf dem Rücken, streift sich nach hinten, und bildet hier eine dicke, die Füße noch deutlich zeigende Wulst. Diese von den größern Arten hergenommene Beschreibung paßt auch für die meisten andern Arten, jedoch giebt es einige Arten, deren Larven kürzer und gedrängener erscheinen, und mit dornenähnlichen Haargruppen besetzt sind. Einige (*Scymnus*) bedecken sich sogar mit einer wolligen Substanz. Hr. Dr. W. Schmidt fand die Zeichnung der Puppen von *C. dispar* außerordentlich variabel, ohne daß sie aber Einfluß auf die Färbung der Käfer hätte. Beim Auskriechen der meisten Coccinellen sind sie fast nur auf den Flügeldecken gelblich, die erst später ihre eigentliche Grundfarbe erhalten, wogegen der Thorax gleich ganz fertig ausgefärbt ist. — Die Eier (welche Hr. Dr. W. Schmidt die *C. 7-punctata* in Baumritzen legen sahe) sind gelb, stehen gruppenweise und aufrecht, und werden späterhin etwas dunkler von Farbe.

**VORKOMMEN.** Zahlreiche Arten finden sich überall in Deutschland, sowohl in Gärten und Feldern, als auch im Forste, auf Bäumen, Sträuchern und Kräutern.

**LEBENSWEISE.** Wir fassen diese hier von allen Arten so viel wie möglich zusammen, da sie auch allen gemeinschaftlich ist, und kleine Abänderungen derselben bei der einen oder andern Art hier gleichgültig sind. Die Zeit ihres Erscheinens ist nach den Umständen verschieden. Die meisten Käfer sehen wir im Herbst und im Frühjahr, und diese sind dann als frisch ausgeschlüpfte mit den reinsten Farben gezier, die später nach und nach ausblassen, da der Käfer öfters noch weit in den nächsten Sommer hinein lebt. Sie überwintern in allen passenden Schlupfwinkeln, so daß man sie bei sonnigen, nicht kalten Wintertagen hervorkommen und oft in großer Menge an den Fenstern der Wohnungen, den Mauern u. s. w. herumkriechen sieht. Im Frühjahr begatten sie sich und das Weibchen legt seine dottergelben, länglichen Eier an Gewächse. Die nun bald auskommenden Larven findet man den ganzen Sommer hindurch, bis sie sich im Juli oder August frei an den Blättern verpuppen. Wird die Puppe berührt, so bewegt sie den Vordertheil wie einen Hammer auf und ab. Nach 12 bis 16 Tagen schlüpft der Käfer aus. Die Nahrung des Insects besteht aus den kleinern, weichern Insecten, namentlich Blattläusen und Blattsaugern (Hr. Sayesen), wahrscheinlich auch den Schildläusen (die Hauptfeinde der Cochenille sind

Arten dieser Gattung). Die größte Menge derselben verzehren die Larven. Diese laufen mit der größten Behendigkeit überall auf den Gewächsen umher und suchen ihre Beute, die sie schnell mit ihren starken Kiefern ganz und gar verzehren, selbst aus den zusammengerollten Blättern hervor, und sind dabei oft so gierig, daß sie sich um den Raub zanken. Im Jahre 1838 gegen Ende des Juni beobachtete ich sogar eine halbwüchsige Larve, welche an einer kleinen, schon ganz matt gewordenen, Raupe sog. Ueber die Mordgierigkeit der Coccinellen berichtet auch Oken (Naturgesch. Bd. V. Abth. III. S. 1762 u. f.) nach eignen und fremden Beobachtungen. Die Larven der *ocellata* sollen sogar Schmetterlingspuppen, wenn man sie ihnen giebt, fressen. Auch die Käfer, die weniger behende laufen, aber desto rascher auf und davonliegen, thuu dies, jedoch weit seltener als die Larven, auch mit solcher Gemüchlichkeit an ihrer, dabei noch lange fortlebenden, Beute saugend, daß man sie für weit weniger nützlich als die Larven halten muß. Wie viel gebraucht denn auch ein solcher Käfer für seinen kleinen Darm! Mir scheint es überhaupt, als wenn sie nur gleich nach dem Ausschlüpfen fräßen und nachher gar nicht mehr; denn ich habe im October und wieder im Frühjahr stundenlang zugehoben, wie einzelne oder mehrere Käfer, die übrigens ganz munter waren, auf einer Stelle saßen, besonders auf Kiefern am Ursprunge der Nadelcheiden oder des Knospenquirles. Nahm ich sie weg, so konnte ich an der Stelle, an welcher sie saßen, durchaus nichts von Fraß bemerken. Wahrscheinlich drücken sie sich also nur gegen die frische, saftige Oberhaut und erlaben sich an der Ausdünstung. Hr. Dr. W. Schmidt hatte Gelegenheit, andre Erfahrungen über diesen Punkt zu machen. Er fand die Käfer zu verschiedenen Zeiten recht lustig schmausend. Auch glückte ihm eine Fütterung, welche er mit einer großen ausgebildeten und völlig erhärteten *C. dipar* vornahm. Er sperrte sie in eine Schachtel und gab ihr, nachdem sie mehrere Tage gehungert hatte, eine halbtodt gedrückte Stubenfliege, welcher am andern Morgen ein guter Theil des Halschildes ausgefressen war. Ein andres Mal hatten mehrere, zusammengepackte Arten von feuchtem Zucker gefressen. Die Menge, in welcher sie erscheinen, ist oft außerordentlich groß und steht gewiss im Verhältniß zur Vermehrung ihrer Fraßthiere. In England bedeckten sie einst in unermeßlichen Schaa ren die Küste (*Kirbi and Spence Introd.*).

**FORSTLICHE BEDEUTUNG.** Die Coccinellen gehören zu den nützlichsten Insecten im Forste sowohl wie in Gärten, weil Blattläuse und besonders Blattsauger, überhaupt alle kleine, weiche *Hemiptera*, zuweilen in besorglicher Menge sich einfunden und dann nur allein durch die Coccinellen in Schranken gehalten werden. Hr. Schmidberger (Obstbaumz. I. 97.) sagt, daß, wenn er nur einen solchen Käfer auf einem Schosse, der mit Blattläusen besetzt war, fand, er fast sicher darauf rechnen konnte, am zweiten Tage keine Blattlaus mehr daran zu treffen, weshalb er das Geschäft immer den Coccinellen überließ. Für die Vertilgung der Blattläuse der Nadelhölzer hält Hr. Hartig die Arten von *Scymnus* besonders wichtig. In größter Menge sah er sie an den Stämmen der Weymouthskiefern, welche von den wolligen *Coccus*-Larven oft ganz weiß waren (Jahresber. H. II. Berl. 1838. S. 180.). Zu ihrer Vermehrung kann man natürlich nichts beitragen; Unwissende dürfen aber auch nicht die Larven für schädlich halten und sie tödten. Gärtner glauben, daß ihnen Mohrrüben angenehm seien und säen diese in der Nähe solcher Gewächse, die besonders von Blattläusen leiden, z. B. Rosen, an. Sollte man nicht aber durch Übertragung der Käfer, welche allgemein beliebt sind und Niemanden daher belästigen würden, in Treibhäusern den dort oft sehr lästig werdenden kleinen Pflanzensäusen entgegen wirken können?

**BEMERKUNGEN.** Der gelbe Saft, welchen die Coccinellen bei Berührungen, besonders aus den Gelenken schwitzen, und der eine auffallende Ähnlichkeit im Geruche mit Opium hat, ist ein treffliches Mittel gegen Zahnweh. Man zerdrückt den lebenden Käfer mit den Fingern und reibt mit diesem das Zahnfleisch.

EINTHEILUNG DER GATTUNG. Diese ist nicht ganz leicht, wenn es darauf ankommt, sämtliche Arten zu ordnen und leicht kenntlich zu machen. Da es uns hier aber gar nicht auf die feinen Unterschiede ankommt, sondern überhaupt nur auf die Unterscheidung einer Coccinelle, als eines zu schonenden Insects, von irgend einem andern zu vertilgenden, wird es hinreichen, nur diejenigen Arten hier aufzuführen, welche sich leicht characterisiren lassen, und das sind glücklicher Weise gerade die gemeinsten und nützlichsten.

#### A r t e n.

Wir unterscheiden zuerst diejenigen, bei welchen der Rand der Flügel breit und deutlich umgebogen ist, von denen, bei welchen dies nicht ist. Die erstern sind glänzend schwarz mit blutrothen Flecken. Eine Art hat zwei solcher (*C. bipustulata* L.) und eine andere vier (*C. quadripustulata* L.), beide sind die gemeinsten Arten auf Nadelbölzern, besonders Kiefern. Die letztern haben sehr verschiedene Farben. Die gemeinsten sind roth mit schwarzen Punkten, welche (auf beiden Flügeln zusammen gerechnet) entweder 7 an der Zahl sind (*C. 7-punctata* L. s. Fig. 15.) oder 5 (*C. 5-punctata* L.) oder 2 (*C. 2-punctata* L., eine Varietät derselben, meist Weibchen, erscheint aber auch schwarz, mit 4-6 blutrothen Flecken), oder 13 (*C. 13-punctata* L. mehr länglich), oder auch sich durch den hellen Rand der schwarzen Punkte auszeichnen (*C. ocellata* L., auch zugleich die größte einheimische,  $4\frac{1}{2}$ '' lang und  $3\frac{1}{4}$ '' breit). Alsdann giebt es noch gelbe mit schwarzen Punkten (*C. 12-punctata* L., *C. 22-punctata* L., *C. 19-pustulata* L. und *C. conglobata*, welche viereckige Flecke hat), und gelbrothe mit gelblich-weißen Punkten (*C. 16-guttata* L. und *14-guttata* L.) und endlich schwarze mit gelben oder gelblich-weißen Punkten (*C. 15-pustulata* L. und *tigrina* L. mit 18 bis 20 großen Punkten).

Die vorher erwähnten, durch die wolligen Larven ausgezeichneten (wegen ihrer feinen Behaarung und geringen Größe zu einer eigenen Gattung *Scymnus* gebrachten) Arten sind besonders folgende: *C. nigrina* Hb. (1,3'' lang, ganz schwarz), *C. flavipes* Ill. (1,2'' lang, schwarz mit gelbbraunen Beinen und Fühlern), *C. analis* Fbr. (1,4'' lang, schwarz mit gelbröthlichen Flügelen, Halschildrändern und Beinen), *C. discoidea* Fbr. (kaum 1'' lang und durch einen großen, gelbrothen Fleck auf jedem Flügel ausgezeichnet), *C. Abietis* Payk. (1,5'' lang, gelbbraun).

### Zweite Abtheilung.

#### Fünfgliedrige (*Pentamera*).

An allen drei Paaren der Beine finden sich fünf Fußglieder (I. 11), die größte überhaupt bei Insecten bekannte Zahl solcher Glieder. Freilich sind diese Glieder nie von gleicher Größe, aber auch nie wird eins allein so klein, daß man es erst mit starker Loupe suchen müßte, und es gehören daher die Borkenkäfer, bei welchen zwischen den beiden letzten Fußgliedern (dem dritten und vierten) noch ein sehr kleines verborgen liegt, welches also nicht mitgezählt wird, nicht hierher. Bei einem, übrigens schon aus den Abbildungen leicht zu erkennenden, Käfer (*Clerus*) ist das erste Glied besonders klein, jedoch, wenn man die Glieder bewegt, meist leicht zu erkennen. Allerdings kommen auch einige wirklich nur vier- oder gar nur dreigliedrige hier vor, wie einige kleine Moderkäfer, diese sind für uns aber so unbedeutend, daß sie nichts gelten. Im Allgemeinen sie zu characterisiren ist sehr schwer, da sehr große Mannigfaltigkeiten in Form, Größe, Lebensweise u. s. w. hier vorkommen. Am ersten könnte man noch von den

Larven etwas sagen. Diese haben nämlich bei den allermeisten Pentameren, vielleicht mit Ausnahme der einzigen Gattung *Buprestis*, deutliche Füße, die den meisten Tetrameren, namentlich den ächten Borkenkäfern, von welchen wir oben, als leicht zu verwechselnden, sprachen, gänzlich fehlen.

FORSTLICHE BEDEUTUNG sehr groß. Nächst dem Reste der noch abzuhandelnden nützlichen Käfer, gehören hierher schädliche Insecten, welche nach den Borkenkäfern den ersten Rang einnehmen, wie Laubkäfer, Bupresten u. s. f. Der Forstmann hat daher die Kennzeichen dieser Abtheilung wohl zu beachten, die auch übrigens leicht in die Augen springen, da nur wenige so kleine Arten hier schädlich sind, daß man zur Zählung ihrer, überdies verhältnißmäßig sehr langen, Fußglieder, die Loupe zu Hülfe zu nehmen nöthig hätte.

EINTHEILUNG. Auch diese hat keine große Schwierigkeit, da die Familien dieser Abtheilung nach leicht zu beobachtenden Organen (meist Fühlern und Flügeln und nur einmal Tastern, die dann aber auch sehr groß und deutlich sind) eingerichtet sind. Die fünf Familien, welche man hier gewöhnlich aufstellt, ordne ich folgendermaßen:

Pentameren	{	mit kurzen, nur einen kleinen Theil des Hinterleibes deckenden Flügeldeck. 1. Kurzflügler.	{	die letzten Glieder blattartig oder zahnförmig erweitert . . . . . 2. Blatthörnige.
		mit langen, den ganzen Hinterleib oder den größt. Theil desselb. deckend. Flügeldeck.		die letzten Glieder rundlich oder kugelig . . . 3. Keulenhörnige.
	{	mit an der Spitze allmählig oder plötzlich verdickten Fühlern	{	Fühler faden- oder horstenförmig mit gleich langen Endgliedern . . 4. Laufkäfer.
		mit an der Spitze nicht verdickten, wenn auch längere Glieder zeigenden, Fühlern		Fühler gesägt o. gekämmt o. wenn dies nicht deutlich ist, m. meist auffallend läng. Endgliedern 5. Sägehörnige.

Nützlich sind alle aus den Familien 1. und 4. und einige aus den Familien 3. (*Clerus*, *Silpha*) und 5. (*Cantharis*). Durchweg schädlich ist Familie 2, allermeist schädlich Familie 5. und unmerklich schädlich sind mehrere Käfer aus Familie 3.

### Erste Familie.

#### Laufkäfer, Fleischfresser. (*Cursores. Carnivora*).

NAMEN. Den hier im Systeme gebrauchten Namen (Laufkäfer, Fleischfresser), welche auch im Allgemeinen im Volke gelten und gleichbedeutend sind mit Rennkäfer oder Läufer, füge man noch hinzu Erdkäfer, Räuber. Sie beziehen sich sämmtlich auf das Betragen dieser Käfer, welche sich durch raschen Lauf und durch räuberische Lebensart auszeichnen.

CHARACTERISTIK ist hier um so mehr im Allgemeinen schon wünschenswerth, als wir dadurch Wiederholungen ersparen, noch dazu, da auch hier auf Arten-Unterschiede dem Forstmanne wenig ankommt. Wer nur einigermaßen Insecten gesammelt oder beobachtet hat und nur einige Arten der Lauf-

käfer dabei kennen lernte, wird auch die übrigen, äußerst zahlreichen, hierhergehörenden Arten leicht erkennen, so viel Eigenthümliches geht hier durch Hunderte von Thieren. Sie erscheinen sogleich als kühne, rasche, starke Thiere, weil sie andere Insecten emsig verfolgen und selbst den angreifenden Menschen heftig beißen: sie sind schöne Käfer und haben lange, starke und doch sehr proportionirte Füße, auch überall eine feste Hornbedeckung, die nur selten mehr als einzelne Haare zeigt. Die meisten erscheinen von oben länglich, elliptisch oder oval, mälsig gewölbt, einige nähern sich dem Rundlichen und sind stärker gewölbt. Die Schultern springen selten stark vor den Halsschild vor. Ihre Farben sind meist schwarz, jedoch glänzend und reinlich, sehr oft aber auch angenehm metallisch, einfarbig oder bunt. Die kunstgerecht entworfene Character macht sie noch deutlicher. — Käfer. Kopf (l. 12 K, 1 K) mälsig, allermeist schmaler oder viel schmaler als der Halsschild, ziemlich flach mit zur Seite vorspringenden Augen. Fühler entfernt, nahe vor den Augen, die halbe Körperlänge nie überragend aber auch meist beinahe erreichend, faden- oder borstenförmig, nie gesägt oder keulenförmig, aus fast gleich langen Gliedern bestehend. Der Kopfschild oft durch eine Furche geschieden. Lefze (l. 11 a) mit dem Kopfschilde verwachsen, hornig, meist gewimpert. Oberkiefer (l. 11 b) hornig, sehr stark, besonders lang und spitz und oft mit einem Zahne, selten mit mehreren, an dem Innenrande. Unterkiefer (l. 11 c) mehrere deutliche Nähte zeigend, mit schmalen, lederartig häutiger, behaarter, oft mit einem krummen Zahne versehenen Lade und doppelten Tastern, deren innerer, der Lade angeschmiegt, zweigliedrig und nicht viel länger als dieselbe ist, und deren äußerer, viel längerer, viergliedrig ist und auf einem hornigen Vorsprunge, gleichsam einem fünften Gliede, steht. Lippe (l. 11 d) dem meist mit Zähnen versehenen Ausschnitte des Kinnes eingefügt, auf der innern Seite (11 d') mit behaarten Hautlappen (*paraglossae* Fr.), auf der äußern auf einem Vorsprunge die dreigliedrigen Taster tragend, welche die Lippe ansehnlich überragen. Halsschild meist ziemlich quadratisch. Schildchen auffallend klein. Flügeldecken gefurcht, gerippt, punkirt, grubig oder chagriniert, selten ganz glatt. Die Unterseite gewölbt, meist glänzender noch als die Oberseite. Füße lang und kräftig, besonders der Schenkelhöcker an der Basis des langen und kräftigen Schenkels der Hinterfüße stark hervorragend. Die Fußglieder sind noch dadurch ausgezeichnet, daß sie bei den Männchen am ersten oder auch am zweiten Fußpaare sehr breite schwammige Sohlen haben, bei den Weibchen aber nur schmal und dünn sind. Auch sind Männchen und Weibchen meist noch dadurch unterschieden, daß erstere 7 und letztere nur 6 Hinterleibs-Ringe zeigen, daß jene ferner den vorletzten Ring unten ausgerandet und diese nicht ausgerandet haben. — Die Larven (l. 11 B, 11 C, 5 C) zeigen in der Form so außerordentliche Verschiedenheiten, daß man sie noch weniger allgemein characterisiren kann als den Käfer. Das einzige durchgreifende Unterscheidungszeichen, welches sie selbst von den Staphylinen sondert, denen manche unter ihnen auffallend ähnlich sehen, sind die inneren Unterkiefer-Taster (an Fig. 11 C), welche bei allen mir bekannten, hierhergehörenden Arten deutlich zweigliedrig sind. Auch stehen die Fühler stets am Seitenrande des Kopfes hinter dem Außenwinkel der Oberkiefer und nie so sehr entfernt und nach der Oberseite gerückt, wie bei den Staphylinen. Die Füße haben oft zwei Häkchen und der Rollhügel findet sich dann am drittelzten Gliede, jedoch kommen auch einklaueige, wie bei den Staphylinen, vor und dann ist das Rollhügelglied das vorletzte. Das Weitere siehe bei *Cicindela* und *Carabus*. — Die Puppen (l. 11 G, 11 H) sind weiß, wahrscheinlich sämmtlich, mit Ausnahme des Rückens und der Seiten des Hinterleibes, welche steife Haare haben, gar nicht behaart. Der Kopf ist mälsig übergebogen, die Fresswerkzeuge vorragend und die Fühler nach vorn, fast parallel, gelegt. Die Schienen und Fußglieder unbedeckt, letztere das Hinterleibsende etwas überragend. Die Flügeldecken nicht sehr lang und da, wo die Käfer geflügelt sind, auch ein Paar am Ende vorragende Unterflügel zeigend.

VORKOMMEN. Die Laufkäfer sind überall da verbreitet, wo es andre Insecten, namentlich Larven derselben giebt, denen sie nachstellen. Da sich viele Insecten aber streng an einen Aufenthalt binden

und entweder nur im Walde, oder auf dem Felde, am Wasser u. s. w. leben, so verhält sich auch der Aufenthalt der Laufkäfer danach. In der That kommen öfters von nahe verwandten Arten die einen bloß im Walde oder in dessen Nähe vor (*Carabus coriaceus*, *rostratus*, *glabratus*, *violaceus*, *auro-nitens*, *Cicindela sylvatica*, *campestris*, *hybrida* u. s. w.), die andern nur im Felde (*Carabus auratus*, *gibbus*, *planus*, *flavicornis*, *Cicindela germanica* u. s. w.). Unsere gemeinsten Arten, wie *C. granulatus*, *C. camp.* und *hybr.*, *Carabus cancellatus* und *niger*, fanden sich so gut in Schwarzwalde wie bei uns (Hr. Warukönig), *C. auro-nitens* kommt im Harz, in Lüneburg, in der Schweiz und Sächsischen Schweiz vor (Hr. Saxesen), auch um Göttingen und bei uns, so wie auch selbst in Schweden (Gyll). Einen interessanten Beitrag zur Kenntniß der Verbreitung verdanken wir noch dem vielerfahrenen Hrn. Heyer. *C. Sycophanta* fand er im Lüneburg'schen, auch selbst zur Zeit des häufigen Auftretens schädlicher Kiefernraupen, nur immer einzeln, aber sowohl auf Laubholz wie auf Kiefern. *C. reticulatus* F. scheint daselbst aber häufiger als irgend wo anders zu sein. Die Larve wurde mehrmals beschäftigt gefunden, wie sie an Kiefern die Puppen der *Ph. B. Monacha* eifrig verzehrte. Besonders ist es bemerkenswerth, daß Hr. Heyer *C. Inquisitor* nie im Nadelholze fand, desto zahlreicher aber auf dem Laubholze. Gegen Ende des Mai bemerkte er einst auf den niedrigen Zweigen bejahrter Eichen viele derselben und saumelte durch Abklopfen von denselben in kurzer Zeit gegen 200 Exemplare, unter denen sogar mehrere vielblaue waren!

**LEBENSWEISE.** Ungeachtet der großen Zahl scheinbar sehr verschiedenartiger, hierher gehörender Thiere findet doch manche Übereinstimmung in der Lebensweise derselben Statt. Hinsichtlich der Zeit ihres Erscheinens und ihrer Nahrung ist eine Verwandtschaft mit den eben betrachteten Coccinellen nicht zu verkennen. Die meisten und schönsten Individuen bemerken wir bei uns im Herbste und im Winter, wo man sogar die beste Lese unter dem Moose (wo sie in kleinen Erdlöchern, oft in einer solchen Stellung sich finden, als kämen sie eben aus der Verpuppung), in den alten faulen Stöcken und unter der losen Rinde anbrüchiger Bäume, wo sie überwintern, halten kann. Einmal läßt sich daraus schon auf das zu dieser Zeit erfolgte Ausschlüpfen schließen. Alsdann fand ich auch nur gegen Ende des Sommers bis in den September ausgewachsene Larven und einmal im August und das andre Mal im October Puppen. In den Jahren 1837 und 1838 bestätigte sich dies wieder in den zahlreichen Fällen von Raupenfraß, welche eine ungewöhnliche Menge von Sykophanten-Larven herbeigezogen hatten. Ferner hat Hr. Heyer am 6. September *C. reticulatum* aus Larven erzogen, welche sich, eingesperrt und gefüttert (mit Puppen der *Monacha*) am 6. August verpuppt hatten. Mehrmals fand ich auch im October tief in der Erde ganz frische Käfer von *Cicindela*, die augenscheinlich erst eben aus der Puppe gekommen waren. Ganz junge Larven, z. B. von *Carabus Sycophanta*, fand ich nur im Frühjahr. Wahrscheinlich ist also im ersten Frühjahr ihre erste Begattungszeit und die Eier werden an versteckten Orten, besonders in der Erde, abgelegt, worüber jedoch nichts mit Bestimmtheit ermittelt ist. Mir ist es nie geglückt dies zu beobachten, denn obgleich ich Weibchen der größern Arten, welche nach der Ausdehnung ihres Hinterleibes zu schließen, gewiß trächtig waren, öfters in mit Erde gefüllte und im Freien aufgestellte Töpfe einsperrte, wo alle sie begünstigende Bedingungen gegeben zu sein schienen, so starben sie doch bald. Allerdings scheint sich auch die Verpuppung früher einstellen zu können, wie das überhaupt bei allen Insecten, besonders zur Zeit einer großen Verbreitung, oder wenn die Larven eingesperrt werden, so verschiednen ist. So verpuppte sich bei Hrn. Heer *Car. auro-nitens* schon den 3. Juni und schlüpfte am 15. aus, und *Carabus rostratus* (beide vom hohen Gebirge entnommen) den 14. Juni und schlüpfte nach vier Wochen aus. Bei uns wird sich das gewiß auch zuweilen ereignen können, denn ich habe einzelne halbwüchsige Larven von *Carabus Sycophanta* auch schon im Herbste gefunden und andre mehr erwachsene schon Mitte März in Bewegung gesehen. Diese würden also im Sommer ausgeschlüpft sein, während jedoch die allermeisten schon im vorigen Herbst erwachsen waren, und noch vor Winter herauskamen.



Hierher gehört auch eine Nachricht von einem meiner Zuhörer, Hrn. Ulrich, welcher in dem (besonders durch anhaltende Juni- und Juli-Wärme ausgezeichneten und an Raupen reichen) Jahre 1538 Käfer von *Carabus glabratus* schon Ende August in der Begattung fand. Die Nahrung dieser Insecten besteht gewifs nur aus thierischen Stoffen. Wenn *Carabus Cephalotes* ein „*frumenti vastator, certe eius larva*“ (Nicol. Col. p. 12.) genannt wird, so beruht dies gewifs auf einem Irrthum. Auch *C. gibbus* will man an Getreidewurzeln zerstörend gesehen haben. Ob sie hier nicht aber den zerstörenden Larven nachgingen? In dergleichen Beobachtungen täuscht man sich sehr leicht. Weder mir noch andern Freunden ist jemals so etwas vorgekommen. Dagegen sahe man sehr häufig sowohl die Larven, wie auch die Käfer, andre Insecten wirklich fressen. Ihre Schnelligkeit, wie auch die ungemein kräftigen und entwickelten Mundtheile, selbst die wunderbaren Fangapparate bei *Cicindela*, deuten schon genugsam darauf hin; ob aber auch die eigenthümliche Absonderung, welche sie aus dem After, zuweilen mit knisterndem Geräusch (bei *C. expulso*, den ich in die Weingeistflasche einsammelte, hörte es sich an, wie wenn man siedendes Blei in Wasser gießt?) kaum! Dies dient ihnen wohl nur als Wehr, denn wer davon nichts weiß und eine solche stinkende Ladung in die Hand oder gar in das Gesicht bekommt, läßt seine Beute gewifs wieder fahren, und auch angreifende andre Thiere scheuen sich gewifs davor. Flüssigkeiten, welche eine ergriffene Beute für die Verdauung vorbereiten sollen (Schlangen, Spinnen) werden nicht aus dem After, sondern aus dem Munde entleert. Was nun die Nahrungsthier selbst betrifft, so dürften diese wohl allermeist nur im lebenden Zustande angegangen werden. Hrn. Hartig's (*Conv.-Lex.* S. 135.) Beobachtung, dafs mehrere Exemplare von *C. cephalotes* ein Cadaver begruben, habe ich nie wiederholen können. Meine Beobachtung, in Folge derer diese Käfer stets in Erdlöchern wie Feldgrillen lebten, stimmt auch mit der von Schrank (*Faun. Austr.* S. 210.) welcher von dem Käfer sagt: *Habitat in terra cavernas fodiens in usque latitans uti gryllus.* Dabei war es sehr auffallend, dafs sie sich bei uns gerade auf Kiefern-Saatbeeten, wo die Grillen sehr überhand genommen hatten, und wo am wenigsten Cadaver von grössern Thieren zu suchen waren, in solcher Menge fanden. Sie waren hier auch im Jahre 1538 wieder sehr zahlreich erschienen, und es eignete sich dabei folgender, ihre Nützlichkeit noch mehr beweisender Fall. Ein Käfer hatte sich in einen Blumentopf geschlichen in welchem Engerlinge aufbewahrt wurden und hatte mehrere derselben so weit verzehrt, dafs nur die Haut übrig geblieben war. Will man hier nach Analogien gehen, so könnte man es, wenn sie Cadaver angehen, als eine Ausnahme aus Noth betrachten, weil man deren so unverhältnissig wenige beim stärksten Raupenfrafs am Boden liegen sähe. Dagegen habe ich nur zu bemerken, dafs, wenn die Falter an der Erde verzehrt würden, man hier doch wenigstens die Flügel derselben finden müßte, die gewifs kein Insect mit verzehrt. Nimmt man an, dafs bei dieser Vertilgung die Vögel besonders wirksam sind, so erklärt sich das gänzliche Verschwinden der Schmetterlinge leichter, die überdies noch zwischen der Rinde und den Zweigen häufig hängen bleiben und von den Winden fortgeführt und zerissen werden. So viel ist gewifs, dafs nach oft und unter den verschiedensten Verhältnissen und in den verschiedensten Gegenden wiederholten Beobachtungen die Laufkäfer nur lebende Insecten angreifen. Am häufigsten sahe man sie mit Raupen beschäftigt. Es ist aber höchst wahrscheinlich, dafs sie auch andre Larven, wie auch Puppen und selbst allerlei ausgebildete Insecten angreifen, und überhaupt dafs sie nicht blofs auf gewisse Arten beschränkt sind. Die Larven wenigstens, welche ich mitten in der Rinde in der Nähe der Gänge von Borkenkäfern fand, können doch nur von letztern gelebt haben. Es kommt vor, dafs Sykophanten-Larven den Weibchen der *Ph. B. Pini* die Eier aus dem Leibe fressen und sich in die Puppen derselben, so wie in die der *Ph. B. Monacha* ganz hinein-

fressen. Sie treiben dies übrigens nicht bloß als Larven, sondern auch als Käfer, und diese scheinen noch kräftiger und muthiger zu sein, als die Larven, denn Käfer von *C. Sycophanta* fraßen ihre eigenen Larven, mit denen ich sie einst zusammengesperrt hatte. Die Käfer ergreifen ihre Beute im offenen Kampfe, wogegen die Larven auch bei einigen im Hinterhalte zu lauern scheinen, wie die der Cicindelen, welche in Erdhöhlen (deren Eingänge denen der Gryllen ähneln und oft, besonders in festem Lehm Boden, in Menge und selbst an steilen Wegwänden beisammen sind) leben, und in diese die vorübergehenden Insecten reifen, wozu ihnen die beiden Rückenhaken gewiß dienen. Wenn die Larven oder die Käfer einen offenen Angriff unternehmen, so fassen sie ihre Beute mit den starken Oberkiefern und halten sie so fest, daß es kein Entrinnen mehr zu denken ist. Die Sycophanten-Larven sahe ich immer die größten und stärksten Kienraupen, unter deren dichtgedrängten Haufen sie sich in Fanggräben bei einem großen Raupenfrasse befanden, auswählen. Die meist viel größere Raupe ergiebt sich nicht sogleich, sondern schlägt mit dem Kopfe und dem nicht ergriffenen Körpertheile so heftig, daß der Räuber oft wie ein Windmühlenflügel herumgedreht wird. Daher kommt es auch wohl, daß man Raupe und Larve oder Käfer oft vom Baume stürzen sieht. Hr. Pfeil sahe bei einem Frasse der *Noctua piniperda*, daß ein und derselbe Käfer zu wiederholten Malen (10 bis 15 Mal schnell hintereinander) auf das Eiligste den Baum bestieg, sich mit einer Raupe von demselben herunterstürzte, sie dann würgte und schnell wieder dasselbe Spiel begann. Wenn man nicht alle Arten der Laufkäfer so fleißig im Verfolgen sieht, so kommt dies wohl daher, daß sie sich bei diesem Geschäft der Beobachtung entziehen, indem sie es während der Nacht betreiben oder auch wohl Larven in der Erde, namentlich gewiß Engerlingen, nachstellen. Da im Ganzen so selten die Angriffe von Laufkäfern beobachtet werden, so will ich hier auch den von Hrn. Suffrian mir mitgetheilten Fall erzählen. Bei Gelegenheit eines merkwürdigen Maikäferfrasses auf einem Rapsfelde zwischen Aschersleben und Stafsfurt, beobachtete derselbe: wie zahlreiche Exemplare des *Carabus auratus* (unsrem, auf Taf. I. P. 8. abgebildeten *auronitens* sehr ähnlich) geschäftig umherliefen und bald hier bald da, oft 3-4 zugleich einen Maikäfer ergriffen und anfrassen. Letztere wurden stets zuerst am Hinterende des Rumpfes ergriffen. Die Caraben suchten ihnen mit dem Kopfe unter die Flügeldecken zu kommen, dieselben in die Höhe zu heben und die Flügel an der Wurzel abzubeißen, worauf der Rumpf von obenher ausgefressen und der untere, härtere Theil (Brust und Bauch) weggeworfen wurde. Künstlich füttern lassen sie sich gewiß schwer. Nur einige Male hatten die Larven und Käfer, welche ich gefangen hielt, gefressen, oft erst, nachdem schon 8 bis 12 Tage Raupen in ihrem Zwinger gefuttert worden waren; die meisten starben bald, wahrscheinlich weil sie sich freiwillig zu Tode hungerten. Bei den künstlich in Töpfen verwahrten Sycophanten-Larven sahe ich auch, wie sehr sie den Aufenthalt in der Erde, in die sie sich geschickt und schnell, mit dem Kopfe voran bohrend und mit den Füßen grabend, einwühlen, lieben, denn sie gingen nach allen Richtungen durch dieselbe und ihre Gänge verschütteten sich nicht sogleich. Sitzen sie draußen und man kommt ihnen nahe, so krümmen und winden sie sich Aufangs und schieben in ihre Gänge, in denen sie sich sehr schnell bewegen. Die Menge, in welcher sie erscheinen, ist oft sehr groß; so sahe ich, wie schon erwähnt, bei einem großen Frasse der Kienraupe Hunderte von Käfern und Larven der Sycophanten, wie auch *C. coriaceus*, *violaceus* und *glabratus* in den Fanggräben. Wie viele mögen da noch auf den Bäumen gesteckt haben! Eben so selten sind sie aber auch wieder manches Mal. So beobachtete Hr. Saxeen zum großen Leidwesen für die Freunde dieser schönen Thiere, daß sie in den Jahren 1835 und 36, welche bekanntlich sehr trocken waren, am Harze selten geworden waren, ja eine Art, die immer nur an einer Stelle dort gefunden worden war und daher um so sicherer beobachtet werden konnte (*C. irregularis*), war fast ganz verschwunden. Die Bewegung der Laufkäfer ist fliegend und laufend. Nur wenige, wie die Cicindelen, fliegen häufig. Die übrigen, welche doch größtentheils noch Unterflügel haben, benutzen diese gewiß selten, denn ich sahe nur kleine Arten, nie die großen, im Fluge.

Die FORSTLICHE BEDEUTUNG geht aus dem eben Gesagten zur Genüge hervor. Die Laufkäfer gehören zu den nützlichsten Thieren im Walde und versagen namentlich bei großem Raupenfraße ihre Dienste nie. Der Forstmann muß sie daher sowohl im Larven- wie im Käferzustande kennen und sie nicht etwa für schädliches Gewürm halten und mit den Raupen tödten, sie vielmehr schonen und auf alle mögliche Weise erhalten. Dazu gehört namentlich, daß er sie nicht in den Raupengraben, wo sie doch überflüssig sind, da die darin befindlichen Raupen ohnehin sterben, unkommen läßt, sondern ihre Thätigkeit wieder den im Reviere auf dem Boden und den Bäumen zerstreuten Raupen zuwendet. Man hat vorgeschlagen, durch hineingelegte Reiser ihnen Gelegenheit zum Entfliehen zu geben. Indessen ist dies, abgesehen davon, daß die Raupen auch auf diesen Brücken herauskriechen können, nicht ohne Mühe zu bewerkstelligen, und in derselben Zeit werden einige Arbeiter durchgehen und die Larven und Käfer mit den Händen herauswerfen können. Allerdings muß man es erst lernen sie so anzufassen, daß sie nicht beißen, oder Handschuhe dazu anziehen.

Die EINTHEILUNG der Laufkäfer, welche bei Linné nur in zwei Gattungen sehr einfach standen, ist in den neuesten Zeiten bei der sich immer mehrenden Artenzahl höchst verwickelt geworden. Man hat sie nicht allein in sehr viele Gattungen gesondert, sondern diese auch noch unter höhere Abtheilungen zusammengestellt. Da es dem Forstmanne aber nicht auf die Unterscheidung aller Arten, wie bei einer sehr schädlichen Gattung, ankommt und er überhaupt nur, wie bei allen nützlichen Insecten, die generellen Merkmale im Auge haben muß, so darf hier nicht auf die specielle Auseinandersetzung, sondern nur auf die Linné'schen Gattungen, zwei an der Zahl, eingegangen werden, und deshalb sind auch nur einige Arten, gleichsam die Repräsentanten der Hauptformen im Walde, zugleich die gemeinsten und wirksamsten bei Raupenausbreitungen, abgebildet worden.

#### Erste Gattung.

#### *Cicindela* Linn. Sandkäfer. (Taf. I. 12.)

Die NAMEN Sandkäfer, Sandläufer, Zangenkäfer, Dünnfußkäfer, Courier werden bald für die eine, bald die andre Art im Volke gebraucht, und andre Benennungen, welche zugesetzt sind, wie Feld-, Wald-Bastard- u. s. w., pflegen nur reine Übersetzungen der lateinischen Artnamen zu sein, und nützen deshalb nichts.

CHARACTERISTIK. Sowohl Käfer wie Larven haben soviel Eignes, daß sie, wenn sie auch im weitem Sinne mit den Käfern der zweiten Gattung in eine Abtheilung (Familie) gehören, doch generisch davon getrennt zu werden verdienen. Schon im ganzen Bauhen unterscheidet man die Käfer auf den ersten Blick von allen übrigen, indem sie äußerst schnell laufen, dann plötzlich auffliegen und nach kurzem Fluge im Zickzack, so daß man ihnen schwer folgen kann, sich wieder setzen und laufen u. s. f., wobei ihnen warmes Wetter besonders zu Statten kommt, während sie bei kühlem und des Morgens auf bethautem Boden nur unbehilflich laufen. In ihrer ganzen Gestalt, besonders wenn man dazu die zierlichen, schlanken Füße nimmt, haben sie mehr Grazie, als die meisten übrigen Laufkäfer. Kunstgerecht characterisirt man sie so: Käfer. Kopf (12k) mit den stark vortretenden Augen breiter als der schmale Halsschild. Kopfschild schmal. Leuze stark vortretend, quer, mit etwas gebogenem, in der Mitte stachelspitzigem Vorderrande. Oberkiefer lang und spitz, mit mehreren spitzen, starken Zähnen am Innenrande. Unterkiefer schmal, mit beweglichen, langen, spitzen, gekrümmten Zahn am Ende, zahlreichen rostgelben Borstenwimpern und viergliedrigen äußern, mit Borstenwimpern besetzten und zweigliedrigen innern, kahlen Tastern. Lippe kaum bemerkbar, hinter dem dreizähligen Kinn versteckt, mit dreigliedrigen, an dem langen zweiten Gliede zahlreiche, lange, starke Borstenwimpern zeigenden Tastern; das dritte Glied

ganz kahl. Halsschild schmal, vorn und hinten eingeschnürt. Unterflügel vorhanden. Die drei ersten Fußglieder an den Vorderfüßen schwammig gepolstert. — Die Larve der *C. campestris* (der gewiß auch die der andern Arten sehr gleichen) (Tab. I. Fig. 12 BC) ist  $13\frac{1}{2}$  lang und über 2" breit. Der Kopf fast herzförmig, oben vertieft und unten auferst stark gewölbt. Lefze mit Kopfschild verwachsen, abgerundet viereckig und, so wie der Kopfschild, an der Seite mit einigen Zähnen. Oberkiefer stark nach oben und innen gekrümmt, spitzig schmal, an der Basis innen mit starkem Zahn. Unterkiefer fast wie bei den Caraben an der Basis mit kleinem Höcker, nur sind äußerer und innerer Taster an der Basis verwachsen, so daß, außer dem gemeinschaftlichen dicken Basalgliede, erstere nur drei kurze dicke Glieder und die letztern zwei lange haben. Lippe abgerundet viereckig, fleischig, die zweigliedrigen kurzen, an der Außenseite eingefügten Taster überragend. Fühler kurz, viergliedrig am Kopfrande hinter dem Aufsenwinkel des Oberkiefers. Jederseits am Hinterwinkel des Kopfes zwei ungewöhnlich große, halbkuglig vorragende Augen; zwei kleine gewölbte Pünktchen an der Unterseite, in der Gegend des ersten Auges, scheinen auch noch dazu zu gehören. Der erste halbmondförmige, regelmäsig gewimperte und behaarte Ring so nahe an den Kopf gepreßt und so mit seinen Vorderrändern an die Hinterränder desselben angepreßt, auch von derselben Farbe und in gleicher Ebene liegend, daß man auf den ersten Blick beide für ein Glied hält (wahrscheinlich beim Fange nützlich). Die beiden folgenden, viel kleineren, aber auch noch mit großen braunen, fast herzförmigen, behaarten Hornschildern bedeckt. Jedes der übrigen hat oben zwei hornige behaarte Flecke, die aber viel blässer, kleiner und weicher sind. Der achte ist dicker, breiter und besonders viel höher, als die übrigen. Hinter den beiden Schildflecken desselben erheben sich zwei stumpfe kegelförmige Wülste, deren jede nach hinten mit steifen kurzen Borsten besetzt ist und nach vorn einen innern kurzen, dicken, spitzen, mit Borsten besetzten Dorn trägt und eiförmig sehr spitzen, hakig gekrümmten, mit der Conveitität nach innen gerichteten. Der letzte Ring trägt einen einfachen, kurzen, etwas nach hinten gerichteten Tubulus ohne Seitenanhänge. Das erste Lufloch an der Grenze zwischen dem ersten und zweiten Ringe, wahrscheinlich mehr dem ersten angehörend. Die Füße sind so wunderbar dem Rande des Körpers eingefügt und nach oben gerichtet, daß man, noch dazu, wenn man die starke Wölbung an der Unterseite des Kopfes betrachtet, in Versuchung geräth, unten für oben zu halten. Der Schenkelhöcker scheint hier nicht ein so abgesetztes und selbstständiges Glied zu bilden wie bei den übrigen Caraben, so daß nur drei Hauptfußtheile und zwei Häkchen die Füße bilden.

**VORKOMMEN.** Mehr an freien Stellen im Walde, wo die Larven im unbenarbteten Boden besser hausen und die Käfer, welche besonders breite, sandige Wege lieben, schneller laufen können.

Über **LEBENSWEISE** und **FORSTLICHE BEDEUTUNG** wurde schon das Nöthige bei den Laufkäfern im Allgemeinen abgegeben.

**EINTHEILUNG.** Die Gattung ist eine der kleinsten und Deutschland hat nur vier, nah verwandte, Arten aufzuweisen, weshalb man weiter keine Eintheilung in kleinere Gattungen damit vorgenommen hat.

#### A r t e n .

Die fast überall, auch da, wo es andre Arten nicht giebt, vorkommende Art, von welcher wir auch die Larve in verschiedenen Stellungen so wie den Käfer abgebildet haben (die Besch. s. oben), ist die *C. campestris* Linn. Sie ist 6 bis  $6\frac{1}{2}$ " lang und von oben grasgrün mit gelblich-weißen Flecken und Hakenzeichnungen. Zunächst gemein, namentlich bei uns vorherrschend ist die, der vorigen in Gestalt und Größe vollkommen gleiche, *C. hybrida* L., welche jedoch oben mehr röthlich-braun und mit ähnlichen Flecken wie bei der vorigen geziert ist. Die dritte, in Wäldern auch dann und wann häufig vorkommende

Art ist die *C. sylvatica* L., 7 bis  $7\frac{1}{2}$  lang, also die größte und überdies durch dunkle, grob-runzliche punktirte Flügeldecken ausgezeichnet. *C. germanica* Fabr. ist nur etwa 4" lang und wahrscheinlich nie in Wäldern.

#### Zweite Gattung.

#### *Carabus* Linn. Laufkäfer. (Taf. I. Fig. 1—11.)

Die NAMEN sind meist die schon bei den Laufkäfern im Allgemeinen aufgeführten. Der einen oder andern Art, besonders wenn sie ausgezeichnet und für Jeden kenntlich ist, werden auch wohl noch besondere Namen gegeben, die jedoch so wankend sind, daß sie kaum zu einer sichern Verständigung dienen, z. B. Goldkäfer, Goldschmidt, Goldarbeiter, Hohlpunkt, Goldleiste, Kupferschmidt u. s. f. Man versteht darunter nämlich nur die ausgezeichnet ganz oder zum Theil metallisch-glänzenden großen Arten, wie *hortensis*, *memoralis*, *auratus*, *auro-nitens*, *violaceus* u. s. f. Ziemlich durchgehend nennt man den *C. Sycophanta* Puppenräuber, Baunkäfer, Mordkäfer, Raupenjäger, Bandit.

Die CHARACTERISTIK kann sehr kurz gefaßt werden, da die Laufkäfer im Allgemeinen, und auch die Sandkäfer im Besondern, schon ausführlich geschildert wurden. So rasch und schnell zum Fluge bereit sind die Caraben nicht wie die Cicindelen; den allermeisten großen Arten fehlen sogar die Unterflügel ganz, ja bei einigen sind die Oberflügel an der Naht verwachsen. Ihr Kopf ist, mit Ausnahme weniger, noch dazu meist nicht im Walde vorkommender, Arten schmaler oder viel schmaler als der Halsschild. Die Oberlippe nie sehr auffallend vortretend, nicht stachelspitzig am Vorderrande. Die Oberkiefer haben nie zahlreiche Zähne am Innenrande. Die Unterkiefer haben entweder nur einen unbeweglichen großen oder auch sehr kleinen Zahn am Ende. Die Unterlippe ist meist ziemlich ansehnlich. Die Taster ohne Borstenwinupern. Der Halsschild rundlich oder abgerundet-viereckig mit nach hinten gezogenen Winkeln, zuweilen nach hinten in eine Art Hals verlängert. Die schwammigen Sohlen der Männchen finden sich entweder an allen Fußpaaren, oder nur am ersten, oder am ersten und zweiten, entweder an den vier ersten Gliedern oder nur an den zwei bis drei ersten. Die Flügeldecken sind abgestutzt oder nicht, das Ende der Vorderschienen gebuchtet oder nicht, wonach die mannigfaltigsten Verschiedenheiten entstehen und Gelegenheit zu Eintheilungen geben. — Von den LARVEN, die wir noch nicht so allgemein schilderten, haben wir auch so umfassende Kenntnisse noch nicht und müssen uns hier auf folgende beschränken, die jedoch die Haupttypen abgeben dürften. Eine der gemeinsten, die von *C. Sycophanta*, ist 1' 3" lang und oft über 4" breit. Der Kopf ist im Verhältniß zu andern Caraben und Staphylinen nicht sehr groß, gerundet, oben uneben flach, unten und an der Seite gewölbt. Mundtheile (11). Kopschild und Lefze verwachsen, zweispitzig vorragend. Oberkiefer stark, spitzig, hornig-gekrümmt, an der Basis mit starkem, gekrümmten Zahne. Unterkiefer länglich, fest-federartig, behaart, mit doppeltem, sehr sparsam behaarten Taster; der äußere viergliedrig, lang; das erste Glied sehr kurz, die übrigen ziemlich gleich lang; der innere zweigliedrig; die Glieder ziemlich gleich lang. Lippe fast rhomboidal mit stark vorspringenden Vorderwinkeln, zu dessen jeder Seite der zweigliedrige, nackte, lange Taster sitzt. Fühler sehr sparsam behaart, viergliedrig am Rande des Kopfes hinter dem Aufsenwinkel des Oberkiefers: das erste, auf einer häutigen dicken Basis sitzende Glied das dickste, das zweite das längste, das vierte das dünnste. Dicht hinter denselben, auf einer halbkuglig hornigen Wulst, die sechs fast im Kreise gestellten Äugeln. Der erste Ring der längste, vorn verschmälert. Die Gestalt der übrigen sehr verschieden, wie es scheint nach Alter und Sättigung; bei sehr ausgewachsenen Larven erweitern sie sich bedeutend bis zum sechsten oder siebenten und nehmen dann allmählig wieder ab (so daß der ganze Körper lanzettförmig), bei jüngern dagegen haben sie vom zweiten bis elften fast gleiche

Breite (so dafs der ganze Körper linienförmig), bei diesen letztern reichen die halbhörnigen Schilder fast von einem Luftloch zum andern (das erste am zweiten Ringe an der Unterseite nahe dem Vorderrande), bei den erstern dagegen liegen diese in einem breiten, häutigen, graugelben Theile (vielleicht bei vollkommener Sättigung des Thieres), welcher gegen das Braunschwarz der Rückenschilder und der kleinen Raudschilder sehr absticht und der Larve ein so verändertes Ansehen giebt, dafs man sie für andre Art halten könnte. Die gerandeten Schilder sind ungetheilt, blofs mit einer Mittellinie und einem seitlichen Eindrucke versehen, und lassen vom Hinterrande im ersten Falle gar nichts und auch im letztern wenig sehen: der letzte Ring ganz vollständig mit einem oben braunrothen Schilde bedeckt, welcher sich in ein Paar nach oben gekrümmte starke, schwarze Haken fortsetzt, die an der Basis noch einen kleinern Haken tragen. Von der Unterseite dieses Ringes geht nach unten ein kurzer häutiger, bis  $\frac{1}{2}$  L. lang vortretender, einen Nachschieber vorstellender Cylinder. Die Unterseite ebenfalls mit Schildern bedeckt, welche aber kleiner und zahlreicher, meist auch nicht so dunkel gefärbt sind. Füfse schwarz, lang und stark, zweiklauig. Die Larve von *C. auro-nitens*, welche Hr. Heer giebt, zeigt fast gar nichts Wesentliches, ausser dem ästigen Afterhaken und einigen Eigenthümlichkeiten der Mundtheile. In der Abbildung erscheinen die Füfse verhältnismäfsig länger, der Kopf gröfser. Die Schilder bedecken die Oberseite ganz. Auch *C. depressus* und *C. rostratus* weichen nach Heer's Beschreibung und Abbildung so wenig ab, dafs ich sie hier übergehe. *C. rostratus* zeichnet sich in der Abbildung besonders aus durch kurzen gedregenen Körper, auffallend kleinen Kopf und etwas nach oben gekrümmten Oberkiefer (wie bei *Cicindela*), auch durch stark behaarte Fühler; ausserdem besitze ich noch mehrere Larven, die zwar nicht der Art nach zu bestimmen sind, aber sicher den Caraben angehören. Die eine 10" lange und 1,7" breite (wahrscheinlich noch nicht ausgewachsen), ist jenen (besonders *Sycophanta*) im Allgemeinen ähnlich, aber ausgezeichnet dadurch, dafs der Kopf gröfser ist, fast wie bei einem *Staphylinus*, und dafs wie bei diesen das dritte Fühlerglied ein Nebengliedchen hat, aber nicht nach innen, sondern nach aufsen, und dafs neben dem Aftercylinder ein Paar gegliederte lange Fortsätze stehen. Die Oberkiefer aufwärts gekrümmt. Ein Paar andre, noch kleinere, ganz lineare, ähneln fast den Larven von *Elaeter*: Kopf kleiner mit sehr kleinen Fühlern und Tastern. Die Schilder reichen von einem Luftloch zum andern und sind viereckig. Das letzte endet in zwei zweispaltige nach oben und innen gekrümmte Dornen. Grundfarbe schön bläulich. Die Schilder hell und dunkelbraun gefleckt. Körper lang behaart. Beine einklauig. — Die Puppen werden wahrscheinlich am besten durch die von *C. Sycophanta* (Fig. 11 G, H) repräsentirt. Diese ist bis 10" lang und 5" breit. Der Kopf ziemlich weit herübergeneigt, den Halschild stark verdeckend. Die Fühler nach unten eingeschlagen, an der Brust parallel endend. Flügel schmal und kurz, nur bis zum dritten Hinterleibsringe reichend: das untere von dem obern nur wenig bedeckt. Die beiden ersten Fußpaare stark ansteigend, das letzte mit absteigenden, unbedeckten Schienen und Fußgliedern, den After überragend. Der letzte Ring mit zwei aufwärts gerichteten, mit kurzen Zacken versehenen Fortsätzen. Unterseite kahl. Der Rücken der neun Hinterleibsringe gegen den Hinterrand, so wie die Seitenwülste durch nach hinten gerichtete braunrothe, dichtstehende Borstenhärcchen scharflich. Die Beschreibungen und Abbildungen einiger Puppen bei Heer bieten nichts Bemerkenswerthes.

Über VORKOMMEN, LEBENSWEISE und FORSTLICHE BEDEUTUNG der Caraben ist hier nichts mehr hinzuzufügen, da das Nöthige schon bei der allgemeinen Betrachtung der Laufkäfer vorgekommen ist.

Die EINTHEILUNG der Caraben ist wegen der großen Menge hierhergehörender Arten auferst schwierig, und wird von verschiedenen Schriftstellern verschieden gegeben. Die Hauptunterschiede, welche dabei zu Hülfe genommen werden, zeigte schon die Characteristik. Wenn man [die Zerspaltung in kleine Gattungen weit treiben will, kann man selbst in der Mark 44, nach Hrn. Erichson, annehmen. Auch die Repräsentanten können wir nicht einmal alle geben. Auf der ersten Tafel sind

wenigstens die wichtigsten für den Forst dargestellt, nämlich: *Calosoma*, *Dromius*, *Carabus*, *Cephalotes*, *Cychrus*, *Procrustes*, und *Feronia*.

#### A r t e n .

Wir unterscheiden zuerst diejenigen, bei welchen die Flügeldecken die Spitze des Hinterleibes nicht ganz bedecken, und hinten gerade abgestutzt sind, von denen, bei welchen dies nicht der Fall ist. Die ersten sind sämtlich kleine Caraben, und unter ihnen besonders häufig: *C. agilis* F. und *4-maculatus* Linn. (*Dromius agilis* und *4-mac.* Dej.) (Fig. 9, 10.): der eine 2 $\frac{1}{2}$ " lang und oben dunkelbraun, ungefleckt, und der andre 2 $\frac{1}{4}$ " lang und oben braun mit vier hellen Flecken der Flügeldecken. Unter den letztern (nichtabgestutzten) giebt es zwar auch viele kleine, aber auch sämtliche große, welche wegen ihrer Kraft und Kühnheit nützliche Forstthiere sind. Sie haben theils einen runden Halsschild, wie der 11-14" lange, meist schön metallisch grün und roth glänzende, selten ins Schwarz variirende *C. Sycophanta* Linn. (*Calosoma* S. Fbr.) (Fig. 11.), (dem mehrere Arten, wie *C. Inquisitor*, der aber meist kleiner ist, ähneln), theils einen abgerundet viereckigen Halsschild, oder fast herzförmigen, wie die übrigen abgebildeten. Der *C. coriaceus* Fbr. (*Procrustes* c. Bonelli) (Fig. 1) ist der größte unter allen einheimischen, bis 17" lang und ganz schwarz. Der ebenfalls schwarze, aber nur bis 8" lange *C. rostratus* (*Cychrus* r. Fbr.) (Fig. 6.) ist durch starke Wölbung der Flügel nach hinten, so wie durch schnabelähnliche Verlängerung der Oberkiefer nach vorn ausgezeichnet. Der ebenfalls schwarze, bis 10" lange *C. Cephalotes* Fbr. (*Cephalotes vulgaris* Bon.) (Fig. 5.) hat einen nach hinten verschmälerten, oder fast herzförmigen Halsschild und fast ganz glatte Flügel, so wie der auch schwarze, bis 9" lange *C. niger* Fbr. (Fig. 7.) (*Feronia nigra* Latr.) sich durch seine tief gestreiften Flügeldecken, durch seine ansehnliche Größe unter den ähnlichen schwarzen (unter denen die gleich großen sich wieder durch breitere Gestalt unterscheiden) auszeichnet. Endlich ist noch der *C. granulatus* Linn. (Fig. 4.) durch seine Länge von 7-9 $\frac{1}{2}$ ", so wie durch die Reihen kettenförmiger Körnchen zwischen den Leisten der Flügeldecken ausgezeichnet, ferner der *C. hortensis* Linn. (*Carabus gemmatus* Fbr.) (Fig. 2.) durch 11-12" Länge und herrlich metallisch-glänzende, regelmässig gereihe Grübchen der Flügel, dann der *C. violaceus* Linn. (Fig. 3.) durch 12-13" Länge und schwarze glänzend-veilchenblau geränderte matte Flügeldecken, und der *C. auronitens* (Fig. 8.) durch 9-11" Länge, geleistete Flügeldecken, und herrlich metallisch-grün und kupferroth stark glänzende Oberseite.

#### Zweite Familie.

##### Kurzflügler. (*Brachelytra* s. *Microptera*.)

Das wichtigste, diese Familie characterisirende Merkmal ist in dem Namen sehr gut ausgedrückt, denn die Kürze der Flügel, welche kaum die Hälfte des Hinterleibes bedecken, unterscheidet sie von allen übrigen Insecten derselben Abtheilung genugsam. Wegen der Larven und Puppen, s. Gattung *Staphylinus*. Indem wir hier über alle allgemeine Betrachtungen, wegen der geringern forstlichen Wichtigkeit dieser Familie ~~deswegen~~, hinweggehen, erinnern wir nur, daß diese Familie erst in neueren Zeiten, als die Artenzahl sich außerordentlich mehrte, aufgestellt werden mußte, um die zahlreichen kleinen Gattungen, welche aus Linné's einziger hervorgegangen waren, zusammenzufassen; diese einzige (also der Familie parallele) ist die

Gattung: *Staphylinus* Linn. Raubkäfer. (Taf. I. 13, 14).

Die NAMEN Raubkäfer, Traubenkäfer, Luderkäfer, Bärenräuber, Misträuber werden, wie gewöhnlich, ohne Unterschied dem einen und dem andern dieser Käfer gegeben. Dieselben beziehen sich sämtlich auf die gleich zu schildernde Eigenthümlichkeit der Lebensweise.

Die CHARACTERISTIK ist den wichtigsten Zügen nach schon in dem kurzen Familiencharacter angedeutet. Sie liegt in der Kurzflügigkeit. Diese erlaubt kaum einen Fehlgriff, wenn man nicht etwa die sogenannten Orlwürmer, die aber einer ganz andern Ordnung (*Orthoptera*) angehören, dafür zu halten verführt würde, oder einige kurzflügelige Holzböcke oder Maiwürmer, die aber auch ganz andern Abtheilungen der Käfer (*Heteromera*, *Tetramera*) angehören, auch sich schon durch die Bildung der Fühler, Fresswerkzeuge u. s. f. unterscheiden. Der kunstgerecht entworfene Character: Käfer. Kopf groß, so breit oder breiter als Halsschild, selten schmaler, meist abgerundet-viereckig und ziemlich flach. Augen meist wenig, selten stark vorragend. Fühler kurz, den Halsschild nicht überragend, fadenförmig, aber gegen das Ende ein wenig dicker, perlschnurförmig. Lefze (I. 14a) mit dem Kopfschild fest verbunden, ganzrandig oder ausgerandet, oft fast bis zur Zweitheiligkeit, mit Borstenhaaren. Oberkiefer (14b) hornig, stark, lang und spitzig, am Innenrande meist mit mehreren stumpfen Zähnen und einer gewimperten, über die tiefste Bucht ausgespannten Haut. Unterkiefer (14c) mit festem, hornigem, mehrere Nähte deutlich zeigenden Stamm und einer zweilappigen, am Ende gewimperten und behaarten Lade: der innere Lappen breiter als der äußere, einem innern Taster ähnlich. Der wahre Taster viergliedrig (bei vielen kleinen auffallend lang und scheinbar dreigliedrig) mit langen Borstenhaaren. Das zweite Glied das längste, das dritte und vierte ziemlich gleich lang, das letzte fast walzig, am Ende eingedrückt, zuweilen keulenförmig oder pfriemförmig, überhaupt bei den kleinen sehr veränderlich. Lippe (14d) aus einem hornigen, aufsen die dreigliedrigen, die Lippe überragenden, borstenhaarigen Taster (deren letztes Glied auch veränderlich) tragenden, und einem hinter dem vorigen versteckten zweilappigen, gewimperten Stücke (*paraglossae*) bestehend. (Mundtheile größtentheils nach dem Baue von *S. olens* geschildert. S. die Abb.) Halsschild meist so breit wie Hinterleib, etwas gewölbt. Schildchen klein. Flügeldecken hinten abgestutzt, flach, meist nur die Basis des langen, linearen Hinterleibes und die zusammengelegten langen Unterflügel deckend. Zu jeder Seite des Afters ein aus- und einziehbares kegelförmiges Bläschen. Beine stark und ziemlich lang. Die Hüften des ersten Paares sehr stark. — Die Larven wären nur mit denen der Caraben, besonders mit einigen kleinern Formen derselben zu verwechseln, scheinen sich aber constant durch den nur eingliedrigen innern Unterkiefer-Taster zu unterscheiden, so wie durch die Entfernung der Fühler vom Kopfraude (Fig. 14B). Soviel ich nach den vor mir liegenden (z. B. Tab. I. Fig. 14B) bestimmt zur Gattung gehörenden, wenigleich nicht der Art nach bestimmbar Exemplaren, so wie nach den Abbildungen und Beschreibungen von Bouché (*Nat. der Insecten*) und Heer schliesen kann, sind sie oft sehr übereinstimmend gebildet. Sie haben einen langgestreckten, entweder durchaus linienförmigen oder lanzett-linienförmigen Körper. Der Kopf ist stets groß und mehr oder weniger vorspringend, sonst scheint er (nach Bouché und Heer) abzuweichen; ich sahe ihn (Fig. 14B) nur abgerundet-viereckig, oben sehr wenig, unten etwas mehr gewölbt. Kopfschild meist mit (6-9) spitzen Zähnen am Vorderrande. Lefze fehlend oder vorhanden und dann untergeschlagen, ganz oder ausgerandet (Bouché). Der Oberkiefer stark, hornig, lang, spitz, ziemlich stark gekrümmt, meist ohne Zähne und kahl, selten zweizählig (*S. moritans* Bouché) oder mit einzelnen Borsten (*S. aeneus* Bouché). Unterkiefer groß und weit vorragend: beide convergirend. Die Angel dick aber kurz, Stamm fast walzig, lang und dünn, ohne Nähte. Taster doppelt: der innere ein kleines, walziges Glied, der äußere viergliedrig: das erste äußerst kurz, aber das dickste, das zweite viel länger und von gleicher Länge mit dem dritten, das vierte kurz, dünn,



kegelförmig. Bouché beschreibt und zeichnet den *S. aeneus*, *variabilis* und *morsitans* mit fünfgliedrigen und den *S. punctulatus* mit viergliedrigen Tastern. Eine *seta articuliformis*, wie sie Heer beschreibt, fand ich nicht, auch ist das fünfte Glied bei Bouché ein wahres Glied und nicht bloß eine Borste. Lippe fast wie bei *C. Sycophanta* (s. Fig. 14 B) geformt, bei *S. morsitans* und *aeneus* schmaler. Taster zweigliedrig, das erste Glied länger, als das zweite kegelförmige. Fühler am Rande des Kopfes, entfernt, viergliedrig oder fünfgliedrig (Bouché). Das erste stets sehr klein, das zweite etwas länger, das dritte das längste, das letzte klein und sehr schmal; bei *olens* soll (nach Heer) das zweite das lange sein (?). Das vorletzte am Ende sehr stark verdickt und trägt hier nach innen noch ein höchst kleines, von Heer gar nicht erwähntes, Gliedchen. Augen ziemlich weit hinter dem Aufsenwinkel der Oberkiefer in einen Halbkreis gestellt. Gabellinie erst auf der Stirn getheilt. Von den drei folgenden Ringen ist der erste meist der größte, fast viereckig; bei *punctulatus* vorn auffallend verschmälert. Bei den folgenden, bis auf die beiden letzten (s. Fig. 14 B), übertrifft die Breite stets die Länge. Die drei ersten sind durch ein weich-horniges Schild bedeckt, welches auf dem ersten nur eine schwache Mittellinie zeigt, auf dem zweiten und dritten eine immer stärkere und von dem vierten bis elften sogar eine, den Schild in zwei Hälften theilende. Sie lassen hinten einen Rand eines jeden Ringes frei, auch an der Seite vom vierten bis elften einen Seitenrand, welcher nach aufsen durch ein geheiltes Hornstückchen begrenzt ist und das Luftloch beherbergt. Das erste Luftloch am Hinterrande der Unterseite des ersten Ringes nahe dem Einschnitt. Auf der Unterseite befinden sich ebenfalls weich-hornige aber kleinere Plättchen, sie lassen daher von der weichen Masse der Ringe mehr sehen. Der zwölfte, viel kleinere, Ring ist oben und unten von dieser weich-hornigen Masse bedeckt und trägt einen langen, walzigen Fortsatz, welcher im Leben nach unten gerichtet und als Nachschieber gebraucht wird. Neben demselben sind ein Paar lange, dreigliedrige, borstenförmige Fortsätze. Die Beine lang und stark, dreigliedrig: aus einem dicksten, längsten und zwei darauf folgenden, mit zahlreichen Dornen besetzten Gliedern bestehend und ein langes, gekrümmtes, ebenfalls gedornetes Häkchen zeigend (s. Fig. 14 B). Die Farben sind veränderlich, meist schmutzig gelblich-grau und braun. Fast der ganze Körper mit langen, einzelnen, starken Haaren besetzt. — In der Beschreibung und Abbildung der Larve von *S. olens* finde ich bei Hrn. Heer nichts Wesentliches, ja es sind dort, wie es mir scheint, sogar einige, die Gattung bezeichnende Merkmale unbeachtet geblieben, was mich um so mehr wundert, als Hr. Heer Hrn. Bouché so scharf kritisirt (p. 31.). Seine Abbildung der Puppe von *S. olens* habe ich (nur etwas gerade gerückt) (Fig. 14 G) copirt und erwähne nur, daß die enorme Größe des auf die Brust gelegten und den Halsschild ganz verdeckenden Kopfes, so wie die nach hinten gelegten Fühler, die äußerst schmalen Flügel und kurzen, ansteigenden Beine, deren Schienen und Fußglieder am letzten Paare ganz verdeckt sind, sich besonders auszeichnen. Am Vorderrande des Halsschildes stehen 12 lange, einzelne Haare wie ein Kranz herum.

Das Vorkommen der Staphylinen gleicht dem der Laufkäfer sehr, indem die meisten dieselbe Lebensweise führen. Leider ist über das Vorkommen der Larven und Puppen wenig bekannt, da diese überhaupt noch so wenig gekannt sind. Einige, namentlich der abgebildete *olens* und *erythropterus*, scheinen sehr weit, selbst nach Süden, verbreitet zu sein.

Die Lebensweise gleicht der der Laufkäfer sehr auffallend. Nur in der Zeit des Erscheinens scheint eine Verschiedenheit zu herrschen, indem die Zeit der vollkommenen Entwicklung höchstwahrscheinlich in den Vorsommer fällt. Hr. Heer (*Obs.* p. 21.) hatte die Larve von *S. olens* im Winter und die Puppe (welche in einer schön geglätteten Erdhöhle lag) im Mai, den ausgebildeten Käfer Ende Juni. Hr. Bouché fand die Larven nur im Winter und ich sahe mehrere im Frühjahr, so wie ich auch die Begattung der Käfer von *S. olens* sehr häufig im September bemerkte. Auch Bechstein giebt das Vorkommen der Käfer fast überall in der Zeit vom April bis in den Juni an. Die Nahrung dieser Insecten

besteht höchstwahrscheinlich wieder nur aus animalischen Theilen, hauptsächlich andern lebenden Insecten. Solche hat man sie wenigstens sehr häufig anehen gesehen. Ich selbst sahe sie bei einem Kienraupenfrasse sehr thätig und viele Andre beobachteten dasselbe. Noch bewahre ich ein Exemplar von *S. olens*, welches ich mit einem auf die Oberkiefer aufgespießten *Curculio incanus*, dessen sich das Thier nicht wieder hatte entledigen können, fing. Hr. Bouché, der die von ihm beschriebenen Larven der kleinern Arten auch mit rohem Fleische füttern konnte, sahe sie im Freien nur mit der Verfolgung kleiner Larven, besonders der Zweiflügler, beschäftigt, und ich bin daher überzeugt, dafs, wenn man sie in Pilzen, im Dünger, unter Rinden u. s. f. fand, sie hier ebenfalls nur kleine andere Insecten, die ja an jenen angeheben, andern Orten überall und so häufig sind, verfolgten und nicht von den vegetabilischen Stoffen lebten. Man hat sich hier wahrscheinlich eben so geirrt, wie bei der Angabe vegetabilischer Nahrung einiger Caraben. Hrn. Heer's (*Obs. ent.* p. 18.) Beschreibung des Verhaltens von *S. olens*, den er längere Zeit fütterte, giebt noch einen hübschen Beitrag zur Natur dieser Thiere. Die Larve, sagt er, lebt in Gruben, welche sie mit den Oberkiefern gräbt (eine solche fand er einst den 12. Februar unter einem Steine), die Erde wirft sie mit den Vorderfüßen heraus. Hier verbirgt sie den weichen Hinterleib und indem sie bald auf dem Rücken, bald auf der Seite, bald auf dem Bauche darin liegt, erwartet sie mit geöffneten Oberkiefern (wie in Fig. 14 & zu sehen) die vorübergehenden Thierchen, wie die Cicindelen (mit denen sie hier also eine sehr merkwürdige und noch von Niemand beobachtete Übereinstimmung der Lebensweise zeigt) und ergreift sie. Kleinere Thierchen werden in die Grube hinabgezogen, grössere aber zurückgehalten und mit den Oberkiefern getödtet. Beim Frasse sah er, dafs sie mit den vier vordern Füßen die Beute fest hielt, den Hinterleib gerade ausstreckte und den Kopf auf und nieder bewegend, den Raub mit den Oberkiefern in Stücke zerrifs. Einer Raupe sog sie blofs die Säfte aus und liefs das Cadaver in der Grube liegen. Übrigens sahe Hr. Heer die Larve Tag und Nacht munter. Einmal beobachtete er sie um 2 Uhr nach Mitternacht ausser ihrer Grube umherlaufend. Die Menge, in welcher man die Staphylinen findet, ist außerordentlich groß, sowohl der kleinern Arten zu jeder Zeit, als auch der grossen zur Zeit eines Raupenfrases. Ihre Fortbewegung ist meist nur ein mehr oder weniger schneller Lauf. Zuweilen fliegen sie aber auch. Besonders sieht man die kleinern Arten, trotz ihrer kurzen Flügeldecken, im Herbst leicht und lange in großer Menge herumschwärmen. Sie sind übrigens sehr behende und geschmeidig, und es ist nicht ganz leicht, die Staphylinen aus ihrem Versteck im Moose, unter Rinden u. s. w. hervorzuziehen, wo sie sich im Augenblicke durch Drehen und Wenden entziehen.

Die FORSTLICHE BEDEUTUNG der Staphylinen stimmt mit der der Laufkäfer im Wesentlichen überein und wir begnügen uns deshalb, sie nochmals als sehr nützliche Thiere im Haushalte der Natur zu bezeichnen.

EINTHEILUNG. Auch die Staphylinen erfreuen sich eines großen Artenreichtums, so wie auch einer großen, zum Theil schon in der Charakteristik angedeuteten Mannigfaltigkeit der Bildung, weshalb man sie auf die verschiedenste Weise in kleinere Gattungen zerfällt hat. Diese haben indessen um so weniger für uns Werth, als man die größten Arten (6-12" lang) und selbst die allermeisten mittelmäßigen (4-6" lang) in einer auch noch jetzt *Staphylinus* genannten Gattung zusammen gelassen hat.

#### A r t e n .

Wir unterscheiden zuerst diejenigen, bei welchen die Lefze ausgerandet ist, von denen mit ganzrandiger. Zu den erstern gehören eben alle große und mittelmäßige Arten, namentlich die für den Forst am meisten thätigen schwarzen *S. olens* Fbr. (L. 14.) von 10-12" Länge, *S. maxillor* Linn. (mit grauen Flecken und Binden) von 6-8" Länge und *S. similis* Fbr., von 6½" Länge. Dann die ebenfalls sehr räuberischen rothflügeligen *S. erythropterus* Linn. (L. 13.) *castaneopterus* Grav. und *stercorarius* Ol.,

welche sich dadurch unterscheiden, daß der letztere (nur 4-5" lang) nur am Hinterleibe einige Spuren von goldglänzenden Flecken hat, während die beiden erstern solche hier viel deutlicher haben und außerdem auch noch am Kopf, Halschild und Schildchen, der *erythropterus* sogar auch am ganzen Hinterrande des Schildchens. Zu den letztern (mit ganzrandiger Lefze) gehören nur kleine, ja sogar viele mikroskopisch kleine, welche der Forstmann als Arten zu unterscheiden nicht nöthig hat.

### Dritte Familie.

#### Keulenhörnige. (*Clavicornia*.)

Die Käfer dieser Familie stimmen weniger ihrem ganzen Habitus nach zusammen: als die der vorigen. Nur ein Kennzeichen vereint sie. Dies ist von der Form der Fühler entnommen, welche stets gegen das Ende sich verdicken, entweder so auffallend, daß die letzten plötzlich und sehr stark angeschwollenen Glieder einen wahren Knopf bilden, oder auch nur ganz allmählig und zuweilen sehr unbedeutend breiter werden.

Übrigens findet sich eine Übereinstimmung der Larven darin, daß sie sämtlich stark und mit kräftigen Füßen versehen sind, und eine solche Ähnlichkeit in der Lebensweise, namentlich in der Auswahl thierischer Stoffe zur Nahrung, daß dies schon mit zur Begründung einer Verwandtschaft gebraucht werden könnte. Allerdings nehmen sie diese Nahrung in sehr verschiedenem Zustande: bald von lebenden Thieren, bald von frisch getödteten, bald nur von einzelnen Überresten derselben, d. h. sie sind wahre Räuber wie die Laufkäfer und Kurzflügler, oder sie wühlen in Cadavern, nagen an Knochen, Fellen und dergl. Diese Ernährungsweise ist um so mehr zu beachten, als sie bei den folgenden gar nicht oder nur sehr selten wiederkehrt.

Allerdings sind die größten und ansehnlichsten Käfer dieser Familie, die wir eigentlich auch nur allein wahre bedeutsame Forstinsecten nennen können, Thierfresser. Allein es giebt auch einen guten Theil entschiedener Pflanzenfresser unter ihnen. Obgleich ich sie theils wegen ihrer geringen Größe (nur äußerst wenige bis 4" Länge), theils wegen der Eigenschaft nur kranke oder abgestorbene Baumtheile anzugehen, sämtlich für unmerklich schädliche halte, so möchten doch einige, die zuweilen in größerer Menge erscheinen, hier vermisst werden. Sie sollen daher, nachdem die wichtigeren, die nützlich geschildert sind, in einer Anmerkung etwas näher erläutert werden. Die mehr oder weniger plötzlich verdickte Keule haben sie alle, und sie aufzufinden im System dürfte daher keine Schwierigkeit haben.

Eine DIRECT FORSTLICHE BEDEUTUNG hat eigentlich nur eine einzige Gattung. Die übrigen, wie die Todtengrüber (*Silpha* Linn.), die Speckkäfer (*Dermestes* Linn.), die Stutzkäfer (*Hister*), sind nur deshalb ganz allgemein interessant, weil sie den Forst von verwesenden Thieren reinigen helfen, lederne Geräthschaften zerstören u. s. f., was hier natürlich im Einzelnen übergangen werden muß. Nur wäre hier noch der Gattung *Dermestes* mit einigen Worten deshalb zu erwähnen, weil Linné in ihr so verschiedene Insecten, ganz gegen seinen gewohnten Scharfsinn, vereinigte, daß noch immer und bei allen Forstschriststellern davon die Rede ist. Er vereinigte hier nämlich mit den, Jedermann unter dem Namen Speck- oder Pelzkäfer bekannten, Thieren die, ebenfalls so allgemein bekannten, Borkenkäfer, nicht zu gedenken der Menge anderer verschiedenartiger, hierher gezogener Dinge. Wenn nun auch hinsichtlich der Fühlerkeule die Borkenkäfer den Speckkäfern ähneln, so sind sie sich doch auch wieder in so vielen Stücken vollkommen unähnlich, namentlich im allerwichtigsten, dem Frasse, daß ihre Sonderung schon Fabricius nöthig schien, daß hier also einer der wenigen Fälle eintritt, in welchen das Ansprechen nach Linné'scher Gattung (z. B. *Dermestes typographus*, *D. piniperda*) durchaus nicht

gestattet werden kann. Eigentlich hätte man den Namen *Dermestes* ganz verbannen sollen. Da er indessen beibehalten ist, so müssen wir uns nur darüber freuen, daß er gerade für diejenigen Käfer gilt, welche wirklich Häute fressen (deun *dermestēs* bedeutet Hautfresser). Die einzige hierher gebörende

Gattung: *Clerus* Fabr. Buntkäfer. (Taf. I. Fig. 17.)

NAMEN. Es geht hier mit den Namen fast wie bei *Dermestes* (s. oben). Auch hier darf man den Linné'schen Gattungsnamen (*Attelabus*) der hierher gebörenden Käfer nicht beibehalten, weil man unter ihm gar zu verschiedenartige Thiere vereint findet. Fabricius löste schon die Gattung auf und liefs unter *Attelabus* nur Rüsselkäfer (s. dort), und machte für die gleich zu beschreibenden Thiere eine neue, *Clerus*.

CHARACTERISTIK. Die wenigen Arten, welche wir kennen, stimmen sogar in der Farbenvertheilung überein. Sie sind nämlich schön bunt. Ziegelroth findet sich oben entweder an der Basis der Flügeldecken, oder am Halsschild, oder an beiden. Weiße Querbinden auf schwarzem Grunde der Flügeldecken haben sie alle. Der kunstgerechte, von der gemeinsten Art (*C. formicarius*) hergenommene Character paßt auf alle. Käfer. Kopf groß, mit vor den Halsschild vorquellenden Augen. Fühler den hintern Halsschildrand nicht überragend, mit gegen das Ende allmählig verbreiterten Gliedern. Lezse (17a) quer, gebuchtet, gewimpert, borstenhaarig. Oberkiefer (17b) spitz, am Innenrande mit einigen spitzen und stumpfen Zähnen, am Außenrande behaart. Unterkiefer (17f) mit hornigem, deutliche Nahte zeigenden Stamm und lederartig-häutiger, zweilappiger Lade: beide Lappen ziemlich gleich groß, am Ende stark behaart. Taster viergliedrig mit einzelnen Borstenhaaren, die Lade kaum überragend; das letzte Glied das längste, fast kegelförmig. Die in der Mitte geknickte, tief gebuchtete und gewimperte Lippe (Fig. 17j) auf kurzem, hornigen Kinn. Die Lippentaster sehr groß, viel länger als die Unterkiefertaster, dreigliedrig: das letzte Glied sehr groß und breit, beilförmig, am Innenrande vertieft. — Larve (I. 17c). Ausgewachsen fast 6" lang und fast 1" breit. Kopf fast so breit als der erste Ring (I. 17q), hornig abgerundet-viereckig, flach, mit deutlicher, schon auf dem Scheitel getheilter Gabelinie, deutlichen dreigliedrigen Fühlern am Vorderrande und jederseits dicht dahinter stehenden deutlichen fünf Äugelchen. Lezse queer, etwas zurückgedrückt. Oberkiefer stark, hornig, gekrümmt, spitz, an der Innenseite mit kleinem, höckerförmigen Zahne. Unterkiefer fleischig mit breitem, kurzen Stamm, beilförmiger, gewimpelter Lade und viergliedrigen Tastern. Das erste Glied das kürzeste, die übrigen ziemlich gleich lang. Lippe abgerundet-viereckig, fleischig, mit zweigliedrigen Tastern: die beiden Glieder fast gleich lang, walzig, so lang wie die Unterkiefer-Taster. Auf dem ersten Körperlinge eine halbmondförmige, braune, fast die ganze Oberseite einnehmende Hornplatte, und auf den beiden folgenden, jederseits der Mittellinie, ein kleines, fast dreieckiges Hornplättchen. Auch auf dem letzten Ringe eine braune, rundliche Hornplatte, welche in ein Paar aufwärts gerichtete Haken endet. Das erste Luftloch am zweiten Ringe, fast nach der Unterseite hin gedrängt, die übrigen mehr nach oben. Beine ziemlich lang, aus drei Gliedern bestehend, einklaugig, sehr hellbraun. Kopf dunkelbraun. Farbe des meist fast liniensförmigen, gewöhnlich nur am hintern Drittheil etwas verdickten, ziemlich stark behaarten, schwach gewölbten Leibes, rosenroth. — Puppe (I. 17g). Kopf mit deutlichem Halsabsatz, den Halsschild in der Vorderansicht ganz verbergend. Fühler nach hinten gewendet und zum Theil hinter dem ersten und zweiten Fußpaare versteckt. Beine wenig ansteigend, das letzte Paar bis auf die, den fünften Hinterleibsring überragenden, Fußglieder und Kniespitzen ganz verborgen. Flügel bis zum vierten Hinterleibsringe reichend: die untern zum Theil sichtbar und die obern, auffallend zugespitzten, etwas überragend. Hinterleib acht-ringelig: der letzte Ring vorn mit zwei zweigliedrigen Warzen und hinten mit zwei auswärts gekrümmten, fleischigen Afterstacheln. Kopf (mit Ausnahme der Augen, Fühler, innern Mundtheile) so wie der Rumpf, die Schenkel und Oberseite des Hinterleibes mit einzelnen langen, dünnen Haaren besetzt.

**VORKOMMEN.** Auch dieses können wir, in Beziehung zur gemeinsten Art, schon hier betrachten. Man findet diese Käfer in den verschiedensten Gegenden und zwar überall da, wo es unter Rinden lebende Insecten, besonders Käfer, giebt, denen sie nachstellen.

Die **LEBENSWEISE** weicht im Wesentlichen von der der vorigen Familien nicht ab. Die Zeit ihres Erscheinens ist sogar dieselbe, indem man die Larven im Herbste erwachsen findet, so wie auch Puppen und ausgebildete Käfer, welche entweder bis zum nächsten Frühjahr in ihrem Lager still liegen und dann erst herumlaufen oder sich schon im Herbste in ihrem schönen, reinen Kleide sehen lassen. Die Nahrung besteht wohl ganz unzweifelhaft aus lebenden, andern Insecten. Den Käfer sieht man sehr häufig an Hölzern sitzen und Borkenkäfer verzehren. Er hält dabei gewöhnlich den Käfer mit den vier vordern Füßen und stützt sich bloß auf die hintern, wobei er seiner Beute mit den Oberkiefern in die Biegung zwischen Kopf und Halsschild beifist. Die Larve läßt sich schwerer dabei beobachten, weil sie nicht unter der Rinde hervorkommt, frisst ganz gewiß aber auch Käfer, so wie deren Larven und Puppen. So fand ich sie immer in der Nähe von Borkenkäfer- und Rüsselkäfergängen, so erhielt ich sie ferner in isolirten, mit Borkenkäferbrut besetzten, Rindenstücken, ja ich fand in solchen, die ich der Beobachtung wegen in Kasten verwahrte, die zerfressenen Stücke von Hylesinæ und Bostrichen und öfters noch halb lebende Thiere herumliegen. *Clerus mutillarius* F. holte Hr. Hartig (Jahresber. H. II. S. 181.) aus Käfergängen des Eichenholzes hervor. Dennahe verwandten *Notoxus mollis* beobachtete Hr. Schlotthauber als argen Räuber. Dazu kommt noch der merkwürdige Aufenthalt der Puppe. Diese fand nämlich Hr. Saxen in dem Puppenlager von *Curculio Heryniae*. In diesem Falle, so wie in einem andern, in welchem er den ausgebildeten Käfer darin fand, war die Puppe aufgefressen. Auch Hr. Hartig fand den Käfer in Puppenlagern von *Curculio notatus*. Allerdings kann sich die Meinung einschleichen, als lebte die Larve von Pflanzenfasern, indem sie sich lange Gänge und Höhlungen durch die Rinde frisst, wie ich das selbst bei eingesperrten, täglich eine Menge Wurmmehl herauschafften, sahe. Diese Gänge sind ihnen aber wahrscheinlich unentbehrlich, um ihrem Fraße überall nachzugehen. Die Menge, in welcher unsre gemeinste Art erscheint, ist sehr groß. Als Larven bemerkt man sie weniger, gewöhnlich nur dann, wenn man nach Käfern stämmt. Als Käfer zeigt er sich aber überall an Bäumen, Klästern und Bretterhaufen, bei warmem Sonnenscheine schon im Februar und März, munter und überaus schnell umherlaufend, und bei drohender Gefahr zwischen die Borkenschichten schlüpfend oder wohl gar in die unerreichbaren Schlupfwinkel der Holzstöcke plötzlich fallend. Fliegen sahe ich ihn nie.

Die **FORSTLICHE BEDEUTUNG** ergibt sich aus dem Gesagten. Er gehört mit zu den nützlichsten Thieren des Forstes, indem er namentlich da wirkt, wo weder den Laufkäfern noch den Kurzflüglern große Macht eingeräumt ist.

Von einer **EINTHEILUNG** kann bei dieser artenarmen Gattung nicht weiter die Rede sein.

#### A r t e n .

Nur eine Art *C. formicarius* Fabr. (*Atelabus formicarius* Linn.) ist gemein. Er ist 3-4" lang und hat oben Roth am Halsschild und an der Basis der Flügeldecken. Der 5-6" lange *C. mutillarius* Fabr. hat nur an der Flügelbasis roth.

Der eigentliche Stamm der Familie zeigt sich immer mehr in Hinsicht der thierischen Nahrung verwandt. Abgesehen davon, daß *Dermestes lardarius* (der Speckkäfer) und verwandte Arten (*affinis*, *vulpinus*, *tessellatus* etc.) sich auf Raupenzwiegern einfinden (wo sie wahrscheinlich nur von den trocknen Häuten der todtten Raupen zehren) und daß *Clerus*-ähnliche Larven (*Notoxus*?) unter Rinden kleinen Larven nachgehen, erfahre ich von Hrn. Suffrian, daß ein *Clerus*-ähnlicher Käfer auch eine *Clerus*-ähnliche Lebensart führt. Es ist der mit starker, 3-gliedriger Keule versehene *Corynetes cyanellus* A. d.

(von Sturm als *violaceus* Bd. XI. pag. 40. beschrieben) durch die dunkelste (fast schwarz-) stahlblaue Farbe von den verwandten helleren verschieden, so wie durch sehr grobe Punkte und fast  $2\frac{1}{2}''$  Länge. Das auffallendste Kennzeichen ist: dafs der Käfer nur vier Fufsglieder hat, weshalb bei den Tetrameren auch gehörigen Ortes seiner gedacht ist. Im Frühjahr 1836 beobachtete Hr. Suffrian, wie der Käfer an einigen Pappelbäumen sich zu Tausenden eingefunden hatte. Er safs nicht nur in den Astwinkeln, sondern auch in den Ritzen der Rinde und lief, sobald die Sonne zu scheinen anfang, am Stamme mit grofser Geschwindigkeit auf und ab, als wenn er Nahrung suchte. Bald kamen einige Käfer mit Ameisen im Maule an und einmal auch einer mit *Chrysomela flexuosa*. Der Käfer ist daher zu schonen, wo er vorkommt und ja nicht zu verwechseln mit blauen Chrysomelen oder Rüsselkäfern. — Ferner ist hier noch zu nennen die Gattung *Silpha* Linn. deren Arten sämmtlich sehr breit und flach und meistens von Farbe schwarz erscheinen. Sie gehören in sofern auch hierher, als einige Arten schon mit dem Tödtlen von Raupen beschäftigt gefunden wurden und die meisten überdies sich noch durch das Vertilgen von Aas nützlich zeigen. Nach Hrn. Hartig (Jahresber. H. II. S. 181.) besteigt *S. 4-punctata* Linn. welche  $6''$  lang und  $4''$  breit und ausnahmsweise gelb und schwarz (namentlich 4 Punkte des Halsschildes) ist, Bäume und vernichtet manche Wicker-Raupe (\*). Ausführlicheres über Silphen bei Oken a. a. O. S. 1771.). Alsdann würden nur noch einige nützliche Käfer, jedoch meiner Meinung nach für den Forst nicht sehr bedeutende, zu finden sein in der Gattung *Cantharis* Linn. welche als erste Gattung der folgenden Familie (der Sägehörnigen) hinreichend characterisirt ist, hier aber schon hinsichtlich der forstlichen Bedeutung näher erörtert werden soll. Die Käfer sieht man oft in unendlicher Menge auf Blumen, jedoch meist nur außerhalb des Forstes (daher auch von Preysler Böhm. Ins. pag. 59. ökonomisch wichtig genannt) umherschwärmen, besonders im Monat Juni, wobei sie öfters andre Käfer angreifen und tödten sollen. Die kräftigen, 6-beinigen, Föhler und Äugelchen schon zeigenden, oft bis  $1''$  langen Larven, welche eine glanzlose Sammettschwärze haben, lassen sich nur selten sehen, weil sie in der Erde leben. Nach Bechstein (Forstins. S. 473.), der sie mit Regenwürmern in feuchter Erde fütterte, sind sie den ganzen Winter hindurch wach, werden beim Stockroden, Hacken und Pflügen hervorgehoben und heifsen bei den Jägern, die sie häufig auf dem Schnee finden, Schneewürmer. Zu Ausgang des Winters kämen sie in der Regel noch häufig aus der Erde und fräfsen Raupen und andre Insecten. Mehr darüber zusammengetragen s. in Oken's Naturgesch. Bd. V. Abth. 3. S. 1744. Die gemeinsten Arten sind rothgelb und nur schwarz die Flügeldecken, Beine, Brust und einzelne kleine Flecke des Kopfes, des Halsschildes und der Bauchseite. *C. fusca* Linn. und *C. rustica* Fall., die beiden gröfsten, haben fast  $6''$  Länge und unterscheiden sich dadurch besonders, dafs der kleine, schwarze Fleck des rothgelben Halsschildes bei der *fusca* bis zum Vorderrand des Halsschildes reicht, bei der *rustica* dagegen nicht. Bei

(\*) Hr. Kollar (schädl. Ins. S. 329.) versichert, dafs die Larven der *Silpha 4-punctata* in den Nestern der Prozessionsraupen leben und von letztern sich nähren.

Es würden auch wohl noch einige schädliche Keulenhörnige wie *Ips*, *Nitidula* (*N. aenea* Fabr. der schädliche Rapskäfer s. Oken a. a. O. S. 1768.), *Throscus* etc. sich nennen lassen, allein sie sind, theils wegen ihrer geringen Gröfse und geringen Häufigkeit, theils wegen ihres Vorkommens an abgestorbenen Baumtheilen, in so hohem Grade unermülich schädlich, dafs auch sie in die Kategorie der bei den Heteromeren zu nennenden gehören. Am meisten Erwähnung verdienten noch die beiden ziemlich langgestreckten und niedergedrückten, stark glänzenden, plötzlich verdickte Föhlerkeulen tragenden *Ips ferruginea* Linn. ( $2,5-3''$  lang und ganz braun) und *I. 4-pustulata* Linn. ( $2,5-3''$  lang und schwarz mit 4 grofsen, rothen Flecken der Flügeldecken), welche unter Kiefernrinde leben und frisch geschnittenes Kieferholz häufig umschwärmen, so wie *Throscus adstrictor* Fbr. ( $1,5''$  lang und einem graubraunen *Elater*, auch hinsichtlich des Aufschnellens, täuschend ähnlich), welcher von Hrn. Hartig (Conversat. Lex. S. 848.) und Hrn. Suffrian im Holze stehender Eichen und zwar die Oeconomic der Anobien treibend, gefunden wurde, von mir dagegen zwischen den Stadtäunten, aus denen er auch sicher ausgekommen war.

*C. dispar* Fbr. sind Halsschild ganz und Beine und Kopf fast ganz rothgelb. Bei der fast 5" langen *C. obscura* L. ist nur sehr wenig Rothgelb am Kopfe und den Rändern des Halsschildes und Hinterleibes. *C. melanura* Fbr. (4") und *C. livida* (fast 5") sind so vorherrschend rothgelb oder gelb, daß nur bei ersterer Flügelspitzen und die Fühler größtentheils, und bei letzterer nur ein Theil der Brust und der Beine schwarz sind. *Melolontha Fullo* soll nach H e n n e r t nützlich sein (s. die fünfte Familie erste Gattung dritte Art).

## Die Reihe der schädlichen Käfer beginnt mit der

vierten Familie:

### Sägehörnige. (*Serricornia*.)

Auch in dieser Familie finden wir die verschiedensten Formen. Nicht einmal das wesentlichste Merkmal, die gesägten Fühler, findet sich immer, jedoch wird es nur selten undeutlich, nämlich nur bei *Anobium*, welches fadenförmige Fühler hat (Taf. II. Fig. 12-20.). Da aber die ihnen so nahe verwandte Gattung *Ptilinus* (Taf. II. Fig. 21, 22.) sehr deutlich gesägte und selbst schön gekämmte Fühler hat, so kann man sie nicht von dieser Familie trennen. Diese kleine Ausnahme, welche die den Borkenkäfern so ähnlichen Anobien trifft, ist ja aber bald zu merken.

In den Larven und der Lebensweise wird auch einige Übereinstimmung gefunden. Die Larven haben, vielleicht mit der einzigen Ausnahme von *Buprestis*, Füße und leben allermeist im Innern der Gewächse. Die Gattung *Cantharis*, deren samtschwarze, weiche, in der Erde lebende Larven (Schneewürmer der Jäger?) Insecten fressen sollen, macht wahrscheinlich allein eine Ausnahme. Daß namentlich *Malachius* und *Dasytes* als Larven im Holze und unter Rinden leben, weifs ich bestimmt.

Die FORSTLICHE WICHTIGKEIT dieser Familie ist nicht unbedeutend, indem es hier mehrere sehr schädliche (physiologisch und technologisch) Käfer giebt und überdies noch wichtige täuschende.

Die EINTHEILUNG ist, wenn man es mit allen Gattungen der Fauna zu thun hat, nicht leicht, und erfordert die Annahme von Tribus, Subtribus u. s. f., kann aber, mit Rücksicht auf die blofs forstlich wichtigen, mit einfachen Gattungen abgemacht werden. Folgende Übersicht wird sie schon deutlich characterisiren:

Flügeldecken	weich	Fühler den Halsschild weit überragend	{ Larven in der Erde	Gatt. <i>Cantharis</i> .
		Fühler den Halsschild kaum überragend	{ Larven im Holze	Gatt. <i>Dasytes</i> (*).
	hart	Kopf in den kapuzenförmigen Halsschild ganz zurückziehbar	Fühler der Männchen nicht gekämmt	Gatt. <i>Anobium</i> .
			Fühler der Männchen gekämmt	Gatt. <i>Ptilinus</i> .
		Kopf in den flachen oder wenig gewölbten Halsschild nicht ganz zurückziehbar	Schnellen sich, auf den Rücken gelegt, in die Höhe	Gatt. <i>Elaeter</i> .
			Schnellen sich nicht in die Höhe	Gatt. <i>Buprestis</i> .

(\*) Auf *Dasytes coeruleus* Fbr. (3" lang und ganz stahlblau und behaart) als eine, häufig im Holze (nach meinen Erfahrungen besonders in Buchen und Haynbuchen) und nach Hm. Kellner auch in der äußern Borke alter Fichten vorkommende, Art bin ich mehrmals aufmerksam gemacht worden und versäume daher nicht sie hier wenigstens in der

## Erste Gattung.

*Lymexylon* Fabr. Bohrkäfer. (Taf. II. Fig. 23-26.)

**NAMEN.** Im Deutschen bedient man sich der Namen Werftkäfer, Bohrkäfer, Holzbohrer, Holzverderber für beide abzuhandelnde Arten. Unter den lateinischen kommen am meisten *Cantharis* und *Lymexylon* vor. Zur Gattung *Cantharis* gehörten die Bohrkäfer bei Linné, sind aber jetzt, als durchaus verschieden, davon getrennt und unter *Lymexylon* vereinigt, welche Gattung sogar nochmals gespalten wird und zwar in *Lymexylon* und *Hylecoetus*, was indessen ganz überflüssig ist. Gar nicht mehr für diese Käfer gebräuchliche Namen sind: *Meloë*, *Lytta*, *Pterophorus*. Darunter versteht man jetzt ganz andre Käfer (s. *Heteromera*).

**CHARACTERISTIK.** Die beiden Arten dieser Gattung unterscheiden sich auf den ersten Blick durch den außerordentlich langen und schmalen Körper und die weichen, wie Papier biegsamen und sich umrollenden Flügeldecken. Kunstgerecht characterisirt man sie so: Kopf mit den hervorquellenden Augen breiter als Halsschild. Fühler kaum den hintern Halsschildrand überragend, ziemlich deutlich gesägt. Lefze stark behaart, rundlich oder quer. Oberkiefer hornig, stark, fast dreieckig, mit einem Zahne, behaart. Unterkiefer (Fig. 23c, 25c und 26c) borstenhaarig mit kurzem, breiten, keine deutlichen Nühte zeigenden Stamm und zweilappiger, am Ende behaarter, Lade: der innere Lappen dreieckig. Taster vier- oder dreigliedrig: beim Weibchen viergliedrig, das letzte Glied abgestutzt und das vorletzte bei *L. navale* äußerst kurz; beim Männchen (welches bei *dermestoides* vier und bei *navale* nur drei Glieder hat) außerordentlich groß und vorragend: das letzte Glied außerordentlich groß, doppelt-gekämmt, mit einem abgesonderten, lang hervorstehenden Kammszahne. Lippe (25d) geknickt, fein gewimpert. Taster dreigliedrig, das erste oder zweite das kleinste. Halsschild nach vorn mehr oder weniger verschmälert, ziemlich flach. Schildchen deutlich, selbst groß. Flügeldecken lang und schmal, äußerst dünn und biegsam, nach hinten verschmälert, fein punktiert, mit anliegenden kurzen Härchen, vom Hinterleibe (besonders bei Weibchen) oft weit überragt. Füße dünn und ziemlich lang. Die Weibchen meist sehr auffallend größer als die Männchen, und mit lang vorragender Legeröhre. Die Männchen sind entweder ganz schwarz, mit Ausnahme der Füße, oder ein mehr oder weniger großer Theil der Flügeldecken bleibt braun. Die Weibchen dagegen sind, bis auf einen Theil der Brust und auch wohl der Flügeldecken und (meist) den Kopf, welche schwärzlich sind, braun. Das sicherste Unterscheidungszeichen gewähren die schönen großen Taster der Männchen. — Die Larven, mit Füßen, lang und dünn, weiß oder schmutzig bräunlich-weiß, dagegen Kopf, Füße und ein Theil des ersten Ringes hell gelblich-braun. Der fast kugelförmige Kopf kann sich in den ersten Ring wie in eine Kapuze zurückziehen, und sich auch wieder weit hervorstrecken (fast bis zum rechten Winkel abwärts gebogen) (Fig. 23B). Die Mundtheile sind denen von *Anobium* (s. unten und Fig. 19d) sehr ähnlich, nur ist die Oberlippe eckiger, horniger, die Unterkieferlade nicht zweilappig und fast hornig, und die mehr nach der Vorderseite hin sehr eigenthümlich auf einen Vorsprunge eingefügten Taster (welche hier also durchaus noch nichts von dem auffallenden Baue des Käfers zeigen) die Lade nicht überragend, auch die Unterlippe mit den zweigliedrigen, bei *L. navale* kaum bemerkbaren, Tastern sehr klein. Der letzte Ring mit nach unten wulstig vorragenden After und nach oben gerichteten blasigen oder hakigen Fortsätzen (doppelten Nachschiebern). — Die Puppen lang und schmal (s. *L. dermestoides*).

Tabelle der Gattungen kenntlich zu machen, wenn sie auch nicht einer ausführlicheren Betrachtung werth ist. Denn die weissen, ziemlich stark behaarten, 6-beinigen Larven finden sich nur in den ganz abgestorbenen Theilen der Bäume, welche sie durch ihre zahlreichen unregelmässigen Gänge ganz und gar in Wurmthul verwandeln. Die Puppen sind öfters schon im Winter farbig und die Käfer schwärmen meist im Mai in großer Menge.



VORKOMMEN a. die beiden Arten.

LEBENSWEISE. Beide Arten stimmen darin überein, daß sie im Holze leben. Das Weibchen sucht sich anbrüchige Stellen (oder schon vorhandene, von andern Käfern gebohrte Löcher?) lebender, stehender Bäume oder wohl auch liegender, mehr oder weniger alter Hölzer, und legt die Eier daran. Die auskommenden Larven bohren sich horizontal in das Holz, oft auf mehrere Zoll tief, durch die äußern Jahrringe, und gehen dann mit der Holzfaser auf und nieder, ihre Gänge hinter sich mit sehr feinem Wurmehle verstopfend. Gegen die Verpuppungszeit erweitern sie die horizontalen Eingänge, verpuppen sich dann in ihnen oder neben denselben und drängen sich, sobald sie ausschlüpfen, durch dieselben heraus. Zuweilen machen sie auch neue Ausgangsanäle und zwar selbst an berindeten Stellen, so daß der Käfer sogar noch eine Rindschicht zu durchbrechen hat. Das Übrige bei den verschiedenen Arten, so wie auch dort von der forstlichen Bedeutung.

### A r t e n.

Es giebt deren nur zwei:

1. *L. dermestoides* Linn. Schabkäferähnlicher Bohrkäfer. (Taf. II. Fig. 25, 26.)

NAMEN. Im Deutschen sind keine Namen weiter als der, aus dem systematischen, lateinischen übersetzte — schabkäferähnlicher Bohrkäfer — für ihn bekannt. Linné nannte ihn *Cantharis dermestoides*. Da man früher das Männchen für eine eigne Art hielt, so hat man diesem auch verschiedene Namen gegeben, und zwar *L. Morio*, dann auch *L. proboscideum*, dann *L. barbatum*, andrer noch älterer nicht zu gedenken.

CHARACTERISTIK. Käfer 3-5-7" lang! Hr. Heyer sahe sie sogar von 3" bis 12" variiren. Unterscheidet sich durch einen Halsschild, welcher breiter als lang ist, durch die Kürze der deutlich gesägten Fühler, durch den verhältnißmäßig nicht so sehr langen und schmalen Körper u. s. f. schon genug. Unterschied der Männchen und Weibchen s. am Ende des Gattungs-Characters. Bei den Männchen finde ich wenigstens immer Kopf, Halsschild und Flügelspitzen schwarz. Die Weibchen sind meist, bis auf die Augen und einzelne Flecke unten, ganz hellbraun. Die Larve (Fig. 26 B) ist der des *L. navale* (s. Nr. 2.) ähnlich, aber ausgezeichnet durch das in einem, nach oben gerichteten, spitzen, mit zweispaltiger Hornspitze versehenen, Schwanz auslaufende letzte Glied und den nach unten gerichteten kürzern aber breitem Afterfortsatz. Der Rollhügel zeigt sich nicht merklich vorstehend. Das erste Luftloch liegt an der Grenze der beiden ersten Ringe. Der erste Ring ist durch viele braune Dörnchen scharflich, und solche, zum Theil in gebogene Querreihen gestellte, finden sich auch vom fünften oder sechsten Ringe an oben. Noch stärkere, sogar etwas gekrümmte, auch auf dem Schwanz. — Die Puppe ist lang und schmal (5" lang und kaum 1,5" breit), der Kopf übergebogen, den Halsschild nicht ganz verdeckend. Die Fühler nach hinten gerichtet, bis auf die Flügel reichend. Mundtheile [besonders beim Männchen (s. Fig. 26 G) die Taster] stark vorragend. Flügel nur bis zum dritten Ringe reichend, die untern fast ganz verdeckt. Füße ansteigend, vom letzten Paare nur die Fußglieder sichtbar. Rücken mit starken, spitzen Dornhöckern, der Kopf mit schwächern. Zu jeder Seite des Afters zwei fleischige, gegliederte Fortsätze.

VORKOMMEN. Sehr verbreitet. Sowohl bei uns, am Harze, wie auch, nach Hrn. Wallt, in Bayern und, nach Hrn. Warnkönig, am Schwarzwalde und zwar dort sehr häufig, als auch in Schweden (Gyll.). Schon mehrmals fand ich sie sehr häufig, aber nur fressend in Buchen, und zwar in geworfenen Stämmen oder Stöcken, die aber öfters noch Ausschläge hatten, und nur an Buchenblättern schwärmend. Hr. Warnkönig sahe sie auch an Fichten so wie an geschlagenem Bauholze fliegen, und vermuthet, daß sie

auch aus ganz frischen Tannenstöcken schlüpfen. Hr. Heyer bemerkte sie nie am Nadelholze, wohl aber im Holze und selbst in der Stadt fliegend. Nach Hrn. Sturm (Deutschl. Faun. XI. S. 69.) wären sie auch in faulen Stücken der Eichen und Erlen.

**LEBENSWEISE.** Die Flugzeit ist im Frühlinge gleich nach dem Ausschlagen der Buchen. Zu dieser Zeit fand ich sie in verschiedenen Jahren um das Buchenlaub schwärmend und sich begattend. In andern Jahren fand ich im März und April ausgewachsene Larven und Puppen. In der Stube gebrauchte die Puppe nur 7 Tage bis zum Ausschlüpfen. Allerdings sahe ich im Jahre 1835 auch am Harze noch im Herbst halbwüchsige Larven, und das wird denn wohl einen spätern Flug gegeben haben. Die Nahrung finden die Larven nur im Holze und zwar, wie ich beobachtet habe, sowohl im alten, faulenden, wie auch im ganz frischen. Höchst auffallend ist es, dafs ich nun schon in zwei Fällen, einmal am Harze und einmal bei Hrn. Lehmann in Boitzenburg, die Larven in den Gängen von *Bostrichus domesticus* gefunden habe, so dafs ich auf die Vermuthung komme, sie benutzen diese bei ihrem Frafs und erweitern sie nur, so wie sie wachsen und nicht mehr Platz darin finden. Sie gehen diesen Gängen überall nach, selbst bis in die Rinde hinein, so dafs man leicht verführt werden kann, da man sie immer mit dem Käfer von jenem *Bostrichus* zusammen findet, sie für die Larve desselben zu halten. In einem Falle fand ich in einem von ihnen bewohnten Stücke auch vertikale, mit Wurmehl verstopfte Gänge, welche von ihnen herzurühren schienen. Indessen lebten hier zugleich die Larven von *Mordella fasciata* und sie dürften diese Gänge gemacht haben. Dafs der Käfer am Buchenlaube frafs, konnte ich nie bemerken. Die Menge, in welcher man die Larven im Holze und die Käfer schwärmend findet, ist zuweilen nicht unbeträchtlich.

Die FORSTLICHE BEDEUTUNG ist noch nicht mit Sicherheit festzustellen. In den gewöhnlichen Fällen mag das Insect wohl gleichgültig oder unmerklich schädlich sein, noch dazu, wenn es stets nur in Borkenkäfergängen schmarotzte, es könnte aber auch wohl Werkhölzer unbrauchbar machen und dadurch merklich schädlich werden. Ein besonderes Interesse gewähren die Larven noch als täuschende, denn ein wohl unterrichteter praktischer Forstmann wollte es sich durchaus nicht nehmen lassen, die kleinen, geschwänzten Larven, welche er in den Gängen von *Bostrichus domesticus* fand, seien die Larven dieses Käfers, und das war ihm eines Theils nicht zu verdenken. Man begegnet demselben sicher durch Reinlichkeit im Forste, nämlich dadurch, dafs man die Windfalle bald wegräumt und die alten Stücke rodet.

## 2. *L. navale* Linn. Schiffswerftbohrkäfer. (Taf. II. Fig. 23, 24.)

**NAMEN.** Schiffswerftkäfer, Matrose, Eichen-Holzbohrer (*Scheeps-, St. Jans-Vlieg* Holländ.), also auf sein Vorkommen hindeutend. *Cantharis navalis* Linn. Auch hier wurde das Männchen für eigene Art, *L. flavipes* Fabr., gehalten.

**CHARACTERISTIK.** Zwei bis 5,6" lang. Unterscheidet sich schon genug durch den mehr langen als breiten, hinten zurückgewendet-eckigen, vorn gerundeten, ziemlich gewölbten Halsschild, die ansehnlichere Halsverlängerung des Kopfes, die nicht deutlich gesägten, verhältnüsmässig längern Fühler, den äusserst schlanken, dünnen und weichen Leib, die äusserst weichen und kurzen Flügeldecken u. s. w. Die Männchen sind nie oben ganz schwarz, es bleibt immer an der Basis der Flügeldecken etwas braun; die Weibchen dagegen sind nie ganz braun, indem wenigstens der Kopf schwarz ist. — Die Larve wird 6" lang und fast 0,5" breit. Sie ist äusserst dünn und zart. Die drei ersten Ringe sind flacher und kürzer als die übrigen, der erste der längste. Die neun übrigen viel länger als breit, ohne Wülste, vorn etwas schmaler als hinten, und besonders unten mit dem Hinterrande über den Vorderrand der folgenden übergreifend. Der letzte endet in einen nach oben stark-biasig aufgetriebenen und einen nach unten gerichteten kleinern, den After tragenden Wulst. Das erste Luftloch an der Unterseite des ersten, fast am


Rande des zweiten. Fülse dreigliedrig, mit scheibenförmig nach hinten vorragendem Rollhügel und einfachen Häkchen. Fülse und Kopf stark, das Übrige schwach behaart. Die Blase des letzten Ringes oben durch kurze Dörnchen schärflich.

**VORKOMMEN.** Wahrscheinlich auch sehr verbreitet. Ganz Deutschland, Schweden, Rußland, Holland, ob auch England? In Eichen und wahrscheinlich nur in diesen die Larven und Puppen, der Käfer an Eichen schwärmend. Hr. Heyer fand sie, wie sie im Juni und Juli in Gehölzen an zu Bau- und Brennholz gefällten Eichen schwärmten und in die, an den gesägten Enden entstandenen, Risse ihre Eier ablegten.

**LEBENSWEISE.** Die Flugzeit ist später als beim vorigen. Ich fand ihn immer erst im Juni in Menge schwärmend, obgleich mir einzelne Exemplare auch wohl früher und später vorgekommen sind, ja selbst noch an schönen Herbsttagen, und zwar sahe ich sie eben so, wie Hr. Kellner, Nachmittags in der größten Hitze am liebsten schwärmen. Die Käfer sind dann äußerst beweglich und unruhig und machen viele Mühe beim Fange. Am liebsten setzen sie sich wieder an die Stämme, aus denen sie auskommen, doch auch an benachbarte Hölzer, Zäune und Mauern. Am Laube sahe ich sie nie. Die Larven fand ich im Herbst halbwüchsig und im Frühlinge erwachsen. Sie nähren sich wahrscheinlich nur in Eichen und zwar sowohl solchen, die schon Jahre lang auf Bau- und Holzplätzen lagen, als auch stehenden Stöcken, ja selbst stehenden, lebenden Bäumen, aber immer nur sehr starken, wie ich bemerkte. Natürlich müssen die Stellen, welche angegangen werden, von Rinde entblößt sein, denn durch die Rinde kann der schwache Käfer nicht hindurch. Wahrscheinlich legt das Weibchen mit der lang vorgestreckten Legeröhre die Eier in Ritzen und Spalten des entblößten Holzes oder vielleicht wohl gar in die schon von andern Käfern gemachten Bohrlöcher. Es war mir wenigstens sehr auffallend und erinnerte mich sehr lebhaft an das Schmarotzen von *L. dermestoides*, in solchen Stämmen, in welchen ich sie antraf, auch *Colydium elongatum* (s. bei den *Xylophagis*) zu finden, dessen Larve (Taf. XIV. Fig. 34.) sogar mehrmals nachbarlich zusammen mit denen von *Lymexylon* zu sehen. Die Gänge waren sogar durchaus nicht von einander zu unterscheiden, indem sie beide tief im Holze geschlängelt auf- und abwärts gingen und mit Wurmehl verstopft waren. Sie enden in horizontale Canäle, wie mit Nr. 9, 10 oder 11 geschossen, durch welche der so sehr in der Stärke variirende Käfer anschlüpft und immer noch etwas Bohrmehl mit herausbringt. In diesen Canälen bewegen sie sich mit großer Leichtigkeit, denn wenn sie schon mit dem Kopfe hervorgucken und man sie fassen will, gehen sie so schnell zurück, daß man ihnen nur mit dem Meißel folgen kann. In den von ihnen bewohnten Stämmen sahe ich auch stets *Bostrichus monographus*, und am Ende ist dieser der Ureinwohner und *Colydium* sowohl wie *Lymexylon* schmarotzen in dessen Gängen. Die Menge derselben ist selbst bei uns nicht so gering, wie man es wohl nach den, allerdings zuweilen nur einzeln vorkommenden, Exemplaren hier und da angiebt. In gewissen Eichen unsrer Gegend wurde alljährlich eine ansehnliche Quantität von unsern Sammlern gefangen und zerstört, und im Jahre 1836 habe ich auf einem Bauplatze an außerordentlich starken, schon längst behauenen Eichen im Juni einen Flug erlebt, der Einem wohl einen Begriff von der möglichen Schädlichkeit derselben verschaffen konnte. Allein von diesjährigen Fluglöchern zählte ich hier und da auf den Quadratzus 100 und mehr. Hr. Kellner sammelte auch am Thüringer Walde im Jahre 1835 eine große Menge derselben.

**FÖRSTLICHE BEDEUTUNG UND BEGEGNUNG.** An lebenden Bäumen dürfte er, da nur anbrüchige und ohnehin zu Nutzhölzern wenig brauchbare Stämme oder gar nur Stöcke von ihm befallen werden, nur als unmerklich schädlich anzusprechen sein. An gefällten, entrieten Stämmen dagegen, entweder schon im Forste oder auf den Bauplätzen könnte er sich wohl merklicher oder sehr schädlich machen, und es ist den Versicherungen derer, welche ihn auf den Schiffswerften für sehr schädlich halten, wohl zu glauben, obgleich wir in neueren Zeiten keine Klagen wieder darüber gehört

haben. Meine deshalb gemachten Anfragen in Holland, Petersburg und in London hatten gar keinen Erfolg. Sollte er sich in besorglicher Menge irgendwo zeigen, so könnte man ihn an Bauhölzern dadurch leicht vertreiben, daß man dieselben, wie man es auch in Schweden machte, antheet oder mit Auflösungen von Kali oder Natrium überzieht. Auf frischem Theere würde das kleine, zarte Thierchen auch leicht kleben bleiben und so vertilgt werden. Daß sie die schwarze Farbe nicht scheuen, sahe ich in diesem Jahre, denn sie setzten sich an getheerte Zäune, die nur eben erst trocken geworden waren. Als das Vorstehende längst niedergeschrieben war und ich das Manuscript schon in die Druckerei geben wollte, erhielt ich, durch Hrn. Lichtenstein's Güte, Linné's eignen Bericht [*Reise durch Westgothland*, aus d. Schwed. übers. Halle 1765. 8. S. 172. (S. 149 des Orig.) u. f.], aus welchem ich, weil man noch nirgend eine genügende Angabe darüber findet, hier das Wesentlichste mittheile. Linné's Beobachtungen stimmen mit den von mir angestellten, die ich jedoch häufiger, und namentlich zu verschiedenen Zeiten wiederholen konnte, überein, und nicht allein daraus, sondern auch aus den von ihm beigelegten (freilich sehr rohen) Abbildungen des Käfers, der Larve und Puppe zu erschen, daß er dasselbe Thier meint und daß hier nie mehr der leiseste Gedanke an eine Verwechslung mit *Teredo navalis* oder dergl. entstehen könne. Es war den 12. Juli 1746, als er auf dem alten Schiffsverft an der Südküste des Meerbusens von Gothenburg die Admiralitäts-Schiffbauerei besah, wo man auf dem Holzplatze eine Menge für den Schiffsbau bestimmtes Eichenholz versammelt hatte. Es ward ihm als ein Geheimniß von Jemandem berichtet, daß das Holz von Würmern sehr zerfressen wäre und dadurch ein großer Schaden erwüchse. Der Schiffsbauemeister wollte durchaus nicht die Erlaubniß zu einer mit dem Holze anzustellenden Untersuchung ertheilen, wahrscheinlich weil er verantwortlich zu werden fürchtete, wenn die Sache öffentlich würde. Linné mußte unverrichteter Sache abgehen, ruhte aber nicht, bis er einige Herren von der Admiralität antraf, welche mit ihm zurückkehrten und die gewünschten Stämme zur Untersuchung anwiesen. Der Befund wird nun mit großer Umständlichkeit geschildert. Da das Meiste, die Lebensweise des Thiers betreffende, schon von mir selbst nach eignen Beobachtungen berichtet ist, so erwähne ich hier nur einiger Umstände, welche die Größe und Wichtigkeit des Fraßes bezeichnen. Die größten, viereckig gehauenen Eichenstämme waren ganz voller Löcher, die von den Seiten bei Hunderten quer in das Holz, oft bis in den Kern, hineingingen und hier und da auch einen halb hervorguckenden Wurm zeigten. Daß der Schaden als ein sehr bedeutender sich ergeben haben muß, geht aus dem Ausrufe Linné's (S. 177.) hervor: „Bewundernswürdig, daß ein so elender Wurm jährlich für so viele 1000 Thaler Schaden thun kann!“ Die Abbildung eines zerfressenen Holzstückes, welche beigelegt wurde, ist so instructiv, auch deshalb, weil sie an einem so wichtigen Orte und von einem so berühmten Manne entnommen wurde, so wichtig, daß ich sie hier im Holzschnitte wiedergebe. Hier noch einige Bemerkungen dazu. Linné will gesehen haben, daß die vertikalen (eigentlichen Larven-) Gänge immer zwei horizontale mit einander verbanden, und daß von dem einen horizontalen der vertikale sehr dünn anfing und sich, immer mehr erweiternd, in den andern endete. Der erste horizontale war also der Eingang der Larve und der andre der Ausgang und der Flugcanal. Was er übrigens von den andern Löchern (auf der Fläche parallel den Markstrahlen) hält, sagt er nicht. Diese gehören doch nicht zum Werfkäfer, sondern sind wahrscheinlich von *Bostrichus monographus*, *Platypus* oder *Colydium* gemacht. Die vertikalen Gänge sind hier



F2

übrigens ein wenig zu gerade gezeichnet, denn ich sahe sie stets leicht geschlängelt, auch immer dichter beisammen. Auch die Flugcanäle sind ein wenig zu stark. Selbst die allerstärksten Käfer gebrauchten nicht so weite. Auf dem Schiffswerfte wurden Linné noch die Fragen gestellt, ob die angebohrten Bäume noch auf dem Stamme wurmstichig geworden wären oder ob die Würmer erst auf dem Werft hincin gekommen. Linné entscheidet sich nicht darüber, sondern versichert nur, daß die Stämme alljährlich weiter zerstört werden würden, hinzusetzend: derjenige, welcher die Stämme gekauft, hätte von Rechtswegen, nachdem sie geschält worden, zusehen sollen, ob sie Wurmlöcher unter der Rinde hätten. (Unter der Rinde versteckt sind aber gewiß nie Wurmlöcher dieses Insects, s. oben). Bei den Stämmen auf unsern Holzplatze entstand dieselbe Frage, und ich erklärte mich dafür, daß die Vorräthern der gegenwärtigen Brut schon aus dem Forste hierher gekommen seien, vielleicht nur an einer einzigen anbrüchigen Stelle, und sich hier nun von Jahr zu Jahr mehr fortgepflanzt hätten. Ich habe sie, wie oben erwähnt, oft im Walde an lebenden Eichen gesehen, und ich halte sie daher für ächte Forstinsecten, die jedoch auch, wenn die Noth gebietet, mit liegendem Holze vorlieb nehmen. Der Baumeister auf dem Werfte hielt dafür, daß das wurmstichige Holz, zum Kiele verbraucht, Wasser anziehen und faulen müsse. Linné glaubt dagegen, daß sich die Löcher durch das Theeren, besonders mit warmem Theer, verstopfen würden, wenn deren nicht zu viele wären. Theer wurde als das beste Schutzmittel empfohlen, s. auch Sturm's Deutschl. Faun. Bd. XI. S. 57. u. f.

#### Zweite Gattung.

#### *Anobium* Fabr. Fadenhorn-Nagekäfer. (Taf. II. Fig. 12-20.)

NAMEN. Von deutschen Namen ist nicht viel Sicherheit zu erwarten, denn, wenn die Unterscheidung schon dem wissenschaftlich Gebildeten Schwierigkeit machte, was ist da vom Volke zu erwarten? In den Büchern heißen sie gewöhnlich Bohrkäfer, Kümmerkäfer, Nagekäfer, Kleinkäfer, Fettkäfer (?), Buckelkäfer, Trotzkopf (weil sie sich so hartnäckig todt stellen), Hauskäfer. Linné hatte sie Anfangs unter seiner Gattung *Dermestes* (s. S. 34.), machte dann für sie und einige andre eine besondre Gattung *Ptinus*, von welcher Fabricius *Anobium* und *Ptilinus* trennte.

CHARACTERISTIK. Unter allen Insecten haben diese, wegen ihres walzigen Baues, des in den kapuzenförmigen Halsschild zurückziehbaren Kopfes, der geringen Größe und Eintönigkeit der Farben, die meiste Ähnlichkeit mit den Xylophagen, und es ist die Verwechselung mit denselben, die so oft bei den Forstleuten vorkommt, um so weniger hart zu tadeln, als Linné selbst sie nicht ordentlich kannte, und selbst noch Fabricius, der zwar die Gattung richtig sonderte, manche Art gewiss confundirt hat. Es lassen sich indessen Kennzeichen angeben, welche solche Verwechselungen unmöglich machen. Erstens haben die Larven Beine. Zweitens sind die Fühler ziemlich lang und nie keulenförmig, und drittens erkennt man die fünf Fußglieder auch ziemlich deutlich. Kann man die Lebensweise beobachten, so ist man vollends vor aller Verwechselung sicher. Sie machen nie so regelmäßige Gänge wie die eigentlichen Xylophagen, sondern mehr verworrene, bunt durch die Rinde oder durch das Holz u. s. f. laufende. Knüpfen wir hieran noch einige feinere Unterschiede. Die Mundtheile (wie man sie besonders deutlich bei *A. tessellatum* sieht) stehen zwischen denen von *Ptilinus* und *Apatе* in der Mitte, ähneln den erstern aber doch mehr, nur daß der innere Lappen der Unterkiefer etwas größer ist und die Taster im Verhältniß etwas länger und dicker erscheinen. Die stark behaarte Unterlippe ist ein wenig geknickt und da, wo bei *Apatе* der Haarbüschel steht (der hier fehlt) ist eine Ausrundung. Die Taster sind dicht über dem Kehlrande eingefügt, dreigliedrig, kürzer als bei *Ptilinus* und länger als bei *Apatе*, das letzte Glied sehr breit. Weder bei diesen noch bei den Unterkiefer-

tastern ist der Eindruck an der Spitze des letzten Gliedes. Die Oberlippe ist klein, queer, behaart. Die Augen sind meist groß und ragen stark und kuglig (besonders beim Männchen) zu den Seiten des Kopfes hervor. Die Fühler fadenförmig, oft sehr lang, doch wenigstens den hinteren Halsschildrand etwas überragend. Die letzten drei bis sieben Glieder die längsten, bei den Männchen oft länger als alle vorhergehende zusammen. Der Halsschild mit breit gerandeten Seiten, meist stark gewölbt. Flügeldecken stark gewölbt, entweder regelmäßig reihig oder unregelmäßig punktiert, fein behaart, oft den Steiß nicht ganz bedeckend. Beine mäsig, mit ziemlich langen und dünnen Fußgliedern. — Sie sind nicht über  $3\frac{1}{2}$ " und auch nicht unter  $1\frac{1}{2}$ " lang und haben heller oder dunkler braune, selten metallisch schimmernde Farben. — Die Larven sind fast ganz walzig und krümmen sich gern stark zusammen. Die größte unter ihnen, die von *Anobium tessellatum* (s. T. II. Fig. 19 B), ist  $5\frac{1}{2}$ " lang (ausgestreckt) und  $1\frac{1}{2}$ " breit. Kopf mäsig, nur an den Rändern stark gewölbt, an der Stelle der sich theilenden Gabellinie sogar etwas eingedrückt, behaart, ohne Augenspur, mit sehr kleiner eingliedriger Fühlerspur. Kopfschild queer, lederartig. Letze wie bei *Ptilinus* dem Käfer, nur kleiner, gewimpert. Oberkiefer auch so, nur ohne Zahn und schärfer. Unterkiefer mit deutlichen Nähten am Stamin; zweilappiger, borstenwimpriger Lade (Fig. 19 γ): der innere Lappen sehr klein, mit beweglichem Zahne. Taster dreigliedrig, wenig länger als Lade. Lippe dick, fleischig, behaart, mit dreigliedrigen, am Rande eingesetzten, die Lippe wenig überragenden Tastern (19 δ). Die Ringe ohne Spur von Schildchen. Die drei ersten am Stärksten nach oben und unten hervortretend, streng auf der Grenze zwischen dem ersten und zweiten das erste Luftloch tragend, mit Füßen versehen. Die folgenden (bis zum zehnten) tragen die kleinen gelbgerandeten Luftlöcher dicht über dem Rande der Seitenwulst. Die Keilwülste vorhanden, groß, mit äußerst kurzen, braunen Dornen scharflich. Hinterwülste ebenfalls vorhanden, glatt, das letzte Glied sehr kurz und breit abgestutzt, an der Stelle der Seitenwülste ebenfalls scharflich. Der After bildet eine breite Spalte unter einer kurzen Fleischwulst. Die Füße kurz, dreigliedrig mit ziemlich geraden, einfachem, nicht zu schwachem Haken. Kopf braun mit mehr oder weniger dunklern Mundtheilen. Der übrige Körper gelblich-weiß. Die Haare, welche fast alle Körpergegenden ziemlich dicht bedecken, gelb.

VORKOMMEN nach den Arten sehr verschieden.

LEBENSWEISE ebenfalls nach den Arten sehr verschieden. Die Flugzeit scheint bei allen ziemlich übereinstimmend das Frühjahr und der Vorsommer zu sein. Auch fand ich die ausgewachsenen Larven stets im Winter. Der Gegenstand ihres Fraßes ist hauptsächlich der Holzkörper, sowohl im frischen wie im trocknen Zustande, lieber der Laubhölzer als der Nadelhölzer. Seltner leben sie im Marke, in der Rinde oder in den Früchten und dann hauptsächlich in den Nadelhölzern. Einige leben auch in zarteren Pflanzentheilen, besonders den mehr krantartigen Stengeln, Blumen und Blättern im getrockneten Zustande (Herbarien, Holzbibliotheken u. s. w.). An diesen verschiedenen Orten findet man sowohl die Käfer wie die Larven: beide fressen unregelmäßig durch einander laufende Canäle, die oft den Gegenstand des Fraßes ganz in Wurmehl verwandeln, welches man in kleinen Häufchen vor den Bohrlöchern antrifft. Man findet manche von ihnen zuweilen in sehr großer Menge. Fliegen sieht man sie nicht häufig. Sie laufen meistens nur langsam und gewöhnlich auch nicht außerhalb ihres Versteckes.

FORSTLICHE BEDEUTUNG UND BEGEGNUNG. Bis jetzt haben nur wenige Erfahrungen dargethan, daß ein *Anobium* merklich schädlich geworden wäre; die meisten zeigten sich mir immer unmerklich schädlich oder gleichgültig. Auch Hr. Saxe n hatte seine Vermuthung, daß die in Fichtenzapfen lebenden Arten erst nach dem Abfall der ersten Hineinkämen, wiederholt bestätigt gefunden und das Vorkommen des, immer nur in trocknen Pflanzentheilen anzutreffenden *A. panicum* in denselben spricht noch mehr dafür. In den Zapfen scheinen daher nur die Larven von *Curculio notatus* und von verschiedenen Wicklern und Spannern wirklich schädlich zu werden. Dennoch sind diese als täuschende, wie wir sehen werden, dem

Forstmannen interessant und, wenn sie derselbe ordentlich unterscheiden könnte (wozu nun doch die Mittel in den genauen Abbildungen gegeben wären), würden wir vielleicht auch bald von andrer Bedeutung derselben hören. Der Schaden, welchen sie an hölzernen Geräthschaften u. dergl. anrichten, ist uns minder wichtig. Ihre Vertilgung wird nur durch Entfernung ihres Fraßes möglich. Die Käfer selbst lassen sich wenig sehen, auch kann man Fangbäume u. dergl. nicht bei ihnen anwenden. Von einigen kennen wir auch noch nicht die Lebensweise so genau, dafs wir ihnen wirksam begegnen könnten.

Eine gute EINTHEILUNG der Anobien ist nicht ganz überflüssig, da die Artenzahl ziemlich beträchtlich ist. Die regelmäfsig oder unregelmäfsig punktirten Flügeldecken und die Länge der letzten Führlglieder geben die besten Eintheilungsgründe.

#### A r t e n .

\* Flügeldecken unregelmäfsig punktirt.

† Das neunte Führlglied des Männchens doppelt so lang oder noch länger als das siebente und achte zusammen.

1. *A. mollo* Fabr. Weicher Nagekäfer. (Taf. II. Fig. 12.)

NAMEN. Wegen der deutschen s. bei den Gattungen. In Betreff der lateinischen, systematischen sind die Schriftsteller wohl ziemlich einverstanden, obgleich man wegen der Ähnlichkeit der Arten untereinander nicht sicher ist, ob nicht hier und da noch eine andre Art mit unter diesen Namen aufgenommen ist, wie z. B. schon aus Gyllenhal's Beschreibung zu vermuthen wäre. Bei Linné soll es der *Dermestes* oder *Ptinus mollis* sein. Bei Bechstein heifst er *Ptinus mollis*.

CHARACTERISTIK. 1,8 bis 2,6" lang, also sehr oft durch ansehnlichere Gröfse von den verwandten unterschieden. Kopf wenig gewölbt, fast flach. Augen des Männchens fast kugelförmig, sehr grofs, mit dem Kopfe fast so breit wie Halsschild, die des Weibchens kleiner, bei beiden schwarz oder bräunlich-schwarz. Die Gegend der Fühlerelenkung nur sehr schwach gebuchtet. Fühler fast die halbe Länge des Körpers überragend. Die drei letzten Glieder beim Männchen dünn, nicht viel länger, beim Weibchen dicker und etwas kürzer als die übrigen zusammen, die vorübergehenden Glieder nicht auffallend klein: das fünfte und siebente länger als das sechste und achte. Halsschild breiter als lang, gewölbt, gerandet, mit abgerundeten Vorder- und Hinterecken, ohne auffallende Vertiefungen und auch in der Mittellinie auf dem ersten Drittheil nur mit einem etwas bemerkbaren, eine Mittellinie andeutenden Punkte. Schildchen sehr klein, länglich. Flügeldecken kaum dreimal länger als Halsschild, mit abgerundeten Schultern, und bis zu den abgerundeten Enden mit parallelen, kaum hinter den Schultern etwas einwärts gebogenen Rändern. Beine lang und schmal, das vorletzte Fußglied tief eingeschnitten, herzförmig. Die Oberfläche des ganzen Körpers sehr fein gekörnt (nicht punctirt, wie Gyllenhal sagt), am feinsten gegen die Spitze der Flügeldecken und auf den Bauchringen, und am wenigsten fein auf Kopf und Halsschild und an der Brust. Farbe röthlich-braun, gegen die Deckenspitzen meist mehr röthelnd. Behaarung gelblich-braun, ziemlich stark.

ÜBER VORKOMMEN, LEBENSWEISE u. s. w. dieser Art ist bis jetzt noch nicht viel zu sagen. Sie hat sich fast überall gezeigt, wie man aus den Sammlungen sieht, obwohl sie von den Forstleuten noch nicht viel beachtet wurde. Bechstein sagt, der Käfer wäre an altem Holze und im Freien im Frühjahr oft häufig an Fichten. Sollte er hier nicht unsere neunte Art meinen? Die Larve kennt er gar nicht, denn er nennt sie ohnfüßig. Hr. Wächter (*Hannov. Mag.* S. 337.) sagt, der Käfer sei im Amte Knesbeck und Burgwedel auf mehrere hundert Morgen Fichtenbestände einmal verbreitet gewesen und habe Gelbwerden der Nadeln hinterlassen. Demnach wäre er schon merklich schädlich. Im Jahre 1835 erzog ich ihn häufig aus Kiefernzweigen, welche ich wegen ihres kranken Aussehens, besonders wegen einzelner, stark angeschwollener, harziger Rindenstellen abgehauen hatte. Auch erzog ich ihn aus Kiefern-Knütteln, aus welchen Hr. Fintelmann mehrere Motten (s. Bd. II.) erzogen hatte und zwar nachdem die Knüttel

schon fast zwei Jahre in meinem wohl verschlossenen Kasten gelegen hatten, so dafs ich hier unbedenklich eine zweijährige Generation annehmen darf. Um ihm wirksam begegnen zu können, mufs noch erst sein Aufenthalt in den verschiedenen Zuständen näher erforscht werden.

2. *A. Pini* Erichs. Kiefern-Nagekäfer. (Taf. II. Fig. 13.)

NAMEN. Nur unter obiger Bestimmung des Berliner Museums mir bekannt. Wahrscheinlich ist die Art auch noch nirgends ordentlich unterschieden und steckt in den Sammlungen mit andern, schon bekannten Arten zusammen.

CHARACTERISTIK. 1,4 bis 2" lang. Dem *A. molle* ähnlich in der fast eben so breiten und kurzen Körperform, jedoch aufser der geringeren Gröfse deutlich verschieden durch etwas kürzere Fühler, deren drei letzte Glieder beim Weibchen etwas kürzer, beim Männchen aber nicht länger als die vorhergehenden, sehr deutlichen und ziemlich gestreckten, an Gröfse allmählig zunehmenden (mit Ausnahme des sechsten und achten) sind (diese geringere Gröfse des sechsten und achten Gliedes ist bald mehr, bald weniger auffallend bei verschiedenen Individuen), nicht abgerundete, sondern mehr winklige Vorderecken und meistens bemerkbare glatte Mittellinie des Halsschildes. Auch ist der Eindruck jederseits der Mittellinie und am Hinterrande kaum bemerkbar. Auch sind die Füfse etwas kürzer und die Oberfläche des Körpers etwas feiner gekörnelt. Die Farbe im Ganzen etwas dunkler, die Deckenspitzen immer deutlich hell gelbröthend. Behaarung bräunlich-gelb, überall ziemlich stark.

Über VORKOMMEN, LEBENSWEISE u. s. w. ist ebenfalls noch nicht viel zu sagen, da die Art bis jetzt so gut wie unbekannt war. Ich habe den Käfer im Sommer an Kiefern sitzend gefangen. Hr. Hartig erzog ihn und *Tortrix Buoliana* aus den Maitrieben der Kiefer, und zwar in solcher Menge, dafs wohl 5-6 Käfer durchschnittlich auf einen Trieb kamen. Die Triebe waren jedoch durch *Tortrix Buoliana* (s. Bd. II.) sämtlich krank gemacht (s. Hartig's Jahresber. H. II. S. 192.). Im Herbst des Jahres 1838 sahe ich auch noch frische, durch Hrn. Forst-Candidaten Sotzmann angeschaffte Kieferentriebe, in welchen *Anobium*-Larven steckten, die dem *Pini* ganz gewifs angehörten. Sie stammten aus Kiefernsonnungen des Dippmannsdorfer Revieres bei Potsdam her, welche früher schon durch *H. piniperda* und *Tortrix Buoliana* hart mitgenommen worden waren. Der Hr. Oberförster Krebs hatte die Larven zuerst bemerkt, welche im October des Jahres 1837 in großer Menge in den vertrockneten (wahrscheinlich schon durch *H. piniperda* und *T. Buoliana* ausgefressenen) Trieben safsen, im Jahre 1838 von Hrn. Sotzmann aber nur noch in geringer Quantität gefunden wurden. Die meisten waren mit den Trieben abgefallen und verschwunden (also wahrscheinlich nach der im Frühjahr erfolgten Verpuppung ausgeflogen). Fernere Beobachtungen wären sehr wünschenswerth.

3. *A. Abietis* Fabr. III. Fichten-Nagekäfer. (Taf. II. Fig. 14.)

NAMEN. Wahrscheinlich ist diese, im Berliner Museo als die ächte Fabricius'sche und Illiger'sche Art steckende, auch das von Gyllenhal beschriebene *A. Abietis*. Bechstein hat es nicht gekannt, denn sonst sagte er nicht (*Forstins.* S. 230.), es sei blofs Varietät von *A. molle*.

CHARACTERISTIK. 1,5 bis 1,7" lang. Den beiden vorigen wieder sehr ähnlich, sowohl in der hellen röthlich-braunen Farbe, wie auch in der Gröfse und Form, jedoch constant verschieden durch andre Fühler- und Halsschild-Bildung. Die Fühler sind kürzer und die drei letzten (oft schwärzlich-braunen), bei dem Weibchen etwas kürzeren und gedrungenern Glieder deutlich kürzer bei beiden Geschlechtern als die übrigen zusammen genommen. Vom vierten bis achten nehmen sie allmählig an Länge und Dicke zu, mit Ausnahme des sechsten und achten, welche zuweilen etwas kürzer als das fünfte und siebente sind. Die Umrisse des Halsschildes nähern sich einem Viereck am meisten, indem die sehr



aufgeworfenen Seitenränder gerade sind und fast ganz parallel laufen, und mit dem vordern Rande einen fast rechten, scharfen, mit dem hintern einen stumpfen, abgerundeten Winkel bilden. Auch ist in der Mittellinie der Anfang einer stumpfen Leiste bemerkbar, so wie zu jeder Seite derselben innerhalb des gewöhnlichen Eindrucks, eine schwach gewölbte Stelle. Die Fußglieder auffallend kurz und breit. Behaarung gelblich-braun, vorzüglich am Halsschild stark.

VORKOMMEN. Schon in den verschiedensten Gegenden wie bei uns, am Harze, in Westphalen, Bayern, Schweden beobachtet und aus diesen mir zugekommen.

LEBENSWEISE, FORSTLICHE BEDEUTUNG UND BEGEGNUNG. Die Nachrichten, daß der Käfer und seine Larve in Fichtenzapfen hause, sind bei allen Beobachtern (Hrn. Saxesen, Hrn. Wallt, Hrn. Creutzinger) übereinstimmend. Hr. Saxesen, der häufig wiederholte Beobachtungen anstellte, ist jedoch der Meinung, daß die Käfer erst, nachdem die Zapfen abgefallen wären, sich in sie hineinbohrten, also nicht am Baume. Da sie Hr. Wallt indessen in reifen Zapfen fand, deren Früchte dadurch zerstört wurden, so könnte der durch sie angerichtete Schaden doch wohl einmal merklich werden; bei Gyllenhal heißt es: *in frondibus Abietis*. Ihre Vertilgung würde durch Sammeln der Zapfen zur Winterzeit (wenn die Larven darin sitzen) und Verbrennen derselben zu bewerkstelligen sein.

#### 4. *A. longicorne* Knoch. Langhörniger Nagekäfer. (Taf. II. Fig. 15.)

NAMEN. Nach handschriftlichen Bemerkungen Knoch's im Berliner Museum.

CHARACTERISTIK. 1,5 bis 2" lang, also wieder sehr verschieden in der Größe wie die vorigen, von denen es aber in der langgestreckten Gestalt, wie auch in der Bildung der Fühler und des Halsschildes vorzüglich abweicht. Die Fühler sind absolut sehr lang, aber kaum länger als die Hälfte des ganzen (so langen!) Körpers. Die drei letzten Glieder beim Weibchen und Männchen, ganz besonders aber beim Männchen, länger als die vorhergehenden sehr feinen. Das achte nur schwer erkennbar. Der Halsschild fast halbmondförmig (indem die Seitenränder sehr kurz sind und allmähig bogig in den Hinterrand verlaufen). Neben der höckerförmigen Spur einer Mittelleiste bemerkt man jederseits eine schwache Wölbung und vor derselben noch eine, oder mit andern Worten: die Oberseite scheint durch einen schwachen Queereindruck zwei vordere und zwei hintere Erhöhungen neben der Mittellinie zu zeigen. Die Fußglieder (besonders beim Männchen sehr) lang und schmal, das vorletzte Glied beim Weibchen nur schwach herzförmig. Farben: entweder nur am Halsschilde oder auch an den Flügeldecken und der ganzen Unterseite bräunlich-schwarz; Fühler und Beine immer heller, mehr oder weniger rötlich-braun. Behaarung bräunlich-grau, am Halsschilde schwach.

VORKOMMEN, LEBENSWEISE, FORSTLICHE BEDEUTUNG UND VERTILGUNG können nach den bis jetzt eingesammelten geringen Erfahrungen nicht als verschieden von denen der vorigen Art angenommen werden. Hr. Saxesen beobachtete diese Art auch in Fichtenzapfen.

#### 5. *A. angusticollis*. Dünnhalsiger Nagekäfer. (Taf. II. Fig. 16.)

NAMEN. Ich habe diese Art, welche, nach Hrn. Erichson, in mehreren Sammlungen Berlins, aber ohne eignen Namen, sich finden soll, wegen des nach hinten so auffallend verschmälerten Halsschildes so genannt.

CHARACTERISTIK. Den kleinsten Individuen von *A. Pini* und *A. longicorne* in der Größe ganz und in der Gestalt ziemlich ähnlich, und dem letztern fast auch in der gestreckten Form gleich, aber von allen verschieden durch die Bildung des nach hinten auffallend sich verschmälernenden, meist auch eine glatte Mittelfurche zeigenden, sonst aber nicht unebenen Halsschildes. Der Seitenrand und ein Theil des Hinterrandes sind so stark aufwärts gebogen, daß der Halsschild durch den nun stark vorstehenden Hin-

terwinkel von oben fast ein rhomboidales Ansehn erhält. Die Fühler ganz wie bei *A. Pini*, nur dafs die Glieder vom zweiten bis achten sehr regelmäfsig (wie auch nur wenig) an Länge zunehmen, und kaum das fünfte und siebente länger als das sechste und achte sind. Kopf (mit Ausnahme der bräunlich-gelben Taster und der meist hellern, kürzern Fühlerglieder), Halsschild und Unterseite schwärzlich-braun, die Flügeldecken etwas heller, an der Spitze sogar röthlich-braun, die Fufsglieder und Knie gelblich-braun. Behaarung grau, schwach.

VORKOMMEN. Auch diese Art erhielt ich vom Harze aus Fichtenzapfen. Hr. Hartig erzog den Käfer aus, in der Gegend Berlins gesammelten Fichtenzapfen, in grofser Menge.

#### 6. *A. nigrinum* Erichs. Schwarzer Nagekäfer. (Taf. II. Fig. 17.)

NAMEN. Da der, angeblich von Hrn. Schüppel herrührende, in mehreren Sammlungen sich findende Name *A. infuscatum* von diesem abgelehnt wird, so hat man auf dem Berliner Museum den obigen, sehr passenden gewählt. Viele halten es für das *A. plumbeum* Ill., aber mit Unrecht.

CHARACTERISTIK. 1,5 bis 2,1" lang. Etwas gestreckter als *A. molle* und demselben im Mangel aller Unebenheiten des Halsschildes am ähnlichsten. Letzterer ist jedoch ein wenig kürzer und die Winkel des noch mehr herabgebogenen und stark umgebenen Seitenrandes noch gerundeter. Die drei letzten (beim Männchen dünnern, beim Weibchen dickern) Fühlerglieder länger (beim Männchen viel länger) als die vorhergehenden (beim Männchen, besonders vom sechsten bis zum kaum bemerkbaren achten sehr) kleinen Glieder. Fufsglieder besonders beim Männchen lang und schmal. Farben meist (bei sieben Exemplaren), bis auf die hellern Fufsglieder, Kniegelenke und Taster (zuweilen auch die Schienen und Fühler, selbst oft nur der drei letzten Glieder) dunkel schwärzlich-braun, zuweilen auch die ganzen Flügel heller braun, nie metallisch (wie *plumbeum*). Die feinen und (besonders am Halsschild) kurzen Härchen grau.

VORKOMMEN. Schon in sehr verschiedenen Gegenden wie bei uns, in Oberschlesien, im Lüneburg'schen (Hr. Heyer), in Pommern, West- und Ostpreußen (Hr. Schmidt) bemerkt.

LEBENSWEISE, FORSTLICHE BEDEUTUNG UND BEGEGNUNG. Diese Art gehört zu den interessantesten, da sie zugleich t ä u s c h e n d und auch s c h ä d l i c h werden kann. Sie giebt nämlich zu Verwechslungen mit einem sehr s c h ä d l i c h e n Käfer, dem *Hylesinus piniperda*, Anlaß und gehört deshalb zu den t ä u s c h e n d e n. Man wird nämlich hier und da in den entomologischen Aufsätzen praktischer Forstmänner angegeben finden: *Hylesinus piniperda* brütete auch in den Trieben der Kiefer. Da dies jedoch immer nur als eine flüchtig hingeworfene Meinung erschien, so legte ich nie Werth darauf. Als ich jedoch kürzlich wieder davon hörte und zwar durch einen tüchtigen Insektenkenner, Hrn. Zebe, so ersuchte ich denselben, mir Gelegenheit zur eignen Anschauung dieser seltsamen Erscheinung zu geben. Ich erhielt durch ihn einen frischen Kiefertrieb und in demselben wirklich eine, der Waldgärtnerlarve äußerst ähnliche, die ich indessen gleich für eine Nagekäferlarve, wegen der deutlich bemerkbaren Füße, erkannte. Der für diese Musterung der Länge nach durchschnittene Trieb wurde wieder verbunden und im April schlüpfte zu meiner Freude der Käfer der gegenwärtigen Art aus. In der beigedruckten einen Hälfte sieht man die durch die Larve ausgefressene Markröhre und das Loch, welches sie sich zum Aus-schlüpfen gebohrt hat. Die 2,4" lange Larve dieser Art bildete ich nicht besonders ab, da sie vergrößert vollkommen das Ansehen der Fig. 19 B abgebildeten von *A. tessellatum* hat. Schon früher hatte mir Hr. Fintelmann von einer Käferlarve in frischen Kiefertrieben geschrieben. Vor Kurzem erhielt ich von ihm den Käfer nebst Larven und Puppen mit der Bemerkung, dafs er ein wahrer Holzverwüster sei, indem er unter der Astrinde mehrerer freistehender, 30-jähriger, gesunder Kiefern vorkomme und die Äste tödte. Die mir mitgeschickten Äste waren mit zahlreichen, geschlingelten, tief in das Holz eingreifenden Larvengängen besetzt. Die



Puppenhöhlen liegen theils oberflächlich, theils mitten im Holze, an den dünnern Stellen sogar im Marke. Man könnte glauben, der Fraß rühre von *Curculio violaceus* her, wenn nicht die Gänge, Puppenhöhlen und Fluglöcher kleiner wären. In andern Ästen hat Hr. Fintelmann auch dies *Anobium* mit einer Mottenlarve (*Phycis abietella*) zusammen fressend gefunden. Solche Äste erscheinen um den Quirl wie aufgeschwollen und gewähren ein ekelhaftes, durch Harzaustritt und Rindenablösung veranlaßtes, grindartiges Ansehen. Ich selbst habe den Käfer ziemlich häufig gezogen, aber aus trockenem Kiefern-Reisig, in welchem *Buprestis 4-punctata* und mehrere *Magdalis* gebaut hatten. Wieder ein Beweis, daß ein und dasselbe Insect in trocknen und frischen Zweigen vorkommt und von den erstern, wenn diese in Revieren lange liegen, auf die letztern übergehen und schaden kann, und daß Reinlichkeit das beste Schutzmittel ist. Auch Hr. Haessler erwähnt einer Larve, welche mit dem *H. piniperda* die Zweigspitzen zusammen bewohne (*A. Pini*? könnte auch *T. Buoliana* sein). Von Hrn. Heyer erfahre ich noch Folgendes über dies, bis jetzt so wenig beobachtete, Thierchen. „Vom 8. Mai bis 6. Juni d. J. klopfte ich diese Art in großer Menge von wenigen unterdrückten, bis 4' hohen Zwergbäumen der Fichte, welche auf der jetzt freien Fläche eines, in Folge des verwüstenden Sturmes vom 29. November 1836 abgetriebenen, Kiefernholzes stehen geblieben waren. Ob sich dies Insect nach dem Auskome — wahrscheinlich aus dem umherliegenden Kiefernreisig — nur zur Ruhe auf der Fichte niedergelassen, oder in Ermangelung von Kiefern sich an die Fichte hält und darin seine Brut unterbringt, wird die Folge lehren. In einer andern hiesigen Gegend fand ich dies *Anobium* ziemlich häufig, auch in *copula*, an den Zweigen der einzeln stehenden Kiefern.“

†† Das neunte Führglied des Männchens kürzer als das siebente und achte zusammen.

#### 7. *A. abietinum* Gyll. Fichtenzweig-Nagekäfer. (Taf. II. Fig. 15.)

CHARACTERISTIK. Das Männchen 1,7" lang. Der gestreckteste und dünnste unter allen. Kopf klein mit außerordentlich hervorragenden Augen. Fühler wenig kürzer als der ganze Körper, mit allmählig zunehmenden Gliedern. Halsschild fast so breit wie lang, wenig gewölbt, fast quadratisch, in der Mitte mit einem leichten querüber gehenden Eindruck, an der Basis mit drei mehr oder weniger deutlichen Höckerchen. Fußglieder lang und dünn. Farbe hell gelblich-braun, die Brust etwas dunkler. Behaarung, besonders auf dem Halsschilde, sehr fein, weißlich. — Das Weibchen 1,2" lang, kleiner und etwas gedrungener als das Männchen. Die Fühler viel kürzer, mit nur ganz allmählig verlängerten Gliedern. Halsschild breiter als lang, ziemlich gewölbt mit kaum bemerkbaren Unebenheiten, scharfem vordern und stumpfem hintern Winkel. Fußglieder kurz und dick, das vorletzte Glied kaum zurückgedrückt. Farben nur am Halsschild und Kopf etwas dunkler. Behaarung fein, aber auch auf dem Halsschild nicht schwächer.

Ist bis jetzt noch nicht so bekannt, als daß etwas Wesentliches darüber gesagt werden könnte. Im Jahre 1837 von Hrn. Saxen aus Fichtenzapfen erzogen.

#### 8. *A. tessellatum* Fabr. Buntwürfliger Nagekäfer. (Taf. II. Fig. 19.)

NAMEN. Unter obiger, noch nicht bei Linné vorhandener, Benennung ganz allgemein bekannt und nicht zu verwechseln.

CHARACTERISTIK. Fast 3" lang und 1,4" breit, also die größte und dickste Art dieser Abtheilung und schon deshalb nicht zu verwechseln, vorzüglich auch wegen der schönen, seidenglanzenden, bräunlich-gelben Haarflecke, welche dem dunkelbraunen Grunde ein buntes Ansehen geben. Die drei letzten Führglieder werden plötzlich breiter.

VORKOMMEN, LEBENSWEISE, FORSTLICHE BEDEUTUNG UND BEGEGNUNG. Diese Art scheint überall die gemeinste in Laubwäldern zu sein. In Nadelhölzern fand ich ihn nur ein einziges Mal, merkwürdig genug,

an anbrüchigen Stellen der alten Taxus-Bäume am großen Rabensteine im Thale'schen Reviere. Also das einzige bis jetzt in der Eibe bemerkte Insect! In der Eiche findet sich der Käfer zwar vorzugsweise, jedoch auch dann und wann in Buchen und Hagebuchen, wahrscheinlich auch in andern Laubhölzern, ja selbst im Gebälke der Häuser. Hr. Schlotthaußer beobachtete ihn hier beim Locken. Der Käfer saß bloß mit den Mittel- und Hinterbeinen auf einem dünnen, trocknen und daher tönend-elastischen, abstehenden Splitterchen und klopfte mit Kopf und Bruststück dagegen, wodurch, gleichsam in Folge vibrierender Schwingungen, das pausenweise unterbrochene, taktmäßige Picken entstand. Dieses Picken ist wohl als ein Lockton anzusehen, durch welchen sich die Männchen und Weibchen rufen. Hr. Heyer glaubt dieses aus seinen Beobachtungen abnehmen zu können. In den *Philosophical Transactions* (Vol. XX, pag. 376.) beschreibt es Mr. Allen ähnlich, wie oben angegeben, bei *A. pertinax* und sagt, daß er beobachtete, wie sich zwei verschiedene Individuen in einem und demselben Zimmer in gewissen Pausen antworteten. Larve sowohl wie Käfer leben in den anbrüchigen Stellen und durchwühlen das Holz nach allen Richtungen, wie man aus der beigedruckten Abbildung ersieht. Selten wird man eine Eiche finden, die sie nicht gleich durch die großen Fluglöcher (wie mit Nr. 4. geschossen) verriethe. Da sie ziemlich tief in das Holz gehen, auch meist in großer Menge vorhanden sind, und so für das Nutzholz nachtheilig werden, kann man sie wohl als merklich schädlich bezeichnen. Das beste Mittel, ihrer los zu werden, ist, solche alte Stämme, die ohnehin keinen normalen Zuwachs mehr geben, immer bald herauszunehmen. Hr. Schlotthaußer beobachtete, daß Eichen-Sohlenbalken ganz morsch und hohl durch das Insect gefressen waren, während die gleich alten Tannen-Ständer ganz unversehrt geblieben waren. Hr. Schlotthaußer schlägt vor, um die Angriffe der Käfer abzuwehren, die Hölzer einmal oder wiederholt anzustreichen mit Gastheer oder verdünntem wirklichen Theer, Heringlake oder mit Auflösungen von Salzen und Alkalien, z. B. von Salz- oder Pfannenstein u. dergl., denn die Erfahrung lehre, daß Tröge, Mulden und andres Hausgeräth, welche nur einmal zum Einsalzen des Fleisches gebraucht wurden, später nie von Bohrinsecten angegangen würden.



\*\* Flügeldecken regelmäßig reißig punktirt.

9. *A. emarginatum* Duftschm. Ausgerandeter Nagekäfer. (Taf. II. Fig. 20.)

NAMEN. Diese Art ist wahrscheinlich oft übersehen und verwechselt und deßhalb von vielen Namen verschont geblieben.

CHARACTERISTIK. 2-2,7" lang. Die Föhler den hintern Halsschildrand kaum überragend. Die drei letzten Glieder derselben viel stärker als die auffallend kleinen, vorhergehenden. Der Halsschild stark gerandet, mit deutlich vorgezogenen Vorderecken und drei starken Eindrücken des Rückens, welche zu jeder Seite und ganz besonders vor einer, vom erhabenen Hinterrande entspringenden und sogleich sich in ein Paar bogige, stark auseinandergehende Äste theilenden Leiste (dem *A. pertinax* Linn. am ähnlichsten) sich finden. Die Flügeldecken lang. Farbe braun, durch eine gelblich-graue, feine Haarbedeckung etwas seidenglänzend.

VORKOMMEN, LEBENSWEISE UND FORSTLICHE BEDEUTUNG. Obgleich diese Art selbst bei den Insectensammlern nicht gewöhnlich ist, so scheint sie doch im Forste häufig vorzukommen und hier vielleicht nur wegen einer Verwechselung übersehen worden zu sein. Zweimal habe ich sie bereits aus Fichtengegenden erhalten, von Hrn. Saxsen und Hrn. Zebe. Beide Herren waren so gütig, mir Rinden-

stücke der Fichten, und zwar sehr starker Fichten, mitzusenden, an welchen deutlich zu sehen war, daß die von Käfer und Larve herrührenden Gänge nur in der eigentlichen Rinde sich befinden und nie bis auf den Bast gehen. Zuweilen fressen sie so oberflächlich, daß die obersten Rindenschuppen ausbrechen und man in die unregelmäßig durcheinander laufenden und mit braunem Wurmwehl angefüllten Gänge hineinsehen kann. (Taf. XXI. Fig. 1. zeigt die theils schon entblösten Gänge, theils noch mit Rinde bedeckte, nur durch die Fluglöcher bezeichnete). Im Falle die Rinde schon abgeblättert ist, wird auch die Natur des Käfers gleich erkannt werden. Bleiben aber die obersten Schuppen unversehrt und man gewahrt nur die, wie mit Nr. 9. oder 10. geschossenen Fluglöcher, welche gewöhnlich sehr dicht beisammen sind, so kann man leicht auf die Vermuthung kommen, der große Fichteuborkenkäfer (*B. typographus*) haue hier. Dies ist auch schon wirklich vorgekommen und einzelne Bäume sind, wie Hr. Renfs versichert, in Gefahr gewesen, heruntergehauen zu werden. Das Insect geht aber, wie gesagt, nicht bis auf den Bast und ist daher ganz unschädlich, interessirt uns hier also nur wegen der Täuschung. Man kann sie sich vermehren lassen, so viel sie wollen, es wäre denn, daß noch ein anderer Aufenthalt, wo mehr Schaden angerichtet werden könnte, entdeckt würde. Ganz kürzlich ist mir eine ähnliche Erscheinung an alten 60-80jährigen gesunden Kiefern, durchaus aber nicht an den ganz beschabten jüngern und Stangen, vorgekommen. Die äußerst dicke Rinde war, bis zu einer Höhe von 4-5', mit zahlreichen, großen Löchern durchbohrt, welche zu Gängen führten, die auch nicht bis auf den Bast gingen. Leider war aber nichts Lebendes darin, nicht einmal ein Stück einer Flügeldecke, welches die Bewohner verrathen hätte. Wahrscheinlich gehören diese aber auch einem *Anobium* an. Vielleicht entdecke ich das Thier noch später. Auch bei dieser Art von *Anobium* ist die Mehrjährigkeit der Generation beobachtet worden. Hr. Zebe nämlich erzog aus denselben Rindenstücken, deren ich vorher erwähnte, bald nach Fällung der Fichte, schon im April, einen Käfer, dann bis Ende Mai 4 Exemplare, und im December desselben Jahres wieder mehrere, dann wieder einige im März und April des folgenden Jahres. Bis zum April des folgenden Jahres (1838) zeigte sich kein Käfer weiter und dennoch fanden sich bei genauer Untersuchung noch lebende Larven, die wahrscheinlich noch den Sommer hindurch gelebt hätten. Hr. Zebe erinnert sich zugleich bei Fällung der Fichte in den entnommenen Rindenstücken neben ausgewachsenen Larven auch halbwüchsige bemerkt zu haben. Eine Larve, deren Gang der Berichterstatter aus Versehen beim Schneiden zerstört hatte, arbeitete in dem für sie künstlich bereiteten Loche sogleich fort. Als er das Stück nach langer Zeit wieder untersuchte, fand er darin den fertigen Käfer, der aber bei Eröffnung seines Ganges sich gleich wieder zurückzog. Er zieht daraus folgenden, die Lebensweise der Anobien noch weiter aufklärenden Schluß: die Käfer hausen gern und lange in der Rinde und gehen nicht so leicht aus derselben hervor (vielleicht nur allein zur Begattungszeit), auch leben die Larven mehrere, vielleicht 3-4 Jahre und erklären die großen Zerstörungen in der Rinde, ohnerachtet doch nur immer wenige Larven und Käfer, welche letztere aber zu allen Jahreszeiten zu finden sind, darin beisammen getroffen werden. Auch eine Nachricht von Hrn. Heyer läßt vermuthen, daß die Mehrjährigkeit bei vielen Anobien, vielleicht allen, vorkommt. Die Larven nämlich, welche er in, im Herbste 1836 eingeholten, Fichtenzapfen bemerkte, hatten sich im Jahre 1838 noch nicht verwandelt.

VERWANDT sind der letzten Section die, den Forstmann auch angehenden, in Häusern, Holzmagazinen, Artillerie-Zeughäusern u. s. f. vorkommenden und öfters in den Geräthen, Tischen, Schränken und selbst dem Jagdzeuge sehr unangenehmen Arten, wie: *A. pertinax* Linn. (bis fast 3" lang und durch gelbhaarige Flecke an den Hinterecken des Halsschildes ausgezeichnet), *Carpini* Hb. (oft eben so groß aber ohne Flecke), *A. striatum* Ol. (meist um die Hälfte kleiner, sonst ganz ähnlich) und das kleinste, besonders die Frucht- und Blumensammlungen verwüstende, hellbraune *A. paniceum* Fabr. Gegen sie ist selten etwas zu thun. Holz-, Frucht- und Pflanzen-Sammlungen kann man sichern durch Eintauchen der Gegenstände

in eine Auflösung des Quecksilber-Sublimats in Alkohol und nachheriges Trocknen. Viel mehr Schaden thut in Magazinen nicht selten der, den kleinern Anobien sehr ähnliche, nur weniger walzige und (wie überhaupt die ganze Gattung *Ptinus* Fabr.) gleich lange Fühlerglieder zeigende *Ptinus fur* Linn., welcher auf dem Halsschild vier hohe helle Haarbüschel, fast wie Kämme, trägt. Gegen ihn wird in Magazinen leider wenig zu thun sein, wenn man nicht die zu schützenden Gegenstände mit Giftauflösungen überziehen kann. Man hat Bewegung (Erschütterung) der befallenen Sachen empfohlen; aber auch dies wird, wie ich glaube, nicht viel helfen, denn meine Herbarien konnte ich, trotz allen Klopfens, nicht befreien. Bei schweren, stark vibrierenden Körpern, z. B. Balken, mag indessen wiederholtes Fahren auf Steinpflaster gute Dienste thun. — Diese Arten verrathen sich ebenfalls oft durch das eigenthümliche, dem Ticken einer Taschenuhr vergleichbare Geräusch, welches wahrscheinlich beim Fraße, und nicht bloß als Lockton verursacht wird. Sie (besonders *A. pertinax*, *striatum* und *Carpini*) sind die Todten-Uhr, welche das abergläubische Volk in Häusern aus alten Holzwänden, Schränken u. dergl. zu vernehmen glaubt, und nicht die Holzlaus (*Termes pulsatorium* Linn.) ist es, welche zwar an ähnlichen Orten lebt, aber als ein kleines, schwaches, weiches Thierchen, dies Geräusch nicht hervorbringen kann. Der Irrthum stammt schon von Linné her.

## Dritte Gattung.

*Ptilinus* Fabr. Kammhorn-Nagekäfer. *Scaphisoma*

NAMEN. Im Deutschen werden diese, den Anobien sehr ähnliche Käfer nicht von jenen unterschieden. Auch Linné hatte sie in seiner Gattung *Ptinus* (s. NAMEN von *Anobium*).

CHARACTERISTIK. Den Anobien sehr ähnlich, aber constant verschieden durch langzahnig-gesägte oder gekämmte Fühler und selbst durch die Lebensweise (s. dort). Mundtheile. Lefze abgerundet-viereckig, fein behaart. Oberkiefer dreieckig und dick, an der Außenseite behaart, mit zweizahniger Spitze. Unterkiefer mit hornigem, deutliche Nähte zeigenden Stamme und zweilappiger Lade: beide Lappen am Ende behaart, der äußere viel größer als der innere. Taster viergliedrig, lang. Lippe mit großer, viereckiger, die langen dreigliedrigen Taster tragender Stütze und darauf sitzendem, tief gebuchteten, zweilappigen, etwas geknickten, häutigen, stark behaarten Theile. Die Larven denen von *Anobium* ganz ähnlich. — VORKOMMEN, LEBENSWEISE u. s. f. S. bei den beiden Arten.

## A r t e n.

1. *P. pectinicornis* Linn. Langstrahliger Kammhorn-Bobrkäfer. (Taf. II. Fig. 21.)

NAMEN. Bei den bedeutendsten Schriftstellern übereinstimmend. Bechstein hat ihn, obgleich er viele minder schädliche aufgeführt hat, nicht genannt, ob wegen Verwechslung?

CHARACTERISTIK. 1,7 bis 2,5" lang und 0,6 bis 0,8" breit. Kopf nach unten gerichtet, sehr gewölbt. Fühler beim Weibchen mit auffallend langen Sägezähnen, welche beim Männchen in sehr lange, dünne, gegen die Spitze wenig verdickte Strahlen sich ausziehen (schön gekämmt). Halsschild fast kugelförmig, vorn ohne Ausrandung und oben in der Mittellinie ohne Längsfurche. Flügeldecken fein unregelmäßig punktiert, ohne Längsrippen, schwach angedrückt-behaart und, so wie Fühler und Füße, besonders letztere, hell rötlich-braun.

VORKOMMEN. Fast überall in Buchen und Eichen im Holze.

LEBENSWEISE im Ganzen mit der der Anobien übereinstimmend, jedoch bleibt er nie bloß in der Rinde, sondern geht gerade durch in das Holz, wo er anfangs wagerechte, später vertikale Gänge macht.

Er geht völlig gesunde, wüchsige Buchen an, wenn sie nur an einer Stelle von Rinde entblößt wurden. So sahe Hr. Saxesen an einer solchen, nur wie ein Paar Hände großen Stelle, ein Dutzend Weibchen beim Einbohren begriffen. Auch ich sahe einzelne an gesunden Eichen. Immer wurden sie in diesen Fällen aber nur in wagerechten, kurzen Gängen angetroffen. Verticale von der Larve ausgefressene, geschlangelte Gänge fanden sich nur an stark anbrüchigen oder ganz abständigen Bäumen. Der Käfer wird jedoch auch häufig in verarbeitetem Holze, Pfählen, Balken, Brettern, selbst Hausgeräthen angetroffen und bohrt sich nach H. Heyer auch an den gesügten Enden frischgeschlagener Erlen tief ein. Hr. Heyer sahe ihn auch noch in Menge in den entrindeten Holzflächen der Weiden und ich vermüthe fast, dafs die Beschädigungen an Satzweiden, welche hier und da vorkommen, von diesem oder dem *P. costatus* herrühren.

**FORSTLICHE BEDEUTUNG UND BEGEGNUNG.** Aus der Lebensweise geht hervor, dafs sie Bäume, die den zufällig an ihnen verursachten Schaden noch ausgeheilt hätten, entweder noch kranker machen oder doch wenigstens als Nutzhölzer verderben und dafs man sie als merklich schädliche ansprechen muss. Solche Bäume sind daher immer so bald wie möglich zu entfernen, da sie diese und andre Holz- und Rinden-Käfer immer mehr herbeiziehn.

## 2. *P. costatus* Gyll. Gerippter Kammhorn-Bohrkäfer. (Taf. II. Fig. 22.)

**NAMEN.** Sonst als *pectinicornis* meist beschrieben.

**CHARACTERISTIK.** Dem vorigen sehr ähnlich, aber immer etwas dicker und untersetzter, meist auch etwas gröfser und dunkler (meist schwärzlich-braun). Der Halsschild vorn mit einer deutlichen Ausrandung, von welcher eine deutliche Längsfurche entspringt. Die Fühlerstrahlen des Männchens kürzer, aber gegen das Ende deutlich verdickt. Die Flügeldecken meist mit 2-3 schwach erhabenen Längsrippen.

**VORKOMMEN.** Nur in Weiden und Pappeln.

**LEBENSWEISE** wie beim vorigen.

**FORSTLICHE BEDEUTUNG** geringer als beim vorigen, weil von ihm nur geringe Hölzer befallen werden.

## Vierte Gattung.

### *Elatér* Linn. Schnellkäfer.

Die Käfer dieser Gattung unterscheiden sich hinreichend durch das, in der Übersicht angegebene, mit einem (kleinen schwachen Hammerschlägen ähnlichen) knipsenden Geräusche erfolgende, durch einen eigenthümlichen Brust-Apparat bewirkte in die Höhe Schnellen, wenn man sie auf den Rücken legt (daher die Namen Springkäfer, Schnellkäfer, Schmidt) so wie durch die, allen gemeinschaftliche, in bestehender Figur ausgedrückte Form.

Ihre Larven haben 6 Beine, sind lang, dünn und ziemlich hart, den sogenannten Mehlwürmern sehr ähnlich. Die Arten sind sehr zahlreich (selbst bei uns über 50), dürfen aber hier nicht erläutert werden, da es höchstens nur auf die Erkennung der Gattung ankommt. Sie sind gleichgültig und werden nur durch die Menge, in welcher manche Arten zuweilen an Holzgewächsen erscheinen, täuschend. Bechstein hat denselben gewifs zu viel eingeräumt. An Blättern sahe ich die Käfer nie fressen, an Blumen zuweilen, dann aber kaum bemerkbar. Die Larven sahe ich immer nur in faulen Stöcken der Nadel- und Laubhölzer, wo sie auch gelegentlich die ihnen in den Weg kommenden Insectenlarven angreifen. Andre Larven, die man etwa mit ihnen zusammensperrt, verschwinden zuweilen. Hr. Saxesen versichert, dafs sie selbst Blattläuse fräfsen. Jedoch ist das auch wieder nicht genug, um sie unter die nützlichen aufzunehmen, da sie gewifs nicht allein auf Thiere angewiesen sind und zu deren Verfolgung auch zu langsam und zu lichtscheu wären. Am häufig-



sten bemerkt man im Forste ganz schwarze Arten (*E. aterrimus* Linn., *E. niger* Gyll., beide fast 6" lang) so wie rothflügelige mit schwarzem Halsschild (der meist fast 7" lange *E. sanguineus* Linn.). Es hat mich nicht gereuet hier auf diese Gattung aufmerksam gemacht zu haben, denn wenn man die Bedeutung kennt, welche einige Arten schon für Garten- und Feldgewächse gewonnen haben, so wird man sich der Furcht nicht erwehren können: es könne die eine oder andre Art wohl auch einmal dem Forste, besonders den Culturen schädlich werden. Die Zerstörungen, welche die Larven des *E. lineatus* L. (*E. segetis* Bjerkander, *E. striatus* Fbr.), die sogenannten Drahtwürmer, am Getreide anrichten, sind längst bekannt und dürfen hier auch nicht ausführlich erörtert werden (s. Oken's *Naturgesch.* B. III. Abth. 3. S. 1659.), ich will nur noch auf Westwood's Abhandl. in *Loud. Gard. Mag. March* 1838. S. 113. u. f. verweisen, welche auch hübsche Abbildungen des Thieres enthält. Er sagt, daß die Larve nicht bloß die Wurzeln der verschiedenen Getreide-Arten und des Grases zerstöre, sondern auch die der Turnips, Kartoffeln, Möhren, Salat- und Kohlarten und selbst krautiger und holziger Gewächse des Gartens, ja daß sie sogar in Stengel der Salatpflanzen gehe u. s. f. Eine interessante, ganz neue Nachricht über die Schädlichkeit der Elateren erhalte ich von Hrn. Heyer. Ein Kunstgärtner in Lüneburg hatte nämlich über den *E. murinus* Linn., welchen Hr. Heyer aus Larven erzog, bittere Klage geführt: daß er auf einem Rosenbeete sämtliche Knospenstengel ziemlich nahe unter der Blumenknospe beinahe abgenagt hatte und letztere zum Verwelken brachte, daß er ferner die Rinde der Pfropfreiser abgeschält hatte. Auch soll die Larve durch das Benagen der Kartoffeln die Aufmerksamkeit des dortigen Gartenbau-Vereins auf sich gezogen haben. Davon, daß sie in Gärten die Salat- und Cichorien-Pflanzen nahe unter der Erdoberfläche abgenagt hatte, überzeugte sich Hr. Heyer durch den Augenschein. Noch kurz vor dem Abdrucke dieser Zusätze erhalte ich auch von Hrn. Saxen die Nachricht, daß einer seiner Correspondenten (Hr. Forstcandidat Barkhausen) den *E. tessellatus* an den Haupttrieben 4-6-jähriger Kiefern fressend gefunden hätte. Es folgte diesem Fraße Saftausfluß und bald darauf gelblicher Ueberzug in einer Längenausdehnung von  $1\frac{1}{2}$ ". Die Folge war, daß die so beschädigten, meist  $1\frac{1}{2}$ " langen, starken Triebe leicht umknickten. *E. castaneus* sahe Hr. Saxen selbst an Knospen fressen, so daß die Käfer sich halb hineingefressen hatten.

## Fünfte Gattung.

*Buprestis* Linn. Prachtkäfer. Taf. II. Fig. 1-11.

NAMEN. Im Deutschen nennt man die Käfer dieser Gattung ganz allgemein Prachtkäfer wegen der schönen, metallischen Farben, welche die meisten haben. Der Name *Buprestis* existirte schon bei den Alten, aber wir wissen nicht für welches Thier. Linné wandte ihn daher auf gut Glück auf die hier zu beschreibenden an.

CHARACTERISTIK. Sie ähneln den Elateren am meisten, schnellen sich aber nicht in die Höhe, sind auch meist breiter und gedrungener, und haben keine verlängerten, nach hinten gerichteten Halsschild-Hinterecken. Fast alle Arten haben mehr oder weniger Metallglanz. Die Mundtheile der, der schädlichsten Art sehr verwandten (*B. Fagi*) zeigten Folgendes: Lefze rundlich, schwach zurückgedrückt. Oberkiefer sehr stark, fast tetraëdrisch, außen gewölbt und hier gegen den Außenrand behaart, spitz, ohne Zähne am Innenrande. Unterkiefer mit hornigem, behaarten, schmalen Stamm und häutiger, zweilappiger Lade. Beide Lappen behaart. Der äußere der größere, zweigliedrig. Taster viergliedrig, mäusig behaart, das zweite bis vierte Glied fast gleich lang. Lippe äußerst klein, häutig, nach innen mit einem stark behaarten, wulstigen Lappen vorspringend, auf der Außenseite, hinter einem Paare Hautvorsprünge, die sehr dünnen und feinen, dreigliedrigen, behaarten Taster tragend, deren letztes abgestutztes Glied das längste. Kinn hornig, flach, dreieckig. — Die Larven der Prachtkäfer sehr lang und meist flach, mit stark vor-




springendem, meistens außerordentlich großen, flachen, ersten Ringe, dem dann gewöhnlich viel schmälere folgen. Der Kopf stets bis zu den Fühlern versteckt, groß, flach, augenlos, oben mit dunkler Gabel- und einer Mittellinie. Fühler klein, dreigliedrig, nahe dem Kopfrande, die beiden letzten Glieder am Ende mit aufgeworfenem, fein gezähnelten Rande. Kopfschild deutlich durch eine Furche gesondert, häutig, abgerundet-viereckig. Lefze groß, abgerundet-viereckig. Oberkiefer kurz, aber sehr dick und stark, mit mehreren Zähnen. Unterkiefer bei den kleineren (*B. noviva*) mit deutlich gesondertem, häutigen, behaarten Kaulappen (welcher bei den großen, wie *B. mariana* als horniger, innerer, eingliedriger Taster hervortritt), und zweigliedrigen, kurzen Tastern. Lippe fleischig, gewimpert, an Statt der Taster nur ein Paar kleine Wülste außen tragend. Der erste Leibesring in einen vordern kleinern, und hintern größern Theil zerfallend, welcher oben und unten meist mit borstlich-scharfem Mittelfelde (Schilde), in welchem unten stets nur eine einfache, oben zuweilen eine gablig getheilte Mittellinie steht. Die Ringe haben keine Wülste, sondern nur hinter den Luftlöchern jederseits einen Eindruck, deren zwei durch eine quer über den Rücken gehende Furche verbunden sind. 9 Luftlöcher liegen mehr nach oben gewandt und das erste, zuweilen halbmondförmige (z. B. *B. mariana*), an der Seite oder mehr nach unten am Vorderrande des zweiten Ringes. Der letzte Ring trägt entweder den wulstig hervortretenden, lang gespaltenen, bloß fleischigen After, oder es findet sich an demselben jederseits eine mit Sägezähnen versehene Hornzange. Behaarung schwach. Farben gelblich-weiß, und nur dunkler braun der schwärzliche Ober- und Unterschild und ganz dunkelbraun die meisten vorragenden Kopftheile. Die Puppen mit wenig übergeneigten Kopfe, zurückgelegten Fühlern, vorragenden Tastern und fast ganz von den Flügeln — deren unten stark nach innen vorragen — bedeckten Schenkeln und Schienen der Hinterbeine, unbehaart (s. Taf. II. Fig. 7 G). Die Haarlosigkeit der Puppen ist besonders auffallend. Ich habe später noch mehrere Arten (*Fagi, tenuis*) als Puppen kennen gelernt und bei der sorgfältigsten Musterung mit einer sehr scharfen Loupe auch nicht ein einziges Härchen am ganzen Thiere bemerken können. — In Betreff meiner früheren Larvenbeschreibungen ist noch ein Irrthum zu berichtigen, der mir um so eher zu Gute gehalten werden wird, als ich der erste gewesen bin, der die früheren Zustände der Prachtkäfer beschrieben und abgebildet hat (s. Oken's *Naturgesch.* B. V. Abth. 3. S. 1693. und Latreille in Cuvier's *regne an.* T. IV. p. 445.). Es ist mir nämlich geglückt, noch mehrere Arten als Larven zu beobachten und da bin ich denn zu der Überzeugung gekommen, dafs die von mir auf Taf. II. Fig. 8 C unter dem Namen der *B. Fagi* abgebildete Larve bestimmt nicht derselben angehört, sondern einer ganz andern. Der Irrthum ist daher gekommen, dafs ich sie da, wo ich sonst öfters die Käfer von *B. Fagi* fand (bei Spechtshäusern an alten, halb abgestorbenen Buchen) antraf, und noch dazu unter der Rinde in Gängen, welche denen der *Fagi* ähnelten und in der Gröfse der ausgewachsenen Larven derselben. Welcher Art sie angehört, weifs ich auch jetzt noch nicht, vermutlich der *B. affinis*, welche ich an demselben Baume schon früher gesammelt habe. Es ist mir indessen nicht unlieb, dafs sie abgebildet ist, denn sie kann als Repräsentantin derjenigen Prachtkäfer-Larven dienen, welche einen auffallend breiten ersten Leibesring und keine After-Hornzange haben, und das möchten wohl alle diejenigen sein, welche zu *Buprestis sens. strict.* gehören, denn ich kenne nun schon diese Form bestimmt bei der *B. Mariana*, *Berolinensis*, 4-*punctata*. Dagegen werden höchstwahrscheinlich alle zu der andern, kleinen, von *Buprestis* gesonderten Gattung *Agrius* Meg. gehörenden Larven jene auffallende Erweiterung des ersten Ringes nicht haben und die merkwürdige After-Hornzange besitzen, denn ich kenne diese Eigentümlichkeit nun schon bestimmt bei fünf Larven von *Agrius*, nämlich bei *novivus*, 2-*guttatus*, *Fagi, tenuis* und einer kleinen Art, die höchstwahrscheinlich *angustulus* ist. Diese letztern unterscheiden sich meist viel weniger von einander, nicht einmal durch die Gröfse im ausgewachsenen Zustande, da auch die Käfer, mit Ausnahme von 2-*guttatus*, nur wenig in der Gröfse verschieden sind. Mit Bestimmtheit kann ich nur angeben: dafs *B. Fagi* etwas schwächere Sägezähne an der mehr abgestutzten Hornzange hat

als *B. nociva*, und dafs die kleinste (wahrscheinlich *angustula*) die allergröfsten Sägezähne (besonders den untersten) und verhältnismäfsig die gröfste Hornzange hat. Ich finde auch wohl noch kleine Unterschiede in der ganzen Form der Larven, allein ich wage sie hier nicht als untrügliches Kennzeichen mit zu geben, da ich sämmtliche Larven in Weingeist vor mir habe und es bekannt ist, dafs dieser gar sehr verschieden auf die Veränderung der Gestalt einwirkt, je nachdem die Larve der Häutung näher oder entfernter ist. Dabei mufs ich namentlich der auffallenden Veränderung gedenken, welche eine Larve der *B. Fagi* im Spiritus erlitten hatte. Sie hatte sich in demselben so vollständig gekläutet, dafs nur noch ein Stückchen der alten Haut über dem Kopf und ein andres über dem letzten Leibesring befestigt war. Als ich das letztere mit seiner Zange abgenommen hatte, war ich erstaunt, keine neue darunter zu finden. Das Fleischstück, an welchem die beiden Stücke der Hornzange hätten sitzen müssen, war ganz abgerundet und zeigte auch nicht eine Spur von Zange und eben so wenig ein Härrchen, obgleich dieser Theil sonst am stärksten behaart ist und der übrige Leib auch fein behaart war. Die ganze Larve war schneeweifs. Ich vermuthete, dafs dies die der letzten (zur Verpuppung führenden) Hautabstreifung vorangehende Häutung war. Ich sammelte dies Individuum im Juni neben einigen schon wirklich verpuppten. Bemerken mufs ich ferner noch, dafs ich bei allen diesen Agrilen-Larven den das Luftloch umgebenden bräunlichen Ring nach vorn nicht ganz geschlossen fand und dafs die beiden Luftlöcher eines jeden Ringes noch etwas mehr dem Vorderrande des Ringes genähert sind, als es in Fig. 7 C angegeben wurde. Die Sägezähne der Zange stehen mittelst eines feinen, an der Innenseite jeder Zangenhälfte querüber laufenden, Vorsprunges in Verbindung.

**VORKOMMEN.** Vom südlichen Deutschland bis nach Schweden und Rußland gleich häufig. In den frühern Zuständen in Holzgewächsen und als Käfer an denselben oder auf Blumen und Kräutern.

**LEBENSWEISE.** Bei den meisten Arten gewifs sehr übereinstimmend. Wahrscheinlich haben sie zweijährige Generation, denn ich fand neben ausgewachsenen Larven auch halbwüchsige, welche vom vorigen Jahre herrühren mußten und erst im nächsten Jahre entwickelt sein konnten. Auch sahe ich Larven, welche schon im Juni ausgewachsen schienen und deren Verpuppung ich täglich erwartete, doch noch überwintern. Hr. Burckhardt hat die Zweijährigkeit der *B. tenuis* und *nociva* ganz aufser Zweifel gesetzt (s. am Ende der Arten). Die Flugzeit ist meist im Juni und Juli, wenn die Wärme am gröfsten und anhaltendsten ist, obgleich man auch noch im Spätsommer, selbst bis in den September noch einzelne sieht. Sie sind, besonders wenn es recht heifs ist, außerordentlich flüchtig, jedoch die kleinen mehr als die grofsen, so dafs sie sogar schwer zu fangen sind. Die Käfer, welche eine Zeit lang gern herumschwärmen und sich an Zäune, auf Blätter, Blumen u. dergl. setzen, findet man, wenn sie legen wollen, nur an Holzgewächsen, vielleicht mit sehr wenigen Ausnahmen. Einige gehen auch an Stöcke, besonders der Kiefern, die meisten aber nur an stehendes, gesundes oder kränkliches, oder liegendes Holz. Sie wählen hier nicht etwa anbrüchliche Stellen, sondern mit unversehrter Rinde bedeckte. Wahrscheinlich können sie hier die feinsten Risse — da sie auch an ganz glatter Rinde junger Stämme vorkommen — benutzen, um ihre Eier hinein zu schieben. Nie habe ich dies, so wenig wie die Begattung, beobachten können, wahrscheinlich weil es nur des Nachts geschieht. Die Larven, wenn man sie kaum mit blofsen Augen sieht, sitzen schon mitten in der Rinde. Hier fressen sie geschlängelte Canäle. Einige bleiben immer in der eigentlichen Rinde, Andere gehen gleich bis auf den Bast und beginnen hier erst den eigentlichen und daher so verderblichen Frafs, zur Verpuppung sich jedoch in das Holz durch die äufsersten Ringe fressend, und noch Andre bleiben nur kurze Zeit in der Rinde und begeben sich bald in das Holz, wo sie nach allen Richtungen die mit gelblichem Wurmehl gefüllten Gänge fressen, jedoch, wie es mir schien, nur immer in faulem Holze. Der anschließende Käfer frist immer einen höchst eigenthümlichen bogig gekrümmten Rindencanal und ein quer ovales Flugloch (s. die beige gedruckte Figur, welche den in sehr dicker Eichenrinde



H

befindlichen Canal von *C. biguttata* vorstellt, so wie auch den aus dem Holze hervorkommenden Gang von *B. nociva* Taf. XXI. Fig. 3.). Die Menge, in welcher sie erscheinen, ist sehr verschieden. Einige sind immer häufig, andre nur in gewissen Jahren, noch andre vielleicht nie zahlreich.

**FORSTLICHE BEDEUTUNG UND BEGEGNUNG.** Seitdem der erste Band der Forstinsecten erschienen ist und auf die Verschiedenheit der schädlichen Prachtkäfer so wie auf ihre Lebensweise aufmerksam gemacht hat, beschäftigen sich thätige Forstmänner in verschiedenen Gegenden von Deutschland mit diesen kleinen, so verborgen wirtschaftenden Thierchen und förderten die Kenntniß von der forstlichen Bedeutung derselben in hohem Grade. Die Zahl der wirklich schädlichen Arten ist dadurch auf drei bis vier gestiegen und wir wissen nun bestimmt, daß es für die Buche, und vielleicht auch für die Eiche, keine schädlicheren Thiere wie die Prachtkäfer giebt. Ausführlicheres über den durch sie angerichteten Schaden so wie über die Begegnung s. am Ende der Arten. Wir kennen bis jetzt noch kein Begegnungsmittel, als das Entfernen der befallenen Stämme. Durch Sammeln in Fangschirme sind sie nicht zu vertilgen, wegen ihrer Flüchtigkeit. Durch Reinlichkeit im Forste wird man auch der Vermehrung der meisten begegnen.

Die EINTHEILUNG ist nicht leicht, da die Zahl der Arten groß (gegen 40 bei uns) ist. Ueberdies sind die kleinen, grünen und blauen Arten (meist *B. viridis* genannt) äußerst schwer zu unterscheiden. Ich glaube durch Auffindung gewisser Sections-Unterschiede die Bestimmung derselben etwas erleichtert zu haben. Unterseite des Hinterleibes (besonders erster und letzter Ring), Form des Kopfes, Stirnfurche, Augenbuchtung, Brustfortsatz-Form, Form des Halsschildes, Flügeldecken-Schnitt, besonders das Flügelende und die Einschnürung vor demselben, Sculptur, Behaarung und Farben (welche letztere meist sehr constant und z. B. selten aus Blau in Grün variiren) sind besonders zu beachten, seltner die Fühler und noch seltner die Halsschild-Leistchen. Mehrere Arten scheinen constant als Larven in gewissen Höltern zu leben und als Käfer auf gewisse zu fliegen. Wissen wir darüber erst mehr Bestimmtes, so werden wir dadurch auch vielleicht leichter unterscheiden lernen. Über die Erkennung der verschiedenen Geschlechter wären hier nur noch einige Worte zu sagen, da auch dies dereinst für die Praxis wichtig werden könnte. Die Männchen und Weibchen sind bei einigen Arten sehr leicht, bei andern sehr schwer zu unterscheiden, aber fast nur an der Unterseite des ersten und letzten Hinterleibsringes, denn ob die etwas stärkere Behaarung am Kopfe (z. B. bei *B. affinis*) und die etwas mehr erweiterten Tarsalglieder (z. B. bei *B. Mariana*), welche ich bei einigen Männchen gesehen zu haben glaube, immer deutlich sind, wage ich noch nicht zu behaupten, besonders da man so häufig bedeutende Abänderungen in der GröÙe der Individuen bei einer und derselben Art findet. Bei mehreren (z. B. *B. Mariana* und *affinis* Fbr.) sind die Männchen sehr ausgezeichnet durch den tief gebuchteten letzten Ring, bei andern (z. B. der *B. Berolinensis*) sind die Männchen einmal und die Weibchen doppelt gebuchtet am letzten Ringe. Die Geschlechtsmerkmale bei mehreren der kleinen, grünen und blauen (*B. tenuis*, *angustula*, *olivacea*, *hastulifera*) sind so wichtig, daß Sectionen darauf gegründet werden (s. S. 60. u. ff.). Bei andern, ganz ähnlichen habe ich dagegen, ungeachtet der größten, angewandten Mühe, keinen deutlichen Geschlechtsunterschied bemerken können und verweise deshalb auf *B. Fagi* so wie auf einige andre Arten, bei denen die Weibchen und Männchen verglichen sind. Ich glaube, daß die beiden auf Taf. II. neben einander abgebildeten Fig. 7. (ein Weibchen) und Fig. 8. (ein Männchen) die allgemeine Form für die verschiedenen Geschlechter angeben werden. Neuerlich hat man die Gattung *Buprestis* in mehrere kleine zerfällt.

## A r t e n .

† Brust abgestutzt, nicht mit einem Fortsatze das Kinn verdeckend (*Buprestis sensu strictiori*).  
(Hierbei alle große und die kleinen auffallend breiten Arten.)

1. *B. Mariana* Linn. u. a. A. Großer Kiefern-Prachtkäfer. (Taf. II. Fig. 11.)

**CHARACTERISTIK.** Die größte hiesige Art (bis 13"), oben mit äußerst groben, glatten, schwarzen Runzeln und kupferglänzenden Furchen und Gruben. Die Larve mit außerordentlich großem, ersten Ringe, bis 2½" lang, ganz weiß.

**LEBENSWEISE** u. s. f. Larve nur in todtten Kiefern und zwar besonders in Stöcken, wo sie das ganze Holz zuweilen so in Wurmehl verwandeln, daß es auseinander fällt. Der Käfer, welcher auch zuweilen von Kiefern geklopft wird, wo er jedoch höchstwahrscheinlich nicht frist, immer häufig auf freien Waldplätzen, Besamungsschlägen und Waldändern, in Kiefernrevieren, wo er gern an Stöcken, Klaftern, Zäunen u. dergl. sitzt, und auch bei der Hitze länger verweilt. Höchstwahrscheinlich also nur als täuschendes Insect beachtenswerth.

2. *B. quadripunctata* Linn. u. a. A. Vierpunktirter Kiefernprachtkäfer. (Taf. II. Fig. 10.)

**NAMEN.** Bisher von allen Autoren übereinstimmend genannt. Wahrscheinlich steckte darunter aber schon früher eine sehr ähnliche Art, welche jedoch reihig punktirte Flügeldecken und keine Halsschildgrüben hat, in der Lebensweise indessen mit dieser vollkommen übereinstimmt: die *B. nigrifula* Erichs.

**CHARACTERISTIK.** 2,6" lang und 1,2" breit. Schwarz, etwas kupfrig schillernd, mit 4 deutlichen, in Querreihe gestellten Grübchen des Halsschildes und unregelmäßig runzlich-punktirten Flügeldecken. Larven 5" lang, mit sehr großem, ersten Ringe, ohne Afterzangen.

**VORKOMMEN.** Nur in Kiefern, und zwar nur in Stangen oder jungen Pflanzen.

**LEBENSWEISE, FORSTLICHE BEDEUTUNG UND BEGEGNUNG.** In manchen Jahren (mit *B. nigrifula* zusammen) äußerst häufig. Gewöhnlich sahe ich sie jedoch nur in jungen, ausgerissenen Pflanzen oder einzelnen, umher liegenden Zweigen der Kiefer, ja selbst in Zaunlatten, einmal jedoch auch in einer aus Birken und Kiefern gemischten Schouung, in zehnjährigen Stämmen, welche zahlreiche Gänge und, wie es schien, schon im vorigen Jahre verlassene, Fluglöcher zeigten und durch sie getödtet zu sein schienen, obgleich auch *Bostrichus Laricis* einzelne Gänge unter der Rinde gemacht hatte. Die Larven fressen zwischen Bast und Splint, so daß in beiden die geschlängelten, allmählig dicker werdenden, meist von oben nach unten 2-3" weit laufenden Gänge zu sehen sind. Gewöhnlich werden dieselben auch hinter der Larve mit braun und weiß gemischten Splänchen verstopft und bleiben nur am Ende offen, wo die Larve fast eine kreisrunde Höhlung frist, hier noch eine Zeitlang gekrümmt verweilt, und dann sich in den Splint schräg hineinfrist. (S. die beigedruckte, nach einem, von Rinde entblösten Kieferzweige gezeichnete, Figur.) Von solchen Zweigen und Stämmchen sammelte ich öfters im November auf abgeräumten Schlägen einige Kasten voll. Die Larven waren größtentheils noch nicht ins Holz gegangen, entwickelten sich aber in der warmen Stube schon im Februar und März in ungeheurer Menge. Man wird daher doch auf sie zu achten haben, und sie gewiss dann und wann merklich schädlich finden. Die von ihnen befallenen, stehenden oder liegenden, Pflanzen und Pflanzentheile sind sorgfältig zu entfernen und vor dem Frühjahr zu verbrennen.



**ANHANG.** Die übrigen Arten dieser Abtheilung sind mir zu selten vorgekommen, als daß ich sie für schädlich halten könnte. Dahin gehört, um nur einige zu nennen, die wegen der herrlichen smaragd-

grünen Metallfarbe beliebte ( $6\frac{1}{2}$ " lange) *B. rutilans* Fabr., welche, wie viele Beobachtungen, auch des Hrn. Waltl, lehren, in alten, lebenden Lindenstämmen lebt (ohne sie aber zu tödten); die noch größere (bis 10" lange) durch Kupferglanz ausgezeichnete, *B. berlinensis* Fabr., welche in anbrüchigen Holze aller Buchenstämme lebt, die (bis gegen 9" lange) *B. flavo-maculata* Fabr. und die (bis gegen 6" lange, von Hrn. Waltl an Föhrenstöcken beobachtete) *B. octoguttata* Linn., welche beide durch schöne gelbe Flecke auf grünlichem oder blauen Grunde sich auszeichnen, und deren letzte nach Bechstein an den Wurzeln junger Fichten leben und dieselben zerstören soll. Auch *B. elata* Fbr. gehört hierher und macht, wegen der Ähnlichkeit in der Gestalt und Farbe mit *B. integerrima* den Übergang zu den folgenden.

†† Brust mit einem vorgestreckten Fortsatze das Kinn verdeckend (*Agrilus* Meg.).

(Hierher nur kleine und meist auffallend schmale, grüne, blaue oder stellenweise kupferröthliche Arten.)

\* Letzter Bauchring ausgerandet oder gebuchtet (s. Fig. 1 L. v. *B. tenuis*).

† Männchen mit 2 Höckerchen auf der Mitte des ersten, aus zweien verwachsenen, Bauchringes (s. Fig. 1 L.).

### 3. *B. tenuis* Mus. Berol. Dünner Prachtkäfer. (Taf. II. Fig. 1.)

NAMEN. Die *Buprestis viridis* nach Germar. Die ganz stahlblauen Individuen hält Hr. Germar für *cyanea* Ol.

CHARACTERISTIK. 2,8–3,6" lang u. 0,9–1" breit. Kopf mäsig, nicht auffallend vor den Halsschild vorragend. Stirn fast flach (Männchen) oder etwas gewölbt (Weibchen), bräunlich-gelb behaart (beim Männchen, beim Weibchen schwach), gerunzelt (beim Weibchen gröber als beim Männchen), in der Mitte mit einer (beim Weibchen stärkeren und fast über die ganze Stirn verlaufenden) Furche, beim Männchen fast kupferfarben, beim Weibchen bläulich erscheinend. Augen auf der Innenseite beim Männchen stärker als beim Weibchen gebuchtet. Brustfortsatz gebuchtet. Halsschild breiter als lang, nach hinten etwas verschmälert, mit einer sehr ansehnlichen, fast nach der ganzen Länge verlaufenden, hinten besonders breiten und tiefen Mittelfurche und 2 seitlichen halbmondförmigen, starken Eindrücken, stark quer gerunzelt und diese meist gabelig anastomosirend. Seitenränder wenig gebogen. Vorderrand in der Mitte wenig vorspringend. Die drei Einschnitte des Hinterrandes ziemlich tief. Das Leisten am äußern Hinterwinkel ansehnlich, fast  $\frac{1}{2}$  der Länge durchlaufend, etwas gebogen. Schildchen sehr deutlich. Flügeldecken viermal länger als Halsschild, fast linearisch mit etwas vorspringenden Schulterecken und vollkommen abgerundeten Spitzen. Die gewöhnliche Verbreiterung ist gering, beginnt sehr allmähig und verläuft ohne eine Einschnürung vor der Spitze zu zeigen. Die schuppenförmigen Körchen sind klein und glatt. Ueber die Spitze sieht man nur sehr feine Zahnchen hervortreten. Härchen nicht bemerkbar. Unterseite wellenförmig fein gerunzelt, mit weitläufigen und (besonders beim Weibchen) feinen Härchen, welche beim Männchen an der Brust und den Hüften zottig und dichter erscheinen. Höckerchen des Männchens nahe dem Hinterrande. Der letzte Ring des Männchens stärker gebuchtet und in der Mittellinie vertiefter als beim Weibchen, bei letztem aber stärker punktiert. Herrschende Farben metallisch blau, bald mehr rein, bald sehr wenig, besonders auf dem Halsschild und auf der Unterseite, ins Grünliche spielend, selten ins Olivengrüne.

VORKOMMEN. Häufig an Eichen, wahrscheinlich auch in denselben. Durch Hrn. Burckhardt bestimmt in Buchen als sehr schädliche Art nachgewiesen (s. die Lebensweise der schädlichen am Ende der Arten).

### 4. *B. angustula* Ill. (*Mus. Berol.*). Schmalere Prachtkäfer. (Taf. II. Fig. 3.)

CHARACTERISTIK. 2,2"–2,4" lang, 0,8" breit. Der *tenuis* sehr ähnlich, aber constant kleiner und unterschieden durch stärker gerunzelten Kopf und Halsschild, tiefer gebuchten Brustfortsatz, noch kräf-

tigere Thorax-Leisten, stärker hervortretende Schuppen der Flügeldecken, geringere Verbreiterung derselben, darauf folgende schwache Einschnürung und gerade abgestutzte, kaum gezähnte Spitze. Unterseite des Hinterleibes mit schwach gerinntem letzten Ringe und mehr entfernten Höckerchen. Farbe metallisch grünlich-blau. In Grösse und Gestalt ist sie der *B. scaberrima* (die jedoch in einer andern Section steht) am ähnlichsten, nur ein wenig kleiner.

VORKOMMEN höchstwahrscheinlich in Buchen, ich fand sie wenigstens bei Neustadt nur in Buchengegenden, in denen es sehr wenige Eichen giebt, häufig. Entweder sind sie hier dennoch aus den einzelnen, zerstreut vorkommenden Eichenstock-Ausschlägen gekommen, oder sie leben in diesen so gut wie in den Buchen. Im Lödderitzer Reviere hat sie Hr. v. Plessen, einer meiner Zuhörer, in einem Forstorte häufig gefangen, welcher aufser einigen Weiden und Aspen, meist nur Eichen und nicht eine einzige Buche aufzuweisen hat. Hr. A petz fing sie häufig auf Eichengebütschen. Wahrscheinlich gehören auch die kleinen Larven, welche im Lautenthal'schen im Harze die jungen Eichen zerstörten, dieser Art an. S. das Weitere deshalb am Ende der Arten.

VERWANDT sind: 1. *B. olivacea* Gyll. (*Mus. Berol. et Germ.*), ganz von der Gestalt der vorigen, jedoch in der Grösse meist etwas unter ihr, nur Kopf und Halsschild etwas schmaler, der erstere auch mehr gewölbt, noch stärker gerunzelt, mit starker, zwischen dem hintern Augenrande beginnender, bis zur Mitte der Stirn verlaufender Mittelfurche, der Halsschild vorn nicht breiter als hinten, mit wenig gebogenen Seitenrändern, starken Leisten. Flügeldecken scheinbar noch kürzer; wegen der grauen, anliegenden (manchmal nur an der Nath bemerkbaren, fast abgeriebenen) Härchen silberglänzend erscheinend. Die Verbreiterung und die darauf folgende Einschnürung noch geringer als bei den vorigen, daher die Spitze auch breiter, noch deutlicher abgestutzt, rechtwinklig gegen die Nath. Die Höckerchen sehr klein, mehr genähert, bei einigen Individuen auffallend weit vom Hinterrande entfernt. Der letzte Ring nuschwach ausgerandet, beim Weibchen nur zurückgedrückt. Farbe olivengrün. Später hinzukommende Exemplare zeigten indessen, dafs Übergänge vorkommen und dafs beide höchstwahrscheinlich zu einer Art gehören. Diese Übergänge machen sich besonders bemerklich in der Grösse, den Seitenrändern und der Breite des Halsschildes, der verschiedenen Wölbung und Breite des Kopfes, selbst in der Farbe, die oft zwischen Bläulich- und Bräunlich-grün schwankt. Bei den nicht behaart erscheinenden Individuen können die Haare abgerieben sein. — 2. *B. hastulifera* Germ. (*Mus. Germ.*), ein klein wenig grösser als *angustula* und noch verschieden, wie es scheint, durch grössere und gebuchtete Augen (so dafs die Fühler sogar näher an einander rücken und der Raum über denselben auffallend schmal wird), etwas längern Halsschild. Schulterecken rechtwinkliger und auch plötzlicher der Seitenrand gegen die mittlere Einschnürung abfallend. An der Spitze der Flügeldecken 4-5 deutliche Zähne. Ganz besonders unterscheidend sind die feinem Schüppchen der hier und da fein behaarten Flügeldecken. Farbe olivengrün.

++ Beide Geschlechter ohne Höckerchen.

#### 5. *B. cyanescens* Ill. Stahlblauer Prachtkäfer. (Taf. II. Fig. 2.)

NAMEN. *Cyanescens* von Illiger im Berl. Mus. genannt: dieselbe ist die *cyanea* von Herbst und von Olivier: da aber die *cyanea* von Fabricius eine andre ist, so änderte Illiger den Namen etwas ab und that recht daran.

CHARACTERISTIK. Von der Länge und Farbe der *tenuis*, aber viel breiter und gewölbt. Kopf sehr dick mit langem und tiefen Stirneindrucke und auffallend kleinen Augen. Brustfortsatz sehr tief gebuchtet. Halsschild mit bedeutend gebogenen Seiten, nur sehr schwach angedeuteter Mittelfurche und ohne Seitenleisten. Die Verbreiterung der Flügeldecken ansehnlich, dahinter keine Einschnürung und daher

ein allmählicher Übergang in die abgerundete, nur sehr feine Zähnen zeigende Spitze. Die Runzeln der Stirn und des Halsschildes so wie die Schuppen der Flügeldecken ansehnlich. Der letzte Hinterleibsring nur schwach zurückgedrückt, ohne Spur von vertiefter Mittelfurche.

VORKOMMEN. An Eichen, wahrscheinlich auch in denselben. Später ist diese Art wieder von Hrn. Apetz auf Eichengebüsch gefangen worden. Hr. Burckhardt fing sie in Gesellschaft der *tenius* und *notiva*, welche im Solling an jungen Buchen so schädlich geworden waren. Hr. Heyer schreibt mir über sie dagegen Folgendes: „Einer meiner Söhne klopfte diese Art im Juni und Juli in einem sehr nassen, mit Erlen, Birken, *Sorbus* und *Rhamnus*-Arten und an lichteren Stellen mit *Myrica Gale* besetzten Bruche, von Wollweiden in der Mehrzahl. Ich selbst fand einst in gleicher Jahreszeit diesen Käfer daselbst bei Sonnenschein auch auf Birkenblättern ruhend, 8 Jahre später aber in einem andern Bruche auf Erlenblättern.“ Wahrscheinlich geht diese Art also mehrere Holzarten an.

### 6. *B. laticornis* Ill. Breithörniger Prachtkäfer. (Taf. II. Fig. 5.)

NAMEN. Vor Illiger nicht unterschieden, wahrscheinlich auch nicht gekannt.

CHARACTERISTIK. Von allen unterschieden durch die allmählig breiter werdenden und dann sich wieder an der Spitze verschmälernden Fühler, den nach hinten stark verschmälernten Halsschild und die gerundeten Flügelspitzen. Sonst der *angustula* am ähnlichsten.

VORKOMMEN UND LEBENSWEISE dieser Art dürften mit der von *B. angustula*, mit welcher sie Hr. v. Plessen zusammen fing, übereinstimmen.

VERWANDT sind: 1. *B. scaberrima*, von mir wegen der scharfen Flügelchuppen so genannt. Sie hat fast die gedrungene Gestalt der *cyaneus*, gleicht auch in der Größe (3") den kleinern Individuen derselben, unterscheidet sich aber durch eine viel schwächere und ganz kurze Stirnfurche, weiter nach dem Scheitel hinauf gehende Augen und tiefer gebuchteten Brustfortsatz. Der Halsschild länger, besonders die Mitte des vordern Randes mit starkem Bogen vortretend. Die Seitenränder an der Vorderhälfte ziemlich bogig und daher nach hinten plötzlich verschmälert. Schuppen der Flügeldecken sehr groß und scharf (wonach ich sie genannt), auch die Halsschildrunzeln sehr grob und weitläufig. Der letzte Bauchring scharfer ausgerandet, mit feiner, vertiefter Mittelfurche. Die ganze Unterseite mit feinen braungrauen Haaren. Unter den Arten anderer Sectionen ähnelt ihr die, nur etwas kleinere, *B. angustula* am meisten. — 2. *B. rugicollis* (Taf. II. Fig. 6.), von mir wegen der groben Runzeln des Halsschildes so genannt. Der *scaberrima* äußerst ähnlich, aber constant kleiner (höchstens 2,5" lang). Der Halsschild vorn fast noch stärker bogig vortretend, seine Seitenränder dagegen weniger gebogen, in der Mitte sogar bei einigen etwas eingedrückt. Die Runzeln im Verhältnis zu dem kleinen Thiere noch stärker (wonach ich sie genannt), die Flügelchuppen aber weniger scharf. Der letzte Bauchring beim Weibchen wenig ausgerandet, beim Männchen aber sehr tief und scharf ausgerandet (\*).

(\*) Zu diesen Arten gehören noch die, freilich nicht als einheimisch bis jetzt erwiesenen:

*B. deraeo-fasciata* Ziegl. Der *B. fagi* sehr ähnlich und 3" lang. An mehreren Stellen die Spuren früherer starker Behaarung der sehr fein beschuppten Flügeldecken. Letzter Bauchring tief ausgerandet, mit vertiefter Mittellinie. Spitze der Flügeldecken nicht zugespitzt, fast abgestutzt.

*B. Coryli*. (*Mus. Berol.*) 4,4". Form der vorigen, aber Kopf und Halsschild sehr breit und letzterer ohne Leisten. Flügeldecken sehr lang, grün, fast zugespitzt. Brustfortsatz nur schwach zurückgedrückt. Letzter Bauchring schwach zurückgedrückt, ohne vertiefte Mittelfurche. Kopf und Unterseite blau.

*B. emarginata* Auct. omm., *B. filum* Schönh. und *B. pusilla* Ol. gehören ebenfalls hierher.

oo Letzter Bauchring ganz und ganzrandig (s. Fig. 7L.).

+ Brustfortsatz gebuchtet.

7. *B. nociva*. Schädlicher Prachtkäfer. (Taf. II. Fig. 7.)

NAMEN. Herrn Wächter wurde diese Art von Hrn. Blumenbach in Göttingen als *B. viridis* Fabr. bestimmt. Da aber so wenig die Fabricius'sche wie die Linné'sche *B. viridis* ordentlich bekannt ist, und es höchst unbequem ist, noch ferner einen schon auf so viele Arten angewandten Namen zu gebrauchen, so verlies ich ihn ganz und wählte einen neuen, die Schädlichkeit, wodurch sich die Art von vielen andern unterscheidet, bezeichnenden.

CHARACTERISTIK. 2,9-3,4" lang und 1,2" breit. Kopf mäfsig grofs, mit feinen, besonders um die Mundgegend dichter stehenden und fast silberglänzenden Härchen besetzt. Fühler nur äufserst schwach behaart. Stirn gewölbt, mit schwacher Mittelfurche, ziemlich breit. Brustfortsatz schwach zurückgedrückt. Halsschild viel breiter als lang, hinten etwas schmäler, mit wenig gebogenen, zuweilen in der Mitte etwas eingedrückten Seitenrändern, schwach vertieft, nur hinten deutlich bemerkbarer Mittelfurche, ziemlich grob gerunzelt. Das Leisten jederseits am äufsern Hintereck, halbmondförmig, kurz, zuweilen ganz fehlend. Schildchen sehr deutlich, fast spiefsförmig. Flügeldecken fast fünfmal so lang als Halsschild, mit wenig vorspringenden Schulterecken, ein wenig hinter der Mitte anscheinlich verbreitert und dann stark eingeschnürt in die abgerundete fast zugespitzte Spitze, vor welcher sich meist eine schwache Einschnürung deutlich zeigt, verlaufend. Die schuppeförmigen Körnchen ziemlich erhaben und rauh. Die über die Flügel Spitze hinausragenden Zähne äufserst fein. Unterseite wellenförmig fein gerunzelt, mit weilaugigen feinen Härchen, welche beim Männchen etwas dichter stehen und besonders an der Brust und an den Hüften länger und zottiger erscheinen, auch die bräunlichen Haare am Rande des letzten Ringes länger. Farben metallisch stahlblau, bläulich-grün und grünlich-blau, zuweilen sogar an der vordern Hälfte mehr bläulich, an der hintern mehr grünlich, aber nie eine Spur von Oliven- (bräunlich-) grün oder Kupferroth und wenn auch zuweilen von Blau sich entfernend, doch wenigstens an den Beinen oder dem Kopfe es zeigend. — Die Larve ist 5" lang und kaum 1" breit, ausgezeichnet durch die Aftersangen. Am ersten Ring nicht so auffallend vorragend, auch mit dem Leibe nicht so stark gedrückt, mit einfacher Mittellinie des nur sehr wenig schürflichen Mittelfeldes. Das erste Luftloch rundlich, mehr nach unten gerückt. Die Puppe 3" lang und etwas über 1" breit. Kopf wenig übergebogen, den Halsschild nur wenig verdeckend, mit zurückgelegten unter dem Halsschildrande verborgenen Fühlern und deutlich vorragenden Tastern. Rüsse wenig ansteigend, das letzte Paar größtentheils von den <sup>kleinen</sup> ~~Falten~~ verdeckt. Flügel weit herunterreichend, das untere Paar zum Theil vorragend. Letzter Hinterleibsring abgerundet. Körper weifs, ganz kahl.

VORKOMMEN, LEBENSWEISE u. s. f. dieses sehr schädlichen s. am Ende der Prachtkäfer.

VERWANDT sind: 1. *B. fagi*. (Taf. II. Fig. 8.) (\*) 2,2-3,6" lang, sonst fast von der Gestalt und den Verhältnissen der vorigen. Halsschild verhältnismäfsig noch breiter und kürzer. Es ist mir nicht

(\*) Da ich diese Art, welche später gewifs noch einmal eine höhere forstliche Bedeutung erhalten wird (s. unten), sowohl durch genaue, nach zahlreichen Exemplaren entnommene, Beschreibung und Abbildung, so wie auch selbst durch Schilderung der Lebensweise charakterisiren kann, so gebe ich ihr einen, das Vorkommen andeutenden Namen. Es hat zwar mit ihr das unter *filiformis* Hb. (*linearis* Fbr. OL.) im Berliner Museo steckende Exemplar große Ähnlichkeit, zeigt jedoch etwas stärkere Runzeln des Kopfes und Halsschildes, stärkere Körnchen und stärker verbreiterte Flügeldecken. Indessen gehört das von H. Germar mir als *B. linearis* geliehene Stück zu einer ganz andern Art (*B. pratensis* Mus. Ber.), welche einen kleinen, gerundeten, gefurchten Kopf, ungezähnte, fast abgestutzte, kaum eingeschnürte grüne Flügeldecken und auffallend kupferrothen Halsschild hat, und überhaupt kleiner und gedrungener ist und von Hrn. Schlotthauer aus Eichenstuckrinde geschnitten wurde. Man ist also wegen der *B. linearis* Fbr. unsinnig, und es schien mir eine bestimmtere Bezeichnung, welche durch obigen Namen erzielt ist, wünschenswerth.



möglich gewesen, die früheren Kennzeichen festzuhalten, nachdem ich eine größere Menge von Exemplaren gesehen habe und die Geschlechter besser unterscheiden gelernt hatte. Die Mäunchen sind nämlich immer schlanker und ihre Flügel- und Halsschildränder immer weniger gebogen als bei den Weibchen, welche letztere sich meist auch durch stärkere Behaarung der Unterseite des letzten Ringes und der Geschlechtsöffnung unterscheiden, nicht aber immer durch stärker gewölbten Bauch, indem derselbe wahrscheinlich nach dem Legen der Eier etwas einfällt. Der einzige sichere Art-Unterschied scheint mir (außer den oben genannten, sehr wichtigen Halsschild-Verhältnissen) in den folgenden Farben — besonders der bräunlichen Mischung des Grünen — zu liegen, die mich nie täuschten. Der letzte Ring des Weibchens am Ende mit gröbern Höckerchen als der des Männchens. Farben immer metallisch grün, dann und wann ins Kupferröthliche, besonders häufig am Halsschild, aber nur am Kopfe und den Füßen zuweilen ins Blaue spielend, also entschieden durch den gänzlichen Mangel von Blau an der Oberseite gegen *nociva* characterisirt. Hinterleib des Männchens schlanker als der des Weibchens. Die Larven denen der *nociva* äußerst ähnlich (s. S. 63.). VORKOMMEN in anbrüchigen, meist starken, Buchen, (s. am Ende der Prachtkäfer.) — 2. *B. sinuata* Fabr. Ol. (Mus. Ber.). 4", also nach *B. Coryli* die größte und sehr ausgezeichnet durch ganz durchgehende Stirnfurche, äußerst tief gebuchteten Brustfortsatz, schwach gerunzelte und kleinschuppige, gegen die zugespitzte Spitze sehr verdünnte Flügel, so wie durch einen über die ganze Oberseite schimmernden Kupferglanz. — 3. *B. Betuleti*. (Taf. II. Fig. 4.), von mir so genannt, weil ich sie in jungen Birkenorten häufig fand. 2,5" lang und 0,6" breit. Also in der Größe der *angustula* und *olivacea* am ähnlichsten, denen sie auch in dem schmalen, langgestreckten Bau gleicht. Kopf gewölbt mit ziemlich deutlich vertiefter aber nicht durchgehender Mittellinie. Brustfortsatz nur schwach zurückgedrückt. Halsschild mit ziemlich stark gebogenen Seitenrändern, mäßig gerunzelt. Verbreiterung der Flügel ziemlich stark. Der darauf folgende verdünnte Theil besonders lang und dicht vor der abgerundeten, kaum gezähnten Spitze etwas eingeschnürt. Farbe olivengrün, noch mehr bräunelnd als bei *B. olivacea*. Häufig in meiner Gegend auf jungen Birken vorkommend. In den Stämmen habe ich sie selbst noch nicht auffinden können. Hr. Aubé (Annal. d. l. Soc. de France VI. 159.) hat aber im Monat März die schon zum Theil zu Grunde gegangene Rinde junger Birken ganz unterminirt von Käferlarven gefunden, die sich im Juni in einen *Agrilus* verwandelten. Hr. Erichson (Wiegmann's Archiv Jahrg. 1838. S. 224.) vermuthet, daß es *B. Betuleti* gewesen sei. — 4. *B. biguttata* Fabr., schon hinreichend durch die ansehnliche Länge von fast 6" und die weißen Flecke, von denen zwei auf den Flügeln, characterisirt. Immer nur in der dicken Borke alter Eichen, nie auf den Bast gehend und daher auch nicht schädlich.

++ Brustfortsatz ganz und ganzrandig (s. Fig. 9J.).

3. *B. integerrima*. Ganzrandiger Prachtkäfer.

NAMEN. Diese Art steckt im Berliner Museum als *B. viridis* Linn. Da jedoch noch zwei andere Arten (*B. tenuis* und *nociva*) ganz gleichen Anspruch auf diesen Namen zu machen scheinen, auch selbst Gyllenhal wieder etwas Anderes wahrscheinlich als *viridis* giebt, so mußte ich ihn ganz verlassen und wählte nach der ausgezeichneten Brustfortsatz-Bildung den obigen. Will man ferner den Namen *viridis* beibehalten, so würde ich die als schädlich bekannt gewordene damit zu bezeichnen rathen. Alle kann man *promiscue* nicht so nennen, weil sie selbst in der Lebensweise so verschieden sind.

CHARACTERISTIK. 3" lang und 1" breit. In dem gedrungenen Bau, namentlich der tief gefurchten Stirn, dem stark gewölbten, breiten Halsschild, den stark verbreiterten, jedoch immer ziemlich plötzlich verdünnten, Flügeldecken der *B. cyanescens* ähnelnd, aber sehr auffallend verschieden von ihr und

allen übrigen durch den hohen und ganzrandigen Brustfortsatz. Die ausspringenden, sehr stumpfen Winkel der Führlglieder weislich bärtig behaart. Farbe olivengrün, nicht so stark bräunelnd wie bei *B. Betuleti*.

Zerstört nach neueren Beobachtungen des Hrn. Saxesen und seiner Zuhörer die Sträucher von *Daphne Mezereum*. Ein Exemplar von Hrn. Schlotthaufer führt die Bezeichnung: „aus Eichenstuckrinde geschnitten.“

VERWANDT ist: *B. Hyperici* Crtz. 2,8" lang, kupferröthlich, mit vertiefter Stirnrinne, ganzrandigem Brustfortsatz und ebenfalls bärtig behaarten Spitzen der Führlzähne.

VORKOMMEN, LEBENSWEISE, FORSTLICHE BEDEUTUNG UND BEZIEHUNG dieser grünen Prachtkäfer. Seit dem Erscheinen dieses ersten Bandes hat sich die Kenntniss der kleinen grünen Prachtkäfer, welche man früher als eine Art, *B. viridis* Linn., anzusehen gewohnt war, so erweitert, dafs das in der ersten Ausgabe darüber Gesagte mancher Aenderung bedarf und daher gänzlich von mir umgearbeitet worden ist. Es schien mir auch jetzt noch passend, die Lebensweise und forstliche Bedeutung der verschiedenen, gründlicher bekannt gewordenen Arten, hier zusammenzufassen, da sie viel Übereinstimmendes gezeigt haben, so dafs man sie, wenn es nicht auf Genauigkeit ankommt, auch ferner noch als *B. viridis* ansprechen könnte. Den ersten Bericht über schädliche Prachtkäfer gab Hr. Wächter aus der Gegend von Cassel (Hartig's *F. u. J. Arch.* Jahrg. I. H. 4. S. 83-95.) mit der Bemerkung, dafs auch in den schönen Solling-Forsten der Käfer sich gezeigt und Verwüstungen angerichtet habe. Alsdann wurde der Käfer wiederholt in der Gegend von Göttingen gesehen. Im Jahre 1836 beobachtete ihn Hr. Saxesen am Harze und 1838 erhielt ich aus einer Cultur bei Blankenburg von Hrn. v. Bülow (Sohn des Hrn. Oberforstmeisters in Blankenburg) mehrere Buchenstämmchen, aus welchen ich den Käfer erzog. In allen diesen Fällen waren nur Buchen von dem Käfer befallen und dieser gehörte zuverlässig nur einer Art, der *B. nociva* an. Ich hatte selbst Gelegenheit, Exemplare von allen zu vergleichen. Dagegen ist bei dem neuesten Frafs in Buchen, welcher sich im Solling ereignete und von Hrn. Burckhardt so umständig und lehrreich beschrieben worden ist (s. am Ende), *B. tenuis* thätig gewesen. Ob diese hier allein schädlich aufgetreten ist, oder ob sie durch andre, vielleicht noch thätiger mitwirkende, Arten unterstützt worden ist, liefs sich nicht genau ermitteln. Die Arbeiter hatten während der Abwesenheit des Herrn Försters die aufbewahrten Buchenstämmchen als nutzloses Geräth verschleppt und nur in einer Pflanzenkapsel waren noch einige Knüttel zurück geblieben, aus denen ein Exemplar der *B. tenuis* (welches ich noch verwahre) ausschlüpfte, während die übrigen in den Knütteln noch enthaltenen, erst einjährigen Larven bald vertrockneten. Indessen ist doch mit grofser Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dafs auch *B. nociva*, ja vielleicht die *cyaneus* mitwirkten, denn sie wurden beide in den Buchenpflanzungen in der Nähe des Frafes gefangen. Der Frafs in den Stämmchen, welche mir Hr. Burckhardt mitschickte und die Zerstörung in den noch stehenden Buchenheistern, welche mir Hr. Förster Steinhof im Herbst 1838 im Solling zeigte, war durchaus ähnlich dem früher von mir an den Knütteln von Blumenbach, Saxesen u. A. beobachteten. Nach diesen wurde die Abbildung Fig. 2. auf Taf. XXI. gemacht. Man sieht, dafs der Gang der Larve dicht unter der Rinde beginnt, an welche der Käfer seine Eier gelegt hat. Wahrscheinlich benutzt der letztere dazu kleine Hervorragungen an welche er die Eier anklebt, denn Risse und Spalten, in die er sie schieben könnte, findet man ausserordentlich wenige an der schönen, glatten Rinde der jungen Buchen. Es scheint als wenn dazu hauptsächlich die Ursprünge der Äste gewählt würden, aber nie die Äste selbst, an welchen noch Niemand Larvengänge gefunden hat. Ich vermute, dafs der Mutterkäfer immer mehrere Eier dicht bei einander legt und dafs sich die auskommenden Lärchen gemeinschaftlich durch die Rinde arbeiten, weil man nämlich öfters mehrere Gänge unter derselben dicht beisammen

beginnen sieht und weil man stets sehr zahlreiche Gänge in einem Stämmchen und diese dann meist auf einer und derselben Seite findet. Gewöhnlich laufen hier die Gänge so bunt durcheinander, daß man die einzelnen Larven angehörenden nicht sicher verfolgen kann. Zuweilen findet man auch wohl vereinzelte Larven oder solche, die sich von der allgemeinen Wanderung entfernten und sich rings um das Stämmchen herum gefressen haben. Der erste Aufzug eines Ganges ist so fein, daß man ihn selten bemerkt und ihn gewöhnlich, wenn man noch nicht die gehörige Übung hat, mit der Rinde wegschneidet. An seinem Ende hat er dagegen die Breite von 1". Ein solcher Gang steigt öfters bis 1' in die Höhe, und wenn man seine Krümmungen, die Anfangs sehr dicht beisammen liegen, später sehr große Bogen machen, mit mißt, so bringt man die Länge von 15-16" heraus! Am Ende macht derselbe gewöhnlich mehrere unregelmäßig hin- und hergehende Windungen oder kehrt auch wohl 1' weit, dicht neben dem aufsteigenden herlaufend, zurück, ehe er sich in das Holz-Bohrloch verliert. Hier ändert sich auch die Farbe des Wurmmehls. Während dieses bisher die dunklere Farbe des zernagten Bastkörpers und des cortex proprius hatte, erscheint es jetzt schneeweiß und so fein wie Staub. Zum Theil rührt es gewiss aus dem Holz-Bohrloch her, zum Theil aber auch aus dem Ende des Ganges, welches schon etwas in das Holz eingreift. Das Holz-Bohrloch hat die fast semiconvexe Form des Flugloches und führt, häufiger auf- als abwärts gekrümmt, zur Wiege, in welcher man später die Puppe, mit dem Kopfe gegen das Bohrloch gewendet, findet. Ueber die Wiege des Insects hat Hr. Burckhardt sehr sorgfältige Untersuchungen angestellt und ich füge hier die eine Stelle seines Briefes, welche wörtlich so lautet, bei: „Wenn wirklich auch die Puppenlager characteristisch für gewisse Species wären, alsdann könnte man an dem Vorkommen verschiedener Arten von Bupresten in den hiesigen Pflanzheistern fast gar nicht zweifeln, denn einige Puppenlager, und zwar die meisten, befinden sich tief im Holze. Nimmt man die Rinde ab, so bemerkt man ein verstopftes Eingangsloch und ein offenes Ausflugsloch, man sieht aber nicht das eigentliche Lager (die relative Lage der beiden Canäle ist verschieden, eben so wie die Larven bald auf- bald abwärts fressen). Andre Puppenlager dagegen werden durch Wegnahme der Rinde sogleich aufgedeckt und ermangeln jenes Eingangschanals. Doch bemerkt man hinsichtlich der Lage der Höhlen auch gewisse Übergänge von dem einen zum andern.“ Das Letztere habe ich auch beobachtet, sogar an einem und demselben Stämmchen, aus welchem sich nur *B. nociva* entwickelte. Allermeist fressen sich die Larven durch 2-3 Jahresringe durch (s. Taf. XXI Fig. 3.) und man muß öftentlich schneiden, ehe man auf die Wiege kommt. Einige Male lag letztere aber gleich sammt dem Käfer offen da, nachdem ich die Rinde weggenommen hatte. Über diese Abweichungen wundere ich mich auch um so weniger, da ich von der nahe verwandten *B. Fagi* weiß, daß sie sich bald im Holze, bald in der Rinde, verpuppt. Einmal habe ich sogar gesehen, daß sich eine Larve der *B. nociva* 10" lang im Holze in die Höhe gefressen hatte, ehe sie sich verpuppte. — Daß die Generation der Prachtkäfer zweijährig sei, habe ich schon im Allgemeinen (S. 57.) als eine Vermuthung ausgesprochen. Von den schädlichen Arten hat Hr. Burckhardt die Zweijährigkeit mit Bestimmtheit nachgewiesen, denn er beobachtete wiederholt, daß gepflanzte Buchen, welche gleich im ersten Sommer von Larven bewohnt waren, erst im Juni und Juli des zweiten Jahres Ausflugslöcher erhielten. Auch die Buchen- und Eichenknüppel, welche ich von Blankenburg und Lauthenthal erhielt, haben noch jetzt, im Winter 1838, lebende Larven, die im Jahre 1837 schon hineingekommen sein müssen. Die Flugzeit ist im Juni und Juli, obgleich einzelne Individuen von Hrn. Saxesen und mir noch im September erzogen wurden. Die Begattung ist noch nicht beobachtet worden, hat aber wahrscheinlich nichts Besonderes (s. am Ende dieses Abschnittes bei *B. Fagi*). Daß die von Hrn. Wächter und mir angestellten Versuche mißglückten, liegt wahrscheinlich daran, daß diese Thiere nur in der wärmsten Sonnenhitze und im Freien auf Blättern zu diesem Act gereizt werden. Was die Erkennung des Fresses von außen betrifft, so ist diese, wenn nicht das kränkliche Ansehen des Stämmchens den Feind verräth,

nicht leicht. Man kann wohl den Verlauf der geschlängelten Fraß-Canäle an der etwas gehobenen Rinde erkennen, aber erst nach genauer Betrachtung. Gewöhnlich wird man leider erst auf die Zerstörung aufmerksam, wenn es schon zu spät ist, d. h. wenn das Stämmchen schon anfängt zu welken, oder gar die Fluglöcher schon vorhanden sind. Solche Stämme, welche von einzelnen Larven bewohnt wurden, nacher sich aber wieder erholten, sind an starken, geschlängelten Rissen zu erkennen. Diese entstehen dadurch, daß die Ränder des Larvenganges vom Cambium überwallt werden und daß die nun entstehenden starken Wülste die Rinde auseinanderreiben und sich aus der Spalte hervordrängen. Hr. Wächter bemerkt auch, daß die Rinde an den Angriffsstellen, besonders unmittelbar über den Gängen, braun, aufgesprungen und zum Theil abgefallen war.

Die FORSTLICHE BEDEUTUNG wurde schon durch Hrn. Wächter so fest begründet, daß wir eine Art zu den wirklich schädlichen Forstinsecten bringen konnten. Er sahe von seinen gepflanzten Buchen 110 Stämme befallen und von den am meisten beschädigten starben mehrere ganz ab. Er sahe Buchen und Eichen (s. oben), welche auf der einen Seite schon ganz abgestorben waren, und er hält sich überzeugt, daß das Absterben von jungen Pflanzbuchen und Eichen, welches man oft bemerkt und nicht immer erklären kann, zum Theil diesem Insect zuzuschreiben ist, so wie auch die Knollen und Auswüchse an jungen Buchen oft weiter nichts, als die von der Natur wieder ausgeheilten Käferverletzungen sein möchten. Der Fraß bei Cassel, welcher durch die ungewöhnliche Wärme des Sommers 1811 sehr begünstigt worden zu sein scheint, hörte im Jahre 1812 bei der kalten und unfreundlichen Witterung auf. Im Jahre 1828 fand sich der Käfer zwar wieder sehr häufig im Göttinger Walde, jedoch ohne merkliche böse Folgen, da keine jungen Pflanzungen vorhanden waren (Hr. Schlotthauber). Die neueren Beobachtungen von Hrn. Saxen und der Fraß bei Blankenburg, welcher nach der Versicherung des Hrn. v. Bülow im Sommer 1838 noch nicht aufgehört hatte, zeugen von der häufigen Wiederkehr dieses Übels in verschiedenen Gegenden. Die neuesten Nachrichten, welche wir haben, rühren von Hrn. Burckhardt her, und ich theile sie, theils weil sie noch eine andre und vielleicht gar noch mehrere Arten graviren, theils weil sie so viele hübsche praktische Beziehungen haben, hier wörtlich mit. „Ich fand,“ sagt er, „diese Bupresten ungeachtet der umständlichsten Nachsuchungen weder in Buchen-Kernorten noch in Pflanzungen ganz junger Stämme, sondern stets nur in starken Stämmen von 1-2" Durchmesser, d. h. in sogenannten Buchenheister-Pflanzungen. Da letztere in hiesiger Gegend von Belang sind, so ist es nicht zu verwundern, daß sie zu jeder Zeit und in jeder Pflanzung mehr oder weniger vorkommt. Besonders häufig zeigte sie sich indessen in den letzten beiden Jahren, und auch noch jetzt hat sie sich nicht vermindert (im J. 1838.). Im verflossenen Frühjahr wurde vorläufig die Hälfte einer Buchenheister-Pflanzung im Brammwalde nachgebeessert. Von ungefähr 1400 Pflänzlingen, welche ausgewechselt werden mußten, war es in der That schwer, einen zu finden, der nicht von Bupresten-Larven bewohnt gewesen wäre. Die meisten vegetirten zwar noch, indessen ein einziger Borkenschnitt an der gewöhnlich sehr deutlich markirten Stelle überzeugte mich, daß sie verloren seien. — Ein anderer Fall ist folgender. Eine im Frühjahr 1837 im Buchen-Hochwalde ausgeführte Buchenheister-Pflanzung von 600 Stück wurde schon im nächsten Nachsommer bis zur Hälfte getödtet und ein großer Theil der übrig gebliebenen Stämme ist so sehr befallen, daßs auch dieser absterben wird (die näheren Umstände unten). — Daß nun übrigens diese Bupreste gewisse, durch Störung des Organismus, namentlich durch Standortsveränderung, Beschädigung u. s. l., besonders disponirte Pflänzlinge zunächst angehe, dürfte durch folgende Thatfachen bestätigt werden. Eben so wie Hr. Wächter beobachtete, daß die Anfälle des Insects größtentheils von der Südwest-Seite her kommen, eben so zeigte sich der Bupresten-Fraß im Brammwalde am häufigsten auf der mittäglichen, als der am meisten exponirten Seite. Häufig auch fand ich die Larve an allen Seiten da, wo ein Zweig sehr nahe am Stamme abgeschnitten war. Hier hauste sie in und unter dem Zellenwulste, welcher die Zweige um-

giebt. Dasselbe beobachtete ich auch in der Nähe solcher Stellen, welche durch Reiben und Quetschen gelitten hatten. Einen andern, noch merkwürdigen Beleg liefert die vorher erwähnte Pflanzung vom Frühjahr 1837. Als nämlich der größte Theil der Pflänzlinge gerodet war und eben eingepflanzt werden sollte, fiel plötzlich ein Spätschnee ein und verzögerte die Pflanzung um beinahe 4 Wochen. Man suchte nun zwar die Pflänzlinge inzwischen möglichst gut zu conserviren, indessen beim endlichen Einpflanzen ging der lockere Erdhellen bis auf einen unbedeutenden Rückstand verloren. Auch mochte die Witterung auf die Stämme selbst nachtheilig eingewirkt haben. Dessenungeachtet trieben sämtliche Stämme Laub und grüntes bis zum Nachsommer, als plötzlich die Hälfte anfang zu welken. Ich untersuchte nun und fand in jedem absterbenden Pflänzlinge ungewöhnlich viele Bupresten. Dabei war es nun sehr auffallend, daß die nach dem Schnee gerodeten Pflänzlinge, so wie alle andere in demselben Frühjahr später ausgeführte Buchenpflanzungen bei weitem weniger Bupresten enthielten. — Von welchem Einfluß der Standort ist, davon kann man sich in unsrer Gegend, wo eine große Verschiedenheit der Bodengüte, verbunden mit allen Expositionen, herrscht, genau überzeugen. In dieser Hinsicht ist es eine constante Erscheinung, daß sich der Schaden desto größer zeigt, je ungünstiger der Standort ist. Trockne Lagen zeichnen sich hierbei ganz besonders aus. Die größte Bedeutung hat aber die Beschaffenheit der Pflänzlinge selbst. Solche nämlich, welche in der Dichtung schon beherrscht, wohl gar unterdrückt standen, dabei von schwachem Caliber sind, werden in hiesiger Gegend fast jedesmal eine Beute der Bupreste. Auch sind solche Heister derselben am längsten (wohl noch 6-8 Jahre nach ihrer Versetzung) unterworfen. Das Gegenheil findet bei kräftigen, stoffigen Pflänzlingen statt. Diese überwinden dann auch auf allen Standorten einen Schaden dieser Art viel leichter als jene Schwächlinge. Mag nun auch die Bupreste als Folge jener Störungen zu betrachten sein, so ist sie nichtsdestoweniger für unsre Buchenpflanzungen ein sehr schädliches, ja das schädlichste Insect von allen darin vorkommenden. Buchen, welche versetzt werden, erleiden immer eine Störung, aber bei gehöriger Behandlung geht gemeinlich nur ein geringer Theil verloren, während die übrigen sich wieder erholen. Aber grade das Letztere verhindert oft die Bupreste, denn theils tödtet sie die Stämme durch ihren Fraß unmittelbar, theils veranlaßt sie dadurch eine solche Schwäche, daß die Pflanzen dem nächsten Zufalle unterliegen. Was die Anzahl der in einem Stamme vorkommenden Larven betrifft, so habe ich sehr oft 20 und darüber hervorgeholt. Den obern Theil der Krone fand auch ich niemals bewohnt. Stämme, welche von zwei verschiedenen Generationen befallen waren, sind hier durchaus nicht selten, eben so wie Hr. Saxen beobachtete, daß der Käfer auch im zweiten Jahre noch einmal den schon beschädigten Stamm, wenn er noch nicht ganz todt war, anflug, indem er neben den alten vertrockneten Gängen ganz frische fand. Es geht also nicht jeder angefressene Pflänzling verloren. Ich könnte deren viele nachweisen, welche von 5 und 6 Exemplaren bewohnt gewesen waren, jetzt aber munter fortwachsen und den Schaden schon wieder mit Holzlagen bedecken. Es hängt hierbei viel, wie schon angedeutet, von der Beschaffenheit des Pflänzlings, so wie vom Standorte ab, zugleich kommt aber auch noch die Form der Gänge in Betracht. Diese nämlich schlängeln sich theils nur an einer Seite des Stammes, oder aber sie winden sich um denselben spiralförmig, oft in  $1\frac{1}{2}$  bis 2 Windungen, und werden dadurch die verderblichsten." In einer spätern brieflichen Mittheilung fügt diesem Hr. Burckhardt noch hinzu, daß er einen im Frühjahr 1836 gepflanzten Stamm mit mehr als 50 Fluglöchern, die erst im letzten Sommer entstanden waren, gesehen habe, und daß dieser Stamm, wie man aus dem abgewelkten Laube und aus der Beschaffenheit der Borke hätte schließen können, im vorigen Sommer noch grün gewesen wäre. Der Fall sei besonders deshalb interessant, setzt er hinzu, weil man den Grund der fast unerklärlich scheinenden Erhaltung des Individuums aufgefunden habe. Sie war nämlich nur dadurch möglich gewesen, daß der von unten bis zur Krone zerfressene Stamm auf der Nordseite noch unversehrt geblieben war, wenigstens so, daß der Bast hier noch nach oben und unten communiciren konnte. Auch kam die

Pflanzung ihrer Lage wegen erst nach dem diesjährigen Spätfroste zum Laubausbruch. Im September 1838 hatte ich selbst Gelegenheit, die Verheerungen der Bupresten an stehenden Buchenheistern, die schon abgestorben waren, zu sehen. Herr Förster Steinhof, der ebenfalls sehr aufmerksam auf solche forstlich wichtige Erscheinungen ist, zeigte mir mehrere solche im Rauschenhagen, u. A. einen mit mehr als 40 Fluglöchern von unten bis oben besetzten, und sagte mir, daß auf der andern (N. W.) Seite des Solling nichts davon zu finden sei. Es ist mir auch aufgefallen, daß die zahlreichen Klagen über Bupresten-Fraß, welche wir in neuern Zeiten hörten, aus dem westlichen Deutschland herrühren, während man im östlichen Deutschland nichts davon weiß. In Schlesien giebt es einige ausgezeichnete Beobachter und Sammler, aber sie besitzen und kennen nicht einmal die gewöhnlichsten Arten. Hr. Zebe schrieb mir deshalb auch einmal: An Bupresten ist hiesige Gegend sehr arm. *B. viridis* besitze ich gar nicht und kann, wegen Mangel an Buchen, keine Beobachtungen darüber anstellen. „Was ich über die Vorbauungsmittel gegen dieses unangenehme Insect zu sagen vermag,“ schließt Hr. Burckhardt in seinem ausführlichen Berichte, „so liegen sie schon in dem Vorangegangenen. Hinsichtlich der Vertilgungsmittel wenden wir das Abhauen und Zerstören der befallenen Stämme vor der Flugzeit an, verfahren damit aber, je nach der Beschaffenheit des Standortes und der Heister, so wie nach der Art und GröÙe des Schadens, mehr oder weniger energisch. Das Abhauen der Stämme, um Stockausschlag zu bewirken, empfiehlt sich allerdings für Schonungen, würde aber auf unsern offenen Huden (Hütungen) ohne Erfolg bleiben.“ Für den Fall, daß man noch Stockausschläge der abgeschnittenen Stämmchen zu erziehen gedächte, würde man auf die Erinnerung des Hrn. Saxen zu achten haben, welcher die Larven an einzelnen Stämmen bis unter den Wurzelknoten gehen sahe und deshalb befürchtet: es könnte beim Abschneiden der Stämmchen über der Erde die Brut erhalten werden, ohne daß man einmal auf ordentliche Knospenbildung rechnen könnte. Es würde daher den so zu behandelnden Pflänzlingen eine sorgfältige Untersuchung vorhergehen müssen (s. die Erkennung S. 66.).

Außerdem ist nun noch eine Art, *B. fagi*, welche hinreichend bekannt wurde. Sie kommt in der Lebensweise in vielen Stücken mit den eben geschilderten überein und würde sich wesentlich nur durch folgende Verschiedenheiten unterscheiden, die als fest begründet anzusehen sind, da ich das Thier nun seit 5 Jahren alljährlich beobachtete und auch von Hrn. Burckhardt kürzlich erfuhr, daß es sich im Solling eben so verhalte und dort eine ganz gewöhnliche Erscheinung sei. Ich fand das Insect immer nur in starken, anbrüchigen Buchenstämmen und einmal auch in einer Holzklafter, besonders in der Nähe feuchter, nicht voll bestandener Orte, und Hr. Burckhardt bemerkt ebenfalls, daß es nur in fehlerhaften Buchen von 5-6" Durchmesser bis zu den ältesten, stärksten Stämmen der durch Laubnutzung verdorbenen Bestände, so wie an Rändern plötzlich entblößter Fronten gefunden habe, jedoch auch in altern Buchenheistern oft da, wo diese jenen bekannten, übereinstimmenden Schaden (Süd- und Südwestseite) haben. Die Borkenstücke, unter welchen die Larven fraßen, waren immer schon ganz abgestorben und ich konnte sie in großen Tafeln leicht lösen. Die Gänge laufen hier zwischen den hervorragenden Markstrahlen der Rinde und haben die auf Taf. XXI. Fig. 4. (wo auch die großen Gänge einer zufällig mit arbeitenden Cerambyx-Larve abgebildet sind) abgebildete Form und GröÙe, unterscheiden sich also auf den ersten Blick durch einen sehr dicht geschlängelten, nach allen Seiten sich gleich verbreitenden Verlauf. Meist geschieht die Verpuppung im Innern der Rinde, zuweilen aber auch im Holze, wie ich bei der angeführten Klafter deutlich sahe und wie auch Hr. Burckhardt ermittelte. Bei dieser Art hat auch Hr. Schmidt die Begattung im Freien beobachtet. Es war nämlich am 24sten Juni bei Mittagssonnenschein, als er das kleinere Männchen auf dem größern Weibchen sitzend auf einem Buchenblatte fing. Es ist demnach wohl schon mit Bestimmtheit anzunehmen, daß diese Art zu den unmerklich schädlichen gehört. Die Stämme, welche sie befällt, wären doch eingegangen, wenn auch vielleicht ohne die *B. fagi*

erst einige Jahre später. Ginge sie gesunde oder nur in Folge der Verpflanzung kränkelnde Stämme an, so würde sie sich in solchen bei uns, wo sie so häufig ist, wohl schon gezeigt haben.

Es ist ferner Manches über eine noch andre Art neuerlich bekannt geworden und wir hätten auf eine solche schon aus den Nachrichten des Hrn. Wächter (a. a. O.) schließen können, der von Beschädigungen an Buchen und Eichen spricht. Hr. Pape ist es, der uns die Versicherung giebt, daß in Eichen eine wirklich verschiedene und schädliche Art lebt. Die Gänge und die Holzböhrlöcher sind, wenn sie auch denselben Verlauf wie bei der *B. nociva* und *tenuis* haben, dennoch merklich kleiner und die sehr kleine ( $4^{\text{te}}$  lange und wenig über  $\frac{1}{2}$  breite, mit auffallend stark gezählter Afterzange versehene s. S. 57.) Larve (welche ich in den mir von Hrn. Saxesen übersandten Knöppeln im Winter 1838 noch lebend und bereits in die Holzweige eingefressen fand) zeigt bestimmt, daß wir es mit einer andern, kleinern Art zu thun haben. Obgleich es noch nicht geglückt ist, den Käfer selbst zu erziehen, so halte ich diesen doch für *B. angustula*. Der Grund dafür dürfte einmal in dem eben Angegebenen zu suchen sein und dann auch in der schon S. 61. hinter der Beschreibung der Art mitgetheilten Erfahrung. Hr. v. Meyerinck der Sohn theilte mir in Beziehung darauf noch später mit, daß er die kleinen Gänge von Bupresten öfters in eingegangenen jungen Pflanzchen bemerkt habe. Hr. Suffrian fing die *B. angustula* nur auf Eichenlaub. Diese fragliche Art hat, wie mir Hr. Saxesen schreibt, theils mit *Eccoptogaster intricatus* zusammen, theils allein in Eichenheistern der Lautenthaler Gegend gefressen und dürfte nach dem Folgenden nicht viel weniger schädlich sein als *B. nociva*. Das Nähere des Thatbestandes ist nach Hrn. Pape's eignen Mittheilungen folgendes: 1) Am Schmogerberg im Innersthal, 1 Stunde unter Lautenthal, waren im April des Jahres 1836 über 500 Stück Eichen von 4-7' Höhe, und zwar mit Ballen, ausgepflanzt, im April 1837 fand man aber schon 100 Stück davon eingegangen und ersetzte sie durch andre. Im April 1838 waren wiederum von den im Jahre 1837 gepflanzten 5 Stücke und von den im Jahre 1836 gepflanzten 21 Stücke trocken geworden. 2) Am Tragthaler Berge unterhalb Lautenthal, aber bedeutend höher als der Schmogerberg im Innersthal gelegen, waren von 387 Stücken im Jahre 1835, in einen 1-3-jährigen Buchen-Abtriebschlag gepflanzter 5-7' hoher Eichen, im Jahre 1836 eingegangen 192 Stücke und im Jahre 1837 ersetzt worden, so wie man im Jahre 1838 hier 61 kränkelnde abschnitt und aus dem Jahre 1837 noch 5 Stücke und von 1835 sogar noch 12 Stücke todt fand. 3) Auch im Hohäuser Reviere waren in einem geschützten Thale nahe vor Hohausen, wo ein eisenschüssiger sehr trockner Boden herrschte, fast sämtliche der wahrscheinlich im Frühjahr 1838 gepflanzten Eichen befallen und eben so zeigten sich am Steinkopf im Langelsheimer Revier, auf frischem, stellenweise sogar feuchten Boden in den im Frühjahr 1838 vorgenommenen Buchenheister-Pflanzungen von 30 Eichen nur 2 Stücke, die nicht von den Insecten befallen gewesen wären. Es wurde nun zwar behauptet, daß der Käfer nur kranke Stämme angehe und in den nicht verpflanzten gar nicht zu finden gewesen sei. Allein Hr. Pape entgegnete mit Recht, daß jeder verpflanzte Heister im ersten Jahre kränkele. Es gilt hier das schon von den angegriffenen Buchenpflanzen Gesagte (S. 68.). Folgende Bemerkungen, welche Hr. Pape bei dieser Gelegenheit noch macht, dürften nicht unwichtig sein. Wenn Eichen oder Ebereschen im Frühjahr durch scharfe Instrumente verletzt werden, so zeigen sie mehr als eine andre Holzart brandige Stellen. Sollte daher bei diesen die Herbstpflanzung nicht vorzuziehen sein? An sämtlichen Forstorten waren die Eichen gleichzeitig mit Buchen-Pflänzlingen, im Braunschweig'schen sogar mit gleich starken Buchenheistern, gepflanzt, doch konnte an keiner Buche ein Insect aufgefunden werden, obwohl Bupresten an dieser Holzart in einigen Districten der letztgenannten Forsten vorkommen sollen. Ich möchte daraus noch mehr schließen, daß *B. tenuis* und *nociva* hier nicht im Spiele gewesen seien, da diese doch wenigstens eben so gern die Buchen wie die Eichen angegangen wären, eben so wie man daraus abzunehmen berechtigt wäre: daß die Eichenzerstörerin, sie mag *B. angustula* sein oder eine andre Art, durchaus nicht in Buchen lebe. In den Fällen,

in welchen Buchen und Eichen zugleich ergriffen waren (s. S. 67. die Beobachtungen von Hrn. Wächter), sind also auch höchstwahrscheinlich alle diese Arten beisammen gewesen. *B. angustula* und *tenuis* wurden auch schon wirklich von Hrn. H. Pfeil im Brieselang bei Berlin, obwohl nicht häufig, beisammen gefangen und auch von Hrn. Apetz bei Altenburg, wenn ich nicht irre, selbst mit *B. cyanescens* zusammen. Eine fernere Bestätigung erhalte ich noch durch Hrn. Schlotthauber, welcher mir Exemplare der *angustula* und der *tenuis* (letztere auffallend dunkelblau, ob vom Gerbstoff der Eichen?) sendet mit dem Bemerkten: „aus Eichenstuckrinde herausgeschnitten.“

### Fünfte Familie.

#### Blatthörnige. (*Lamellicornia*.)

CHARACTERISTIK. In dieser Familie finden sich mehr Übereinstimmungen als in den vorigen, nicht bloß in der Form der Käfer, sondern auch der Larven, selbst in der Lebensweise. Das beste und faßlichste Kennzeichen bieten uns auch hier wieder die Fühler, so daß man nach ihnen auch den Namen der Familie sehr passend gewählt hat. Die letzten Glieder derselben (s. pag. 72. der Übersicht) sind stark verdickt, aber nicht nach allen Seiten, sondern nur nach einer, der innern. Sie erweitern sich nach innen in einen Fortsatz, welcher gewöhnlich auffallend breit ist und daher auch mit einem Blatte verglichen wird, zuweilen aber auch nicht so breit ist und nur einem Kammzähne ähnelt. In diesem letztern (nur bei unmerklich schädlichen vorkommenden) Falle könnte man sie mit gekämmten Fühlern oder auch keulenförmigen verwechseln, wenn man nicht daran dächte, daß bei den gekämmten die Glieder schon vom dritten an einen Fortsatz tragen und bei den keulenförmigen die Glieder fast nach allen Seiten breiter werden. Sind die Glieder sehr verbreitert, so liegen sie auch meist dicht über einander, wie die Blätter eines Buches, einen rechten Winkel mit den übrigen Gliedern bildend, können aber von dem lebenden Thiere wie ein Fächer ausgebreitet und wieder zusammengeklappt werden. Sind sie kammzahnähnlich, so können sie sich nicht dicht an einander legen. Die Fühler sind stets nur kurz, d. h. sie überragen nicht den Hinterrand des Halsschildes. Die Käfer haben sämtlich ein plumpes, unbehendes Ansehen, d. h. sie sind gedrungen, kurz und meist stark gewölbt. Die Farben der wichtigsten sind gefällig, oft bunt und selbst metallisch, einiger wenigen schwarz oder braun. Ihre Larven sind sämtlich weiß oder gelblich-weiß, dick, sehr weich, mit großem oder mäßigem, augenlosen Kopfe, langen, hinter den Oberkiefern am Kopfrande stehenden Fühlern und großen Mundtheilen. Sie haben sämtlich lange und dicke Füße, ja es kommen die längsten Füße unter den Käferlarven bei ihnen vor (Maikäfer-Engerlinge). Sie sind deutlich, zum Theil sogar ziemlich stark behaart und zeigen einen auffallend großen und dicken letzten Ring. Eigenthümlich ist den meisten, daß sie nicht, wie andre Larven auf der Erde kriechen können, sondern daß sie hier auf der Seite liegen oder sich in spiralförmigen Windungen fortbewegen, weil sie nur in der Erde oder in faulem Holze u. dergl. in eigenen Gängen zu kriechen bestimmt sind. Die Puppen sind gedrungen, wenig oder gar nicht behaart, mit stark bedeckten Unterflügeln und mehreren Afterfortsätzen.

Die LEBENSWEISE ebenfalls ziemlich übereinstimmend. Die Käfer leben am Lichte, die Larven und Puppen aber im Dunkeln, d. h. in der Erde, im faulen Holze, im Miste, wo sich erstere Gänge bereiten und in diesen ihrer Nahrung nachgehen. Diese besteht bei den forstlich wichtigen nur aus vegetabilischen Stoffen, wie ein jeder vom Maikäfer, vom Schröter weiß. Selbst die Mistkäfer, welche hierher gehören, gehen meist nur den pflanzlichen Überresten im Dünger nach, und die Maikäferlarven scheinen in der frühesten Jugend es eben so zu machen. Die Käfer, welche entweder Blätter fressen oder an flüssigen Pflanzenabgängen saugen, fliegen am liebsten des Abends und sitzen, mit wenigen Ausnahmen, am Tage



still. Die Begattung ist innig und dauernd. Wollen die Weibchen legen, so graben sie sich ein. Nach dem Legen kommen sie meist wieder hervor, sterben dann aber bald.

Die FORSTLICHE BEDEUTUNG der Blatthörnigen ist sehr wichtig. Die Maikäfer sind für unsre Genden die am meisten gefürchteten. Auch einige unmerklich schädliche und gleichgültige sind so gemein und so auffallend im Walde, daß sie der Forstmann kennen muß und auch wegen ihrer Größe und eignen Körperform leicht kennen lernen kann.

Die EINTHEILUNG ist nicht schwer, da alle Mistkäfer hier wegbleiben. Bei Linné finden wir sie nur in einer Gattung (*Scarabaeus*), nachher in mehreren, und diese sind auch jetzt allgemein angenommen und die Forstleute sprechen nicht mehr *Scarabaeus Cervus*, *Scarabaeus Melolontha*, *Scarabaeus auratus*, sondern *Lucanus Cervus*, *Melolontha vulgaris*, *Cetonia aurata*.

Endglieder der Fühler	{ klattartig erwei- tert, dicht zusam- men liegend	{ zur Seite des zweiten Fußpaares (Schulterstück oben fast ein deutlich gesondertes, gegen die bis an das Schildchen tretend . . . . . Gatt. <i>Cetonia</i> .
		{ Schultern hinauf steigendes Stück (Schulterstück) . . . . . Gatt. <i>Trichius</i> .
	{ kammzahnartig erweitert, voneinander stehend	{ Schulterstück nicht deutlich . . . . . Gatt. <i>Melolontha</i> .
		{ Oberkiefer groß, zangenartig vorragend . . . . . Gatt. <i>Lucanus</i> .
		{ Oberkiefer klein, versteckt . . . . . Gatt. <i>Sinodendron</i> .

#### Erste Gattung.

#### *Melolontha* Fabr. Laubkäfer.

CHARACTERISTIK. Die Form eines Maikäfers, welcher zu den größten Arten dieser Gattung gehört, ist Jung und Alt so bekannt, daß wir sie hier nur als Muster angeben dürfen, um uns hier über den herrschenden Habitus verständlich zu machen. Einige kleinere Arten weichen wohl in der Gestalt etwas ab, d. h. sie sind entweder etwas langgestreckter oder auch etwas gedrungener, zuweilen auch gewölbter, jedoch ist dies nie so entstellend, daß man sie eher zu den andern Gattungen, als zu dieser bringen würde. Kunstgerechter würde man sie so charakterisiren: Käfer. Kopf ziemlich klein und flach. Augen entfernt. Fühler kurz, nicht geknickt, mit nicht sehr langem, keulenförmigem Grundgliede. Die 3-7 letzten rechtwinklig absteigenden (Fächer-) Glieder sind geblättert und bald sehr kurz und rundlich, bald sehr lang und etwas gebogen. Kopfschild stark vorragend. Die halb darunter verborgene Lefze (Taf. III. Fig. 1a) meist sehr dick, lederartig, ausgerandet oder gebuchtet, stark behaart und gewimpert. Oberkiefer (1b) stark, hornig, mit stark gekrümmtem behaarten Außenrande und breit- oder spitzzahnigem, über der Basis gezähnelten Innenrande. Unterkiefer (1c) stark behaart, sehr fest und hornig mit mehreren hornigen Zähnen an der Lade und viergliedrigem, mülseigen Taster. Lippe mit dem kleinen hornigen abgerundet-viereckigen Kinne fest verbunden, an den Seiten bauchig, vorn etwas zurückgedrückt, innen eine zweilappige, geknickte Zunge und am Aufseurande die dreigliedrigen Taster tragend (Fig. 1d). Halsschild quer, gewölbt, vorn nicht viel schmäler als hinten. Schildchen groß. Flügeldecken in der Mitte etwas breiter als der Halsschild, gewölbt, am Ende mehr oder weniger abschüssig und abgestutzt, die Spitze des Hinterleibes meist nicht ganz deckend, gerippt. Unterseite gewölbt. Hinterleib am Ende meist etwas nach unten gebogen. Beine lang, hinsichtlich der Schiendornen und der Hälchen sehr verschieden. Die, meist braune oder gelbliche, selten metallisch angeflogene Grundfarbe oft durch dichtenliegende, breite, schuppenartige Hälchen verdeckt oder bunt gemacht. Außerdem auch noch hier und da lange Zottenhaare. Die Weibchen unterscheiden sich von den Männchen meist dadurch: daß sie dicker und breiter sind, besonders einen

stärker nach unten gewölbten Hinterleib, ferner kürzere Hinterbeine und kleinere Fächerblätter, zuweilen auch kleinere Glieder des Fühlerfadens haben. Zuweilen unterscheiden auch die Farben, aber selten. Die Larven (Taf. III. Fig. 1. BC) erscheinen im Verhältniß zu andern, wie *Cetonia*, lang gestreckt, gegen das Ende nicht so sehr verdickt und haben einen sehr großen Kopf, dessen rundliche, eine schon auf dem Scheitel getheilte Gabellinie zeigende Oberseite etwas gewölbt und dessen Unterseite flacher erscheint. Fühler so lang wie die Oberkiefer, fünfgliedrig, das zweite dicke und das letzte fast lanzettförmige die kürzesten. Kopfschild deutlich durch eine Furche gesondert, quer, viereckig. Lefze fast hertzförmig, groß, dick, lederartig, stark behaart. Oberkiefer hornig, sehr stark, lang, schwach gebogen, mit gezählelter, breiter Schneide am Ende und einem großen, zahnförmigen Höcker an der Innenseite der Basis. Unterkiefer mit sehr langer Angel, kurzem Stamm und zweilappiger Lade. Die Lappen mit breiter, fleischiger Kaufläche und mehreren starken, schwarzbraunen, zum Theil hakig gekrümmten Zähnen am Rande und zahlreichen Borstenhaaren. Taster viergliedrig, etwas länger als die Lade. Lippe kurz, dick und fleischig, an der innern, wulstig vortretenden Seite mit vielen starken Haaren und Borstenhaaren. Taster entfernt, am Rande, zweigliedrig, mäßig. Die 3 ersten Leibesringe mit langen Füßen. Das erste Luftloch auf dem ersten, die übrigen 8 vom vierten bis elften Ringe, alle mit einer deutlich vortretenden birnförmigen Wulst, größer oder kleiner, mehr oder weniger schüsselartig vertieft, mit einem stark gewölbten, mehr nach dem Vorderrande hinliegenden Knöpfchen. Auf dem Rücken sind große gewölbte Keil- und Hinterwülste. Der letzte Ring so groß wie zwei bis drei der vorhergehenden zusammen, blasig aufgetrieben mit deutlich durchscheinender Lufröhrenverstellung und querer Afterspalte unter einer dreieckigen Hautwulst. Beine sehr lang, dreigliedrig, einklauig, das Haken des ersten Paares größer als die der beiden folgenden, in den langen Borstenhaaren versteckt. Die Behaarung des Körpers ist doppelt: theils finden sich lange Borstenhärchen, welche auf dem Rücken sparsamer stehen, nach den Luftlöcher-Wulsten aber sich mehren und besonders um die Aftergegend häufig sind, auch auf der Unterseite sich finden und auf dem letzten Ringe am Ende etwas hakig umgebogen erscheinen, theils kleine braune Börstchen, welche, besonders vom vierten Ringe an, am Rücken so dicht stehen, daß sie denselben scharflich machen. Dicht vor dem After in der Mittellinie ein linearer, von kurzen Dörnchen umgebener Fleck, der nur selten (*M. brunnea*) fehlt. Farben an den ersten 11 Ringen gelblich-weiß, am letzten (wenn er mit Koth erfüllt und stark glänzend ist) bläulich-schwarz. Die Luftlöcher rötlich-braun. Füße, Kopf, so wie ein halbmondförmiger, festerer Fleck an der Seite des ersten Ringes oben gelblich-rothbraun. Die Schneide und die Höcker der Oberkiefer nebst einer Kante, so wie der äußere Kopfschildwinkel schwarz. Die Puppen gedrunen, glatt und kahl, am Ende zugespitzt, mit kleinen, etwas übergeneigten, den Halsschild wenig verdeckenden Kopfe, an welchem die Taster und Fühler auswärts gebogen sind und über die Vorderschienen wegragen. Die Beine ansteigend, die Schienen und Fußglieder des letzten Paares unbedeckt. Flügel bis zum fünften Ringe: die untere nur bis an die Spitze unbedeckt. Afterglied mit zwei auswärts gekrümmten, spitzen Afterstacheln.

Die NAMEN werden hier in Deutschland bekanntlich meist nach den Monaten, in welchen die eine oder andre Art fliegt, bestimmt. Allerdings halten drei wichtige Arten ihren Monat meistens, erscheinen doch aber auch bald etwas früher, bald später, und überdies giebt es dann noch mehrere andre (selbst wichtigere) Arten, die mit ihnen zugleich fliegen, so daß man jene Namen wenigstens nicht für ganz ausschließend halten darf.

VORKOMMEN sehr verbreitet, auch von den nördlichsten Gegenden und hohen Gebirgen nicht ausgeschlossen. Die Käfer auf den Gewächsen, die Larven unter der Erde.

LEBENSWEISE, FORSTLICHE BEDEUTUNG. Die Laubkäfer zeigen in Folgendem Übereinstimmung. Sie gehören zu den wenigen Insecten, welche eine mehrjährige Generation haben. Während dem man keine Käfer bemerkt, fressen die Larven an den Wurzeln der verschiedensten Gewächse und schaden da-

durch dem Forst- und Landwirth, so wie dem Gärtner. Dann erscheinen einmal wieder die Käfer bald in diesem bald in jenem Jahre häufig und fressen das Laub und die Blüten von Bäumen, Sträuchern, Kräutern und Gräsern. In dem einen Jahre sieht man diese, im andern jene Art, und zwar dieselben bald in unumfänglicher Zahl, bald nur sparsam. Man muß, da die ganze Gattung eine sehr schädliche genannt werden kann, mehrere Arten kennen lernen, ja eigentlich auf sämtliche in Deutschland vorkommende Arten gefaßt sein. Arten, die man in Sammlungen für selten hält, sind mir schon häufig vorgekommen, freilich nicht so oft wiederkehrend wie die allgemein bekannten. Sie sind fast alle schon auf den ersten Blick an den Farben zu erkennen und ihre Unterscheidung wird, vielleicht bis auf zwei, nach unsern Abbildungen nicht schwer fallen.

BEGEGNUNGSMITTEL hat man sowohl für die Käfer wie für die Larven. Davon bei dem gemeinen Maikäfer.

EINTHEILUNG. Die Gattung ist ziemlich bevölkert, denn es giebt selbst bei uns wenigstens 14 Arten, und wenn man die süddeutschen dazu rechnen wollte, noch viel mehr. Man hat daher mehrere kleinere Gattungen daraus gemacht, welche mit unsern Sectionen so viel wie möglich parallelisirt werden sollen. Die Charactere dieser Abtheilungen werden durch die Abbildungen erläutert.

\* Fühler-Fächer aus mehr als 3 Blättern bestehend (*Melolontha auct.*).

1. *M. vulgaris* Fabr. Gemeiner Maikäfer. (Taf. III. Fig. 1. Männchen, Fig. 2. Weibchen)

NAMEN. Man darf sich nicht wundern, daß es in allen Sprachen eine große Menge von Namen für den Käfer sowohl wie für die Larven giebt, welche, da nur Verwechselung mit einer einzigen sehr verwandt, wenn man die Lebensweise ganz übereinstimmenden, *M. Hippocastani*, zu befürchten wäre, also wirklich einmal Werth haben und hier daher alle genannt werden sollen. Der Käfer heist Mai- oder Maikäfer, Laub-, Baum-, Sägenblatt-, Maulwurfs-, Weiden-, Kreuz-, Kauz-, Hecken-, Hexenkäfer, Ranken-, Eckernschäfer, Eckeltewe, Eckelwerl, Eckernscheersel, Enksäwer (Eichenkäfer), Eckernschnabel, Weidenhahn, Raubkäfer, Kolbenkäfer, Müller. (*Le hanneton ordinaire, gros hanneton, Chzraszes*). Die Larve heist: Engerling, Enderling, Enderlein, Ängerich (wahrscheinlich von Anger), Wirtelmade, weiße Erdglime, Ackerkrabbe, Ackerkrappe, Kornwurm, Glime, Glimme, Kappenstößer, Quatte, Schafhund, Brachwurm. Franz. *le ver blanc, ver de blé, ver ture, ver matis, mans*. Bei Linné hieß die Art *Scarabeus Melolontha*, jetzt allgemein *M. vulgaris* nach Fabricius.

CHARACTERISTIK. 12-13" lang. Kopf grob punkirt und mit gelblich-grauen Zotten bedeckt. Augen groß, gewölbt, vorn mit einem, von langen Zotten besetzten tiefen Einschnitte. Fühler mit einzelnen Borstenhaaren, beim Weibchen kürzer, beim Männchen länger als der Kopf, zehngliedrig. Fächer beim Weibchen sechseckig, oval, beim Männchen siebenblättrig, stark verlängert-länglich, etwas nach außen gekrümmt. Der Kopfschild vorn abgestutzt, mit stark zurückgeschlagenen Rändern. Halsschild mit spitzen Winkeln, vorn in der Mitte, hinten zu beiden Seiten der bis über das Schildchen ragenden und besonders beim Männchen stark gewimperten Mitte gebuchtet, quer, gewölbt, ziemlich grob und dicht punkirt (weniger auf der, mit schwacher Längsfurche durchzogenen Mitte), und nur wenige glatte Flecke zeigend, zottig, an den Seiten in der Mitte erweitert (beim Weibchen etwas mehr als beim Männchen). Schildchen fast halbkreisförmig, größtentheils glatt und kahl und nur einige wenige haartragende Punkte zeigend. Flügeldecken an der Basis wenig breiter als die Basis des Halsschildes und dreimal länger als derselbe, gegen die Mitte etwas erweitert und nach hinten allmählich verschmälert, gewölbt und am Ende abschließig, mit kurzen, weißen, angedrückten breiten Härchen bedeckt, runzlich punkirt, eine jede mit vier,

hüten in einen glatten Höcker auslaufenden, erhabenen Längsrippen, die so wie die Ränder nur sehr sparsam punktiert und daher auch weniger behaart erscheinen. Brust mit sehr langen, gelblich-grauen Zotten. Hinterleib unten stark gewölbt, in der Mitte weniger als an den Seiten behaart und hier besonders ausgezeichnet durch schneeweiße, aus schuppenartigen Haaborsten gebildete Flecke. After stark hervorgezogen und mit einem (besonders beim Männchen sehr) langen, fast vertikal absteigenden, vor dem Ende etwas eingeschürten, stumpfen Griffel. Beine theils mit angedrückten Zottenhaaren, theils mit Borsten und Stacheln besetzt. Farben sehr selten dunkel, oder gar schwarz, sondern allermeist hell; röthlich-braun und nur durch die Behaarung etwas verdeckt sind: die Flügeldecken, Kopfschildränder (meist), Fühler, Lippe (meist), die innern Mundtheile und Füße (bis auf die dunklern Spitzen und zuweilen auch einzelne Flecke der Flächen der Schenkel, Schienen und Schienendornen), so wie auch der Aftergriffel. Schwarz sind Schildchen, Halschild (bei den sogenannten Mohren oder Königen, während sie bei einer Var., den sogenannten Türken, Königen, Capuzinern, auch grösstentheils braun oder rothbraun sind), Kopf (die Ausnahmen s. oben) und Unterseite des Thieres (bis auf die hellern Brustseiten in die schneeweißen, dreieckigen Flecke der Hinterleibsseiten s. Taf. III. Fig. 1A). Die ausgewachsenen Larven (Taf. III. Fig. 1a c) sind 1" 8" lang und 4-5" breit und besonders ausgezeichnet durch sehr dicht stehende Borsten, große Luftlöcher-Schüsseln, starke Behaarung und großen linearen Fleck des letzten Ringes. Die jungen sind den alten schon sehr ähnlich, auch in der Seitenlage, welche sie, auf die Erde gelegt, annehmen, verschiedenes aber durch die schmutzigere Kopffarbe, die längeren Haare (welche besonders auf dem neunten, zehnten, elften Ringe ausnehmend lang sind und auf dem letzten Ringe sehr dicht stehen), die verhältnißmäßig bei den jüngsten noch länger erscheinenden Beine (welche so lang sind, wie die drei ersten Ringe sammt dem Kopfe) und die mehr bläulich-weiße, nur wegen der Haare ins Röthliche spielende Grundfarbe. Schon in der dritten Woche sind sie 4-5" lang. — Die Puppe ist 1" lang und 6" breit, gelbbraun, anfangs mehr weiß als später. — Die Eier (Fig. 1r) wenig kleiner als Haufkörner, gelblich-weiß, eiförmig, sehr weich.

VORKOMMEN überall, wo es überhaupt Laubkäufer in Deutschland giebt, namentlich in allen Preussischen Provinzen, sowohl im Forste wie auch auf Äckern, Wiesen, Gärten, an Alleen, und zwar bemerkt man hier entweder bloß den Käfer um die Flugzeit, oder auch vorher oder nachher die Larven. Im Jahre 1836 fand man sie an den höchsten Bergen des Harzes an Fichten fressend (Hr. Saxsen). Sie sind auch in Schweden (Hr. Gyllenhal) wie in Rußland (Ménétriés) sehr gemein.

LEBENSWEISE. Die gründliche Kenntniß derselben ist bei keinem Insecte so wichtig, weil wenige Insecten eine so lange Lebensdauer haben, keines seinen Aufenthalt so sehr verändert und keines eines so versteckten, schwer zugänglichen Aufenthalt hat und dergl. Wir nehmen dieselbe daher hier ganz besonders gründlich und in bestimmter Reihenfolge durch.

1) Von der Entwicklung des Insects und dessen Aufenthalte zu verschiedenen Zeiten an verschiedenen Orten. Nach der Befruchtung <sup>(s. unten Fig. 1r)</sup> beginnt die Entwicklung der Eier in den beiden Eierstöcken des Weibchens sehr schnell, jedoch so, daß die hintersten noch klein sind, wenn die vordersten schon gelegt werden können. Die Weibchen gehen dann an die Erde und suchen einen Ort zum Ablegen, in dessen Auswahl sie oft sehr eigen sind. Sie wählen immer, wenn sie können, lieber einen lockern, trocknen, als einen festen, nassen Boden, ja sie meiden sogar die schon weiter vorgerückte Wintersaat, gehen auf Culturen lieber in die Pflanzlöcher als in den benannten Boden, lieber auf nackten als auf bemoosten und mit Laubdecke versehenen. Auch einen freien, sonnigen Boden ziehen sie einem beschatteten wohl vor. Allerdings giebt es Ausnahmen, so sahen wir einen tüchtigen Fraß in einem dunkeln Besamungsschlage, auch habe ich öfters ganz junge Larven in Mittelwaldähnlichen Beständen unter dem dichtesten Gebüsch von Heidekraut und Blaubeeren gefunden, wenn der Boden nur recht locker

war. Auch kehren sie sich selbst an den festen Boden nicht, wenn kein anderer in der Nähe ist, und arbeiten sich mit Hilfe des spitzen Aftergriffels auch durch die Grasnarbe oder durch eine dichte Laubdecke hinein. Wir sehen ja auch oft den heftigsten Fraß der Larven auf Wiesen, die so fest wie eine Tenne sind. Ist das Loch gegraben, welches nach der Festigkeit oder Lockerheit des Bodens 4-5" tief ist, so legen sie 12-30 Eier auf den Grund desselben in ein Klümpchen zusammen. Um dies zu beobachten, sperrte ich öfters Weibchen ein, sahe aber nie mehr Eier beisammen, zuweilen sogar nur 3-6 einzeln umherliegen. Da sie aber wohl 60-80 entwicklungsfähige Eier bei sich haben, so muß ein und dasselbe Weibchen das Legen nothwendig an verschiedenen Orten wiederholen, auch schon deshalb, damit es den jungen Larven, die im ersten Jahre sich nicht weit bewegen, nicht an Nahrung fehle. Entweder begeben sie sich deshalb wieder aus dem Loche heraus, und graben ein neues, oder sie gehen unter der Erde fort und legen an verschiedenen Stellen. In meinem, mit lockerer Erde 5" hoch gefüllten Zugkasten geschahe das letztere ohne Zweifel, denn ich fand auf dem Boden des Kastens mehr Eierhäufchen als ich Weibchen hineingesetzt hatte, und diese letztern waren meist gar nicht wieder aus der Erde hervorgekommen, sondern in derselben gestorben. Daher mag es auch wohl kommen, daß man in den Käferjahren, in welchen mau meinen sollte; der Boden müsse sich mit toten Käfern bedecken, gar nicht so auffallend viele herumliegen sieht. Dabei muß ich bemerken, daß in meinen Kästen auch die Männchen sich in die Erde begeben hatten, wahrscheinlich weil ihnen die Kühle derselben angenehm gewesen war. Allerdings werden von den wieder herauskommenden oder über der Erde bleibenden auch viele von Thieren gefressen. Bis 1 Fuß tief werden die Eier gewiß nur selten abgelegt (Feistm. *Forstwiss.* I. 363.). Das was den jungen Larven zur Nahrung dient, findet sich auch mehr oberflächlich, wie ich denn junge, nicht längst erst ausgekommene Larven auch immer nur einige Zolle tief sahe. Mit meiner Beobachtung des Verschleppens der Eier würde auch die des Hrn. Plieninger (Maikäfer S. 19.) am besten zu vereinbaren sein, nach welcher der Käfer mehrere Tage zu dem Geschäfte des Eierlegens gebraucht. Höher als 40 geht auch kein Beobachter die Zahl der von einem Weibchen gelegten Eier an. Demnach gehört der Maikäfer gar nicht einmal zu den fruchtbarsten Insecten, unter welchen es ja viele giebt, die bis 200 Eier und mehr legen! Die Plage würde dann aber auch noch weit größer sein, indem von den einmal abgelegten Eiern gewiß weit weniger untergehen, als von den über der Erde befindlichen Eiern anderer Insecten. Die Entwicklung der Eier zu Larven erfolgt schon nach 4-6 Wochen, je nachdem ihr Bette mehr oder weniger trocken ist und von äußerer Wärme begünstigt wird. Jedenfalls erreichen sie aber noch in demselben Jahre eine ansehnliche Größe (8-9"), bleiben aber noch sehr dünn, so daß ihr späteres Wachstum, im Verhältniß zu der mehrjährigen Dauer, weniger auffallend in Länge als in Dicke zunimmt. Im nächsten Jahre zerstreuen sie sich schon und im dritten und vierten verbreiten sie sich überall, nach allen Richtungen geschickt Canäle durch die Erde grabend und ihrem Fraße an den Wurzeln der Gewächse nachgehend, ohne daß sie sich aber auf weite Strecken von ihrer Geburtsstätte entfernten. Ihre Canäle gehen bald auf- und abwärts, bald wagerecht bald bogig gekrümmt und können, wenn der Boden nicht zu locker ist, mit dem vorsichtig nachgeschobenen Finger verfolgt werden. Wie sie sich dabei bewegen, kann man etwa an einer auf die Erde gelegten Larve sehen, welche sich durch spiralförmige Bewegungen und durch stetes Unterschieben und Stützen des Afterringes wieder einzugraben sucht. Sucht man sie darn zu hindern, so kneipen sie empfindlich mit den Oberkiefern. Aufser der Erde befinden sie sich unbehaglich und, wenn sie auch nicht gleich sterben, so magern sie doch ab und schrumpfen bald zusammen. Selbst wenn man sie in eingeschlossenen, mit Erde gefüllten Kästen, die mit Kiefern bepflanzt sind, an denen sie dann auch fressen, zieht, werden die Käfer etwas kleiner, sie verpuppen sich aber zu derselben Zeit, wie die im Freien lebenden. Im J. 1836 tödtete man sie in Württemberg nach Hrn. Plieninger dadurch, daß man sie um die Mittagszeit den Sonnenstrahlen aussetzte, worauf sie in einer Stunde starben. Zum Winter begeben

sie sich jedesmal mehrere Fufs tiefer in den Boden. Auch um ihre Häutung, welche alljährlich nur einmal vor sich zu gehen scheint, zu überstehen, graben sie sich tiefer ein und bereiten sich eine runde, innen glatte Höhle. Nach 4-6 Tagen verlassen sie dieselbe wieder und kehren mit verdoppeltem Appetit in die Nähe der Erdoberfläche zurück. Eben so sind sie auch mitten im Sommer bald höher bald tiefer zu finden. Dies scheint von der Witterung abzuhängen, so dafs sie bei anhaltender Dürre die kühlere, tiefere Erde suchen, nach einem erfrischenden Regen wieder heraufkommen. Der Sommer 1838, in welchem die zweijährigen Engerlinge sich schon wieder recht lästig zeigten, bestätigte dies aufs Neue. Während der kühlen Tage des Juli und August frafsen die Engerlinge dicht unter der Erdoberfläche und man konnte sie mit einem Handgriffe ausscharen. Während der sehr heifsen Juni-Tage hatten sie sich aber in sehr bedeutende Tiefe begeben. Dafs sie auf diese Weise aber in einem und demselben Tage sich der Mittagshitze entzögen und bei nächtlicher Kühle zurückkehrten, bemerkte ich nie, wenn ich auch nicht behaupten will, dafs Andre, die dies bemerkten, sich geirrt hätten, im Gegentheile dies immer zu beachten rathe, wenn es sich um Vertilgung handelt. Hatten sie etwas, das ihnen schmeckte, z. B. junge Kiefernpflanzen, so frafsen sie an den Wurzeln so gut bei Mittag als bei Abend oberflächlich. Am Ende des vierten Sommers gehen sie tiefer als jemals, wohl bis eine Klafter tief, und schicken sich zur Verpuppung an. In einer ovalen Höhle, welche sehr regelmäfsig geformt und innen fest angedrückt, aber nicht, wie Einige meinen, mit Fäden tapeziert ist, findet man die Puppe. Sie liegt bald horizontal, bald gestürzt und die abgestreifte, trockne Haut hängt am Schwanzende oder liegt auch neben ihr. Meistens geschieht dies von der Mitte des August bis zum September, jedoch sahe ich auch schon im Anfange des August Puppen, ja es mag deren noch früher gehen, wenn, wie es zuweilen vorkommt, Käfer noch im Herbst fliegen. Hr. Lüdecke sahe die Larven noch den ganzen September hindurch fressen und sich erst im October verpuppen. Nach 4-8 Wochen entwickeln sich in der Regel schon die Anfangs ganz blassen, weichen, immer mehr und mehr dunkel werdenden und erhärtenden Käfer, bleiben dann aber gewöhnlich bis zum nächsten Frühlinge, bis dafs die Knospen ausschlagen, in ihrem Verstecke. Dafs sie bei sehr harten Froste tiefer gingen, konnte ich, trotz mehrfach deshalb auf freien Culturen angestellter Versuche, nicht bemerken. Vom Februar an arbeiten sie sich immer höher, wozu sie besonders die frostfreien Tage benutzen, so dafs man sie im März schon nahe (6-8 Zolle) unter der Oberfläche findet. Einzelne mögen wohl überhaupt nicht so tief gehen, und diese sind es denn, welche, wenn sie sich bei auffallend gelindem Winterwetter anfangen heraufzuarbeiten, unverhofft und gar nicht selten im Winter, über der Erde erscheinen. Die Zeitungen berichten dies öfters als etwas Wunderbares (\*). Eben so lassen sich auch die Larven leicht verleiten, zur unrichten Zeit heraufzukommen. Im December wurden einmal die Engerlinge durch die Wärme eines auf dem Erdrreiche brennenden Feuers unter die Oberfläche gelockt (Corr. d. Würt. landw. V. Jahrg. 1832. S. 79.). Im Herbst bemerkt man zuweilen schon eine ungewöhnliche Menge fliegender Maikäfer. Dies mag Folge einer ungewöhnlich frühen Verpuppung sein. Die Regel ist bekanntlich, dafs sie im April und Mai erscheinen. Man sieht sie dann auf allen Wegen, im Walde wie im Garten, sich mühsam aus dem Boden herausarbeiten und Löcher zurücklassen, welche aussehen, als hätte sie Jemand mit einem Stocke gestochen. Sie sitzen dann eine kleine Weile still und erheben sich, wenn es warm ist, sogleich zum Fluge. Vorher pumpen sie mehrmals mit den Flügeln, um Luft genug zum Tragen des schweren Körpers, der eigentlich mit grofser Leichtigkeit und Schnelligkeit sum-

(\*) In den so ungewöhnlich warmen Tagen des Januars 1834 beobachtete man an mehreren Orten in Württemberg und in der Schweiz fliegende Maikäfer, welche offenbar von der im Spätjahre 1833 zur letzten Verwandlung reifen Brut heranstammten und zu den schon in den Herbst- oder Wintermonaten 1833 ausgeschlüpfen Käfern gehörten. (Plien. Maik. S. 27.)

mend dahin fliegt, zu schöpfen. Am Tage ruhen sie meist, in der Dämmerung aber schwirren sie nach den Gatten und nach dem Fräse umher. Zur Nacht tritt wieder Ruhe ein und am frühen Morgen sitzen sie ganz still, gewöhnlich vom Thau erstarrt oder während der dauernden Begattung schwerfälliger und loser an den Gewächsen. Ist das Wetter günstig, so verschwinden sie im Mai allmählig, wird es aber häufig durch Nachfröste, kalte Regen und Stürme unterbrochen, so verkriechen sie sich und kommen wieder vor, ihr Leben dauern bis in den Juni, ja bis Juli fristend, wie im merkwürdigen Jahre 1836 (\*). Große Strecken können sie nicht fliegen, so dafs ein Maikäferfräse auch meist ganz local erscheint. Während sich im Jahre 1835 ein ansehnlicher Maikäferstrich zwischen Neustadt und Berlin quer durch zog, hatten beide Orte kaum einen für die Sommer. Auch Gebirge überliegen sie nicht so leicht, so z. B. sind die, durch die schwäbische Alp getrennten Flußgebiete der Donau und des Neckars darin verschieden: dafs die Donauggenden Maikäferjahre zugleich mit den nördlichen Gegenden der Schweiz und den Bodenseegegenden haben, die Neckargegenden dagegen meist die Maikäferflüge gleichzeitig mit den Main- und Rheinländern (Plien. *Maik.* S. 29. *Anmerk.*). Es ist schon vorgekommen, dafs die einladenden Waldbestände des ganzen nördlichen Harzrandes mit Maikäfern wie besät waren, die ganze Parallele von Quedlinburg, wo man die Gegend durch Käfersammeln gesäubert hatte, dagegen frei blieb. Wir haben hier, gestützt auf eigene Erfahrungen so wie auf die, von Rösel (a. a. O. S. 6.) unternommene Erziehung einer vierjährigen Generation angenommen. Diese findet auch gewifs in der Regel Statt, denn in Franken beobachtete man mit Bestimmtheit die Jahre 1805, 9, 13, 17 als Käferjahre (Bechstein), bei uns die Jahre 1832 und 36 und früher die Jahre 1811 und 1820. Auch ist jetzt, da dies gedruckt wird, schon mit Bestimmtheit vorauszu sehen, dafs die Brut vom J. 1836 im J. 1840 flugbar wird. Dafs sie schon ein Jahr früher reif würden, ist kaum zu glauben, eher, dafs es einmal ein Jahr länger dauerte, wenn die Larven nämlich durch rauhe und nasse Sommerwitterung am Fräse häufig behindert waren. Man will beobachtet haben (*Corr. d. Würt. L. W.* 1832. B. II. S. 77.), dafs Engerlinge längere Zeit, selbst den ganzen Sommer über, in der blofsen Erde ohne alle Nahrung leben konnten. Bestätigte sich dies, so würde man darin schon einen Grund einer um ein Jahr verspäteten Entwicklung suchen können. Dann und wann kann es auch in mehreren auf einander folgenden Jahren viel Käfer geben. So z. B. werden wir, wenn die diesjährige Brut nicht unterdrückt wird, im Jahre 1840 wieder einen großen Flug haben, aber auch schon 1839 gewifs zahlreiche Käfer, weil sich schon im Herbst 1835 mit den Puppen zusammen viele junge Larven fanden, welche von Käfern gesetzt sein mußten, die sich von Nachbarflügen hierher verflogen hatten. Immer ist es aber sehr wichtig, ausgezeichnete Maikäferjahre im Auge zu behalten und danach die Zeit zu berechnen, in welcher die damals gesetzte Brut am schädlichsten werden könnte. Es ist immer gut, in einer Gegend bestimmt zu wissen: jetzt ist die Mehrzahl im zweiten, dritten oder vierten Larvenjahre, jetzt tritt die Verpuppung ein. Man kann dann schon bei Zeiten Anstalten zur Vertilgung machen. Selten wird die Brut eines ausgezeichneten Maikäferjahres ganz verloren gehen oder auch nur, wenn nicht besondere Vertilgungsmaafsregeln

(\*) Vom 12ten bis 15ten April fanden sich schon einzelne, fliegende Käfer. Vom 25ten bis 26ten erschienen bei anhaltend schönem Wetter (meist +13 bis 14° R.) die ersten großen Schwärme. Den 28ten verschwanden sie bei +5° wieder und liefsen sich auch mehrere Tage, ungeachtet des absichtlich angestellten Suchens, nicht entdecken, wahrscheinlich weil sie wieder in die Erde gegangen waren. Am 4ten Mai waren sie bei schönen, warmen Wetter wieder da und am andern Morgen blieben die meisten in Begattung. Die starken Nachfröste vom 6ten bis 9ten Mai (in München sollte es den 11ten-7° R. gewesen sein!) töteten wirklich viele, jedoch lange nicht alle, denn am 19ten erschienen sie von Neuem in ungeheurer Menge, so dafs an Aileen und im Walde die Äste unter der Last der daran hängenden Käfer sich im strengsten Sinne des Wortes beugten. Bis zum 18ten Juni erschienen und verschwanden sie abwechselnd. Dann verminderten sie sich merklich, waren aber selbst in den ersten Julitagen noch nicht ganz fort, ja ich fand einzelne, die noch unabgelegte Eier bei sich trugen und die eingesperrt auch wirklich noch ablegten.

getroffen wurden, sich so vermindern, daß ihr Flugjahr nicht wieder einigermaßen ausgezeichnet sein sollte. Nach und nach kauu dies allerdings unmerklich werden, während ein andrer Jahrgang dagegen sehr begünstigt und nun herrschend wird. So erinnere ich mich der Jahre 1820, 1832 und 1836 nur und diese liegen in einer und derselben Folge, d. h. die Voreltern des diesjährigen Fluges waren wahrscheinlich die zahllosen Schaa ren von 1820.

2) Von dem Fraße und dessen Erkennung. Der Maikäfer frisst als Larve und als Käfer. Der Käfer frisst die Blätter der meisten Holzgewächse, besonders der Laubbölzer, unter welchen ihm Birken, Eichen, Pappeln, Ebereschen, Ahorne und Buchen, das Steinobst und die Wallnutsäume die liebsten sind. In unserm Forstgarten, welcher die verschiedensten Holzarten beisammen enthält, konnte ich recht deutlich sehen, daß sie von größern Sträuchern und Bäumen nichts verschmähten, höchstens die Traubenkirschen (*Prunus Padus*), an welchen ich sie nie sitzen sahe. Selbst Fichten- und Lärchen-Nadeln, besonders die letztern, fraßen sie, wenn ich ihnen im Zwinger nichts andres gab, aber Kiefern rührten sie durchaus nicht an. Allerdings sieht man sie im Mai hier und da häufig auf Kiefern, dann gehen sie aber nur den männlichen Kätzchen nach, welche sie, besonders wenn dieselben noch nicht ganz aufgeblüht sind, gern befressen. Von Hrn. v. Pannewitz erfahre ich noch, daß die Käfer im Frühjahr 1837 ganze Lärchenbaum-Districte bei Ratibor kahl abgefressen hatten, ja daß sie sogar auf Weistannen gegangen waren, obgleich Saalweiden und andre Laubbölzer sich in deren Nähe befanden. Sehr eigenthümlich ist, daß mau sie nie an niedrigem Gesträuch (mit Ausnahme der Rosen) und noch weniger an Kräutern fressen sieht. Nur einmal habe ich davon gehört, daß sie den Raps kahl gefressen hatten, aber in einer Gegend, wo es durchaus an Bäumen mangelte. Hr. Suffrian giebt hier noch einen interessanten Zusatz. Im Mai des großen Maikäferjahres 1832 gieng er an einem sehr heißen Tage von Aschersleben nach Stalsfurt. Auf dem ganzen, etwa 1½ Meilen langen und stets durch Ackerfelder führenden Wege war damals kein Baum vorhanden. Dennoch fanden sich auf der Mitte des Weges in einem blühenden Rapsfelde zahllose Maikäfer. An jeder Pflanze hingen deren mehrere, zuweilen 8-12, so daß selbst die stärksten Pflanzen sich beugten und die untere Hälfte derselben schon fast ganz kahl gefressen war. Zwischen den einzelnen Pflanzen war der Boden mit herabgefallenen, zum Theil umherkriechenden Käfern, mit Flügeln, Beinen und andern Bruchstücken bedeckt, zwischen denen zahlreiche Exemplare von *Carabus auratus* umherliefen und bald hier, bald da, oft 3-4 zugleich, einen Maikäfer ergriffen und anfrassen. Die Maikäfer wurden von ihren Feinden stets zuerst am hintern Ende des Rumpfes angegriffen, letztere suchten jenen mit dem Kopfe unter die Flügeldecken zu kommen, hoben dieselben in die Höhe und bissen die Flügel an der Wurzel ab, dann ward der Rumpf von obenher ausgefressen und der untere, härtere Theil (Brust und Bauch) blieb meist unangerührt liegen. Der Koth, welchen man unter den von Käfern befressenen Bäumen findet, besteht aus kleinen, ganz dunkelgrünen, fast schwarzen Krümeln, und es sieht so aus, als wären Pulverkörner ausgestreut worden. Der Fraß der Larven zeigt noch viel mehr Abwechselung. In den beiden ersten Jahren ihres Lebens nähren sie sich noch von zarteren Pflanzentheilen: im ersten, wie schon erwähnt, wahrscheinlich von der im Boden zerstreuten, halb aufgelösten Pflanzenfaser, von Moder oder Mist. Das glaubt man daraus abzunehmen, daß die Mutterkäfer so gern in gemisteten Boden legen und daß man die jungen Larven sich öfters nach Misthaufen hat zusammenziehen gesehen; Hr. Plieninger (*Maikäf.* S. 79.) behauptet sogar, daß der Engerling vorzugsweise auf die faulenden Theile des thierischen Düngers angewiesen wäre und daß er die Pflanzenwurzeln bloß dann angreife, wenn der Dünger im Boden aufgezehrt oder völlig mit dem übrigen Boden vermengt sei. In der That eine überraschende Erinnerung an die Mistkäfer, denen also diese Blattfresser doch wenigstens in der Jugend in Hauptcharacterzuge der Lebensweise ähnlich sind! Wie schon öfters erwähnt, ich habe sie am Ende des ersten Sommers mehrmals ausgegraben, aber an den Gewächsen (Blaubeeren



und Heidekraut), deren Wurzeln sie dicht umgaben, nicht die geringste Verletzung bemerkt. Rösel (Th. II. Cl. 1. S. 4.) gab ihnen im ersten Jahre Rasen und im zweiten Erbsen-, Linsen- und Salat-Pflanzen, es ist aber auffallend, daß sie, wie man aus seiner Abbildung sieht, so langsam wuchsen, besonders im ersten Jahre. Der große Schaden, welchen man die Engerlinge anrichten sieht, geschieht immer erst im dritten und vierten Sommer. Dann haben sie eine so ansehnliche Länge und Dicke und so kräftige Mundtheile (wovon man sich durch den hingehaltenen Finger überzeugen mag), daß ihnen keine Wurzel zu fest ist. Wurzeln von der Dicke eines Strohhalmes und darüber beißen sie am Ende ganz ab und benagen sie dann an ein- bis zweijährigen Pflanzen meist bis an den Wurzelknoten hinauf, so daß man die Pflanze mit der leisesten Berührung aus dem Boden nimmt. Begnügen sie sich mit der Wurzelspitze, so erhält sich das Pflänzchen öfters durch Ernährung mittelst der Seitenwurzeln und selbst das Ende der Pfahlwurzel verharren und treibt von Neuem, jedoch so, daß man die verletzte Stelle noch lange erkennt. Solche Pflanzen geben sich doch immer durch ein kränkliches Ansehen, ein mattes Grün, zu erkennen. Giebt man genau Achtung, so sieht man, wie sich solche Pflanzen öfters hin und her bewegen und fährt man mit der Hand unter, so wirft man den Fresser heraus. Bleiben die, ihrer ganzen Wurzel beraubten, Pflanzen im Boden, so welken sie natürlich schon nach einigen Stunden und verdorren später, wodurch sich der Feind verräth. Von Hrn. Eyber erhielt ich 1 Fuß lange Birkenpflanzen, deren Seitenwurzeln ganz abgebeissen und deren übrige Enden auch noch benagt waren. Hr. Saxen bemerkte sie auch zwischen den Wurzeln junger Fichten. Befressen sie die Wurzelsfasern großer Bäume oder Sträucher, so zeigt sich die Wirkung auch daran bald durch das Welken der jüngsten, krautigen Triebe. So machte mich Hr. Bouché in seinem Garten einst auf einige kräftige Apfel- und Birnbäume von 25-30' Höhe aufmerksam, an welchen die jungen Triebe rings herum an der schönen Krone trocken heruntergingen und aufs Deutlichste zeigten, daß die entsprechenden jüngsten Triebe der Wurzel benagt waren. Aber auch an der Pfahlwurzel alter Bäume und alter und junger Sträucher bis nach dem Wurzelknoten hinauf nagen sie, wie ich das öfters an jungen gepflanzten Buchen und Eichen, auch an fünf- bis sechsjährigen Kiefern, so wie an Kirschbäumen und Pflaumenbäumen, auch am Weinstock gesehen habe. Man glaubt beim ersten Ausblicke solcher Verletzungen, sie rühren von Mäusen her, bei genauerer Betrachtung aber sieht man, wie die unregelmäßig zerbißenen Fasern herumhängen und keine Spur der glatten Mäuse-Nagezähne zu finden ist. Dringen sie bis zum Wurzelknoten vor und nagen sie hier rings herum, so gehen die Stämme ein. Man hat an einem einzigen so befallenen Baume schon einmal beinahe eine ganze Metze Engerlinge gesammelt. In Gärten bemerkte man sogar, daß sie nicht bloß die Wurzeln der Rosensträucher benagt hatten, sondern auch die Stöcke, an welchen sie angebunden waren. Mit den Wurzeln der nicht Holzigen Pflanzen werden sie noch leichter fertig und an diesen richten sie die größten Verheerungen an, besonders am Roggen, Salat, Hanf, Raps, Kohl, Klee, an Kartoffeln, Erbsen, Linsen, Erdbeeren, Zwiebeln u. dergl. Noch ausgebreiteter sind hier und da die Verheerungen an den Graswurzeln (vielleicht frisst an diesen auch noch eine andere Art?), denn man hat schon auf den ausgedehntesten Wiesenflächen die Grasnarbe in der Tiefe von 3-4' unterminirt gefunden, so daßs man bei jedem Schritte einsank. An solchen Stellen wurden schon 10-12 und noch mehr Engerlinge auf den Quadratrufs gezählt! Man hat sie selbst an den Wurzeln von Topfgewächsen nagend gefunden.

BEDEUTUNG FÜR DEN FORST, FÜR GARTEN UND FELD. Wenn auch nur die Beschädigungen der Käfer am Laube und an den Blüten der Bäume bekannt wären, der würde das Thier schon als merklich schädlich ansprechen, indem die Bäume, welche nach Johanni wieder treiben, danach zwar nicht ausgehen, aber doch im Zuwachse etwas zurückkommen und oft ihre Früchte einbüßen. Wer aber auch den Fraß der Larve einmal beobachtet hat (s. d. vorhergehenden Absatz), wird das Insect für sehr schädlich halten, ja wir können hinzufügen, in unsern Gegenden für das allerschädlichste, denn nicht allein

der Forst wird durch dasselbe sehr häufig und an vielen Orten empfindlich heimgesucht, sondern auch Gärtner und Landmann kennen keine größere Plage. In den Jahren 1835 und 1836 hatte man die beste Gelegenheit, diese Verheerungen zu studiren. Von allen Seiten unsers Vaterlandes liefen zugleich die Klagen ein, daß die Kiefern-Culturen und Saatbeete, ja selbst Birken-, Eichen- und Buchenpflanzungen von den Engerlingen zerstört würden. Große Kosten und viele Mühe und Arbeit waren vergeblich aufgewendet, und Mauchen, der den wahren Feind nicht sogleich erkannte, ward wohl noch der Kummer, glauben zu müssen, der Schade sei durch seine Schuld herbeigeführt. Von Hrn. v. Meyerück höre ich, daß in der Kolbitzer Heide an 1000 Morgen sechs- bis siebenjähriger Kiefern verheert worden sind. In unsern Instituts-Forsten wurde i. J. 1835 eine sonst ganz vorzügliche Buchenbesamung hart mitgenommen, mehrere schön gelungene Kiefernplantagen wurden vernichtet, Saatkampe wurden sehr gelichtet, lückig u. s. f. (s. auch Pfeil *crit. Bl.* X. 1. S. 101.).

**BEGEGNUNG.** Ehe wir noch die Mittel betrachten, welche dem Menschen gegen Maikäferplagen zu Gebote stehen, wollen wir:

I. die von der Natur selbst angewandten erwägen. Leider scheint sie dies Thier mehr als andre zu begünstigen, denn die Larven und Puppen werden nicht von so zahlreichen Feinden wie oberirdische verfolgt und sie sowohl wie die Käfer sind lange nicht so empfindlich gegen climatische und meteorische Einflüsse wie andre Insecten. Ichneumonem habe ich weder in Larven noch Puppen bemerkt, wie denn überhaupt diese merkwürdigen Thiere nur über der Erde zu leben scheinen. Dagegen scheinen sie von einer Fliege (zur Gattung *Leptis* gehörig) zu leiden, deren Tönnchen (merkwürdig!) ich einigemal an toten Maikäfern zwischen Halsschild und Kopf hervorkommen sahe. Wahrscheinlich zerstören Laufkäfer-Larven eine Menge Engerlinge. Vom Maulwurf weiß man dies gewiß und die blinde Vertilgungswuth, welche man gegen denselben noch immer so häufig übt, verdient großen Tadel. Man sollte diese nützlichen Thiere im Gegentheil überall da, wo es irgend zulässig ist, schonen. Hr. Plieninger macht darauf aufmerksam, daß die Larven sich öfters zum Winter nach größeren Erdhöhlen (verlassenen Bauen von Mäusen, Wiesel u. dergl.) hinzögen und daß sie wahrscheinlich auch eben so oft in die Maulwurfs-Canäle sich begäben, wo sie dann gemächlich von den Bewohnern gespeist würden (s. Vertilgung). Die Vögel, welche sie gern fressen, besonders Krähen, Staare, Lerchen, Bachstelzen können, sie nur erreichen, wenn sie dicht unter der Oberfläche fressen. Dann störe man aber diese nützlichen Vögel ja nicht, wie jener, der die Krähen<sup>er</sup> keiner Wiese durch Vogelscheuchen vertrieb, weil er glaubte, sie zerstörten ihm durch das unaufhörliche Hacken mit dem Schnabel das Gras! Gegen die fliegenden Käfer zieht allerdings eine desto größere Schaar von vier- und zweiflügeligen Feinden, wie auch wieder die Krähen und überdies die Sperlinge, Würger (*Lanius*), Spechte, Ziegenmelker (*Caprimulgus*), sämtliche Tag- und Nacht-Raubvögel (*Falco*, *Strix*), viele Sänger und Meisen, die Fledermaus, der Fuchs, Marder, Dachs, Igel, selbst die zahmen Enten, Hühner und Pfauen, auch Frösche und Schlangen, zu Felde, allein das will doch am Ende nicht viel sagen gegen die ungeheuren Schwärme, in denen die Käfer erscheinen, und dann sind überdies die meisten gefressenen Männchen oder halbtode, die sich vor Ermattung nicht mehr vom Boden erheben können. Die Weibchen bringen ihre Eier immer sehr bald in Sicherheit, so daß die Vertilger über diese am wenigsten Gewalt haben. Einer meiner Zuhörer, Hr. v. Scheele, erzählte mir, er habe einst auf der Gallerie des Doms zu Halberstadt eine so unermessliche Menge von Maikäferflügeln gefunden, daß man in denselben förmlich waten mußte. Sicher rührten diese von solchen Käfern her, welche Krähen und Dohlen, die gern zu Hunderten in dergleichen alten Thürmen hausen, hierher verschleppten. Was nun die Witterungs-Einflüsse betrifft, so kann man auf diese allerdings bei den meisten andern Insecten Gewicht legen, aber beim Maikäfer weniger. Im J. 1836 haben wir gesehen, wie schon oben erwähnt, daß die Käfer durch den großen Witterungs-Wechsel und harte Nachfröste sich nicht

abhalten ließen, wieder zu kommen, sobald das Wetter besser wurde. Dies, wie auch mehreres Andre, spricht sehr gegen die gewöhnlich angenommene Empfindlichkeit der Käfer. So ist mir z. B. noch kein Käfer vorgekommen, der so schwer durch Weingeist oder Äther zu tödlen wäre, als der Maikäfer, der Wochen lang in festgetretenen Erdgruben, oder an Nadeln gespiest leben könnte. Die Larven zeigen mehr Empfindlichkeit, aber auch immer gewis nur unter Umständen, und im Ganzen bestimmt weniger als andre Insecten-Larven. Su sollen starke Überschwemmungen den Larven schaden, weil sie durch das Wasser, gleich wie durch Öl, am Athmen behindert würden, und die Puppen tödten, weil sie sich nicht vor der Nässe retten und tiefer gehen könnten. Hr. v. Meyerinck versichert uns aber in einem Schreiben vom Mai 1836: „Über die Meinung, daß im Inundationsgebiete der Flüsse kein Maikäferfraß Statt finden könnte, bin ich jetzt ganz enttäuscht worden, denn „der District, welchen die Maikäfer jetzt abgefressen, hat noch kurz zuvor vier Wochen unter Wasser gestanden.“ Hr. Plieninger sagt unter Andern: „In Württemberg hat man eine Menge Larven lebendig auf dem Wasser treiben gesehen und ich selbst sahe diejenigen, welche ich in Blumentöpfe gebracht hatte, nach starken Regengüssen auf dem im Topfe gesammelten Wasser schwimmen und „sich wieder eingraben, nachdem dem Wasser Abfluß verschafft worden war.“ So sollen sehr trockne, dürre Jahrgänge eine Menge von Engerlingen tödten, weil sie sich in den trocknen, harten Untergrund nicht tiefer eingraben und vor dem Austrocknen retten könnten. Kann es aber trocknere Jahre, wie die von 1834 und 1835 geben? Gras und Kräuter verdorren, selbst in den wasserreichsten Gebirgsgegenden entstand Futtermangel und Stillstand der Mühlen, und dennoch hörte man nie größere Klagen über die Engerlinge als damals und nie kann es größere und verbreitete Maikäferflüge als 1836 gegeben haben. In Württemberg soll i. J. 1836 die Trockenheit und Hitze im Juni und Juli den Käfern sehr verderblich gewesen sein. (*Corresp. Jahrg. 1836, S. 33.*) So schadet auch die stärkste Kälte den Larven und Puppen nicht, wenn sie nur tief genug liegen, wogegen sie erfrieren, wenn sie der Oberfläche nahe liegen und besonders durchnäßt einfrieren. Hält die Kälte aber lange an, so ist das wohl tödtlich für sie. Rüssel (a. a. O. S. 5.) fand im Jahre 1740, in welchem der Juni noch Schnee und Eis auf den Feldern traf, in welchem ein Flug hätte Statt finden sollen, aber nicht eintrat, nur im Juli und August einzelne Käfer. Ohne Weiteres können wir daher solche Witterungseinflüsse nicht als zerstörend für sie betrachten, sondern nur unter gewissen Umständen, die uns aber leider noch nicht recht klar sind, Hülfe von ihnen erwarten. Wahrscheinlich werden die sehr trocknen Jahre höchstreich sein, wenn sie die Larven im ersten und zweiten Jahre, wo sie sich noch nicht so tief eingraben, ereilen; ferner wenn Überschwemmungen länger dauern, oder nasse Jahre zur Zeit der größten Gefräßigkeit der Larven eintreten und diese nöthigen, sich tiefer in die Erde zurückzuziehen und längere Zeit zu fasten, u. dergl. Eben so wenig kann man sich darauf verlassen, daß die Mutterkäfer immer nur an Anhöhen und auf freien sonnigen Plätzen ablegen. In der Regel thun sie dies am liebsten, sie legen aber auch, wenn sie die Noth zwingt, auf ausgedehnten Niederungen, in der Nähe von Brüchern, wie in dichten Laubholz-Beständen.

II. Der Mensch muß also selbst Hand anlegen (\*), wie bei allen großen Insectenverbreitungen. Es fragt sich nur, wo anfangen? Nach einer Generalregel: wo man mit der geringsten

---

(\*) Man muß aber die Mittel, welche dem Forstmanne zu Gebote stehen, besonders wenn sie das Vertilgen der Engerlinge betreffen, wohl von denen unterscheiden, welche der Landmann und der Gartner noch mit Erfolg anwenden kann. Diese haben es gewöhnlich mit kleinen, leichter zu übersiehenden Flächen zu thun, ihre Wirthschaft bietet ihnen schon eher Stüffe, welche zur Vertilgung gebraucht werden können, u. dergl. Davon redet Hr. Plieninger (*Maikf. S. 56-79.*) sehr ausführlich und es wird desseu beachtenswerthe Schrift, wegn ich hier auch das Wesentlichste

Mühe die größtmögliche Menge von Thieren vernichten kann. Das ist nun beim Maikäfer offenbar zur Flugzeit. Von jeher hat man dies erkannt und immer ist man wieder auf dies Mittel, die einzige Radicalcur, könnte man sagen, zurückgekommen, und hat gesammelt, aber — leider doch noch nicht oft genug. Die verständigen Alten (s. Krünitz *Encycl.* S. 240), schlugen schon vor, dies von Obrigkeit wegen durch Bettler und Kinder und überhaupt durch müßige, oder zu andern Arbeiten untaugliche Personen besorgen zu lassen, woran aber, wie sie hinzusetzen, an solchen Orten, wo man nur bei dem alten Schlandrian stehen bleibt und jedem Dinge seinen Lauf läßt, nicht zu gedenken ist. Hoffentlich wird man uns diesen Vorwurf nicht mehr lange machen. Auch Hr. Pfeil (*Crit. Bl.* X. 1. S. 140.) erklärt sich für das Sammeln im Forste. Leider hört man gegen das Sammeln so vielerlei Einwendungen

mittheile, von jedem Landmann und Gärtner selbst aufmerksam zu lesen sein. Einzelne werthvolle Bäume soll man während der Flugzeit mit zerfallnem, gebranntem Kalk bestreuen. Man gründet diese Maßregel auf die Erfahrung: daß stark bestaubte Alleeabäume nicht von Maikäfern befallen würden (?). Auf leichten Ackerboden wird zur Flugzeit schwerer Boden als Mergel, Straßenkoth, Teichschlamm aufzufüllen und gleichmäßig zu verbreiten sein. Er hält die legenden Thiere, welche den lockersten Boden suchen, ab, und wird nachher untergepflügt. Jedenfalls würden noch wirksamer sein: Die ätenden oder narkotischen Abgänge von Salpetersiedereien, Talackfabriken, Torf-, Steinkohlen- und Holzasche, die bei der Wasche gebrauchte Lauge, Ofenruß, Mistjauche u. dergl., welche auch zugleich den Boden vortreflich düngen. Bewässerung der Wiesen, wo man darauf eingerichtet ist, muß zur Flugzeit die Käfer am sichersten abhalten. Das Überstreuen einer dichten Schicht von zerstoßnem Gyps auf Gartenflächen hat sich nicht bewährt. Die Anwendung von Kalkwasser dürfte, so nützlich sie auch für diesen Zweck ist, doch manches andre Bedenken in agronomischer Hinsicht erwecken. Auch ein Gemenge von Pflanzensaft mit  $\frac{1}{2}$  gestoßener und klar gesieberter Kohle wird ziemlich sicher die Engerlinge und zugleich auch die Weizen abhalten (*Krünitz Encycl.* S. 240.). Unter den Mitteln zur Zerstörung der Engerlinge selbst steht wohl ein vorzügliches Überführen des Mistes über Gärten und Felder oben an, denn man hat die unumstößliche Erfahrung gemacht, daß die Engerlinge sich gern nach dem Stalldünger, besonders wenn er in Composthaufen geschichtet liegt, hürziehen, oder daß die Mutterkäfer wohl gar hier legen. Breitet man diesen nun zur Zeit der strengsten Winterkälte über den Boden aus, so werden die dadurch bloßgelegten Larven, so viel Kälte sie auch in ihren schützenden Erdhüllen aushalten könnten, erfrieren. Dabei würde auch manches Nest entdeckt und zerstört werden können. Schweinemist soll besonders anziehend für Insectenbruten sein. Haben sich die Engerlinge einmal über die Felder verbreitet und merkt man ihre Gegenwart an dem Verbleichen des Korns, der Hackfrüchte u. dergl., so säume man nicht, je eher je lieber umzuapfen oder umzugraben und die herausgebrachten Larven gleich hinterher aufzusammeln zu lassen. Dann tettet man doch etwas, d. h. man vertilgt die Fresser der nächsten Jahre und kann, wenn es nicht schon zu spät ist, das Feld noch mit einer schnell reifenden Fruchtart, mit Futterpflanzen u. dergl. besamen. Auf kleinen Flächen würden Schweine die Dienste des Auswühlens leisten können. Die Meinung, daß ihnen die Engerlinge schaden, erklärt Hr. Plieninger (S. 61) für ganz ungründet. Nur solle man sie nicht zu sehr und zu lange der Hitze aussetzen und nicht ohne Saufen lassen, auch nicht ganz allein mit Engerlingen füttern. Die Anwendung von Lauge, Kalkwasser u. dergl. ohne Flüssigkeiten, ist nach Hrn. Plieninger nicht vortheilhaft, weil die Engerlinge dadurch nicht sicher getödtet werden, sich im Gegenheil tiefer zielen, und diese Maßregel auch im Großen zu kostspielig wäre. Bei vollständiger und ausgedehnter Verheerung der Wiesen wird ebenfalls Umbrechen der Grasnarbe und Aufsammlen der Larven gerathen. Ist die Verwüstung nicht total, so hebe man den (ohnein schon durch den Frass aufgelockerten) Rasen ab, sammle die Larven und setze ihn wieder auf und trete oder walze ihn fest, gieße ihn auch, wenn es angeht oder die Operation sich nicht während eines Regens vornehmen ließe, an. Auch die Brackacker, Viehtriften und Anger wird man nicht außer Acht lassen dürfen, weil, wenn auch hier die Larven nicht so viel schaden, doch ein Heerd der allgemeinen Käferverbreitung entsteht. In Gärten werden so ziemlich dieselben Maßregeln zu nehmen sein, d. h. man sei vorsichtig mit der Verteilung des Mistes, man grabe bei Zeiten um, wenn der Frass merklich wird, und verpflanze, was sich verpflanzen läßt, man lege Erdböhlen, in welchen sich die Engerlinge sammeln und leicht herausgenommen werden können, an (s. S. 73.), die so fest sein könnten, daß sie viele Jahre aushielten, man nehme Erdmüngung und dergl. vor. Auch hat man für Gärten und Weinberge das Anpflanzen von Gewächsen vorgeschlagen, welche den Käfern und Larven ungenehm sind und sie von den nützlichen Gewächsen ableiten könnten, z. B. Erdbeer- und Salzpflanzen, Weiden-Einfassungen. Hr. Plieninger (S. 76.) hält die übertriebenen Düngungen, besonders mit Stalldünger, den Weinbergen in dieser Hinsicht verderblich und rath zu einer Compostdüngung aus Pflanzensabfall.

machen, obgleich doch nicht eine einzige gültig ist. Der eine findet es verächtlich, sich mit Maikäfersammeln, dem gewöhnlichsten Kinderspiel, abgeben zu sollen! Ein andrer behauptet geradezu, es ginge nicht, die Thiere zersreuten sich zu weit (allerdings wird man nicht den letzten vertilgen, aber wenn man auch nur einen Theil, auch nur die Hälfte, was leicht wäre, vertilgte, so wäre schon viel gewonnen), ein dritter: es wäre ja noch ungewiß, ob überhaupt die Brut diesesmal durchkäme, es wäre ja, wenn diese da sei, immer noch Zeit genug, zu vertilgen. Die Brut gedeiht aber allermeist gewiß (s. S. 79.) und die Vertilgung ist dann viel mühsamer, kostspieliger und ungewisser!! (s. auch noch am Ende die Vorurtheile). Ich gebe zu, daß diese Maafsregel des Sammelns im Ganzen viel wichtiger für den Landmann und Gärtner ist, welcher an den einzeln stehenden Bäumen der Gärten, Wege und Parks leichter absammeln kann und der auch immer einen sichern Gewinn davon hat, indem die einen oder andern seiner Produkte gewiß zu Grunde gegangen wären. Niemand wird aber auch glauben, ich wolle den ganzen Wald ablesen und Jeder wird einräumen, daß, wenn es sich nur um einzelne Orte handelt — und man kann die Käfer ja, wie oben gezeigt, isoliren — deren Säuberung nicht schwer und wohl ausführbar sei. Ich meine nur die Säuberung solcher Orte, in welchen ein Aubau vor sich gehen soll, also besonders die Pflanzengärten, Plantagen, in welchen Saatkämpfe angelegt werden sollen, allenfalls auch die Ränder der Schläge, auf denen man Culturen, Saatkämpfe oder natürliche Besamungen vornehmen will, denen die Engerlinge am meisten schädlich sind, während man sie im geschlossenen Bestande, wo sie sich durch Benagen der äußersten Wurzelsfasern ernähren, kaum bemerkt. So haben wir in unserm Forstgarten die Engerlinge nur auf den Kiefern-Saatbeeten bemerkt und als die Fresser entfernt waren, hatten wir Ruhe. Man hätte meinen sollen, es wäre nun kein Engerling mehr auf dem ganzen Garten zu finden gewesen, und doch schwärmen hier nachher unzählige. An den Rändern ziehen sich alle Käfer zusammen, sowohl die etwa schon auf dem Schläge ausgekommenen, wie auch die im Innern des hohen Holzes entwickelten, welche, wenn sie aufs Freie gehen und legen wollen, immer vorher noch einmal auf den Randbäumen Halt machen, hier also nach und nach erreicht werden können. Hände zu dieser Arbeit werden sich immer genug finden. Meistens hat man zu dieser Zeit noch Cultur-Arbeiter in der Nähe, oder auf den Schlägen werden Eichen geplättet. Wäre dies auch nicht, so sind ja zu diesem Geschäft selbst die schwächlichsten Subjecte aus den benachbarten Dorfschaften zu gebrauchen. Die Käfer lassen sich, so lange noch Thau an ihnen hängt, am leichtesten abschütteln und klopfen. Man lasse dann aber das Sammeln jeden Morgen wiederholen, von der Zeit an, daß sich die ersten Käfer zeigen (also von Ende Aprils an) bis daß sie sich nicht mehr merklich vermehren (also gewöhnlich bis Ende des Mai). Dann ist man gewiß, daß die trätägigen Weibchen fortgeschafft werden. Wollte man warten bis zu der Zeit, daß sich die größte Masse der Käfer zeigt und dann vielleicht einige Tage um und um mit größter Macht sammeln lassen, so wäre dies lange nicht so zweckmäßig, denn eine große Menge Weibchen, welche eben in die Erde gegangen wären, würde man gar nicht mehr finden oder wohl gar schon von Eiern entleerte sammeln. Beim Sammeln gebraucht jeder Arbeiter nur einen Stock und einen Kober oder Sack. Mit dem Stock klopft er an die Zweige, die er nicht erreichen kann. Schwache Stämme stößt man mit der Hand an. Schon die geringste Bewegung stürzt die Käfer herunter. An den starken Bäumen muß man sich mit Abklopfen der erreichbaren Äste begnügen, an denen sich auch die Käfer, so lange die Nächte noch kalt sind, besonders versammeln. Wird es wärmer, so schwärmen sie bis zum Gipfel und es ist wenig zu machen. Da die Käfer so groß sind, so kann man sie auch an der Erde sehen und auflesen. Leichter macht man es sich allerdings, wenn man unter einem abzuklopfenden Zweige ein großes Tuch ausbreitet. Die abgeschüttelten Käfer dürfen aber nicht gleich zertreten werden, denn dabei entkommt so mancher und das Zertreten in weichem Boden ist nicht so leicht, auch hat man keinen Maafsstab, wie viel ein jeder Arbeiter geleistet hat. Gewöhnlich zählt man ja auch nach der Quantität der gesammelten Käfer. Im Würtemb. Oberamtsbezirk Cannstadt zahlte man i. J.

1836 für den Simri 12 Kr. Prämie. Wo hinein nun aber sammeln? Die Käfer sind sehr beweglich und wenn man eine Schachtel oder dergleichen nehmen wollte, so würden, während man zehu durch den geöffneten Deckel hineinsteckt, hundert herauskriechen. Den Insectensammlern geht es auch mit ganz kleinen Thieren so und da hilft man sich denn mit einer Art, oben durch einen Kork verschlossen, Trichters, welchen man durch den Deckel des Gefäßes so hineinsteckt, daß das Ende desselben in letzteres weit hineinragt. Dieses findet dann so leicht kein Insect und man kann den Kork dreist öffnen und hineinstecken so viel man will. Zum Maikäfersammeln könnte man nun am besten einen Kober nehmen, durch dessen Deckel man einen, vielleicht von Birkenrinde gedrehten Trichter einbrächte, der oben durch einen Graspfropf verstopft wird. In den Säcken klawmern sie sich mit den Haken zu fest an. Vorzuziehen würden diese dann sein, wenn man die Käfer mit kochendem Wasser tödten wollte. Nach der Ablieferung der Käfer tödtet man dieselben am besten gleich durch Zerquetschen zwischen Brettern oder Steinen. Es ist eben so schwer und unsicher, sie zu ersäufen als sie zu vergraben. Sie sind außerordentlich zählebzig und es erzählte mir einmal Jemand, er habe eine Metze Käfer, die in seinem Garten gesammelt worden seien, in ein 6-8" tiefes Loch eingegraben und dasselbe mit den Füßen tüchtig fest getreten. Nach sechs Wochen habe er doch sehen wollen, was aus seinen Käfern geworden sei und zu seinem Erstaunen bemerkte er nach dem Aufgraben, daß sie noch alle lebten! So manche Kleinigkeiten, die beim Sammeln noch zu berücksichtigen sind, ordnet sich ein Jeder selbst. Ist die Vertilgung der Käfer versäumt worden, so wird die Gefahr größer und die Hilfe schwerer. Man muß die etwa noch anwendbaren Mittel, um die Larven zu vertilgen, nach der Localität abändern. Man wird gewöhnlich nicht eher aufmerksam, als bis schon Schaden geschehen ist (\*). Auf Saatkämpfen bemerkt man ihn erst dann, wenn die zuerst befreiten Pflänzchen braun werden, das ist etwa schon nach 3-4 Tagen. Dann gebe man nur Achtung, wo sich zunächst ganz frisch welkende Pflänzchen zeigen, und da fahre man mit der Hand unter. Ein Arbeiter gewinnt darin bald so viel Übung, daß er die Larve heraushebt, ohne viele Pflanzen dadurch mit zu heben, die dann ja auch leicht wieder eingedrückt werden können. Dem Engerling wird das Fressen von einer Pflanze zur andern durch die regelmäßigen Reihen derselben sehr leicht, aber auch dem Arbeiter das Nachsehen. Man erstaunt, wenn man oft schon nach einigen Tagen, nachdem einige Schocke Engerlinge entfernt sind, Ruhe hat, während man aus dem Fraße auf den Beeten Legionen vermuthete. Sind die Verwüstungen schon allgemein geworden, so breche man lieber den ganzen Kainp um und sammle die Engerlinge. Einmal zerstört man diese dann aus dem Grunde und dann sind gewöhnlich noch viele Pflänzchen zum Verpflanzen tauglich. Sonst würde man gar nichts retten und den Kainp auch nicht einmal zum nächsten Jahre gebrauchen können. Im dritten und vierten Fraßsommer und zwar im Mai und Juni des Morgens und Abends (s. Lebensart S. 66.) muß man am aufmerksamsten sein. Auf den Culturen und in den Besamungsschlägen ist es noch schlimmer, denn hier ist das Revidiren schwieriger, und man kann nicht einmal recht viel thun. Auf den Culturen bemerkt man an einer Pflanze immer erst die Gegenwart der Engerlinge, wenn dieselbe schon tödtlich verletzt ist. Anfangs welkt sie bloß, später werden die Blätter oder Nadeln mehr oder weniger gelb, je nachdem die Wurzeln stärker oder schwächer verletzt wurden. Dann bleibt nichts übrig, als die Pflanze (die oft schon beim Anfassen zwischen den Fingern hängen bleibt) herauszunehmen und einige Spatenstiche Erde herauszuwerfen, in welcher man den Fresser allermeist

(\*) Hr. Pflieninger hat, auf die, S. 81. mitgetheilte Erfahrung gestützt, hier und da Versuche mit künstlich angelegten Erdhöhlen (mit etlichen Steinplatten in der Tiefe von 1', bis 2') machen lassen. Man fand schon Ende Octobers in diesen Höhlen Engerlinge und sogar schon vollkommene Maikäfer zu Dutzenden versammelt und konnte sie auf diese Weise leicht herausnehmen und zerstören (Maik. S. 37.). Im Kleinen wäre die Anwendung dieses Mittels sehr zu rathen. Auf den Morgen würden 10-12 solcher Höhlen genügen (Maik. S. 74.).

gleich sehen wird. Dies ist durchaus nöthig, denn sonst geht es den nun frisch eingepflanzten Stämmchen wie den alten. Die Engerlinge gehen von einem solchen Pflanzloche nicht fort, weil sie hier lockern Boden haben, rings umher aber einen festen Wurzelfilz finden, den sie nur ungerne durchdringen. Auch ist es nicht gut, die alten, welkenden Pflanzen eher herauszunehmen, als bis man nachpflanzt, denn man erhält die Larven um so sicherer in dem Loche, während sie sonst doch wohl weiter gehen könnten. Oft sieht man ganz verdorrte Pflanzen und wenn man nachgräbt, sitzen doch noch die Larven (oft bis 4) in dem Pflanzloche. Wahrscheinlich begnügten sie sich auch mit den verwesenden Wurzelresten der Pflanze. Beachtet man dies, so wird man doch wenigstens nach dem Nachbessern Ruhe haben. Noch schlimmer ist es in den älteren Eichen- und Buchenschonungen. Die Larve kann nicht die ganze Wurzel abbeissen und die Pflanze kränkelt nicht so merklich, stirbt aber im andern Jahre doch ab. Das Nachbessern kann hier also erst später vorgenommen werden, meist dann, wenn die Larven sich schon zur Verpuppung anschicken, uns also vorläufig nicht mehr schaden. In diesem Falle bleibt also das Saummeln das einzige wirksame Mittel. Eben so ist es auf den Besamungsschlägen. Man muß hier ruhig zusehen, wie ein Pflänzchen nach dem andern hinstirbt, denn wie wollte man die Fresser hier verfolgen und ansehen wie auf Saatbeeten? Wir haben hier selbst die traurige Erfahrung gemacht und sind auch zugleich darüber belehrt worden, daß das gerühmte Eintreiben der Schweine nicht immer hilft. Hr. Pfeil hat darüber schon (*Crit. Bl. X. I. S. 102.*) berichtet. „Im Lieper Reviere der Institutsforsten, sagt er, wurde im Winter 1833 ein dunkler Besamungsschlag angehaufen und vortrefflich besamt, der sehr geschlossen gestanden hatte und in dem man deshalb vorher keine Vegetation fand. Er wurde bei der sehr reichlichen Mast den ganzen sehr weichen Winter hindurch mit Schweinen betrieben, welche den Schlag so tief umwühlten, daß kein, auch noch so kleiner, Fleck blieb, der nicht umgebrochen gewesen wäre. Die Besamung ging auch so dicht auf, daß man den Fuß nicht setzen konnte, ohne Pflanzen zu treffen. Aber schon im Juni wurden dieselben größtentheils von Engerlingen verzehrt, wovon man mit jedem Spatenstiche mehrere herauswerfen konnte. Wenn man dabei noch bemerkte: daß gerade dieser Fleck dicht bei dem Dorfe Senftenhütte liegt, welches eine große Menge Schweine hält, und daß derselbe mit den zunächst gelegenen Forstorten die eigentliche Schweinehütung dieser Gemeinde ist, welche diese Districte von jeher unausgesetzt mit ihrer starken Heerde betrieb, so daß sie jährlich vielmals umgewühlt wurden, so wird dies am deutlichsten beweisen, daß von dem allerdings wohl zu empfehlenden Eintriebe der Schweine keine sichere Hilfe gegen diese Insecten zu erwarten ist.“ Einen schlagenderen Beweis gegen die Unfehlbarkeit dieses Mittels kann es nicht geben. Meiner Meinung nach kann es nur in dem Frühjahr nach dem Verpuppungswinter recht wirksam sein, denn alsdann arbeiten sich die Käfer allmählig hervor und können schon vom Februar und März an, wenn nicht zu strenge Kälte herrscht, von den Schweinen erreicht werden. Außer dieser Zeit wird das Eintreiben dann nur nützlich sein, wenn die Engerlinge nicht weit von der Oberfläche entfernt sind, also im Sommer wenn sie fressen. Leider wird dann nur alle Vegetation mit zerstört. Jedoch dürfte man sich bei einem großen Fraße auch durch diese Rücksicht nicht abschrecken lassen, man würde, wenn auch ein großer Theil der Pflanzen vernichtet würde — der ja auch durch die Larven verloren geht — doch wenigstens die Larven zerstören und ihr Wiederkommen und ihre Verwandlung verhüten. Auch schon früh im Frühjahr wäre diese Maßregel nützlich, da sich die Larven, wie man aus dem häufigen Auspflügen derselben weiß, zu dieser Zeit auch sehr oberflächlich halten und die Buchen erst anfangen zu keimen. Immer ist also der Winter die ungeeignete Zeit zum Eintreiben. Hr. Pfeil macht (a. a. O.) auch noch mit Recht darauf aufmerksam, daß von den wilden Schweinen, in Beziehung zum Maikäfer, noch weniger zu erwarten sein würde, indem diese im Sommer weniger brechen, sondern sich mehr vom Grase nähren oder die Felder beschen. Von Vorbaumungsmitteln wird bei diesen bösen Thieren nicht viel die Rede sein können. Sie sind da, ehe man

es sich versieht und wo man es nicht erwartet. Alle solche Maassregeln, welche man gegen Rinden- und Holzinsecten anwenden kann, helfen hier nichts. Liefse sich eine Cultur-Methode finden, welche den Maikäfern widrig wäre, so würde man damit weit mehr ausrichten können, als durch die Vertilgungsmaassregeln gegen schon vorhandene Larven. Dazu ist bis jetzt aber noch keine Aussicht! Man hat hier und da gefunden, daß die Larven in den Culturen den meisten Schaden angerichtet hatten, wo die Bestände abgeholzt waren und der Boden mehrere Jahre müßig gelegen hatte (Hr. Hennecke). Dies fordert allerdings noch mehr dazu auf, gleich nach dem Abtriebe, besonders wenn derselbe in den letzten Jahren vor der Verwandlung der Maikäfer vorgenommen werden kann, zu cultiviren. Ganz sicher ist man aber auch dann noch nicht, denn wenn die Bestände gemischt sind, enthalten sie fast immer Maikäferbrut und diese überträgt sich dann auf die Culturen. Die hier auskommenden Käfer werden, wenn sie Fraß in der Nähe finden, doch wieder hier ablegen. So liefs sich in unsrer Gegend in mehreren Jagden nachweisen, daß die Larven schon im Boden steckten, also schon, als der Bestand noch geschlossen war, entstanden, und sich nachher in die Pflanzlöcher zogen. Die Zerstörung war dann freilich desto merklicher. Die Sache ist also die, daß wir sie bei der Methode zu cultiviren, bei welcher nur die weitläufig liegenden Pflanzlöcher Pflanzen enthalten, weit eher bemerken, weil der Larve die Zerstörung der Pflanzen viel leichter wird und viel größere Lücken entstehen, während man, wenn mit reichlicher Samenmenge, und ohne Auswahl einzelner Stellen, angebaut wird, den Abgang der gefressenen Pflanzen gar nicht so sehr bemerkt und keine fühlbare Lücken erhält. Zum Schlusse dieses Abschnittes nur noch die Bemerkung: daß es doppelte Pflicht für den Forstmann sei, über die Ausführbarkeit der Vertilgungsmaassregeln, besonders des Sammelns, nachzudenken, weil man schon öfters (s. auch wieder das neueste *Corresp. d. Hürt. Landw. Ver.* J. 1835. S. 34.) auf die, gewis nicht ungegründete, Vermuthung gekommen ist, die Laubwäldungen seien nicht nur als Ableitungen, sondern auch als Hecksstätten für die Maikäfer anzusehen, und den Wunsch von Seiten der Landleute ausgesprochen hat, das Sammeln der Käfer möge auch so viel wie möglich auf die Wäldungen ausgedehnt werden.

Ich hatte bereits die Nachträge zur Lebensweise und Vertilgung des Maikäfers abgesendet, als ich durch die Güte des Hrn. Plüninger noch die neuesten, aus dem Correspondenzblatte des landw. Vereins von 1835 besonders abgedruckten, naturhistorischen Berichte erhielt, aus welchen ich Folgendes heraushebe. In Owen erschienen die Maikäfer in außerordentlicher Zahl, hatten ihren Hauptzeit jedoch immer nur in einem gegen Norden liegenden Buchwalde. Es ist indessen nicht, wie der Berichtersteller vermuthet, anzunehmen, daß sich die Engerlinge in dem Waldboden selbst, einer leichten, schwarzen Erde mit kalkigem Felsengrunde und mit Moos und Waldgras bewachsen, aufhalten, vielmehr ziehen sich die auf Wiesen und Feldern erzeugten Käfer, nach vielfältigen, anderweitigen Berichten in die Wälder. Von Kuchen, wo eine Bewässerung der Wiesen von Michaelis bis in den Januar Statt findet und sonst das Jahr hindurch wiederholt wird, wird dies mit Recht als Ursache angegeben, daß dort nie Schaden durch Maikäfer verursacht werde. Auch von Remingen, Schalkstetten und Unterböhringen wurde berichtet, daß dort nie bedeutender Maikäfer-Schaden vorgekommen sei, wahrscheinlich wegen des festen, geschlossenen Bodens und der Menge dort heimischer, Insectenfressender Vögel. Einer Nachricht aus dem Canton Schwyz zufolge sammelt man schon deshalb die Maikäfer dort eifrig und gern, weil sie, wenn man sie in Gruben mit heissem Wasser tödtet, nach einiger Zeit einen Dünger liefern, der alle bekannten Düngmittel übertrifft. Aus dem Oberamtsbezirk Saulgau wurde gemeldet, daß die Maikäferflüge im J. 1836 (wo sie denn auch bei uns so ungewöhnlich häufig waren) die Luft in einer Höhe von 6-8' über der Erde wahrhaft erfüllten, daß aber der lehmigte oder torfartige Boden überall von ihnen gemieden wurde. Im Oberamtsbezirk Waldsee seien sie dagegen nie in so großer Menge, wahrscheinlich weil hier die zahlreichen Möven ihrer Vermehrung entgegen arbeiteten. Zu Aichtetten soll es sich



sehr nützlich erwiesen haben: auf den angesteckten Feldern 1' tiefe und breite Erdgruben mit Dünger zu füllen und dann die Egerlinge, die sich hierher zusammenzogen, zu zerstören. Im Bodenseegebiet sollen sich die Maikäfer erst in neueren Zeiten in zahlloser Menge eingefunden haben, nachdem die Trockenlegung der dortigen Weider die so überaus nützlichen Möven vertrieben hatte. Als ein seltener Grund, warum zu Friedrichshafen die Maikäfer niemals sehr überhand nehmen, wird angeführt: daß die Käfer während ihrer Flugzeit häufig durch die, gegen Abend entstehenden, Ostwinde in den See getrieben würden (ersetzt also das Sammeln!). Von mehreren Orten wird übereinstimmend gemeldet: daß die Maulwürfe im Stande wären, die Maikäferlarven in Schranken zu halten und sich, wenn sie eine Wiese ausgejagt (d. h. von Egerlingen befreit) hätten, von selbst wieder verlören, ferner auch: daß die Vögel-Jagden, namentlich die Uhn-Mitteln, sich überall verderblich gezeigt hätten.

Leider können wir die Acten über die Unschädlichmachung der Forstinsecten immer noch nicht abschließen. Am wenigsten ist dies vorläufig beim Maikäfer zu hoffen. Indessen sind wir doch auf dem Wege, diesen unangenehmen Thiere mit größerer Sicherheit und ausführbareren Mitteln begegnen zu können, als es bisher geschehen ist, und wir werden darin binnen Kurzem vielleicht noch größere Fortschritte machen. Die von mir in der ersten Ausgabe der Forstinsecten mitgetheilte, ausführliche Darstellung der Lebensweise und der bekannten Vertilgungsmittel hat zu neuen Nachdenken und zu neuen Versuchen angeregt. Ich besitze bereits die neuen Ansichten und Erfahrungen von einigen unserer ausgezeichnetsten, practischen Forstmänner durch die Güte derselben und theile sie hier mit deren eignen Worten mit, weil sich daraus ergibt: welche verschiedene Gesichtspunkte man bei der Begegnung aufstellen kann, welche Localitätsverschiedenheiten dabei zu berücksichtigen sind u. dergl. Auch ersieht man daraus aufs Neue: daß nicht ein Mittel dem Thiere überall und unter allen Umständen entgegen gestellt werden kann, und daß die Answahl aus mehreren immer das Nachdenken des Forstmannes in Anspruch nehmen wird.

Hr. v. Thadden sagt, daß der Schaden, welcher früher in den Königl. Forsten des Regierungsbezirkes Stettin durch Maikäfer angerichtet worden war, sich nur hin und wieder auf das Absterben einzelner Büschel junger, angesäeter Kiefernpflanzen beschränkte. Seit zwei Jahren sind aber die Verheerungen durch die Egerlinge in dem eine Meile von Gollnow belegenen, Hohenbrücker und angrenzenden Jagen des Stepenitzer Reviere in solcher Ausdehnung vorgekommen, daß das Übel zum sorgfältigsten Nachdenken aufforderte. Im Frühjahr 1835 zeigte sich im Königl. Hohenbrücker Forste ein bedeutender, localer Maikäferflug auf einer Strecke von 2500 Schritten Breite und einer Meile Länge, und zwar von Süden nach Norden. Er hatte sich besonders in den mit Laubholz gemischten Kieferbeständen durch das gänzliche Entblättern von Eichen, Buchen und Birken kenntlich gemacht, wohingegen außer dem Bereiche dieser Flugstrecke fast kein Baum befreffen war. Am stärksten liefs sich dieser Frafs in einer entwässerten, mit 14-jährigen Birken bestandenen, 65 Morgen enthaltenden Niederung wahrnehmen, welche von einem Kiefern-Lichtschlage und ausgedehnten haubaren, reinen Kieferbeständen umgeben war. Am Tage waren diese ganz geschlossenen, jungen Birken dergestalt mit Käfern bedeckt, daß man kaum das Laub wahrnehmen konnte. Nach 3 Wochen standen sie gänzlich entlaubt da. Der Reviervorwalter, Oberförster Falke, liefs Schweine in den befallenen Birkenort eintreiben und die Käfer abschütteln. Diese wurden anfänglich von den Schweinen sehr gern gefressen. Das dauerte aber nur wenige Stunden, denn die Schweine gingen wieder an das Gebrüch, wahrscheinlich weil ihnen die fetten Käfer zuwider wurden. Es blieb also noch eine große Käfermenge übrig. Endlich verschwand diese so allmählig, daß man bei der größten Aufmerksamkeit nicht bemerken konnte, wohin die Käfer gekommen seien. Daß sie eine unheilvolle Brut zurückliefsen, wird gleich nachher gezeigt werden. Deren Tummelplatz war der vorher erwähnte Lichtschlag. Er befindet sich auf leichtem, lockern Boden von mittelmäßiger Beschaffenheit und war im Jahre 1832 größtentheils natürlich mit Kiefern angepflanzt. Anhaltend trocken

Witterung hatte aber die Pflanzen dergestalt beschädigt, daß solche sich nur in den Niederungen geschlossen erhielten. Also auch natürliche Besamung schützt nicht! Da jedoch von den noch vorhandenen, schon licht gestellten Samenkiefern Samen genug zur Erde kommen konnten, um den noch vorhandenen, jungen Bestand wieder in Schlufs zu bringen, so wurde das Eintreiben von Schweinen angeordnet. Der Erfolg war so vollständig, daß der Schlag bereits im Jahre 1836 völlig hätte abgetrieben werden können. In diesem Jahre aber, besonders im Juli und August, wurde abermals das Verschwinden der nunmehr 2-jährigen Pflanzen bemerkt. Obgleich man bald aus der Beschädigung der Wurzeln auf den wahren Feind schließen konnte, so war dieser selbst doch durchaus nicht aufzufinden. Erst im folgenden Jahre (1837), da die Engerlinge bereits 3-jährig geworden waren, konnte man sie entdecken. Wurde eine noch kränkelnde Pflanze aufgehoben, so ließen sich oft 5-6 Engerlinge zu gleicher Zeit mit derselben aus der Erde heben. Merkwürdig, daß Hr. Oberförster Falke, bei wiederholten Nachsuchungen, häufig gar keine Larven mehr fand. Wahrscheinlich rührte dies von dem Tiefer- und Höhersteigen derselben während der häufig wechselnden, rauhen Witterung her. Zuletzt wurde der Eintrieb der Schweine in die am stärksten befallenen Districte angeordnet und mit Freude bemerkt, daß sie hier stark brachen, eine große Menge von Engerlingen verzehrten und sich dabei sehr wohl befanden. Da indessen in dortiger Gegend keine größere Anzahl von Schweinen zu haben war, so blieb die Maafsregel nur eine halbe; denn, als der Oberförster Anfangs Juni mehrere Morgen streifenweise aufhacken ließ, fanden sich fast auf jeden Quadratfuß noch 2-3 Engerlinge in der obern Erdschicht, welche nun vernichtet werden konnten. Im J. 1835 wurde bemerkt, daß durch die anhaltend nasse Witterung der Engerling in seinen Verheerungen sehr gestört worden war, da sich nur sehr wenige in der Erdoberfläche auffinden ließen. Ein Theil der, schon in den vorhergehenden Jahren hart angegriffenen, kränkelnden Pflanzen trieb wieder Faserwurzeln und wurzelte sich fest. Dennoch waren ungefähr 200 Morgen dieser Kiefern-Naturschonung völlig zerstört worden, so daß, ohne Rücksicht auf die noch wenigen erhaltenen Pflanzen, die ganze Fläche nun aus der Hand wieder cultivirt werden muß. Aufser dieser völlig zerstörten Kiefern-Schonung waren noch zwei andre von 5-6-jährigem Alter im Hohenbrücker Reviere von Engerlingen befallen gewesen, jedoch bei weitem nicht in dem Umfange wie jene. Der Grund liegt höchstwahrscheinlich in Folgendem. Der Käferstich hat sich im J. 1835 nicht bis hierher in so bedeutender Anzahl erstreckt, auch sind hier und in der Umgegend nur sehr wenige Laubholzstämme untermischt, die einer großen Käfer-Menge die erforderliche Nahrung hätten gewähren können, und dann endlich ist hier der Boden fest und mehr überzogen und war nicht vor dem Fluge aufgelockert worden. In jener zuerst genannten Naturschonung war dagegen der Boden vor dem Flugjahre zur Bewirkung von Samenempfänglichkeit aufgelockert worden und die Käfer hatten hier um so lieber die Brut abgesetzt, weil sie reichliche Nahrung in der benachbarten Birkenschonung fanden. Dies beweist also, daß bei großer Käfermenge auch Breit- und Vollsaaen angegriffen werden, wie sich im angrenzenden Theile des Stepenitzer Reviers selbst der Fall ereignet hat, daß eine geringe Fläche Vollsaa eben so wie eine streifenweise Cultur von Maikäfern angegangen und, wenn auch nicht so total, doch bedeutend beschädigt wurde. Im Übrigen ist es allerdings auch hier beobachtet worden: daß sie stets die platzweisen und Streifen-Saaten am liebsten wählen. In torfhaltigem Boden fand sich hier nie eine Spur von Engerlingen. Zur Verminderung künftiger Beschädigungen sind daher folgende Mittel besonders empfehlenswerth: 1) Schonung der natürlichen Feinde der Engerlinge, besonders der Krähen. 2) Sammeln der Käfer bei bedeutendem Fluge durch Abklopfen der Laubbölzer und Vernichtung der ersten durch Schweine oder durch Menschenhände. Zur Erleichterung dieses Verfahrens können in Kiefernanlagen, welche dem Übel ausgesetzt sein möchten, hochstämmige Birken einzeln und am Rande eingepflanzt werden, damit die Käfer auf diese fallen und leichter gesammelt werden können. 3) Eintrieb der Schweine in diejenigen Schonungstheile, welche von Engerlingen befallen sind. Die Hirten

müssen durch Remunerationen und unter steter Aufsicht der Beamten angehalten werden, die Schweine nur auf den beschädigten Stellen brechen zu lassen. Wo dies nicht ausführbar ist, müssen kleine Stellen, auf denen der Engerling sich zeigt, aufgehackt und die gesammelten Larven durch Menschen vernichtet werden.

Hr. v. Meyerinck hatte im J. 1836 einen bedeutenden Maikäferflug und im J. 1838 zeigten sich, wie gewöhnlich, schon die Engerlinge verderblich. Er schreibt mir darüber folgendes sehr Beachtenswerthe: Wissen wir, daß 1836 ein bedeutendes Maikäfer-Jahr war, daß die heranwachsenden Larven in den Jahren 1838 und 1839 mathematisch stark fressen werden, so scheint es mir in Gegenden, welche von dieser Plage sehr heimgesucht werden, wohl rathsam, hierauf Rücksicht zu nehmen und wenigstens große Kiefernanlagen im Jahre 1839 auszusetzen oder zu beschränken, wenn wir aus den Zerstörungen von 1838 augenscheinlich vorhersehen, daß die Saaten oder Pflanzungen nur für die Engerlinge gemacht werden. So werde ich eine diesjährige Pflanzung von 90 Morgen, welche ganz abgefressen ist, nicht im nächsten Frühjahr erneuern, obgleich die schönsten Pflanzen dazu vorhanden sind. Man wird dagegen einwenden, daß die Kiefer bis in ihr spätestes Alter den Beschädigungen durch Insecten ausgesetzt sei, daß wahrscheinlich im J. 1842 ebenfalls ein starker Engerling-Frass eintreten und die im J. 1840 gemachten Anlagen zerstört werde u. dergl. Dagegen aber spricht die Erfahrung, daß dieses Insect in seinem Turnus nicht gleich zerstörend alle vier Jahre auftritt und daher doch auch wohl einer Verminderung, unter Umständen, die wir nicht kennen, unterworfen sein muß. Ferner sehen wir, daß in den Heiden die Käfer vorzugsweise an den Birken und Eichen schwärmen und müssen vermuthen, daß sie auch in solchen Orten vorzugsweise ihre Eier ablegen. Sollte diese Erfahrung nun nicht dahin leiten, daß in Revieren, wo Birken-, Buchen- und Eichenräumen abgeräumt und mit Kiefern in Anbau gebracht werden (was in hiesigem Regierungsbezirk in großer Ausdehnung statt findet), immer schon mehrere Jahre vor der Saat oder Pflanzung dergleichen Räumden eingeschlagen werden, damit der Käfer hier nicht schwärmt und seine Eier ablegt? Diese Ansicht bestätigen die hiesigen Kiefernanlagen in gegenwärtiger Zeit augenscheinlich, indem sich auf solchen Flächen viel weniger Schaden zeigt, wo keine Laubbölzer in der Nähe sind und dergleichen Bestände schon vor längerer Zeit abgeräumt wurden, als da, wo die Culturen von noch vorhandenen Eichen-Räumden begrenzt oder solche Bestände darauf noch vor wenigen Jahren vorhanden waren. Der Einwand: daß man mit der Cultur dem Hiebe folgen müsse, indem der Boden durch mehrjährige Freistellung vor dem Anbau veröde, wird von solchen Forstleuten nicht erhoben werden, welche die Bestände kennen, die ich hier im Auge habe. Möchte wirklich auch durch die frühere Abräumung  $\frac{1}{2}$  p. C. Humus in diesen Boden verloren gehen, so bedingt hier die Noth eine Ausnahme von der Regel, und wird man am Ende in etwas schlechterem Boden mit größerer Sicherheit Culturen aufbringen, als wo derselbe voller Maikäfer-Larven steckt. Hinsichtlich des Sammelns der Käfer glaube ich zwar auch nicht, daß wir in den Forsten durchgängig dem grobsartigen Beispiele überall folgen können, womit Quedlinburg uns vor einigen Jahren voranging, wo nur Alleeabäume und Obst-Plantagen geschüttelt zu werden brauchten. Doch bin ich überzeugt, daß in den meisten Forsten die Localität auch durch Sammeln der Käfer die Verminderung dieses Insecten in der Nähe neuer Anlagen gestattet, und ich werde daher im Jahre 1840 an den Rändern der Culturplätze alle Anstalten zu einer allgemeinen Jagd darauf treffen, wobei Fangbäume, wie sie Hr. Pfeil vorschlägt (d. h. einzelne überhaltene oder absichtlich angepflanzte Laubbäume), gewiss mit großem Vortheile benutzt werden können. Wer die Schwierigkeiten kennt, welche mit dem Sammeln von Raupen und andern Larven in großen Kiefernforsten verbunden sind, und wer weiß, wie viel hierin bereits geleistet ist, der wird vor dergleichen kleinern Bemühungen nicht zurückschrecken (\*).

(\*) Bei dieser Gelegenheit muß ich noch andere Einwendungen erörtern, welche man gegen das Käfersammeln gemacht hat. Es soll nicht radical helfen. Das kann man aber auch eben so wenig von dem Käfersammeln verlangen.

Was nun die Vertilgungsmaassregeln gegen schon vorhandene Larven anlangt, so glaube ich, fährt Hr. v. Meyerhuck fort, dass man bei sehr ausgedehnten 1-6-jährigen Kiefern-Anlagen getrost davon Abschied nehmen kann, wo das Übel so überhand genommen hat, dass man mit jedem Spatenstiche im Sommer mehrere Egerlinge herauswerfen kann. Wo hingegen die Larven in mässiger Zahl fressen und die Culturen sich nicht über einige 100 Morgen ausdehnen, da möchte doch in solchen Jahren, besonders wo die Larve zum letzten Male vor der Verpuppung frisst, noch Vieles erhalten werden können. Beobachtet man unter diesen Umständen die Pflanzenreihen in den Furen des Pfluges, so sieht man deutlich, dass die jungen Kiefern darin, besonders 1-2-jährige, nach einer Richtung gewöhnlich fortschreitend absterben, als Beweis, dass die Larve unter der Erde mit ihrem Fraß in den Pflanzenreihen (\*) weitergeht, sobald die Wurzeln der ersten Pflanzen abgefressen sind. Man kann diese Gänge sehr leicht mit einer schwachen Ruthe unter der Erde verfolgen und eben so von aufsen wahrnehmen, dass das Fortschreiten des Fraßes einer oder mehrerer Kiefern, die zusammen frassen, bei ältern, gut bewurzelten Saaten langsamer, bei jüngern rascher ist. Eine ähnliche Erscheinung fand hier bei den Pflanzungen statt, so dass die 1-2-jährigen zum Theil ganz ruiniert, die 5-6-jährigen aber nur durchlichtet sind. Auf diese Wahrnehmung gestützt glaube ich, dass man da, wo nicht eine zu große Menge Larven frassen, durch unausgesetztes Herauswerfen der welk werdenden Pflanzen mit einem starken Erdballen und durch Vernichten der so zu Tage geförderten Larven, besonders im Anfang des Fraßes, noch sehr viel retten kann. Es wird dies Verfahren schon in dem 1sten Bande der Forstinsecten empfohlen (S. 74.), hier aber hinzugefügt: „die Egerlinge gehen von einem solchen Pflanzloche nicht fort, weil sie hier lockern Boden haben, rings „umher aber einen festen Wurzelnz finden u. s. f., auch ist es nicht gut die welkenden Pflanzen eher heraus- „zunehmen, als bis man nachpflanzt“ u. s. f. Ich möchte dem widersprechen, denn 1) findet sich z. B. bei Ballenpflanzung kein aufgelockerter Boden, 2) würde man beim Nachpflanzen im Spätherbst und Frühjahre die Egerlinge nicht mehr finden, weil sie zu tief in die Erde gehen, 3) aber gingen dieselben hier, wenn sie die Wurzeln ganz junger Kiefernpflanzen aufgezehrt hätten, unbezweifelt weiter nach andern Pflanzenstellen, da man sie schon häufig im Juli nicht unter den befallenen Pflanzen fand und ihre Aus-

wie von dem Seilnettelungsammeln z. B. beim Spinner. Man ist aber auch schon zufrieden, wenn man nur die Brut verringert, ohne sie gänzlich zerstört zu haben. Beim Maikäfer hat dies nun noch besondere Schwierigkeiten darin: dass er zu einer Jahreszeit, wo Spätfröste seinen Flug und sein Auskommen plötzlich hemmen, erscheint, und dass man oft genöthigt ist, die mit Mülle getroffenen Anstalten auf mehrere Tage zu unterbrechen und nachher wieder zu beginnen. Bei einem Wetter, welches das Sammeln der ruhig an den Bäumen sitzenden Schmetterlinge gerade begünstigt, wird dies beim Maikäfer ganz unmöglich, indem er sich so verkriecht, dass man ihn gar nicht findet. Schlimmer kann es damit gar nicht gehen, als in dem Maikäferjahre 1836, wo sich die Flugezeit bis in den Juli verschleppte. Da konnten wir ihrer nicht einmal in unserem kleinen Forstgarten Herr werden, denn im J. 1838 zeigte sich wieder Egerlingfraß auf den Kiefern-Saatenbesten des Forstgartens. Indessen war doch auch der Nutzen des Sammelns nicht zu verkennen; denn, wenn die ungeheure Menge von Käfern im J. 1836 geblieben wäre, so wäre vielleicht für jedes Kieferapflanzchen ein Egerling da gewesen. Wir hatten aber im Kafern nur Fraß auf einzelnen Stellen. Es würde also Alles darauf ankommen, während der ganzen Flugezeit des Maikäfers immer so viele Leute bei der Hand zu haben, dass man beim plötzlichen Wiederausbrechen des Käfers zugleich einschreiten könnte. Bei gewissen Localitäten, und ganz besonders wenn man Fangbäume hielte, dürfte dies auch keine Schwierigkeiten haben. Aldann giebt es ja auch Jahre genug, in denen der Maikäfer in 2-3 Wochen gänzlich abshawmt.

(\*) So nachtheilig es auch einer Seits ist, dass den Egerlingen der Fraß in den Saatenreihen und Furen erleichtert wird, so vortheilhaft ist es aber auch wieder da, wo man unausgesetzt Achtung darauf geben kann, denn es erleichtert das Aufsuchen und Töden der Larven ganz ungemein. Während man bei dem Uebeinanderstehen der Pflänzchen nicht weiß, wohin das Thier sich von einer zerstörten Pflanze aus gewendet hat, so ersippt man es in den Reihen gewöhnlich schon bei der zweiten oder dritten und rettet dann durch seine Aufhebung den ganzen übrigen Theil der Reihe.

gängeröhre deutlich verfolgen konnte. Nur wenn die Kiefern 5-6 Jahre alt sind, glaube ich, daß die Wurzel einer starken Pflanze hinreichen möge, eine oder mehrere Larven den Sommer hindurch zu ernähren und daß letztere dann nicht weiter wandern. Denn ich fand den Spätsommer bis zur Mitte Octobers unter allen angefressenen Kiefern in diesem Alter (bei einer Pflanzung in 3' Entfernung) überall die Engerlinge, nachdem diese zuletzt die Wurzeln bis zur Stärke einer Rabenfeder mit Stumpf und Stiel aufgezehrt hatten. Wollte man daher bis zur Nachpflanzung mit dem Auswerfen und Töden der Larven warten, so würde jedenfalls sich deren Fraß auch auf die benachbarten Pflanzen ausdehnen, so wie die spätern Nachpflanzungen abernals vernichten, wenn nicht gerade die Verpuppung einträte (\*). Übrigens ist in den hiesigen Kiefernsaatkämpfen ein gleiches Verfahren wie das im Neustädter Fortgarten beobachtete mit dem besten Erfolg gegen die Engerlinge angewendet worden. Warum sollte man dies auch nicht auf größere Flächen ausdehnen, so lange man noch Herr des Übels werden kann?

Die Ansicht, daß die Engerlinge den Kiefer-Pflanzungen schädlicher als den Saaten sind, berichtet sich, nach den in hiesiger Provinz gesammelten Erfahrungen, dahin: daß zwar die größten Saaten bis zu fünfjährigem Alter hier bei großer Zahl der Engerlinge gänzlich vernichtet wurden, daß aber doch wohl eine kleinere Zahl derselben dazu gehört, um eine Pflanzung zu verderben und daß daher nur in so fern für diese öfter Gefahr eintreten kann, als für die Saaten. Eigentümlich ist es doch, daß man die Ursachen noch nicht kennt: warum die stärksten Maikäfer-Generationen mit einem Male gänzlich vertilgt werden. Einzelne Gegenden in der Altmark waren vor 5 Jahren von dieser Plage so heimgesucht, daß die Larven noch im Spätherbst die grünen Roggensaaten abfressen und daß die Äcker umgepflügt und neu bestellt werden mußten, während in diesem Jahre gar keine Engerlinge (oder Zapfen, wie man sie dort nennt) bemerkt wurden. Auch hier zeigte sich, wie das schon (S. 75.) mitgetheilt wird, die Larve nur in schmalen Landstrichen, während dazwischen liegende Gegenden ganz verschont waren. Vorzugsweise sind es die Zuckerrüben, welche hart mitgenommen wurden, und von den Getreidearten litt die Gerste am meisten. Im Walde haben sie, außer den Kiefern, noch Fichten- und Eichensaatkämpfe ganz zerstört, die Ballenpflanzung in Sandschellen blieb dagegen ganz unberührt, obgleich alle Pflanzungen rings umher abgefressen wurden. Wahrscheinlich die einzige lobenswerthe Eigenschaft des Flugsandes. In den Flussthälern giebt es abernals keine Engerlinge, obgleich die Maikäfer im J. 1836 hier große Mittelwald-Districte entblättern. Fast scheint es daher, als wenn diese von jenseits der Elbe herkämen.

Nach diesen schriftlichen, interessanten Mittheilungen des Hrn. v. Meyerinck erhielt ich noch später eine mündliche, welcher zu Folge Hr. v. Meyerinck im Sommer 1839 ein neues, leicht anwendbares Mittel versuchen will. Es haben ihn nämlich Erfahrungen gelehrt — ich glaube vorläufig nur in einem Garten gesammelt — daß Insecten durch den Geruch des Steinkohlen-Theers, ein Mittel, das schon in ältern Schriften genannt wird, vertrieben werden. Er beabsichtigt nun bei der Anlage von Saaten und Culturen in den, dem Fraße ausgesetzten Gegenden neben den Samen und neben den Pflanzen, nur durch eine dünne Erdschicht von denselben getrennt, eine kleine Portion von jenem Theer anzubringen, und zwar mittelst eines trocknen (Eichen-) Blattes, welches in den Theer eingetaucht wird. Da der letztere

---

(\*) Es war jene Bemerkung auf S. 85. auch nur für die Mehrzahl der Fälle berechnet und ich räume ein, daß sie auf Ballenpflanzungen und auf junge Pflänzchen, welche die Engerlinge nicht lange fressen, nicht paßt. Sie war aber auch, wieder in andrer Beziehung, nur für den, gewiß seltneren, Fall berechnet: daß man nichts zur Vertilgung der Engerlinge augenblicklich thun will. Kann man sich der Zerstörung derselben gleich während des Fraßes unterziehen, wie es Hr. v. Meyerinck rath und wie es gewiß auch oft ausführbar ist, so wird man den Engerlingen nicht Zeit lassen, sich von dem Orte zu entfernen, wo man sie so leicht auffindet. Gleich vor jener Stelle auf S. 85. schlug ich dies auch schon als Haupt-Maßregel vor.

nicht theuer ist und auch die Application desselben keinen großen Aufenthalt verursachen dürfte, so läßt sich der beste Erfolg davon erwarten, wenn der Geruch des sehr lange sich frisch erhaltenden Theers die Larven wirklich zurückschreckt.

Eines eigenthümlichen, freilich gewiß nur selten anwendbaren Schutzmittels gegen die Engerling-Verwüstungen erwähnt Hr. Mufs. Die Stellen, auf welchen in seinem Reviere sich vorzugsweise Engerlinge zeigten, sind solche, deren Oberboden aus einer aschenartigen Stauberde besteht, die selbst bei der größten Nässe von oben nicht Nässe anzieht. Selbst nach dem Aufthauen der bedeutenden Schneemasse des Winters 183 $\frac{3}{4}$  waren diese Stellen so beschaffen, daß die daraus genommenen Kiefernpflanzen den Ballen nicht hielten. Zur Bepflanzung solcher Stellen nahm er denn vorzugsweise Kiefern aus Lehm- oder aus festem und frischem Sandboden und hatte an diesen Stellen dann nicht mehr von den Engerlingen zu leiden. Wenn man also die Wahl hat, so würde man sich unbedingt dieses Mittels bedienen dürfen.

Hr. Pfeil hat den Gegenstand in neuester Zeit auch wieder aufgenommen (*Crit. Bl.* Bd. XIII. H. 1. S. 213. u. f.) und ebenfalls bewiesen: daß die an Laubholz grenzenden Reviere am meisten dem Maikäferfraße ausgesetzt sind. Er schlägt vor, in solchen den Insect besonders durch geeignete Wirthschaftsmaßregeln zu begegnen, namentlich solche Cultur-Methoden zu wählen, bei denen der Fraß weniger verderblich wird. Am wenigsten würden sich, nach ihm, hier die Pflanzungen mit 1- und 2-jährigen Stämmen und entblößter Wurzel empfehlen, weil die Larven in dem lockern Boden sich schnell von einer Pflanze zur andern fortarbeiten und diese mit wenigen Bissen tödten. Eben so wenig empfiehlt sich hier die Stecklöcher- und Plattensaart. Die Pflanzen stehen hier so dicht beisammen, daß die Engerlinge sie leicht vernichten. Ferner sind auch die Streifensaaten hier verwerflich. Schon weniger sind die großen Ballenpflanzungen dem Schaden ausgesetzt, da die Wurzeln hier so stark sind, daß sie der Engerling nicht mehr ganz abbeißen kann. Auch die breite Rimmen- oder Reifensaart, die Vollsaat, wenn die Pflanzen nicht zu einzeln stehen, finden darin Schutz, daß die Larven doch nicht jeden Fleck durchwühlen und immer noch genug übrig lassen, daß sich daraus ein Bestand bildet. Am allerwenigsten leiden die Samenschläge, weil die Larven hier nicht überall hinkommen und auch schon der Boden in solchen fester ist. Auch hier wird gerathen, bei der Umwandlung lichter Laubholzbestände in Kiefern mit der Cultur erst nach einigen Jahren dem Hiebe zu folgen.

Zum Schluß will ich noch einige Nachrichten über die, bei dem großen Maikäferfraße in der Gegend von Quedlinburg angewendeten Vertilgungsmittel mittheilen, welche ich Hrn. Oberförster Eyber zu Thale verdanke. Es hatte sich ein Verein zur Vertilgung der Maikäfer, bestehend größtentheils aus Gärtnern und Oconomen, gebildet. Es wurden, meist durch die unbeschäftigten Kinder verschiedener Professionisten und anderer Arbeiter, 93 Wispel und 4 Scheffel Käfer gesammelt und im Ganzen nur 267 Rthlr. 11 Sgr. dafür verausgabt, d. h. pro Scheffel Anfangs 4 Sgr., dann nur 3 Sgr. und zuletzt wieder 4 Sgr. Auf den Scheffel rechnete man circa 15,000 Stück Käfer, also sind im Ganzen an 33,540,000 Käfer mit einer unendlichen Brut zerstört worden! Die Käfer wurden mit Dreschflegeln getödtet und zu Dünger benutzt. Die Maulwürfe hatten sich bei der guten Nahrung so vermehrt, daß nachher Anstalten zu ihrer Vertilgung getroffen werden mußten. Es wurde bei der Gelegenheit auch beobachtet, daß selbst die Mäuse Engerlinge fressen.

VORURTHEILE, welche man hier und da im Volke über die Maikäfer hegt: 1) Aus einer mehr bläulichen Farbe der Larven soll man auf einen gelinden Winter schließen können und aus einer mehr weißen auf einen harten. Es ist aber dafür weder ein vernünftiger Grund einzusehen, noch ist auch die Verschiedenheit der Farben wirklich so constant, sondern mehr von der Füllung des Darmes mit Koth abhängig. 2) Die roth- und schwarzbläulichen Maikäfer sollen periodisch mit einander abwechseln und von einer fetteren

oder mageren Kost herrühren. Bestätigte sich dieser Wechsel der Farben wirklich, so wäre ein vernünftiger Grund nur darin zu suchen: daß in dem einen Jahre *M. vulgaris*, in einem andern *M. Hippocastani* sich häufiger finde (s. S. 95.). Mit der angeblich verschiedenen Kost ist es aber nichts. 3) „Maikäferjahr ein gut Jahr.“ Das Jahr 1836 lehrt das Gegenteil. Auch ist nicht abzusehen, warum ein Maikäferjahr immer ein warmes sein soll, da ja die Maikäfer, wenn ihre Zeit da ist, fliegen müssen, es mag warm sein oder nicht. 4) Der Maikäfer soll nicht auf Linden gehen! 5) Die Maikäfer sollen gegen Wasserscheu heilsam sein. Wahrscheinlich beruht dies auf einer Verwechslung des Maikäfers mit dem Maiwurm (*Meloe S. Heteromera*). 6) Die Engerlinge sollen den Schweinen schädlich sein. Allerdings! wenn man ihnen zu viele giebt und sie nicht ordentlich dazu zu saufen haben oder zu starke Hitze leiden müssen. 7) Die dunklen Var. (wahrscheinlich *M. Hippocastani*) sollen im weissen und die hellen im rothen Sande erzogen werden. 8) Die Maikäfer-Weibchen sollen, schon ehe sie aus der Erde kommen, ihre Eier ablegen. Ein sehr verderblicher Glaube, denn wenn das wahr wäre, könnte das Sammeln gar nichts helfen. Dem Eierlegen muß Begattung vorhergehen, und diese geschieht, wie Jeder weiß, an den Bäumen. 9) Durch häufiges Aufessen der Maikäfer, namentlich beim Sammeln derselben, soll sich ein häßlicher, juckender Ausschlag an den Händen zwischen den Fingern bilden. Daran ist nicht eine Spur von Wahrheit, und wahrscheinlich liegt hier wieder eine Verwechslung mit den Maiwürmern, welche solche Ausschläge erzeugen, wenn sie häufig angefaßt werden, zum Grunde. 10) Die Maikäfer sollen Baumraupen fressen. Das wäre so übel nicht. Wahrscheinlich beruht dieser grobe Irrthum (s. auch *M. Fullo*) aber darauf, daß man die Raupen nach großem Maikäferfraße allmählig verschwinden sieht, welches aber wieder darin seinen Grund hat, daß die Käfer schnell die Bäume kahl fressen und die Raupen nun Hungers sterben müssen. Auf die Weise würden sie also doch nützlich, denn die Bäume erholen sich eher nach dem schnell abgemachten Käfer- als nach dem langsamen Raupenfraße. (Hegetschw. S. 71.)

Der NUTZEN, welche die Maikäfer gewähren sollen, ist nur gering. Man will, nachdem der Boden der Wiesen einmal durch die Engerlinge durchgewühlt und aufgelockert worden ist, im nächsten Jahre einen üppigern Graswuchs als zuvor bemerkt haben. Im *Correspondenzblatte* Jahrg. 1836. S. 33. findet sich wieder eine dieses bestätigende Bemerkung. Wahrscheinlich kann man dabei auch die Dungkraft der von den vielen Larven im Boden hinterlassenen Häute, Koth und Cadaver in Anschlag bringen. Maikäfer, Engerlinge und Puppen geben ein vortreffliches Futter für Schweine und zahmes Federvieh (die Gänse, welche sie nicht fressen, ausgenommen), und würden auch, wenn sie als solche nicht verbraucht werden könnten, als Dünger sehr gut sein. Ob man aber Öl und Fett aus denselben wird mit Vortheil gewinnen können? fragt sich. Hr. Pleninger (a. a. O.) spricht davon mehrmals, ohne aber das bei der Gewinnung beobachtete Verfahren anzugeben. Ein im Magdeburgischen im Kleinen angestellter Versuch, die Käfer zur Bereitung von Öl und Wagenschmiere anzuwenden, schlug fehl, denn sie verkohlten sich, ohne nur einen Tropfen Öl zu geben (*Haude- und Spenerische Zeitung* 1836). Früher sammelte man den schwarzbraunen Saft, welchen die Käfer im Schlunde haben, besonders des Abends, mit Pinseln und verbrauchte ihn, in Malermuscheln getrocknet, als eine schöne, klare, braune Farbe (*Krinitz Encycl.* B. 86. S. 237 u. 245.). In Öl eingemacht, sollen sie die Wanzen vertreiben.

VERWANDT ist: 1) *M. Hippocastani* Fabr. (Taf. III. Fig. 3. das Weibchen.) Der *M. vulgaris* äußerst ähnlich, jedoch bestimmt verschieden durch etwas geringere Größe (10-11"), dann durch die in der Mitte etwas mehr erweiterten Flügeldecken, ferner durch einen etwas größern glatten Fleck zu den Seiten des Halsschildes und ganz besonders durch einen viel kürzern, an der Basis mehr eingeschnürten und am Ende fast halbkreisrunden Aftergriffel. Auch ist die ganze, grauweis schillernde Behaarung etwas stärker, die Fühler und Taster dunkler, die Ränder der Flügeldecken, die unbedeckte Hinterleibs-Endigung, so wie die Beine, schwarz, letztere doch auch in einer Var. braun, bei welcher auch der Halsschild

braun erscheint. Selten erscheint der Käfer ganz schwarz. VORKOMMEN u. s. f. Überall mit dem gemeinen Maikäfer zusammen, bei uns sogar viel häufiger als derselbe, auch in Schweden, (Gyllenhal *Ins. Suec.* I. p. 555.) und in Rußland bis in den Caucasus (Méuëtré's). Ihre Larven leben auch zusammen und man wird schwerlich jemals ein Unterscheidungszeichen an ihnen finden, da auch die Grösse, welche die Käfer beider Arten unterscheidet, nicht so sehr bedeutend ist. Es könnte daher wohl sein, daß die Taf. III. Fig. 1 u. c. abgebildeten Larven zu *M. Hippocastani* gehörten. Die jungen Larven (Fig. 1 u. c.) gehören jedoch bestimmt zu *M. vulgaris*, denn ich habe sie aus den vom Käfer dieser Art gelegten Eiern erzogen. Im Jahre 1836 entwickelten sich die Käfer dieser Art offenbar etwas früher als die der vorigen. Die ersten vollkommenen Käfer, welche ich fand, gehörten ihr an. Ende Aprils fand ich an einer Stelle schon unzählige Käfer dieser (daher eher Aprilkäfer zu nenneuden) Art schwärmend und darunter nur einen von *M. vulgaris*. Die Zahl der letztern mehrte sich erst gegen Ende des Mai, kam aber nie der der andern hier gleich. Auch von ihr waren stets doppelt so viele Männchen als Weibchen an den Bäumen zu finden. Ein Unterschied im Fraße war nicht zu bemerken. Beide Arten fanden sich äußerst häufig in Begattung. Dies erklärt wohl genügend die Sage von dem abwechselnden Erscheinen der roth- und schwarzflügeligen (s. S. 94.).

## 2. *M. Fullo* Linn. Großer Juliuskäfer. (Taf. III. Fig. 4. das Männchen.)

NAMEN. Im Deutschen nennt man ihn: Walker, Müllerkäfer, marmorirter Maikäfer, weisssprenklicher großer Juliuskäfer, Weinkäfer, Tiger, Tannenkäfer, Donnerkäfer, Dünenkäfer. FRANZ.: *le foulon, hanneton du Poitou*. HOLL.: *Duinkever*. Bei Linné: *Scarabaeus Fullo*.

CHARACTERISTIK. Der *M. vulgaris* ähnlich, aber viel größer noch (bis 15"). Flügel des Männchens außerordentlich groß. Kopfschild vorn breiter und besonders beim Männchen stark zurückgeschlagen. Halsschild sehr sparsam, besonders an den Seiten, punktiert, am Hinterrande in der Mitte etwas weniger nach hinten vorspringend, am Vorderrande stärker nach vorn gezogene Winkel und innerhalb derselben beiderseits einen Eindruck zeigend. Flügeldecken in der Mitte weniger erweitert, daher auch hinten wenig verschmälert und mit kleinen deutlichen, erhabenen Längsleisten. Die herrschende Farbe ist bald schwarz, bald braun, oben durch Flecke von schuppenartig verbreiterten Haaren schön bunt besprenkt, unten mit bräunlich-gelben, an der Brust sehr langen, am Hinterleibe kurzen Haaren.

VORKOMMEN u. s. f. Der große Juliuskäfer ist viel seltener als die beiden vorigen, obwohl er so weit südlich (in Bayern nach Hrn. Wallt) als nördlich (in Schweden (Gyll.) und Rußland, selbst dem Caucasus (Méuëtré:)) geht. In vielen Gegenden trifft man ihn gar nicht, in andern dagegen, wie z. B. in hiesiger, an einigen Stellen ziemlich häufig und zwar alljährlich regelmäßig in der ersten Hälfte des Juli. Solche Stellen sind immer sehr sandig, so wie sie auch Bechstein (*Forstins.* S. 208.) angiebt. Hier die Larven zu finden, ist mir noch nicht gelungen. Sie sollen sich von Wurzeln der Gräser, besonders der nützlichen, zur Befestigung der Dünen in Seegegenden angebauten (Saudhafer und Sandroggen *Elymus arenarius*, und *Arundo arvensis*) nähren und dadurch öfter schädlich werden. Der Käfer frisst an Nadelholz und Laubholz und, wenn ihm dies fehlt, auch an Kräutern und Gräsern. Sie sind schon an Eichen, Buchen, Hagebuchen, Pappeln, Acacien und Kiefern bemerkt worden. An den Kiefern sahe ich ihn immer am liebsten fressen. Er nimmt die Nadeln meist nur an einer Seite der Mittelrippe in der Gegend des mittlern Dritttheils an, so daß aber die Nadeln durch unregelmäßiges Ausbeissen und Verschonen einzelner Stückchen wie zerfetzt erscheinen. Beim Fraße sitzen sie so, daß die Nadelkante in die Lefzenaufrandung paßt und daß die Unterkiefer unter steter Bewegung der Taster die Nadel angreifen, während man von Bewegung der Oberkiefer nichts bemerkt. Dann und wann fressen sie die Nadeln auch beide



bis auf die Scheide ab. Der Koth, welchen sie dabei liefsen, bestand aus 5-6" langen, knäuelförmig aufgewickelten, schwärzlich-grünen, krümelig-weichen Fäden, welche sehr verdaut waren. Zum Logen schleichen die Weibchen sich sehr früh in die Erde zu begeben, denn ich fand 1835 vom 13ten bis 15ten Juli, als schon die Männchen in großer Menge erschienen waren, nicht ein einziges Weibchen, vom 25sten an dagegen desto mehr Weibchen, die bereits abgelegt hatten. Frisch (*Ins. Deutsch.* Th. II. S. 23.) erzählt: „Im Jahre 1731 im Juli hat man sie in der Mark Brandenburg mit Schaden kennen lernen, denn sie „kamen häufig in die Gegend von Strausberg und fraßen da die Baumbblätter, sonderlich der Eichen ab, „machten auch viel fruchtbare Bäume kahl, und wenn sie auf die Erde kamen, wurde auch das Gras von „ihnen verzehrt.“ In einem Manuscript des Frisch in folio auf der Dresdner Königl. Bibliothek findet sich auch folgende, durch Hrn. v. Bulmerincq mir mitgetheilte Stelle: „Ao. 1750 im Juli habe ich sie bei Dresden kennen lernen, da sie kamen häufig uml frassen da die Baumbblätter, sonderlich die Eichen ab, wie auch das Gras von ihnen gefressen wurde.“ Ebenso berichtet Hennert (*Raub. u. Windbr.* S. 59.) von einem sehr bemerklichen Fraße in der, nicht weit von Peitz liegenden Tauer'schen Forst, wo sie die Kiefern entnadelten, ohne denselben aber merklichen Schaden zugefügt zu haben. Eben dieser Schriftsteller ist es auch (a. a. O. S. 63.), von welchen sich (der ebenfalls von Bechstein aufgenommenen) grobe Irrthum herschreibt: der Julikäfer fresse Kienraupen. Der Grund dieses sonderbaren Wahrnehmung ist gar nicht einzusehen. Ein so entschiedener Pflanzenfresser, dessen ganzer Verdauungs-Apparat nur auf Blätter eingerichtet ist, kann eben so wenig Thiere fressen, wie ein thierfressender Käfer Blätter frisst. Das pfeisende Geräusch, welches dieser Käfer durch Auf- und Abbewegen der Flügel gegen den Hinterleib verursacht, wird bei keiner Art so auffallend. Der Käfer ist also doch viel besprochen und gehört immer zu den bemerkenswerthen Forstinsecten. Die Vertilgung wie beim Maikäfer.

†† Fühlerfächer nur aus drei 3 Blättern bestehend.

\* An allen 3 Fußpaaren 2 gleiche, divergirende, an der Basis mit schwachem, graden Zahne versehene Hakchen: (*Amphimalla* Latr.)

3. *M. solstitialis* Linn. u. f. Sonnenwend-Laubkäfer. (Taf. III. Fig. 5. Männchen u. 5e Weibchen.)

NAMEN. Diese auch wieder von Linné unter *Scarabaeus* aufgeführte, bei Latreille zur Gattung *Amphimalla* gerechnete Art, trägt allgemein den obigen Namen. Deutsch heißt sie: Juniuskäfer, Brackkäfer, Johanniskäfer, kleiner Laubkäfer, kleiner Maikäfer. Franz.: *le petit hanneton d'automne*, *hanneton d'Allemagne*. Russ.: *Chrusch*.

CHARACTERISTIK. Der *M. vulgaris* ähnlich, doch um die Hälfte kleiner (7-8") mit vorherrschenden schmutzig hellgelben Farben und sehr langen Zottenhaaren. Kopf oben größer, zum Theil rüch-punktirt. Kopfschild etwas zurückgedrückt. Fühler neungliedrig. Fächer beim Männchen länger als beim Weibchen. Halsschild sehr stark und dicht punktirt, an den Seiten weniger erweitert, ohne ansehnliche glatte Stellen, in der Mitte des Hinterrandes wenig vorragend. Flügeldecken in der Mitte wenig erweitert, nach hinten ziemlich merklich sich verschmälernd, mit 4 erhabenen, hinten in schwache Höcker auslaufenden Längsleisten. Beine nicht sehr lang. Die Schienen der Weibchen am Außenrande mit drei starken Dornen, beim Männchen unbewehrt.

VORKOMMEN u. s. f. Diese in der Lebensweise dem Maikäfer so nahe verwandte (jedoch stets erst im Juni oder Juli schwärmende) Art, wird zuweilen auch eben so häufig als dieser und kann dann denselben Schaden verursachen. Dafs er an Blättern oft tüchtig frisst, namentlich an Pappeln, Weiden, Buchen, Hagebuchen, Kiefern, haben Viele (die Hrn. Bouché, Hartig, Walti, Zebe, s. auch Bechstein u. A.) und auch ich selbst mehrmals beobachtet. Wenn man von der Larve nicht so häufig spricht, so kommt dies wohl daher, dafs sie wie der gemeine, noch nicht ausgewachsene, Engerling aussieht und für denselben

gehalten wird. Nach Hrn. Plieninger (Mkf. S. 80.) findet sie sich in sandigem, leichten Boden, namentlich auf Brachfeldern, wo sich auch der Käfer zum Absetzen der Eier vorzugsweise hinbegäbe, während man auf Saatkeldern noch keinen beträchtlichen Schaden von ihnen bemerkt habe. In einem bei Horlach in Bayern gelegenen sehr jungen Kiefernbestaude beobachtete man, dafs die Männchen meist auf den alten Bäumen und die Weibchen auf den Büschen safsen und dafs auch die eingesperrten Individuen nichts als Nadeln fressen wollten (*Allgem. F. u. J. Zeit.* Jahrg. 2. S. 259.). Nach meinen Beobachtungen beissen sie nur die Spitze der Nadeln ab und saugen an dem stehen bleibenden Stumpfe (wohl  $\frac{1}{2}$  Stunde), der sich auch nur unmerklich dadurch verkürzt. Diese Art ward auch in Württemberg an einzelnen Stellen schädlich bemerkt, jedoch nur als Käfer (Hr. Plieninger). Die Vertilgungs-Maafsregeln werden dieselben wie beim Maikäfer sein, nur dafs man die gröfsere Beweglichkeit des Käfers, der, so wie es warm wird, leicht aufliegt, berücksichtigen und recht früh Morgens sammeln mufs. Dieser Käfer soll das Mutterkorn, dessen Genufs die sogenannte Kriebelkrankheit erzeugt, hervorbringen, dadurch dafs er sich an das Korn hängt, wenn es in der Milch steht (Nemnich nach Lentin's Beobacht.). So achtbar die Autorität auch ist, so mufs ich mich doch durchaus gegen diese Beobachtung erklären, indem ich das Mutterkorn auch in Jahren fand, die von Laubkäfern am Getreide keine Spur zeigten. Weitere, besonders die forstliche Bedeutung dieses Käfers vermehrende Nachrichten verdanke ich Hrn. v. Pannewitz. „Im September d. J.“ sagt derselbe „kam ich in eine 4-jährige Kieferschönung, welche bergigt ist, schlechten Sandboden hat und noch dazu eine Mittagslehne darbietet. Sogleich bemerkte ich, dafs die meisten der dominirenden, 2' hohen Pflanzen an den Zweigen hier und da dürr waren und zwar bald an der Spitze, bald in der Mitte. Manche Äste waren ganz gesund. Die dürren Stellen waren meist nur 3-4" lang und merkwürdigerweise oft von recht frischen Spitzen überragt. Der Schaden war offenbar schon 2-3 Monate alt. Der Oberförster kannte den Grund desselben nicht, da er, seiner Angabe nach, sehr plötzlich (in 8 Tagen) entstanden sei. Bald darauf kam ich in ein andres Revier, wo ich in einer niedrig gelegenen Schönung, welche guten Boden und 3-jährige, kräftige Pflanzen hatte, einen ganz abnormen krüppelhaften (im Frühjahr hier noch nicht bemerkten) Wuchs entdeckte. Der Oberförster zeigte mir nun an: dafs *Melolontha solstitialis* (von welchem auch trockne Exemplare noch vorgezeigt wurden) hier häufig gewesen sei. Anfangs habe er die zarte Rinde der diesjährigen Triebe benagt oder vielmehr daran gesogen, später aber hätte er mehr an den Nadeln gesessen und diese benagt, und zwar wahrscheinlich deshalb, weil ihm die Epidermis der Rinde nach den ersten 8-10 Tagen zu hart geworden sei. Die ganze Schönung sahe traurig aus. Die Zweigquirle, von welchen Proben beigefügt sind, erscheinen hin- und hergebogen. Die Krümmung fand sich immer an der Nagestelle. An den Wunden standen auch Harz-Ausflüsse. Nirgends aber fanden sich verdorrte Zweige, wie in jener Bergschönung, in welcher der Schaden zuverlässig auch durch denselben Käfer angerichtet sein wird. Dagegen zeichneten sich die Zweige in der Schönung mit kräftigerem Boden, selbst bei ältern, 6-8-jährigen Pflanzen, wenn sie auch nicht verdorrt waren, durch die auffallenden Krümmungen aus, obwohl die Epidermis doch nur ganz leicht beschädigt zu sein schien. Es entsteht nun die Frage: Ob sich diese verkümmerten Zweige wieder gerade biegen werden?“

Nach Hrn. v. Meyerinck's Briefen frafsen die Larven der *M. solstitialis* im Sommer 1835 fast in gleicher Anzahl mit denen der *M. vulgaris*. Er schlägt daher vor, die Käfer zur Flugzeit mit Fangbüscheln von Kiefern, die in den Culturflächen aufgesteckt würden, anzulocken. Da der Käfer aber eben so gern an Laubbölzer geht (s. vorher) so würde man ihn von den, gegen den Maikäfer einzurichtenden Fangbäumen abschütteln können.

Einen merkwürdigen Vorfall theilte mir noch Hr. Heyer mit. Auf mageren Brachfeldern und Weiden sahe er einstens, zumal bei Sonnenuntergang, Millionen der *Melolontha solstitialis* schwärmen und zu 30-50 in Knäuel geballt an der Erde sich wälzen. Die bewegte, alle Beschreibung übertreffende

Unzahl dieser Käfer bot, gegen die untergehende Sonne gesehen, einen überraschenden Anblick. Es zeigte sich, ungeachtet der grenzenlosen Menge, überall keine Spur ihrer Schädlichkeit! Ich vermuthete, daß sie aus diesen Feldern, wo ihre Larven gefressen haben, ausgekommen sind und daß sie, nach vollzogener Begattung, baumreichere Gegenden gesucht haben werden.

VERWANDT ist: *M. ruficornis* Fabr. (Taf. III. Fig. 6. Männchen.) (*Rhizotrogus ruficornis* Latr., *Melolontha marginata* Hbst.). Der *M. solstitialis* sehr ähnlich, aber kleiner (6") und unterschieden durch weniger gewölbte aber stärker und dichter runzlich-punktirte, nur sehr undeutliche Längsleisten zeigende Flügeldecken, so wie auch durch ein dunkles, zum Theil schwärzliches Braun, welches an den Füßen (wenigstens an den Rändern der Schienen und Fußglieder), am Halsschild und an den Rändern der Flügeldecken (besonders breit am hintern Theile), so wie an der (stets schwärzlich gesäumten) Nath herrscht, so wie auch durch noch dichter stehende Zottenhaare der Oberseite und der Brust. Nach Hrn. Erichson fände sie sich um Pfingsten in Kiefernknäueln. Bei Füßen in Bayern soll sie nach Hrn. Wallt früh Morgens auf Wiesen zu Tausenden gewesen sein. Hr. Heyer sah, wie er mir schreibt, diesen Käfer weder auf Wiesen noch in Gehölzen, wohl aber oft häufig im Mai und Juni früh Morgens bei Sonnenschein in sandigen, mageren Gegenden und Wegen schwärmen und kriechen, zuweilen in großer Gesellschaft von *M. aestiva*. Hr. Schlotthauber nennt ihn einen Feld- und Brackkäfer und fand ihn im Sommer 1827 im Juni oder Juli auf den kurzgrasigen Schafweideplätzen, Abhängen und Schluchten des Heinebogens in außerordentlicher Menge schwärmend und zwar bis Nachmittags 4 Uhr bei warmem, sonnigen Wetter. Ein rascher Aufzug und plötzliches Niederfallen nach schnellem, hummelartigen Umherschwirren charakterisirte ihn. Eigentlich nur wichtig wegen der möglichen Verwechslung mit *M. solstitialis*.

\*\* An allen 3 Paaren der Beine zwei gleiche divergirende oder dicht an einander liegende zweispaltige Haken; (*Omaloptia* Dej.)

#### 4. *M. brunnea* Linn. Rothbrauner Laubkäfer. (Taf. III. Fig. 12. Weibchen.)

NAMEN. Diese von Dejean wieder zu einer eigenen Gattung (*Omaloptia*) gebrachte Art, wurde seit Linné, der sie wieder zu *Scarabaeus* bringt, so genannt, wie oben angezeigt ist.

CHARACTERISTIK. Der *M. ruficornis* in der Gestalt sich nähernd, aber noch kleiner (4½") und fast ganz walzig, auch fast ganz kahl und bis auf Augen, Scheitel, Stirn und jederseits ein Halsschildflecken, welche schwärzlich sind, von einer schön rothbraunen Farbe, in gewisser Richtung zuweilen etwas metallisch schillernd. Kopfschild ausgerandet. Fühler neungliedrig. Fächer des Weibchens kaum so lang als die übrigen; die des Männchens viel länger als dieselben und gebogen. Halsschild in der Mitte wenig erweitert, fein und ziemlich weitläufig punktirt, in der Mitte schwach eingedrückt, an den Seitenrändern mit Borstenwimpern. Schildchen gleichschenkelig-dreieckig, fein punktirt. Flügeldecken an der Basis so breit wie Halsschild und mehr als dreimal so lang als derselbe, in der Mitte sehr wenig erweitert, nach hinten wenig verschmälert, stark gewölbt, hinten aber wenig abschüssig, an den Seitenrändern mit Borstenwimpern, punktirt-gestreift. Die Punkte der Reihen klein und dicht stehend, hier und da in die zur Seite stehenden verlaufend. Die Zwischenräume zwischen den Reihen erhaben und unregelmäßig, zum Theil runzlich-punktirt. Unterseite fein punktirt, am Hinterleibe, besonders am letzten Ringe, mit Borstenhaaren. Beine mit starken Borsten und Dornen, sehr zart, besonders die Fußglieder lang und dünn. Die beiden Haken ziemlich stark divergirend.

VORKOMMEN u. s. f. Diese Art ist, wie ich mich selbst i. J. 1836 überzeugt habe, zuweilen nicht ganz selten, und wird wahrscheinlich nur deshalb weniger bemerkt, weil sie in tiefster Nacht ihr Wesen treibt. Bei uns fanden sich nur wenige Exemplare lebend, die meisten sammelte man des Morgens in den

Gewebe der Kreuzspinne, in welchen sie, meist ganz umspannen, hängen. Einmal sahe man sie an Birken fressen. Die Flugzeit ist Juni und Juli. Hr. Saxen fand die Larven am Iberge in mit Moos untermengter Erde unter Steinen, wo sich Fichtenwurzeln durchzogen, einmal mit denen von *Atopa cinerea* zusammen. Hr. Heyer schreibt mir über sie noch: „Sie scheint zu den schädlichen nicht gezählt werden zu können und kommt hier nur einzeln vor. Einst fand ich jedoch auf einer, durch Regen in „einem Buchenholze entstandenen Pflütze, in welcher ein alter Buchenblock lag, eine Menge lebender und „todter, theils schwimmend, theils auf dem Blocke kriechend.“ Auch ich habe sie vor mehreren Jahren in und an einem Wässerchen in Buchenbeständen gefunden und es scheint fast, als ergötzen sie sich an solchen Orten durch Trinken und Baden. Noch mehr! Hr. Suffrian fand sie bei Dortmund jährlich auf einigen Teichen schwimmend und meist todt. Die Vermuthung, daß sie von den am Ufer stehenden Pyramiden-Pappeln herabgefallen waren, wurde dadurch bestätigt, daß ein Knabe, der hinaufgestiegen war, mehrere lebende Exemplare herunterbrachte.

VERWANDT sind: 1. *M. variabilis* Fabr. (*Omalopia variabilis* Dej.). (Taf. III. Fig. 11. Männchen.) Der *M. brunnea* sehr ähnlich, aber etwas kürzer (4") und gedrungener, auch oben stärker gewölbt und von dunkel schwarzbrauner, etwas perlgrau in gewisser Richtung schillernder Farbe, die nur auf der Unterseite, auf den Füßen, Fühlern und Tastern heller bräunelt. Fühler zehngliedrig. Fächer des Männchens sehr stark verlängert, linienförmig. Auch ist die Punktirung überall gröber und dichter, auf den Flügeldecken stehen einzelne und auf der zum Theil behaarten Unterseite häufigere, zerstreute, kurze Borstenhaare, Schildchen gleichseitig-dreieckig. Die beiden Haken dicht an einander liegend. ÜBER VORKOMMEN u. s. f. noch wenig bekannt. Sie gehört zu den seltensten Arten und fliegt im Mai. — 2. *M. ruricola* Fabr. (*Omalopia ruricola* Dej.). (Taf. III. Fig. 13. Weibchen.) Den beiden vorigen ähnlich, aber stets kleiner (3") und besonders kürzer und gedrungener, auch ausgezeichnet durch die rothbraunen, in gewisser Richtung grau schillernden, an der Nath so wie an den Aussen- und Vorderrändern breit schwarz gesäumten Flügeldecken, so wie auch durch die starke, zum Theil borstenartige Behaarung des ganzen Körpers. Kopfschild gar nicht ausgerandet. Fühler neungliedrig. Halsschild grob aber ziemlich weitläufig punktirt, in der Mitte mit schwacher Längsfurche. Schildchen gleichschenkelig-dreieckig, ziemlich grob und weitläufig punktirt. Flügeldecken nicht viel mehr als zweimal so lang als Halsschild, mit wenig vertieften Punktstreifen und sparsamern und schwächern Punkten. Haken der Fußglieder stark divergirend. VORKOMMEN u. s. f. Im Ganzen selten, hier und da auf großen Haiden gefunden.

\*\*\* Die beiden Haken des dritten Paares der Beine ganz, das vordere des ersten und zweiten Paares zweispaltig: (*Anomala* Dej.)

#### 5. *M. Frischii* Fabr. Frisch's Laubkäfer. (Taf. III. Fig. 10. Weibchen.)

NAMEN. Fabricius nannte diese, von Dejean erst kürzlich zur Gattung *Anomala* gezogene, Art nach dem alten, braven Frisch, welcher sie zuerst sammt ihrer Verwandlung beschrieb (*Ins. Deutsch.* Th. 9. S. 30.) und sie Juniuskäfer nannte. Seine *M. Julii* ist bestimmt nur eine Varietät dieser Art.

CHARACTERISTIK. Etwas größer als *M. ruficornis* (7-5"), besonders breiter und gewölbt, auch oben, bis auf einige Wimpern, kahl u. s. w. Stirn und Kopfschild stark und dicht punktirt, letzteres nur wenig zurückgedrückt und zurückgeschlagen. Lefze stark gebuchtet. Halsschild sehr gewölbt, überall sehr dicht und tief punktirt. Schildchen abgerundet-dreieckig, grubig. Flügeldecken an der Basis so breit wie der Halsschild und nicht viel mehr als zweimal so lang als derselbe, hinten verschmälert, punktirt-gestreift, die Punkte grob und dicht, aber unregelmäßig und mit denen der Zwischenräume verfließend. Unterseite punktirt, schwach und weitläufig behaart. Beine ziemlich kurz. Farben des Kopfes (mit Ausnahme der Fühler, Augen und Mundtheile), des Schildchens und des Kopfschildes, so wie

der Unterseite und der Beine metallisch-grün, letztere etwas dunkler, die der Flügeldecken, zuweilen auch des Halsschildrandes, braun und metallisch-grün überflogen. Es giebt auch dunklere, meist etwas mattere Varietäten, die zuweilen selbst einen bläulichen Halsschild, so wie auch sogar einen bläulichen Anflug der Flügeldecken haben, oder auch ganz bläulich-schwarz sind. Diese sind wahrscheinlich die von Fabricius *M. Julii* genannten.

VORKOMMEN u. s. f. Wieder eine der gemeinsten und hin und wieder auch schädlicheren Arten. Man findet sie bald im Juni, bald erst im Juli schwärmend und zwar mehr an niedrigen Sträuchern, selbst jungen (Birken-) Pflanzen, als an großen Bäumen. Auch an den Kornähren hängen sie. Die Käfer fliegen auch bei Tage sehr lebhaft und schnell.

6. *M. horticola* Linn. Garten-Laubkäfer. (Taf. III. Fig. 9. Weibchen.)

NAMEN. Diese, eben so wie die andern, bei Linné zu *Scarabaeus* gezählte Art wird gewöhnlich *Anisoplia horticola* genannt (s. Latr. in Cuv. *régne an.* T. IV. p. 563.), gehört aber offenbar mit *M. Frischii* (welche eine *Anomala* ist) zusammen. So steht es mit diesen Gattungen!

CHARACTERISTIK. Der *M. Frischii* in Gestalt und Farben ähnlich, aber kleiner ( $5\frac{1}{2}$ “) und etwas schmaler, auch nicht so gewölbt. Die Punkte des Kopfes, des Halsschildes und des Schildchens nicht ganz so grob und grubig. Die Punktreihen der Flügeldecken stehen viel dichter und lassen nirgends einen breiten Zwischenraum. Die Punkte undeutlich, oft zu einer tiefen Rinne, besonders bei dem mehr flachen Weibchen, zusammenfließend. Die Behaarung auf der Unterseite stärker und auf der Oberseite deutlicher. Die Häkchen der Männchen stärker gespalten. Die Farben glänzender und deutlicher grün und braun, letztere nur wenig metallisch überflogen, zuweilen sehr dunkel und dann auch deutlicher metallisch-glänzend.

VORKOMMEN. Auch diese Art gehört zu den gemeinsten und beachtenswerthesten. Im Juni, meistens schon im Anfange, findet man Sträucher (besonders Rosen und Weiden), Garten- und Waldbäume hier und da ganz beladen mit ihnen. Sie fressen an Blättern (einmal an Haseln und Aspen sehr bedeutend) und Blüten (nach Hrn. Hegetschweiler S. 72. besonders an Apfelblüthen) sehr stark, zernagen nach Hrn. Schmidberger (*Obstb.* I. 271.) sogar die jungen grünen Äpfel. Nach Hrn. Plieninger (*Malkf.* S. 82.) und Bechstein (*Forstins.* S. 209.) richtet auch die Larve an Gartengewächsen beträchtliche Verwüstungen an. Hr. Saxen vermutet, daß die Verrüstungen, welche vor einigen Jahren die Bergwiesen des Harzes erlitten, von den Larven dieser Art herrührten, die er auch an Fichtenwurzeln daselbst fand. In unsern Gegenden bemerkte ich sie auch nur alle fünf Jahre in so ungeheurer Menge. Die Käfer sind am Tage auch sehr beweglich, und müssen deshalb früh Morgens abgeschüttelt werden. Sie sitzen sehr häufig niedrig und können leicht in Fangschirme gesammelt werden. Hr. Bouché (*Gartenins.* S. 20.) klagt auch sehr über diese Art und bemerkt, daß die Larve (welche sich nur durch die geringere Größe auszeichnen soll) den Wurzeln der Topfgewächse sehr schadet und daß die gefräßigen Käfer in Gärten öfters niedrige Obstbäume völlig entblätterten und auch an den Rosen so arg hausten, daß die Ernte der Hambutten ganz verloren gieng. Hr. Heyer nennt diese Art auch im Lüneburg'schen sehr gemein und Hr. Burckhardt beobachtete sie in Gesellschaft mit *M. argentea* (s. dort).

\*\*\*\* Die beiden Häkchen an allen drei Paaren der Beine ungleich und ganz, oder höchstens das größere an der dem kleinern zugekehrten Seite mit einem schuppenartigen Zahnchen (Fig. 7cd). (*Anisoplia* Meg.)

7. *M. fruticola* Fabr. Getreide-Laubkäfer. (Taf. III. Fig. 7. Weibchen.)

CHARACTERISTIK. Der *M. horticola* in Größe ( $5\frac{1}{2}$ –6“), Gestalt und Farben sehr ähnlich, jedoch unterschieden durch die Bildung der Häkchen, den mehr rüsselförmig vortragenden Kopfschild, so wie

auch durch die stärkere, zottige Behaarung, besonders des Kopfes, des Halsschildes, des Schildchens so wie der Unterseite, welche greisgrau erscheinen. Der Halsschild dichter punktirt. Die Punktstreifen der Flügeldecken undeutlich, weniger vertieft und gegen die Basis, in der Nähe des Schildchens, ganz verschwindend. Die Punkte der runzligen Zwischenräume feiner und dichter. Die kleinern Haken des ersten Paares der Beine beim Männchen noch kleiner als beim Weibchen, die größern mit deutlichem Schuppenzahn; die kleinern des zweiten und dritten Paares beim Männchen und Weibchen nicht so klein. Die Farben der Flügeldecken heller gelbbraun, beim Weibchen an der Basis mit einem, auch das Schildchen einnehmenden, schwarzbraunen Fleck.

VORKOMMEN u. s. f. In manchen Jahren eben so häufig wie die vorigen, aber vorzugsweise am Getreide, an welchem sie die Staubkölbchen fressen. An Strauch-Weiden sahe ich sie auch schon, doch nicht so häufig. Sie fliegen Mitte Juni und können, da sie immer niedrig sitzen, sehr bequem in Fangschirme gesammelt werden. Die Larven fand Hr. Bouché in der Erde in halb verfaultem Dünger.

VERWANDT ist: *M. agricola* Fabr. (*Anisoplia agricola*.) (Taf. III. Fig. 8. Weibchen.) Der *M. horticola* sehr ähnlich und daher auch von Illiger für Var. derselben gehalten, jedoch stets etwas größer und breiter und ausgezeichnet durch ein (freilich nicht immer deutliches) braunschwarzes Kreuz, welches durch eine dunkle Querbinde und dunkle Einfassungen sämtlicher Ränder der Flügel entsteht. Auch Kopf, Halsschild und Schildchen sind braunschwarz. Die Punktstreifen der Flügeldecken noch schwächer. Die kleinern der beiden Haken an allen drei Paaren der Beine ziemlich gleich lang, etwa fünf Sechstheile der Länge der größern betragend und die Schuppenzähnen, besonders am ersten und zweiten, deutlich zeigend. Dann und wann häufig und zwar schon im April und Mai, gewöhnlich am Grase. Nach Hrn. Hartig (*Conv. Lex.* S. 555.) auf Kiefernulturen.

\*\*\*\* Am dritten Paare der Beine oder auch an allen drei Paaren, nur ein Haken (Fig. 14cd). Mundtheile kleiner mit undeutlichen Zähnen. (*Hoplia* III.)

#### 8. *M. argentea* Fabr. Silberschuppiger Laubkäfer. (Taf. III. Fig. 14. Männchen u. 15. Weibchen.)

NAMEN. Nach Hrn. Erichson's Meinung die ächte Fabricius'sche und auch Illiger'sche Art. Höchstwahrscheinlich auch die *Hoplia argentea* von Gyllenhal. Andre Synonyme verwirren und sind aufzugeben. So erhielt ich diese Art von mehreren tüchtigen Entomologen als *pulverulenta*. Die *pulverulenta* Fabr. gehört aber nach Hrn. Erichson eigentlich zu *graminicola* und ist von Illiger (*Mag.* II. 229.) für einerlei mit *argentea* genommen. Die *pulverulenta* Oliv. (*lepidota* Ill.) ist eine ganz andre, fremde Art. Illiger (Übers. v. Oliv. *Enlom.* Th. I. S. 93.) hält seine *argentea* für den Linné'schen *Scarabaeus fuscicornis*.

CHARACTERISTIK. 4<sup>te</sup> lang. Der *M. horticola* ähnlich, nur etwas schmaler und gewölbt. Fühler zehngliedrig. Fächer beim Weibchen rundlich-eiförmig und die beiden letzten Glieder des Fadens sehr klein, beim Männchen der letztere deutlicher und größer und der Fächer mehr verlängert. Kopfschild ziemlich schmal, vorn abgestutzt, etwas zurückgeschlagen und, so wie die Stirn, gekörnt-gerunzelt. Halsschild ziemlich gewölbt, gekörnt, an den Seiten etwas erweitert, beim Männchen jedoch mehr als beim Weibchen, ohne Mittelfurche, mit etwas nach hinten gezogenen, ziemlich spitzigen Winkeln. Flügeldecken nicht viel mehr als zweimal die Länge des Halsschildes übertreffend, nicht sehr gewölbt, auf der Mitte einer jeden mit zwei deutlichen, von der Basis bis zum Höcker verlaufenden Leisten. Die Beine des Männchens, besonders die hintern, länger als die des Weibchens. Die Schienen des ersten Paares am Außenrande mit zwei größern und einem kleinern zackigen Dorn. Die Haken des ersten Paares un-

gleich, beide an der Spitze schwach zweispaltig, das des dritten Paares einzeln mit einem schwachen Schuppenzähnen. Die Farben des Kopfes (mit Ausnahme der Taster und der Fühler, welche erstere ganz und welche letztere zum Theil röthlich-braun sind), des Halsschildes, des Schildchens so wie des Hinterleibes (beim Männchen auch zuweilen des größten Theiles der Füße) schwarz, der Flügeldecken und meist auch der Beine röthlich-braun oder schwärzlich-braun, überall (mit Ausnahme der Augen, Fühler, Taster und Fußglieder) mit sparsamen, kleinen, metallisch-grün schillernden Schüppchen bedeckt, zwischen welchen sich sehr vereinzelt und sehr kurze, etwas angedrückte, braune Borstenhärchen finden, die nur auf dem Kopfe, dem Halsschilde und der Brust etwas länger sind.

VERWANDT ist dieser eine, ebenfalls durch zehngliedrige Fühler ausgezeichnete, Art, welche jedoch etwas breiter und größer ist und besonders stärkere Behaarung, auf dem Halsschilde sogar lange Zotten zeigt. Die Vorderschienen haben nur zwei Dornen. Die Haken auffallend lang, besonders der Hinterbeine, wo sie mehr als die Länge der beiden letzten Glieder haben, bei einem Individuum die Flügeldecken schwarz, beim andern braunroth (*pratricula* Dahl). Füße bei beiden schwarz.

VORKOMMEN u. s. f. In einigen Gegenden hat sich diese Art schon ziemlich bemerklich gemacht, so z. B. in den Thälern des Harzes im Juni 1834 an Erlen (Hr. Saxesen). Im Juni des J. 1838 beobachtete Hr. Burckhardt zahllose Schwärme dieses Käfers mit *M. horticola* untermischt in einer Eichenpflanzung des Solling, wo sie einen sichtbaren Schaden am Laube der jungen Eichen anrichteten. Sie benahmen sich dabei ungemein unruhig und unstät. Während die einen frassen, schwärmten die andern und dies wechselte unausgesetzt. Auffallend war aber ihr plötzliches Verschwinden. Tags nach ihrer großen Häufigkeit bei gleich günstigem Wetter wurden wohl 5 Stämme geschüttelt, ehe ein Paar Exemplare zusammen kamen. Hr. Heyer hat diese Art ebenfalls einmal sehr häufig gesehen, aber in der Mitte Juli's und auf einer in sandigen Gegenden belegenen Weide. Andern Erfahrungen ist wegen der Namen-Verwirrung nicht zu trauen. Sammeln durch Abklopfen ist das einzige Mittel.

#### 9. *M. graminicola* Fabr. Gras-Laubkäfer. (Taf. III. Fig. 16. Weibchen.)

NAMEN. Nach Hrn. Erichson die ächte Fabricius'sche und sicher auch die Gyllenhal'sche *Hoplia graminicola*. Hierher gehört auch die *squamosa* von Paykull, wegen die *squamosa* von Fabr. und III. die größere, prächtig grüne, stüdlichere Art ist.

CHARACTERISTIK. Der *M. argentea* ähnlich, nur noch kleiner ( $3\frac{1}{2}''$ ), stärker gewölbt und mit viel zahlreicheren metallisch-grünen Schüppchen, aber sparsamern Härchen bedeckt. Die Fühler nur neungliedrig (16 e). Die Mitte des Halsschildes durchzieht öfters eine etwas vertiefte, auch mehr von Schüppchen entblößte Mittellinie. Flügeldecken kaum doppelt so lang als der Halsschild, auch nahe der Basis desselben stärker erweitert. Die beiden Leisten des Mittelfeldes undeutlich. Die beiden großen Dornen der Vorderschienen durch eine weitere und tiefere Bucht gesondert. An allen drei Paaren der Beine nur ein Haken mit sehr schwachem Schuppenzahn. Die Weibchen breiter und dicker, mit kürzern und dickern Hinterbeinen (besonders kurzen Schienen) und sehr dickem, stark nach unten gewölbten Hinterleibe und kaum abwärts gebogenem Steife.

VORKOMMEN u. s. f. Hier und da zuweilen häufig, so bei uns im Juni 1836. Theils wurden sie von Pappeln geklopft, theils krochen sie am Grase herum. Werden jedoch, wegen ihrer geringen Größe, wohl nicht merklich schädlich werden. Auch hier könnte nur Sammeln helfen.

## Zweite Gattung.

*Cetonia* Fabr. Metallkäfer, Goldkäfer. (Taf. III. Fig. 18.)

Das Kennzeichen des auf der Oberseite deutlich bemerkbaren Schulterstückes (s. S. 72.) ist ganz untrüglich. Sonst haben die Käfer ziemlich viel Ähnlichkeit mit den Laubkäfern, unterscheiden sich aber durch einen kleinern Kopf, vorn auffallend verschmälerten und hinten sehr breiten Halschild, sehr großes Schildchen und auch auffallend breite, wenig gewölbte Flügeldecken mit stark vorstehender Nath und undeutlichen oder ganz fehlenden Rippen. Die Beine sind sehr breit und stark, die Unterseite ziemlich gewölbt und mit sehr deutlichem Schulterstücke. Die Farben meist schön metallisch. Auch die Mundtheile (s. Taf. III. Fig. 18b, c, d) denen der Laubkäfer ähnlich, nur die Lefze versteckter, dünner, die Oberkiefer kleiner, dünner, sehr schwach, die Unterkiefer schmal und ebenfalls schwächer, mit beweglichem, fast ganz mit langen Haaren verhüllten Hornstücke und kurzen Tastern, und endlich die Lippe gebuchtet und das erste Tasterglied ganz versteckend (s. daher den neben Fig. 15d besonders dargestellten Taster.) Die Larven (s. Taf. III. Fig. 18a) denen der Laubkäfer sehr ähnlich, aber unterschieden durch kürzern, gedrungern Bau (daher auch weniger gekrümmt in der Seitenlage), stärkere Anschwellung des letzten Ringes, viel längere und dichtere Behaarung, kleinern Kopf, kürzere Fühler und kürzere Füße, welche an Stelle des Hückchens ein fleischiges Gliedchen zeigen. Die Luftlöcher sind flacher, am Vorderrande gebuchtet, mit wenig erhabenem, mehr in der Mitte liegendem Knöpfchen. Der erste Ring jederseits mit deutlichem Hornleck. Die Mundtheile zeichnen sich dadurch aus, dafs die Oberkiefer kürzer sind und starke spitze Zähne haben, dafs beide Lappen des Unterkiefers verwachsen sind und nur mit wenigen Zähnen versehen erscheinen, und kurze, aus kleinen rundlichen Gliedern bestehende Taster haben und dafs auch endlich die Unterlippe etwas kleiner ist. In der Conformation der Puppe bemerkt man gar keinen Unterschied, nur dafs sie noch gedrungener als die der Laubkäfer erscheinen und sich festere Cocons aus Erde, Abnageln, Holz- und Nadelstückchen bilden, in denen man sie meist im Frühlinge findet, oder auch schon im Herbst und den ganzen Winter hindurch.

VORKOMMEN, LEBENSWEISE, FORSTLICHE BEDEUTUNG UND BEGEGNUNG können hier schon im Allgemeinen gegeben werden, da nur sehr wenige Arten hier in Betracht kommen und diese sehr übereinstimmen. Die Generation ist eine mehrjährige, wie die der Maikäfer, kommt aber wahrscheinlich ein bis zwei Jahre früher zu Stande. Die Larven halten sich auch versteckt, entweder in der blofsen Erde oder in der Nähe faulender Stöcke, oder in denselben, oder selbst an den Wurzeln lebender Bäume, welche durch den Frafs andrer Insecten kränklich geworden sind. So sah ich einst an einer von *Cerambyx Carcharias* befallenen Pappel eine Menge Cetonien-Larven, welche da, wo sich die stärksten Wurzeläste trennten, frafsen und hier förmlich ein Nest bereitet hatten. Brachte man sie über die Erde, so wühlten sie sich noch schneller als die Engerlinge wieder ein, nämlich in einer halben Minute bis 1' tief, während die Engerlinge kaum damit anfangen hatten. Auch in anbrüchigen Eichen fand ich sie, wie Bechstein (*Forstins.* S. 212.). Hr. Plieninger schreibt mir, dafs er die Larven zu Tausenden in Pflanzen- und Dünger-Composthaufen gehabt habe, und dafs einige Landwirth in Erfahrung gebracht hätten, die Larven der Cetonien (es ist hier von keiner einzelnen Art die Rede) richteten auf ähnliche Art wie die der Melonthen, jedoch in weit geringerem Grade, Schaden an den Pflanzenwurzeln an. Wahrscheinlich begnügen sie sich, da sie immer in geringerer Menge erscheinen, gewöhnlich mit verwesenden vegetabilischen Körpern, gleich wie auch die Engerlinge, wenn sie solche haben, sich nicht an Pflanzenwurzeln machen. Höchst interessant ist es, dafs die Larven der *Cetonia aurata* (Rösel wufste es schon!) häufig in den Haufen der *Formica rufa* gefunden und von diesen auch geduldet werden (woher der Glaube des gemeinen



Mannes an besondere Kräfte dieses Wurmes, die Betrügereien mit dem Hecke männchen u. dergl.) und dafs die der *C. fastuosa* nach Hrn. Zebe's Beobachtungen in den Stöcken der wilden Bienen leben! Hr. Heyer bemerkt hierbei, dafs er in den Haufen der grossen Ameise nur *Cocons* und Larven der *Cetonia aenea* Gyll. aber nicht die der bei Lüneburg gemeinen *C. aurata* gefunden habe. Ganz sicher überzeugt bin ich allerdings nicht, dafs die, der Art nach wohl kaum zu unterscheidenden, Larven, welche ich so oft in Ameisenhaufen fand, grade der *aurata* angehörten, ich vermuthete es nur, weil ich den Käfer so häufig in der Nähe und sogar auf alten Kiefernstöcken sitzend antraf. Es ist auch höchst wahrscheinlich, dafs beide, so nahe verwandte Arten in diesem Zuge der Lebensweise nicht von einander abweichen und die Beobachtung des Hrn. Heyer zeigt nur, dafs er grade auf die *aenea* traf, als ihm die Zucht der Cetonien glückte. Bei Gelegenheit der Beobachtung des Hrn. Zebe bemerkt Hr. Hartig (*Jahresber.* a. a. O.), dafs er *C. fastuosa* gefunden habe, wo es keine wilden Bienen gebe. So gut wie die Larven der kleinern Cetonien auch ausserhalb der Ameisenhaufen von mir gefunden wurden, so können die der *fastuosa* auch wohl wo anders, vielleicht selbst an alten, kranken Wurzeln leben. In unsrer Gegend kommt *C. fastuosa*, wenn auch selten, vor, ohne dafs ich hier wilde Bienen wüfste. In Oberschlesien, wo letztere gewifs gemein sind, ist auch diese schöne Art häufig. Die Käfer erscheinen in manchen Jahren im Juni und Juli in grosser Menge und versammeln sich dann besonders gern auf blühenden Sträuchern und Bäumen, deren Blüthen sie in Gärten zuweilen empfindlichen Schaden zufügen. Jemand will einmal beobachtet haben, dafs sie auch an der zarten Rinde junger Obstbäume nagten und dadurch schädeten. Demnach würden die Cetonien gewöhnlich nur als unmerklich schädlich anzusprechen sein und vielleicht nur ausnahmsweise merklich schädlich werden. In diesem Falle kann man sie wie die Maikäfer des Morgens früh von den Zweigen schütteln und klopfen. Am Tage, besonders wenn es warm ist, sind sie sehr flüchtig und fliegen, wenn sie gestört werden, sogleich mit grossem Gesumme davon. Rüssel (a. a. O. S. 17.) hat den Käfer drei Jahre lang mit angefeuchtem weissen Brod erhalten.

#### A r t e n .

Die Taf. III. Fig. 18, abgebildete, gemeinste, 8-9" lange Art: *Cetonia aurata* Fabr. (*Scarabaeus auratus* Linn.) zeichnet sich durch das schöne Smaragdgrün aus und unterscheidet sich dadurch von einer auch hier und da sehr häufigen, in der Gröfse meist ganz gleichen, aber stets schmutziger bräunlich-grünen Art, der *C. aenea* Gyll., welche überdies noch einen (zwischen dem zweiten Paare der Beine vorragenden) flachen, vorn abgestutzten Brustfortsatz und nicht einen kugligen (wie *C. aurata*) hat. Viel seltener sind die 11" lange, grünlich-braune, weifs gepunktete *C. marmorata* Fabr. und die über 12" lange, colossale, smaragdgrüne, einen schönen Kupfer-Reflex zeigende *C. fastuosa* Hb.

#### Dritte Gattung.

*Trichius* Fabr. Pinselkäfer. (Taf. III. Fig. 17.)

Die Käfer haben mit den Metallkäfern die meiste Ähnlichkeit, ja sind eigentlich nur durch das von oben nicht recht sichtbare Schulterstück unterschieden, auch sind bei den meisten die Flügeldecken noch kürzer. Die Farben meist sehr schön, oft bunt. Auch die Mundtheile zeigen viel Übereinstimmung, nur dafs die Haare der Unterkieferlade noch länger sind und daher wohl zur Benennung Pinselkäfer Anlafs gaben. — Die Larven sind denen der Cetonien sehr ähnlich, nur (die von *T. Eremita*) etwas schlanker, auch hinten weniger dick, mit sehr vielen, langen und besonders dicken, braunen Haaren besetzt. Der Kopf auffallend gros. Oberkiefer ohne Zahn. Unterkiefer mit verwachsenen Leppen, ohne Zahn,

kurzen Tastern und starkem Borstenhaar. Fülse länger als bei *Cetonia*, auch ohne ordentliche spitze, hornige Häkchen. Die Puppen ebenfalls denen der Cetonien sehr ähnlich und auch in einem aus Erde und Abnageln bereiteten Cocon eingeschlossen. Linearfleck vor dem After fehlt. Luftlöcher flach.

Über VORKOMMEN u. s. f. kann ich aus eigener Erfahrung nichts weiter sagen, als dafs ich den Käfer von *T. nobilis* zuweilen im Juni und Juli auf verschiedenen Bäumen (besonders *Sambucus*) gesammelt habe. Nach Bechstein (*Forstins.* S. 211.) soll er Blüthe fressen und seine Eier an anbrüchliches Holz legen, wodurch die Larve ein Holzwurm, und durch sie das Verderben absterbender Bäume befördert würde. Hr. Saxesen fand *T. 8-punctatus* bei Lüneburg in Erlen häufig, und ich *T. hemipterus* in einem Winter in Weiden in ungeheurer Menge. Rösel (a. a. O. S. 18.) fand die Larven an den Wurzeln eines abgestorbenen Pflaumenbaumes, welcher ganz durchlöchert war. Hr. Häberlin, einer meiner Zuhörer, fand die Larven von *T. Eremita* im Sommer in großer Menge in kernfaulen Buchen bis hoch hinauf. Von Hrn. Hartig (*Jahresber.* a. a. O. S. 155.) auch aus faulen Eichen von Hrn. Apetz aus dem Lurnern alter hohler Linden in Menge gezogen und von Hrn. Suffrian in Weidengefunden. Hr. Schlott- hauber fand sie als Larven (aus denen später auch Käfer erzogen wurden) in einem hohlen Apfelbaume in solcher Menge, dafs wohl einige Metzen Baumerde und Genagel herausgeschafft wurden. Am häufigsten sollen sie, nach demselben, in Eichen leben. Hr. Heyer und Hr. Suffrian bemerkten bei *Trichius nobilis*, dafs sie ihn immer auf den Blumen des Flieders und auf Schirmpflanzen (Hr. Suffrian im Selkethale auch auf den Blumen von *Valeriana officinalis*) finden, meist in Gesellschaft mit *Cetonia aurata*, auch wohl auf dem Laube der Weiden und an dem ausgetretenen Saft der Bäume saugend. *Trichius 8-punctatus* fand Hr. Heyer in Brüchern beim Sonnenschein fliegend, auch auf Blättern und Blumen ruhend und einmal sogar in einer fast ganz hohlen, von einer Seite offenen, alten Eiche. Die Käfer safsen an den Wänden und dem Boden in großer Menge. Sie mufsen aus dem Boden gekommen sein und waren eben flugfertig, denn so wie er staunend einzutrat, begann die flüchtige Auswanderung und er erwischte nur mit Mühe noch 20 Stücke! Hr. Schlott- hauber fand die Larven in einem hohlen Eichen- stücken und *T. hemipterus* oft in unsäglicher Menge in schäumenden Geschwüren der Obst- und Weiden- bäume. Werden kaum je merklich schädlich werden.

#### A r t e n.

Der Taf. III. Fig. 17. von Bechstein als schädlich angeführte, 7-8" lange *T. nobilis* Fabr. (*Scarabaeus nobilis* Linn.) ist auch wohl der gemeinste und zeichnet sich durch sein schönes ins Kupferrothe spielende Grün genugsam aus. *T. 8-punctatus* Fabr. (*Scarabaeus variabilis* Linn.) ist ein wenig gröfser und schwarz mit acht weissen Punkten. *T. Eremita* Fabr. (*S. Eremita* Linn.) ist dunkelbraun und 10-14" lang, auch wie gesagt, zuweilen sehr gemein.

#### Vierte Gattung.

##### *Lucanus* Fabr. Schröter. (Taf. III. Fig. 19.)

Diese Käfer weichen schon mehr von der in dieser Familie herrschenden Gestalt ab, dadurch, dafs sie länger und paralleler erscheinen und besonders durch die, alle weitere Charakteristik sparenden, grossen Oberkiefer (s. Taf. III. Fig. 19.) den ganzen Mund von unten). Die Unterkiefer am langen Innenrande mit auffallenden Haarpinseln. Die sehr tief gespaltene zweilappige, hinter dem grossen hornigen Kiem ver- steckte Lippe auch sehr lang behaart, so dafs hier eine Annäherung an die saugenden Mundtheile entsteht. Die Larven (von *L. parallelipipedus* s. Taf. III. Fig. 19a.) haben grossen Kopf, lange Fülse und sind auch in der ganzen Form mehr den Laubkäfer- als den Metalkäferlarven ähnlich, jedoch fehlen die Keil- und Hinterwülste vom vierten Ringe an ganz. Der After liegt der Länge nach zwischen zwei grossen Wülsten. Der lineare Fleck und die Dörchen an der Unterseite des letzten Ringes sehr undeutlich. Die Larve von *L. Cervus* hat wieder etwas kleinern Kopf, überall deutliche Keilwülste, ist überhaupt etwas gedrungener

und auch wegen der kürzern Füße etwas mehr den Metallkäferlarven ähnlich. Die Puppen (s. die von *L. parallelipedus* Fig. 19c) sind gedrunen, überhaupt den Maikäferpuppen in der Lagerung der Theile ähnlich, jedoch auf den ersten Blick ausgezeichnet durch den stark vorragenden Oberkiefer und die zurückgelegten Fühler und die scharfen Höckerchen an der Oberseite der Hinterleibsringe.

In VORKOMMEN und LEBENSWEISE entfernen sich die Schröter mehr von den vorigen, indem ihre Larven und Puppen nur im Holze leben. Meistens wählen sie faule Stöcke und Stämme, dann und wann aber auch anbrüchige oder keru faule lebende Bäume. Die Weibchen begnügen sich nicht die Eier aufsen abzulegen, sondern sie arbeiten sich tief in das Holz hinein, um zu legen, wie ich das mehrmals an Eichen von *L. parallelipedus* beobachtete. Männchen und Weibchen arbeiten gemeinschaftlich. Die Larven gebrauchen mehrere Jahre zu ihrer Entwicklung, denn ich fand schon ganz kleine mit halb und ganz ausgewachsenen Larven zusammen. Ihre Gänge ziehen sich nach allen Richtungen geschlängelt durch das (oft schon ganz bröckliche und modernde) Holz und sind mit dicken Würsten von Wurmmehl verstopft. Sie finden sich hier öfters in großer Menge und selbst von dem Hirschschröter, dessen Larven ich gewöhnlich in dem mit Erde gemischten Mulm nalter hohler Eichen fand, sahe Hr. Waltl gegen 40 Puppenhöhlen von der Größe der Hühnereier in einer hohlen Eiche. Die Käfer fliegen im Mai und Juni, auch wohl noch viel später, wenn sie von einer verspäteten Brut herrühren (ich fand selbst im Winter frisch entwickelte Käfer im Holze) und schwärmen besonders des Abends gern. Am Tage sieht man sie an Bäumen sitzen, da wo sich ein Ausfluss von Säften zeigt, den die Hirschschröter besonders gern auflecken. Auch fressen sie wohl an Blättern und Knospen, wie Hr. H. Pfeil dies von *L. caraboides*, der aber glücklicher Weise nie in großer Menge erscheint, an Aspen bemerkte. Die Knospen waren so befallen, dass sie bei der geringsten Berührung in der Hand blieben. Die Wiege des Insects (welches ich schon aus Kiefern- und Buchenwurzeln herausmeißelte) soll nach Hrn. Schlottthanber ganz vorzüglich in Eschen sein, denn er fand es nicht allein fast in jedem theilweise weißbrüchigen, hohlen oder morschen, übrigens noch vegetirenden Stämmen und Stuken dieses Baumes, sondern auch einmal in sehr großer Menge in einem gesunden Stamme.

Die FORSTLICHE BEDEUTUNG ist demnach nur gering und man kann alle Arten wohl nur unmerklich schädlich nennen, ich mußte sie jedoch hier, wenn auch nur kurz, berühren, da sie von allen wichtigen Forstschritstellern wie Pfeil (*Krit. Bl.* Bd. X. H. I. S. 112.), Bechstein, Linker u. A. erwähnt werden und überhaupt so sehr bekannt, auch die meisten wegen ihrer Größe auffallend sind.

#### A r t e n .

Die überall am häufigsten erscheinende und daher auch für den Forstmann auffallendste Art ist der 8-12" lange *L. parallelipedus* Fabr. (Balkenschröter, viereckiger Schröter, Kannenkäfer) [Taf. III. Fig. 19. das Männchen und 19k der Kopf des Weibchens. Fig. 19a die über 12" lange Larve und Fig. 19c die 11" lange männliche Puppe], ausgezeichnet durch seine schwarze Farbe und den auffallenden Parallelismus seiner Seiten. Hier und da auch sehr häufig ist dann der Riese unter den deutschen Käfern *L. Cervus* Fabr. (*Scarabaeus Cervus* Linn.) [Hirschschröter, Hirschkäfer, Hornschröter, fliegender Hirsch (wegen der gewöhnlichen Oberkiefer), Feuerschröter, Feuerwurm, Börner (wegen des Verdachtes, in welchem man den Käfer ehemals hatte: dass er seine langen Zangen gebrauchte, glühende Kohlen auf Häuser und Scheunen zu tragen und letztere dadurch zu entzünden), Pferd klemmer, Waldkäfer, Eichhorns u. s. f.], ausgezeichnet durch die schöne braune Farbe und die Oberkiefer, welche beim oft 2" langen, albekannten Männchen ganz ungeheuer groß sind und allein 1" messen, beim 1" 6" langen, hierneben abgebildeten



Weibchen auch noch sehr auffallend sind. Auffallend kleinere Individuen (von 1 Zoll Länge) werden von Einigen als eigne Arten betrachtet und *L. Capreolus* u. s. f. genannt. Endlich ist eine dritte, ebenfalls hier und da zuweilen häufige, kleinste (5" lange) Art *L. caraboides* Fabr. (*Scarabaeus caraboides* Linn. blauer Schröter), ausgezeichnet durch metallisch blaue (Männchen) oder grüne (Weibchen) Farbe.

#### Fünfte Gattung.

#### *Sinodendron* Fabr. Walzenkäfer.

Die einzige deutsche Art dieser Gattung, das 6" lange und 3" breite *S. cylindricum* Fabr. (*Scarabaeus cylindricus* Linn.) unterscheidet sich von allen übrigen auf den ersten Blick durch vollkommen walzigen Bau, durch schwarzbraune Farbe und durch ein Horn des Kopfschildes, welches beim Männchen sehr groß ist. Ich habe auch schon Larven, Puppen und Käfer (und zwar im Winter beisammen) zahlreich in faulen Ästen lebender Buchen gefunden und ihn im Mai und Juni in allerlei Bäumen gesehen. Wahrscheinlich ist er immer erst Folge der Fäulniß der Bäume und brütet erst, wenn diese schon sehr bedeutend ist.

#### A n h a n g.

Ganz entfernt bemerkenswerth wäre hier noch der, durch seine Größe (15" lang und 6" breit), seine braune Farbe und sein großes Kopfschild-Horn (beim Männchen) ausgezeichnete Nashornkäfer, *Geotrupes nasicornis* Fabr. (*Scarabaeus nasicornis* Linn.), weil seine Larve in noch nicht ganz abgestorbenen Bäumen (besonders Eichen) lebt, die Lohe gern zerfrisst und dadurch ganz besonders in Treibhäusern und Mistbeeten Schaden anrichtet und nur durch Sammeln vertilgt werden kann.

### Dritte Abtheilung.

### Ungleichgliedrige. (*Heteromera*.)

An den beiden ersten Paaren der Beine fünf und am letzten vier Fußglieder.

Die hierher gehörenden Käfer sind sämmtlich, wenn man die kleinsten, etwas schwer zu untersuchenden Arten ausnimmt, recht gut an diesem Merkmale zu erkennen, zumal die einzige forstlich wichtige, mit nur einer Art ausgerüstete, Gattung (*Lytta*). Wir könnten daher sogleich zur Betrachtung dieser letzteren übergehen, wenn nicht die allermeisten übrigen Käfer dieser Abtheilung im Holze lebten und uns, obgleich sie bis jetzt noch nicht als schädlich bekannt geworden sind, die Pflicht auferlegten, über sie hier wenigstens etwas Allgemeines zu sagen. So verschieden auch das äußere Ansehen derselben im ersten Augenblicke erscheint, so sehr man auch geneigt ist, viele verschiedene Familien aus ihnen zu bilden, so zeigen sie doch bei näherer Betrachtung mehr Übereinstimmung als die Pentameren. 1) Larven und Puppen der allermeisten leben in Gewächsen, meist Bäumen, nur ein einziger (*Lytta*) vom Laube der Bäume. 2) Insectenfresser giebt es unter ihnen gar nicht, wenigstens ist das vermuthete Schmarotzen der Larven der Spanischen Fliegen und Maikäfer noch höchst präcär. 3) Ihre Larven haben (wahrscheinlich sämmtlich) Beine. In einer besondern Darstellung der unmerklich schädlichen und gleichgültigen Forstinsecten (wie ich eine solche in einem besondern Werke später beabsichtige) würden diese eine Hauptrolle spielen, da sie dem Forstmanne so häufig, wenn auch nicht in großer Menge, begegnen und einige auch wohl täuschende werden könnten. So wird man wenige alte Buchen finden, an denen nicht unter der abgestorbenen Rinde sich befinden: der kleine rüsseltragende *Rhinosisus*, das mit einer viergliedrigen Fühlerkeule versehene rothhalsige, schöne *Tetratoma*, die prächtige große, scharlachrothe *Pyrochroa* u. s. f. So wird man häufig die kleinen, langen und glänzenden Arten von *Hypophloeus* in Rinden- und Holzgängen

ander Insecten, namentlich der Borkenkäfer (s. dort) finden und sich verführen lassen, sie für Ureinwohner zu halten. So wird man alte Buchenstücke und aufrüchlige Weiden oft mit kurzfüßigen, einen Aftersichel zeigenden, weißen, weihen Larven, welche alles in Wurmmehl verwandeln, angefüllt finden und glauben es sei ein Holzwespenfraß im Anzuge, und wenn man sie erzieht, erhält man — *Mordella* (die auch als vollkommenes Insect die Holzwespen unter den Käfern repräsentirt) u. s. f.

Diese Andeutungen werden genügend zeigen, wie viel Interessantes der, seine Aufmerksamkeit über die schädlichen Forstinsecten hinaus erstreckende Forstmann und Naturforscher in dieser schönen Abtheilung zu erwarten hat. Hier müssen wir, selbst auf eine analytische Tabelle verzichtend, sogleich übergehen zur einzig schädlichen

### Gattung: *Lytta* Fabr. Pflasterkäfer.

Da die Gattung nur überhaupt eine einzige deutsche Art enthält, also auch stets nur eine forstlich wichtig sein kann, so vereinigen wir, der Kürze wegen, die Charactere der Gattung mit der der Art

#### *L. vesicatoria* Fabr. Spanische Fliege. (Taf. II. Fig. 27.)

NAMEN. Dies dem Gebildeten bekannte (freilich vom gemeinen Manne wirklich für eine Fliege gehalten und mit z. B. *Musca Caetar*, *cornicina*, *ruficeps* u. s. f. verwechselte, daher auch wohl *musca viridis hispanica* genannte), Thier hat mancherlei Schicksale hinsichtlich seiner Namen gehabt, die sogar ins gewöhnliche Leben eingreifen. Die älteren entomologischen Schriftsteller (wie Schäffer, Geoffroy, Olivier und selbst Latreille früher noch) nannten es *Cantharis*, weil sie es für die *Cantharis veterum* hielten. (Aus dem Grunde ist in der Kunstsprache der Ärzte auch das Wort *Cantharis* für sie noch beibehalten.) Später erhoben sich Zweifel darüber und man verließ den Namen *Cantharis*. Besonders gebrauchte Linné den Namen *Meloe*, welcher keine solche Zweideutigkeiten zuließ, unter welchem er aber noch mehrere andere Insecten, z. B. die sogenannten Maiwürmer, zusammenstellte. Obgleich diese letztern mit der Spanischen Fliege viele Ähnlichkeit haben, besonders in den merkwürdigen, heftigen Wirkungen (welche den Maiwürmern auch den Ruf eines ausgezeichneten Heilmittels, besonders in der Huudswuth zuzogen), so zeigen sie doch in der Körperform (besonders den sehr kurzen, kaum den halben Hinterleib deckenden Flügeln) Abweichung genug, und Fabricius fand sich veranlaßt, sie als *Meloe* fortbestehen zu lassen, die Spanische Fliege aber von ihnen als Gattung *Lytta* zu trennen. Im Deutschen heißt der Käfer auch noch: Blasenzieher, Laub-, Gras- oder Goldkäfer, Spanische Mücke, Mailändischer Käfer, Goldwürmchen. Franz.: *Mouche d'Espagne*, *Cantharide*. Russ.: *Spanskaja much*. Poln.: *Czeraszczek zielonozoty*.

CHARACTERISTIK. Die ausgezeichnete, smaragdgrüne, hier und da einen Kupferglanz zeigende, Farbe dieses schönen (5-12" großen) Käfers machen ihn auf den ersten Blick kenntlich und es könnte höchstens eine Verwechselung mit der auch grünen *Cetonia aurata* und dem *Cerambyx moschatus* entstehen, welche jedoch ganz andern Abtheilungen (Pentameren und Tetameren) angehören. Kunstgerecht characterisirt man sie so. Käfer: Kopf groß, breiter als Halsschild, nach unten geneigt, fast herzförmig. Fühler fadenförmig, nicht sehr lang. Lezfe (Fig. 27 a) stark, hornig, gebuchtet, mit langen Haaren. Oberkiefer (Fig. 27 b) hornig, gekrümmt, mit breiter, scharfer Spitze und gezählter Schneide. Unterkiefer (Fig. 27 c) mit hornigem, am Grunde breiterem, behaarten Stamm und zweispigiger Lade. Beide Lappen ziemlich gleich groß, am Ende dicht behaart, der äußere halb hornig, zweigliedrig (innerer Taster). Taster behaart, nulsig, viergliedrig. Lippe (Fig. 27 d) aus einem hornigen, etwas gewölbten, fast herzförmigen, leicht zurückgedrückten, gewimperten und behaarten Stücke und einem an dessen Innenseite angewachsenen, aus zwei behaarten und gewimperten Lappen bestehenden Stücke zusammengesetzt. Taster dreigliedrig,

behaart. Halsschild fast viereckig, hinten etwas schmaler als vorn. Schildchen klein, dreieckig. Flügeldecken ziemlich weich und gewöhnlich etwas umgerollt, den Hinterleib fast ganz bedeckend. Hinterleib achtringelig. Beine kräftig, schlank. Hälkchen gespalten. Die Männchen unterscheiden sich u. A. dadurch: daß die Unterseite des letzten Hinterleibsringes gebuchtet ist für den Austritt der Ruthe. Die mit langen Beinen versehenen Larven (welche ich jedoch nur ganz jung, kaum 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> lang und 0,2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> breit, kenne, s. Br. u. Ratzeb. *Med. Zool.* S. 119, u. S. 105, die von *Meloë*) sind linienförmig, hinten allmählig verschmälert, flach und lang, behaart und bis auf den hellern zweiten und dritten Ring dunkelbraun. Der Kopf ist rundlich und trägt deutliche, viergliedrige mit langer feiner Endborste versehene Fühler und punktförmige, braune Augen hinter denselben. Die Mundtheile bestehen aus einer ganzen, gewimperten Lefze, bornigen, halbmondförmigen Oberkiefern, fleischigen, dicken Unterkiefern und fleischiger Lippe. Die Taster der Unterkiefer dreigliedrig, die der Lippe zweigliedrig, beide mit abgestutztem Endgliede. Die Beine lang, dreigliedrig, einklauig. Die drei ersten Leibesringe größer als die übrigen, der letzte mit zwei langen, divergirenden Afterborsten. Die Eier fast schwefelgelb, länglich, sehr weich.

VORKOMMEN keinesweges allein auf Spanien (wo sie ursprünglich wohl allein gesammelt sein mögen) oder überhaupt auf das südliche Europa beschränkt, sondern, wie jeder Forstmann, leider! oft genug erfährt, auch über ganz Deutschland verbreitet und selbst bis nach Schweden, Rußland, Sibirien hinaufreichend. Die Larven in oder dicht über der Erde, die Käfer an Bäumen und Sträuchern, besonders an Eschen (nicht bloß *Fraxinus excelsior*, sondern auch den meisten fremden eben so gern) und Rheinweide (*Ligustrum vulgare*), doch auch an mehreren Arten von Geisblatt (besonders *Lonicera tatarica*), Spanischem Flieder (*Syringa*) und selbst zuweilen auf Hollunder (*Sambucus*), Ahorn, Pappeln und dem Trompetenbaum (*Dignonia Catalpa*), auch Rosen.

LEBENSWEISE. Die Generation ist wahrscheinlich einjährig, denn man sieht die Käfer fast in jedem Jahre, wenn auch nicht immer gleich häufig. Bechstein nennt sie vierjährig, jedoch ohne einen andern Grund dafür zu haben, als daß sie nach vier Jahren allezeit in Menge auf den einzelnen Eschen der Dreifisgacker-Allee vorgekommen seien. Sie fliegen in der wärmsten Zeit, nun die Mitte des Juni, und man kann sie dann um Mittag, wenn es recht heiß ist, auf ihren Lieblingsgewächsen erwarten und sich auf ihr Erscheinen vorbereiten. Selten bemerkt man bloß einzelne Vorläufer, gewöhnlich die ganze Masse zugleich, woraus ich auf gleichzeitiges Ausschlüpfen an einer Stelle schließen möchte. Auch Hr. Hennecke sah sie immer plötzlich erscheinen und vermuthet, daß sie, ihres schweren Fluges wegen, nie weit gekommen seien. Auf den von ihnen befallenen Gewächsen wimmelt es dann, und im bunten Gewirre sieht man die dem Fräse und der Begattung nachgehenden durch einander laufen und fliegen. Die Begattung wird mit großer Heftigkeit gepflogen und zeigt manches sehr Sonderbare. Die Männchen halten die Weibchen, auf denen sie sitzen, mit den Vorderbeinen an den Fühlern wie am Zügel und vermögen die Ruthe mit dem unzähligen Male rasch hin und her bewegten, lang ausgestreckten Hinterleibe öfters erst nach mehrstündigen, vergeblichen Versuchen einzubringen. Alsdann steigen sie vom Rücken der Weibchen und nun beginnt erst der eigentliche Coitus. Beide Geschlechter hängen so zusammen, daß sie sich den After zukehren, und bleiben in dieser Stellung mehrere Stunden, selbst mehrere Tage, fressen dabei aber sehr begierig, entleeren ihren Koth und kriechen umher. Ein Männchen kann sich mit mehreren Weibchen begatten, ohne daß die Ruthe abreißt. Bald nach der Begattung, gewöhnlich schon am andern oder zweiten Tage, lösen sich die Eier vom Eierstocke, treten aus ihren Säckchen in die Höhlung des Eierstockes und dann in die Eierleiter. Das Weibchen biegt sich an die Erde und wählt, mit ihren Fühlern und Tastern suchend, eine Stelle, an welcher es sich eingräbt, gewöhnlich in festern Boden, damit das 10-14<sup>1</sup>/<sub>2</sub> tiefe Loch nicht so leicht nachstürze. Beim Graben gebrauchen sie die Vorderbeine, mit den Hinterbeinen schaffen sie die Erde heraus, und der Hinterleib muß sich dann und wann spiralförmig

drehen, um dem Loche die gehörige Rundung zu geben. Hat sich die Erde draussen zu stark aufgethürmt, so kommen sie hervor und verteilen dieselbe vor dem Loche, damit sie nicht wieder dasselbe verschüttet. Sind sie mit dem Graben fertig, so kommen sie heraus, um mit dem Afer voran wieder hineinzukriechen und das Legen zu beginnen. Während desselben verhalten sie sich ruhig und zeigen blofs durch Bewegung der Fühler und Taster, dafs es ihnen sauer werde. Nach etwa einer halben Stunde sind sie auch damit fertig und fangen nun allmählig an, mit den hinausgestreckten Vorderbeinen wieder Erde in das Loch hineinzuziehen und sich so allmählig wieder herauszuhelfen. Sie verscharren dann dasselbe vollends mit Erde, drücken dieselbe mit den Hinterbeinen und dem Afer fest, um so viel wie möglich die Stelle unkenntlich zu machen, und laufen davon. Gleich darauf fangen sie wieder an zu fressen, leben aber nur noch wenige Tage. Gewöhnlich findet man nur 40-50 Eier in dem Loche, und diese liegen unregelmäfsig über einander verklebt. Untersucht man das Weibchen nach dem Legen, so bemerkt man am Anfange des Eierstockes noch viele kleine, wie es scheint, unvollkommene Eier. Nach 3-4 Wochen kommen die Lärchen (welche man zuletzt schon durch die dünne Eihülle durchschimmern sieht) aus der Erde hervor und zerstreuen sich über der Erde. Einige Wochen erhält man sie wohl in mit frischer Erde angefüllten Gläsern, länger aber nicht. Wahrscheinlich sterben sie, weil man ihnen nicht das rechte Futter zu geben weifs und weil sie zu sehr der Luft entbehren. Will man sie in luftigere Drathkasten sperren, so entweichen sie. Meines Wissens ist es auch noch Niemand geglückt, sie bis zur Verpuppung zu erziehen. Hr. Fintelmann versuchte es noch ganz kürzlich wieder, indem er ein Pärchen in einen, zur Hälfte mit Eschenholzmoder, vermodertem Eschenlaube u. dergl. gefüllten, Zwinger brachte. Den 21sten Juni legte das Weibchen auf der Oberfläche dieser, stets feucht erhaltenen, Substanzen 21 dicht an einander gereichte Eier, und den 11ten Juli erschienen daraus die Larven. Diese befanden sich neun Tage lang sehr munter und wühlten häufig in dem feuchten Moder, ohne sich an die mit eingesperrten Fliegen, Blattläuse und Käfer zu machen, bis ihrem Leben und dem Versuche, den Hr. Fintelmann gewifs wieder aufnehmen wird, durch einen unglücklichen Zufall ein Ende gemacht wurde. Wahrscheinlich leben sie wie die Larven der Maikäfer (*Meloe*), über die man aber leider auch nichts Bestimmtes weifs. Es ist schon in älterer Zeit (Réaumur, De Géer) und wieder neuerlich behauptet worden, diese lebten schmarotzend auf anderen, besonders fliegen- und bienenartigen Insecten, und ich selbst glaubte früher etwas bemerkt zu haben, was dafür spräche. Jetzt bin ich andrer Meinung, da ich nichts wieder, diese Erscheinung Bestätigendes habe bemerken können. Besonders spricht die plötzliche und zahlreiche Erscheinung der Käfer dagegen. Wie sollten sie, nachdem sie doch mit ihren flüchtigen Wohnungsthieren sich in alle Gegenden hätten zerstreuen müssen, so schnell wieder sich zusammenfinden? Leben sie in (*Bouché Gart. S. 23.*) oder an der Erde gesellig und verpuppen sie sich hier gemeinschaftlich, so kann man sich dies gesellige Erscheinen viel eher erklären. Wenn Latreille (s. Cuv. *régn. an. T. V. p. 66.*) die Vermuthung aufstellt, *Meloe* legte seine Eier, wie verschiedene Heteromeren, in die Nester bienenartiger Thiere, so scheint er das Legen von *Meloe* gar nicht zu kennen. Auch wüßte ich nicht, welche Heteromeren, wenigstens von heimischen, so schmarotzend lebten. Die geheimnißvolle Entwicklung von *Lytta vesicatoria* sowohl, wie von *Meloe*, ist auch bis zum Jahre 1839 noch nicht aufgedeckt. Hr. Hartig (*Jahresber. a. a. O. S. 106.*) sagt zwar: „zwischen dem Hinterleibssegmenten, besonders von *Anthidium manicatum*, habe ich ziemlich häufig kleine Käfer (?) - Larven gefunden, welche von der Taf. II. Fig. 27a bei Ratzeburg gegebenen Abbildung der jungen *Lytta* - Larven nur „darii abweichen, dafs sie einen nach vorn zugespitzten, fast dreieckigen Kopf haben.“ Allein dadurch kommen wir, abgesehen von den Täuschungen, welche bei solchen Gelegenheiten möglich sind, der Lösung des Räthels noch nicht näher, und ich mufs mit Hrn. Erichson, den ich ebenfalls noch kurz vor dem Abdruck dieser Zeilen nach seinen neueren Erfahrungen fragte, ausrufen: „Schande für Europa, dafs Bienen, *Meloe* und *Lytta* so sehr gemein sind und noch kein Mensch über die Verhältnisse dieser Thiere etwas

Bestimmtes ermittelt hat, da es doch in Amerika bewiesen ist, daß eine *Lytta* verwandte Gattung, welche den Namen *Horia* führt, als Larve in den Nestern von *Xylocopa* lebt.“ Der Fraß und dessen Erkennung: Dieser ist also nur von den Käfern mit Zuverlässigkeit bekannt. Derselbe besteht aus den Blättern der genannten Bäume und Sträucher. Unter diesen sind sie uns nur wichtig auf Eschen. Nach Hrn. Hennecke lieben sie mehr die auf frischem Boden erwachsenen und üppiges Laub treibenden (aber nicht über 60 Jahre alten). Zuerst nehmen sie die jüngern Blätter, verschmähen zuletzt aber auch nicht die ältern, härteren und fressen bei übergroßer Menge die Bäume so kahl, daß nur Blattstiele und Rippen bleiben. Ja auch diese zwingt sie öfters die Noth zu benagen, und man will sogar gesehen haben, daß sie auch die jüngsten, grünen Triebe mit verzehren. Hr. Hennecke, welcher sie in seinem Reviere oft beobachten konnte, sah dies auch nie. Sie fangen am Rande des Blattes an und fressen eine Stelle nach der andern bogenförmig heraus. Es wird sie daher sowohl dies kenntlich machen, wie auch das struppige Ansehen ganz entblätterter einzelner Zweige oder Bäume. Ja wir haben noch ein, nur bei einigen Insecten uns unterstützendes, Mittel, sie bei Zeiten ausfindig zu machen. Dies ist der Geruch, welchen man schon mehrere Schritte von ihnen entfernt wahrnimmt, der sogar, wenn die Menge der Käfer groß und die Richtung des Windes günstig ist, auf größere Strecken wahrgenommen werden kann. Beschreiben läßt er sich nicht. Die meisten Menschen finden ihn unangenehm, weichlich und doch durchdringend. Er erhält sich so ziemlich an den getrockneten Thieren.

FÖRSTLICHE BEDEUTUNG. Wir können dies Insect als ein merklich schädliches bezeichnen, denn es hat schon sehr häufig in den verschiedensten Gegenden bedeutende Verwüstungen an den Eschen angerichtet, besonders auf den jungen Eschensaat und in den Eschenplantagen. Diese bleiben, wenn sie des Laubes im Sommer beraubt werden, im Wachsthum zurück, einzelne gehen auch wohl ganz ein. Unser Forstgarten, welcher ganz von Kiefern umgeben ist, blieb mehrere Jahre nach seiner Anlage ganz verschont, bis die Spanischen Fliegen auch zu ihm den Weg fanden.

FÜR DIE BEZIEHUNG ist es sehr wichtig, daß man um die Flugzeit die Eschen-Anlagen täglich beobachtet, weil die Spanischen Fliegen meistens plötzlich da sind und dann auch gleich, wenn sie zahlreich sind, alle Blätter abfressen und die Gegend mit neuer Brut versorgen. Man muß sie dann sogleich sammeln und zwar des Morgens früh, da sie am Tage sehr beweglich sind und beim Schütteln und Klopfen gleich aufsteigen. Leute wird man dazu immer ohne Tagelohn haben können, wenn man sie mit dem Werthe der Käfer bekannt macht. In jeder Apotheke werden 4-8 Groschen für das Pfund gezahlt. Die Käfer dürfen dann aber nicht gleich getödtet oder zerquetscht werden, sondern müssen, wenn sie heilkräftig bleiben sollen, vorsichtig getrocknet, aber auch bald abgeliefert werden, da sie, wenn sie nicht gehörig verschlossen gehalten werden, auch wieder von ihrer Wirksamkeit verlieren. Auch muß man auf die blasenziehenden Eigenschaften des Käfers aufmerksam machen, welche schon nach dem häufigen Anfassen oder unvorsichtigen Zerdrücken in den Händen hervortreten. Noch weniger dürfte sich Jemand gelüsten lassen, mit dem Essen einen Versuch zu machen. Es giebt Leute, welche im Gefühle einer besondern Kraft auch darin andern Menschen überlegen zu sein vermeinen, daß sie solche für schädlich erachtete Stoffe aus Übermuth verzehren, oder auch gewisse Wirkungen dadurch absichtlich hervorzubringen wünschen. Bei den starken würde aber wie bei den schwachen die heftigste Wirkung erfolgen: Entzündungen der Harn-, Geschlechts- und Verdauungsorgane, namentlich Blutharnen, heftige Priapismen u. dergl. Diese Wirkungen werden mehr durch die weichen Theile, besonders des Hinterleibes, als durch die Flügeldecken und die übrigen harten Theile des Käfers erzeugt. Daß der Igel (*Erinaceus*) denselben Wirkungen nicht unterworfen sei, bedarf noch der Bestätigung.



## Vierte Abtheilung.

Viergliedrige. (*Tetramera*.)

An allen drei Paaren der Beine finden sich vier Fußglieder (z. B. Taf. XVI. Fig. 3.). Auch hier sind sie nie alle von gleicher Größe, jedoch immer wenigstens mit der Loupe deutlich und sogleich zu erkennen, und wenn daher ein so kleines (fünftes) vorkommt, daſs man es erst mit einer starken Loupe oder mit dem Mikroskop suchen müſste, ſo wird es nicht gezählt. Die Borkenkäfer werden deſhalb (s. Taf. XII. Fig. i, k) nicht zu den Pentameren, ſondern zu den Tetrameren gerechnet. Nur ein Käfer kann eine Täuſchung veranlaſſen. Dies iſt der ſtahlblaue, *Clerus*-ähnliche keulenhörnige *Corynetes cyanellus*. Er müſs, obgleich er nur 4 Fußglieder hat, wegen der Verwandſchaft mit *Clerus* u. A. zu dem *Clavicornia* unter den *Pentamera* geſtellt werden (s. dort am Ende). Im Übrigen ſind ſie ſchwer allgemein zu charakteriſiren, da ſehr groſſe Mannigfaltigkeiten in der Form der ganzen Thiere — Käfer und Larven — wie auch der einzelnen Theile vorkommen. Es giebt unter den Tetrameren bei Weitem mehr fußloſe Larven als in irgend einer andern Abtheilung, namentlich unter den Rüſſel- und Borkenkäfern, welche ſich durch die Fußloſigkeit von den ſonſt ähnlichen Anobien-Larven unterſcheiden. Auch den Larven der Bockkäfer fehlen die Beine häufig, und wenn ſie da ſind, ſind ſie nur ſehr klein. Die Blattkäfer-Larven haben dagegen ſämmtlich Beine und ſind auch nicht ſo weifs und weich, wie die der übrigen genannten. Bei den Larven der Tetrameren iſt der Unterſchied der Wülſte wichtiger als anderswo und wir können ohne dieſelben oft kaum die Gattungen unterſcheiden. Auf der Oberſeite findet ſich z. B. zwiſchen je zwei Ringen bis zum zehnten eine eingekeilte Wulſt: Keilwulſt. Dann entſtehen vom vierten bis elften Ringe noch andre Wülſte dadurch, daſs die vom Luftloche heraufſteigende Furche (Querfurche) an den Hinterrand der Keilwulſt oder an den Oberrand des Ringes geht und eine oder zwei Wülſte (Vorder- und Hinterwulſt) bildet. Unterhalb des Luftloches entſteht ebenfalls eine kleine, aber meiſt ſtark vortretende Wulſt (Luftlochwulſt) und unter dieſer die Unterwulſt. Dieſe Wülſte haben für mich noch mehr Bedeutung gewonnen, ſeitdem ich die Regelmäßigkeit ſolcher Wülſte bei den Lepidopteren-Larven (s. beſonders Bd. II. bei den Wicklern), bei denen ſie auch noch zahlreicher vorhanden ſind, kennen lernte.

Die LEBENSWEISE bietet zu groſſe Mannigfaltigkeit, als daſs ſich hier ſchon Viel im Allgemeinen ſagen lieſſe. Nur ſo viel: daſs ſich hier die meiſten und wichtigſten im Innern der Bäume, ſelbſt lebender, geſunder (s. *Xylophaga*), hauſenden Inſekten finden, und daſs dieſe ſich beſonders durch ihre Gänge beim Fraſſe unterſcheiden. Dieſe werden entweder von den Larven gemacht (Larvengänge) oder auch von Käfern (Muttergänge). Da, wo bloß Larvengänge ſich finden, legen die Mütter von außen ab, wahrſcheinlich weil ihre anſehnliche Größe und die ſchwächern Mundtheile das Eindringen in das Gewächs verhindern. So iſt es bei den Rüſſel- und Bockkäfern. Bei den Holzfressern dagegen machen es die verhältnißmäßige ſtarken Kiefer den Käfern, welche meiſt klein ſind, möglich, in den Stamm einzudringen und dort auch Muttergänge anzulegen, wodurch ſich dieſe merkwürdige Familie von den übrigen und, wenn wir noch die regelmäßige Bildung der Gänge hinzurechnen, von allen übrigen unterſcheiden.

Die FORSTLICHE BEDEUTUNG iſt, wie aus dem Vorigen hervorgeht, beſonders wegen der Menge hier vorkommender Baſtfresser, in lebenden Hölzern, ſehr hoch. Überall ſtehen in dieſer Abtheilung Forſtinſekten vom erſten Range. Der Forſtmann hat die Kennzeichen derſelben daher vor allen zu

beachten, und sie nicht blofs nach einem flüchtigen Blicke auf den Habitus zu bestimmen, damit er nicht die Anobien hierher oder die Borkenkäfer zu den Pentameren bringe (s. auch S. 20 u. 21.).

Die EINTHEILUNG der Tetrameren ist, wenn mau, wie der Forstmann, es nicht mit allen hier vorkommenden Arten zu thun hat, sehr leicht, denn man kann sie unter wenige (die meisten z. B. unter 3-4 Linné'sche) Gattungen unterbringen, die noch dazu leicht zu erkennen sind und z. B. in der Form und Länge der Fühler, in Gegenwart oder Abwesenheit des Rüssels, Körperform, Larven und sogar Frafs sehr allgemein übereinstimmen. Man hat sie neuerlich in viel mehr Gattungen getrennt und diese unter verschiedene Familien zusammengestellt. Es soll nun zwar dies für den Gang unser Untersuchungen benutzt werden, jedoch so, dafs ein Jeder auch sogleich den Zusammenhang dieser neueren Gattungen und der Familien (die übrigens schon allermeist in ihrem Namen die alte Gattung, aus der sie entstanden sind, hitbsch andeuten), mit den alten Linné'schen übersehen und, wenn es ihm beliebt, auch nach diesen ansprechen kann.

Tetramera	{	Fühler keulenförmig (*). Larven falsch oder, wenn sie Fühler haben, doch hell gefärbt (**)	{ Kopf in einen deutlichen Rüssel verlängert. Im Baume stets nur Larvengänge oder doch wenigstens keine regelmässige Muttergänge . . . 1. Rüsselkäfer.
			{ Kopf ohne Rüssel oder mit undeutlichem. Im Baume Larven- und Muttergänge . . . . . 2. Holzfresser.
	{	Fühler faden- oder borstenförmig, und wenn sie am Ende etwas verdickt erscheinen, so haben sie doch 6-beinige Larven und diese sind bunt oder ganz dunkel gefärbt	{ Käfer gestreckt, mässig gewölbt, meist groß oder sehr groß, mit langen oder sehr langen Fühlern. Larven weiss oder gelb, ohne Beine, oder mit sehr kleinen, dünnen . . . 3. Bockkäfer.
			{ Käfer kurz, gedrungen, stark gewölbt, meist klein, mit nicht langen Fühlern. Larven dunkel oder bunt, mit starken, langen Beinen . . . 4. Blattkäfer.

### Erste Familie.

#### Rüsselkäfer. (*Curculionides*.)

CHARACTERISTIK. Keine Familie kann natürlicher sein als diese. Auf den ersten Blick sieht man die merkwürdige vordere Kopfverlängerung, welche Rüssel heisst und diesen Käfern den Namen gab. Man könnte höchstens bei einigen Arten, deren Rüssel nur kurz und dabei ziemlich breit ist in Zweifel sein, ob sie hierher gehören. Dann könnte man sie aber nur zu der zweiten Familie bringen wollen. Hier sind aber die wichtigen, Rüsselspur zeigenden (*Hylesinus*) nur kleine, bis 2" lange Arten, auch wird man bald den Frafs beobachten können und nun gar nicht mehr in Zweifel sein. Daher wird man auch umgekehrt einen Holzfresser nicht unter den Rüsselkäfern suchen. Man könnte da nur unter den kleinern Arten suchen und diese haben bei den Rüsselkäfern alle einen sehr deutlichen, meist sogar langen Rüssel. Einige Schwierigkeit verursacht die zu den Rüsselkäfern gestellte Käfergattung, welche Fabricius *Cosmopus* nennt. Diese haben das Ansehen von Holzfressern, besonders von *Hylesinus ater* (dem die meisten und gemeinsten auch in der Grösse, Fühlerbildung u. dergl. gleichen), zeigen dabei aber

(\*) Der *Clerus*-ähnliche, stahlblaue *Corynetes* gehört, obgleich er tetramersch ist, zu den pentamerischen Clavicornen (s. am Ende derselben).

(\*\*) Einige nicht forstlich wichtige sechsbeinige Arten von *Anthrabus* machen hier allein eine Ausnahme.

meist einen deutlichen Rüssel. Sie sind indessen nicht schädlich und begnügen sich immer mit ganz abgestorbenem Holze und sind nie unter Rinden, deshalb wir sie ganz übergehen können. Allerdings leben sie allermeist nur im Holze, indessen habe ich doch die gemeinste Art, *C. crassirostris* (s. am Ende der Rüsselkäfer), unter Kiefernrinden (ob nach dem Auskommen hier blofs versammelt?) gefunden und zwar in außerordentlich großer Menge einmal als man bei Gelegenheit eines in der Nähe vorgekommenen Frafes von *Hylesinus piniperda* geneigt war, ihn für diesen schädlichen Käfer zu halten. Kunstgerecht characterisiren wir die Rüsselkäfer so. Die Käfer: der Kopf ist allermeist klein und schmaler als der Halsschild. Der Theil hinter den (entfernten, seitwärts stehenden und selten stark vorragenden) Augen ist stets gewölbt, sogar einmal in einen deutlichen Hals verlängert, vor demselben aber in den Rüssel verlängert, welcher allermeist rund und lang, dabei auch gekrümmt, seltener flach und kurz und dabei grade ist, und stets die Fühler trägt, welche keulenförmig sind und da, wo die Keule aus (drei) gesonderten Gliedern besteht, im Ganzen elf Glieder (*Anthribus*, *Rhynchites*), und da wo die Keule aus (vier) nicht abgesetzten, gleichsam nur geringelten, Gliedern besteht, im Ganzen nur zwölf Glieder (die übrigen) zeigen und entweder schwach gekrümmt (grade) oder gekniet erscheinen. An seiner Spitze trägt er die Mundtheile, welche daher auch meist nur sehr klein sind und kaum alle einzelne Theile erkennen lassen. Diese zeigen die mannigfaltigsten und auffallendsten Verschiedenheiten. Nur bei einer Gattung (*Anthribus*) ist die Lefze deutlich gesondert, halbmondförmig vorragend, vorhanden. Bei den übrigen ist sie mit dem Kopfschilde mehr oder weniger zusammenfließend oder ganz fehlend. Die Oberkiefer sind stets groß und stark, hornig, entweder blofs mit einer Spitze am Ende (*Anthribus varius*, *Apoderes*) oder mit mehreren, zuweilen durch sehr tief gebuchtete Einschnitte getrennten (*Rhynchites*), dicht unter dem Ende oder am Innenrande befindlichen Spitze, selbst öfters an der Basis noch mit einem zahnartigen Höcker (*Hylobius*). Die Unterkiefer haben entweder eine zweilappige (*Anthribus varius*, *Apoderes*) oder eine ganze Lade und zwar ist dieselbe im erstern Falle blofs mit laugen Haarrimern (bei *Apoderes* sehr laugen), im letztern theils mit solchen, theils mit borsten- und dornähnlichen Organen von bestimmter Zahl besetzt, bei *Hylobius* außerdem noch mit einem zahnähnlichen Büschel langer Haare. Der Unterkieferstaster ist stets viergliedrig, entweder von ziemlicher Länge und dann sogar etwas gekrümmt (*Anthribus varius*, *Apoderes*), oder sehr kurz und dann nur grade der Lade angepaßt, jedoch wieder so verschieden, daß das erste Glied sehr kurz und kaum vorragend, das zweite dagegen das längste ist (*Brachyderes*, *Thylacites*), oder daß die beiden ersten gleich lang und nebst dem letzten die kürzesten, das dritte aber das längste ist (*Hylobius* und die meisten übrigen Gattungen). Die Lippe hat entweder eine große, hornige (*Apoderes*) oder eine fleischige Stütze und zeigt bald eine deutliche Zunge (*Anthribus varius*, *Rhynchites coeruleocephalus*), bald keine. Im erstern Falle stehen die Taster weit von einander (*Anthribus varius*, *Rhynchites coeruleocephalus*), im letztern sehr genähert. Sie sind meist deutlich dreigliedrig, zuweilen sogar ziemlich lang und etwas gekrümmt (*Anthribus varius*, *Rhynchites coeruleocephalus*), selten sind sie verschwindend (*Apoderes*) oder äußerst klein (*Thylacites*, *Brachyderes*), bei denen ich nur ein Glied bemerken konnte und zwar ganz und gar zwischen den Unterkiefern versteckt). Bei den langrüssigen fehlen Unterkiefer und Lippe mit ihren Tastern nie ganz, letztere haben auch die gewöhnliche Gliederzahl vier und drei, aber sie sind, besonders bei den kleineren Arten, äußerst klein und nur durch sehr starke Vergrößerung bemerkbar. Der Halsschild ist nie ganz viereckig, sondern immer mehr rundlich und stets achtmaler als die Flügeldecken, allermeist gegen die Schultern abgesetzt. Das Schildchen ist sehr klein. Die Flügeldecken meistens den Hinterleib ganz deckend, stark gewölbt und hinten abschüssig, reihig-punktirt und hart oder sehr hart. Die Beine sind stark und kräftig. Die Schenkel zuweilen sehr dick und öfters gegen das Ende mit einem Dorn. Das vorletzte der vier Fußglieder gelappt. Brust und Hinterleib stark gewölbt. Männchen und Weibchen unterscheiden sich durch die Größe oder durch den Rüssel,

welcher beim Männchen kürzer ist und die Fühler näher der Spitze trägt, durch Dornen am Halsschild u. dergl. Die Farben geben für das Geschlecht keine Unterschiede, sind aber für die Unterscheidung der Arten, wegen ihrer Mannigfaltigkeit, sehr wichtig. Oft werden sie durch Gruppen kleiner, schuppenartiger Härchen erzeugt, welche der Käfer bei seinem Herumtreiben leicht abreißt. Die dunklere Grundfarbe erscheint, und man glaubt ein ganz anderes Thier zu sehen. Die Larven sind meist gedrunen und walzig, seltener gestreckt und flach. Die herrschende Farbe ist gelblich-weiß, selten dottergelb. Der Kopf ist nie sehr klein, ziemlich gewölbt. Gabellinie einfach oder noch mit zwei, dem ungetheilten Aste parallelen Linien. Von Fühlern nur eine undeutliche Spur unter der kleinen schwarzbraunen Hornwölbung am Ende der Gabellinie. Augen gänzlich fehlend. Mundtheile. Der quere Kopfschild immer mit der halbmondförmigen, gewimperten, nach innen einen fleischigen Vorsprung zeigenden Lefze verwachsen, letztere jedoch beweglich. Die Oberkiefer denen der Käfer ähnelnd. Die Unterkiefer mit stets ganzer Lade, die übrigens die Form derer von *Hylobius*, *Pissodes* u. A. hat. Bei *Anthrribus varius* ist sie auffallend dick und schwach gewimpert. Deutliche Tasterglieder sind nur zwei und diese bei *Anthrribus varius* überdies noch äußerst kurz. An der Basis wäre vielleicht die Andeutung von noch einem in der hellern, wulstig hervortretenden Substanz zu suchen. An der in jeder Hinsicht so auffallenden Larve von *Anthrribus albinus* finde ich drei deutliche Glieder und eine sehr dicke, mit vielen starken Borstenhaaren besetzte Lade. Die Lippe dick und fleischig, an der Außenseite, fast in der Mitte, die beiden zweigliedrigen Taster zeigend, welche sehr genähert sind und an der Basis noch ein verstecktes Glied zu haben scheinen (Kinn?). Anseher klein, wahrscheinlich nur aus einem einzigen Gliede bestehend, sind sie bei *Anthrribus varius*. Die drei ersten Körperringe von gleicher Größe, größer als die übrigen und [mit Ausnahme einer, mir im Larvenzustande bekannten großen Art von *Anthrribus* (*albinus*), welche (so wie *Cossonus*?) kleine Beinchen hat] stets ohne Beine. Diese werden durch die stärker vortretenden und stärker behaarten Brustwülste vertreten. Am ersten Ringe an der Seite ein großes (etwas tiefer als die übrigen liegendes) Lufthole und auf dem Rücken ein fast horniges, dunkelgelbes, hier und da aber doch wenig unterscheidbares Rückenschildchen. Die unbeinteten Larven, welche ich früher für *Cossonus*-Larven hielt, müssen doch einem andern Käfer angehören, denn ich erhielt kürzlich von Hrn. Saxen ein beinloses Larven, welche bestimmt für die des *Cossonus linearis* ausgegeben wurden. Es war allerdings auch schon die Wahrscheinlichkeit dagegen, daß *Cossonus*, als Mittelform zwischen Curculioniden und Xylophagen, unbeintete Larven haben sollte, weshalb ich auch das ? in der Parenthese gebrachte.

Die PUPPEN meist ausgezeichnet durch den Rüssel und die gebrochenen langen Fühler. Selbst bei den kurzfüßigen stehen die Fühler merklich von den Augen ab. Bei allen die Flügel fast die Hälfte des achttringigen Hinterleibes bedeckend. Die Unterflügel überragen meist die Oberflügel weit. Oberseite des Hinterleibes meist mit starken Dornenhöckern, auch Halsschild, Kniegelenke und Kopf, zuweilen selbst der Rüssel, mit solchen, wenn auch kleineren, oft Haare oder Borsten tragenden. Meist dazwischen zerstreut noch feine Härchen. Afterdornen stets zwei, meist lang.

VORKOMMEN UND LEBENSWEISE. Die Rüsselkäfer sind wegen des Reichthums an Arten und Individuen sehr verbreitet und kommen in allen Gegenden wie auf allen Gewächsen vor. Sie fressen sowohl an Holz- wie Krautgewächsen und unter den Holzgewächsen sind nur wenige vor ihnen sicher. Die Nadelhölzer alle leiden am meisten. So leben sie auch in den verschiedensten Theilen derselben und übertreffen in dieser Mannigfaltigkeit die Holzfresser wie die Bockkäfer. Ihre Larven fressen an den Wurzeln wie Engerlinge, in der Rinde, im Baste, im Holze, im Marke, in den Blumen, Früchten, Blättern und Nadeln. Nicht bloß die Larven fressen, sondern auch die Käfer, wenn auch nur um ihre Eier mittelst eines Rüsselstiches unterzubringen, zuweilen sind sogar diese nur schädlich. Da dies aber immer nur von ausen her geschieht, so finden wir auch im Gewächse keine Muttergänge, sondern nur Larvengänge, welche

stets geschlingelt sind und das Wachsthum der Larven an der allmählig zunehmenden Dicke verrathen. Die Zeit ihres Erscheinens ist verschieden, jedoch fliegen die meisten im Frühjahr und legen ihre Eier ab. Die Generation ist einjährig oder anderthalbig, selbst zuweilen mehrjährig und dies alsdann wohl nur ausnahmsweise. Die Beobachtung von *C. glandium* (No. 19.) hat gezeigt, wie verschieden die Entwicklung selbst bei Individuen sein kann, die unter ganz gleichen Umständen gehalten wurden. Es ist diese für die Entwicklungsgeschichte der Insecten höchst beachtenswerthe Erscheinung auch practisch wichtig, denn man lernt daraus: daß die Vertilgung nicht alljährlich zu derselben Zeit vorgenommen werden kann. Sie überwintert als Käfer, als Larven, selbst als Puppen. Man darf daher nicht glauben, eine Art komme nur in Einem Zustande im Winter vor. Das richtet sich ganz nach der Witterung (s. *C. Pini* und *notatus* u. A.). Eine doppelte Generation habe ich von keiner Art beobachtet. Allerdings sieht man öfters von einer und derselben Art im Frühlinge und wieder im Herbst Käfer. Dann gehören aber nur die letzteren der Brut des laufenden, die ersteren aber der des vorigen Jahres an. Die Menge, in welcher viele Rüsselkäfer erscheinen, ist außerordentlich groß. Ihre Bewegungen sind ungeschickt, zeigen aber etwas Keckes. Sie gehen nur beschwerlich und fliegen nicht alle, auch nur bei großer Wärme. Wenn sie sich daher retten wollen, so lassen sie sich bei der geringsten Berührung des Zweiges, auf welchem sie sitzen, oder schon, wenn sich Schritte nähern, die sie in aufmerksamer Stellung mit vorgestreckten Fühlern zu vernehmen scheinen, plötzlich fallen und verschwinden im Grase oder Moose.

**FÖRSTLICHE BEDEUTUNG UND BEGEGNUNG.** Die Rüsselkäfer dürften nach den Borkenkäfern die schädlichsten Käfer genannt werden. Sie übertreffen, da sie alljährlich erscheinen, noch die Maikäfer, mit denen man sie, hinsichtlich der Schädlichkeit, vergleichen könnte, weil sie zu den Hauptverwüstern der Nadelholz-Culturen gehören. Die schädlichsten sind, wie gewöhnlich, die Bastfresser. Man begegnet ihnen auf verschiedene Weise, theils durch Sammeln, theils durch Fangapparate (s. *C. Pini*), am besten durch Entfernung der Stöcke oder kranker, schon von ihnen befallener Stämme oder Reiser, also durch Reinlichkeit. — Als besonders wirksame Feinde derselben habe ich noch kürzlich die Laufkäfer kennen gelernt (s. *C. Pini*).

**EINTHEILUNG.** Begnügen wir uns hier mit den von Linné gebrauchten Gattungen, und bringen die (schon S. 113. erwähnte) Gattung *Cossonus*, als Bindeglied mit den Xylophagen, ans Ende der Rüsselkäfer, so kommen wir mit einer: *Curculio*, und höchstens noch einer aus, in welche ein Rüsselkäfer zu stehen käme, den Linné nicht mit zu *Curculio* rechnete. Das ist sein *Attelabus Coryli*. Da er aber unter *Attelabus* so vieles höchst Verschiedene vereinigte (s. z. B. S. 34.), so folgen wir denen, welche die Gattung auflösen und nennen sie

#### Erste Gattung.

#### *Apoderes* Oliv. Dickkopfkäfer.

**CHARACTERISTIK.** Ein einziges Kennzeichen unterscheidet diese merkwürdige Gattung auf den ersten Blick von der folgenden: das ist der nach hinten verschälerte und einen Hals bildende dicke Kopf, welcher, wie sich Linné sehr treffend ausdrückt, einem abgebalgten Fuchskopfe gleicht (*excoriatae vulpis caput refert*). Das Übrige, namentlich Beschreibung der Larven und Puppe s. bei der einzigen Art

#### *A. Coryli* Ol. (*Attelabus Coryli* Linn.) Hasel-Dickkopfkäfer. (Taf. IV. Fig. 5.)

**CHARACTERISTIK.** Der Käfer gehört zu den Rüsselkäfern, mit geraden, zwölfgliedrigen Fühlern, deren erstes Glied wenig länger als die folgenden ist. Der Rüssel ist nur kurz aber ganz rund. Die ganze Gestalt ist dick und breit. Flügeldecken grob punktiert, gestreift mit runzligen Zwischenräumen.

Die Farben schön. Flügeldecken und meist auch der ganze Halsschild schön roth, das Übrige schwarz. Bei einer Varietät (*A. avellanae* Linn.) auch die Schenkel größtentheils roth. Er ist 3-4" lang. — Die Larve (Taf. IV. Fig. 5a) ist 5" lang und 1" dick. Der Kopf schmutzig-graubraun mit dunklern Mundtheilen. Der übrige Körper dottergelb. Die Fufswülste sehr stark hervorragend und auf der Oberseite der vierte bis sechste Ring außerordentlich stark und scharf hervortretend. Fufswülste und Oberseite der Ringe stark behaart, die Unterseite, mit Ausnahme des Afterringes, dagegen kahl. Im Leben krümmt sich die Larve so stark, daß Vorder- und Hinterhälfte an einander liegen. Die Puppe (Fig. 5c) 2,7" lang und fast 2" breit. Kopf mit deutlichem Halse, tief auf die Brust gesenkt. Fühler sehr weit zurückgelegt, in der sehr schmalen, zwischen den Schenkeln des ersten Paares der Beine und dem Brustschilde bleibenden Furche. Beine stark aufsteigend, das letzte Paar nur Knie- und Fußglieder-Spitzen zeigend. Von den Unterflügeln fast die Hälfte unbedeckt. Hinterleib kegelförmig, stark nach vorn gegen die Brust gekrümmt. Afterstacheln stark und lang. Alle Theile, mit Ausnahme der Mundtheile, Flügel, Schienen und Fußglieder, mit vielen, außerordentlich langen, borstenähnlichen, braunen, zum Theil auf Höckerchen sitzenden Haaren.

VORKOMMEN, LEBENSWEISE U. S. F. Der Käfer ist durch ganz Deutschland bis Schweden hinauf gemein und zeigt sich in manchen Jahren sehr häufig an verschiedenen Holzgewächsen, besonders Haseln, dann aber auch an Buchen, Hagebuchen und Erlen, die er merklich verunstaltet. Er wickelt nämlich die Blätter derselben in Form einer oben und unten verschlossenen Geldrolle zusammen, wie der Holzschnitt zeigt. Um dies zu bewerkstelligen, nagt er die Mittelrippe nahe über dem Blattstiele durch, so wie auch die eine ganze Hälfte und einen kleinen Theil der andern Hälfte der Blattseiten. Beide Hälften des Blattes werden neben der Mittelrippe zusammengelegt und so aufgerollt, daß eine walzige Rolle entsteht, deren Basis durch die Mittelrippe und deren Spitze durch die beiden Ränder des Blattes gebildet werden. Die Sägezähne werden so umgeklappt, daß der Eingang vollkommen verhüllt ist. Ein bis drei kleine, bernstein-gelbe, glänzende, eiförmige Eier liegen an der Spitze des Blattes theils auf der Außenseite, theils auf der Innenseite. Sie sind aber nicht angeklebt, sondern liegen ganz lose. Hier und da bemerkt man in beiden Seiten des Blattes kleine Einschnitte von 1" Länge, an denen sie sich wahrscheinlich halten, wenn sie das Blatt rollen (s. auch *Rhynchites*). Die Rollen erhalten sich lange frisch, weil ihnen noch durch die Seitenrippen Saft zugeführt wird. Im Juli und August findet man erwachsene Larven, nebst einer Menge schwarzen, fadenförmigen Kothes, Puppen oder schon Käfer darin. Der Käfer frisst sich heraus, macht gleich neue Rollen und legt darin. Die jungen Larven fallen mit den Blättern zur Erde, überwintern hier und verpuppen sich im Frühjahr. Die Generation ist also anderthalb. Der Käfer wird meistens nur unmerklich schädlich sein und nur wegen der sonderbaren Form seiner Rollen dem Forstmann auffallen. Die Bewegung des Saftes, besonders der Rücktritt desselben als Lebenssaft wird allerdings in den Rollen gestört und wenn solche häufig an den Blüthen wären, könnten dies etwas im Zuwachse leiden. Die Käfer sowohl wie die Rollen fallen sehr in die Augen und lassen sich, da sie auch meist niedrig sitzen, leicht sammeln.

VERWANDT ist *A. curculionoides* Linn. dem *A. Coryli* sehr ähnlich, aber gedrungener und besonders ausgezeichnet durch den größeren Halsschild, die schmalen Punktreihen der stark glänzenden Flügel und röthliche Fühlerbasis. Bei uns ist der Käfer auf Haseln in Niederwäldern nur selten, im Harze aber soll er nach Hrn. Saxen auf jungen Eichen eben so häufig sein wie *A. Coryli* auf Haseln. Hr. Hartig (*Jahresber.* a. a. O. S. 187.) sagt, daß von ihm die zierlichen, tönnchenförmigen Blattrollen an Eichen herühren. Hr. Heyer erhielt den Käfer mit den Exemplaren von *C. Coryli*, welche von den Eichen bei Lüneburg abgeklöpft worden waren.



## Zweite Gattung.

*Curculio* Linn. Rüsselkäfer.

Eine besondere CHARACTERISTIK der Gattung ist, da außer ihr nur noch eine (die vorige, so kleine) in dieser Familie, welche schon ausführlich characterisirt wurde, steht, nicht nöthig. Wir gehen daher gleich zur

EINTHEILUNG. Diese bietet bei der Menge von Arten (im Ganzen mehrere Hunderte), selbst von forstlich wichtigen, nicht geringe Schwierigkeiten, man mag bloß Sectionen der Gattung annehmen oder sie in kleinere Gattungen spalten, wie das in den neuesten Zeiten besonders mit den Rüsselkäfern aufs Äußerste gekommen ist. Wir werden, um das Aufsuchen der Arten zu erleichtern, hier die Abtheilungen nach der analytischen Methode angeben und die für sie am meisten gebrauchten (Gattungs-) Namen aufführen, so daß allen Anforderungen genügt wäre. Wenn man aber sich auch nicht der Namen bedienen will, so wird man doch der Abtheilungen nicht entbehren können, weil man ohne die Kennzeichen derselben, und wenn man nicht etwa die Abbildungen allein befragt, nicht leicht auf den Namen der Arten kommt. Die Kennzeichen dieser Abtheilungen sind meist sehr leicht und da wo es nöthig ist, mit Hinweisung auf die besonders dazu eingerichteten Abbildungen entworfen.

Curculio	mit graden oder leicht gekrümmten Fühlern (Taf. IV. F. 2, 3.)	Rüssel kurz und breit. Das dritte Fußglied vom 2ten fast ganz umschlossen (Taf. IV. Fig. 6.) . . . . .	1. <i>Anthrribus</i> Fabr. No. 1.
		Rüssel lang und rund. Das dritte Fußglied frei und deutlich sichtbar . . . . .	2. <i>Rhynchites</i> Hb. No. 2-3. 3. <i>Magdalis</i> Grm. No. 4. 4. <i>Thylacites</i> Grm. No. 5. 5. <i>Brachyderes</i> Schh. No. 6.
	mit einer Furchen an jeder Seite z. Aufnahme des Fühlerschaftes (Taf. V. F. 8 a)	Körper fast kuglig (Taf. IV. Fig. 1.)	6. <i>Sitona</i> Grm. No. 7.
		Rüssel nicht länger als breit	7. <i>Hylobius</i> Schh. No. 8.
		Rüssel gekrümmt	8. <i>Cleonis</i> Meg. No. 9.
		Rüssel ohne Metallglanz als Rüsselgrade. Körper meist metallisch (grün od. blau)	9. <i>Polydrosus</i> Schh. No. 10-12. 10. <i>Phyllobius</i> Schh. No. 13.
	mit einer Grube z. Anheftung d. Fühlers (Taf. IV. F. 7, 8.)	Körper länglich	11. <i>Otiorynchus</i> Grm. No. 14.
		Körper eirund oder fast kuglig . . . . .	12. <i>Pissodes</i> Grm. No. 15-18.
		Fühlerfurchen bis unter die Augen gekrümmt (Taf. V. Fig. 1-4.) . . . . .	13. <i>Balaninus</i> Grm. No. 19.
		Rüssel des Weibchens von Länge des halben od. ganzen Körpers	14. <i>Anthonomus</i> Grm. No. 20.
mit geknickten od. rechtwinklig gebogenen Fühlern (T. V.)	Rüssel lang d. h. d. Fühler über der Mitte tragend (Taf. V.)	Rüssel d. Weibchens kürzer als die halbe Körperlänge	15. <i>Brachonyx</i> . No. 21.
		Larve in Blättern	16. <i>Orchestes</i> Ill. No. 22.
	Rüssel in der Ruhe zwischen springen (Hinterschenkel verdickt die Vorderhüften gelegt, versteckt (Taf. IV. Fig. 13, 14 a)	Larve in Blüthen oder Früchten	17. <i>Cryptorhynchus</i> Ill. No. 23.
		Larve in Blättern	

## A r t e n.

1. *C. (Anthribus) varius* Fabr. Bunter Rüsselkäfer. (Taf. IV. Fig. 6.)

**CHARACTERISTIK.** Die Käfer 1,5" lang und bis 1" breit, sehr gedrunen und stark gewölbt, schwärzlich-braun. Die Flügeldecken punktirt-gestreift. Die Zwischenräume abwechselnd mit kleinen, fast viereckigen (abwechselnd schwärzlich und weißlich oder goldgelb gefärbten) Haarbüscheln und abwechselnd ohne solche. Die Larve ist fast 2" lang und  $\frac{1}{4}$ " dick. Kopf ziemlich groß, hellbraun und grau gesprenkelt. Oberkiefer mit drei Zähnen und einem vierten, besonders stark an der Basis vorspringenden. Kopschild und Lefze klein. Unterkiefer und Lippe sehr klein. Taster kaum bemerkbar. Die ersten drei Körperringe bedeutend dicker als die übrigen ohne bemerkbares Luftloch. Die Keilwülste bei diesen wie auch bei den folgenden. Behaarung äußerst schwach. Nur an den Fußwülsten und am Kopfe einige größere, und an den Keilwülsten so wie um den After einige äußerst zarte Haare. Die Puppe (Fig. 6c) 1,5" lang. Kopf nach hinten verschmälert, ziemlich tief auf die Brust gesenkt. Fühler halb unter dem Halsschildrande versteckt. Die beiden ersten Paare der Beine nahe an den Halsschild gezogen, das dritte sehr entfernt und nur sehr wenig die Kniegelenke und Fußglieder zeigend. Von den Unterflügeln nur wenig unbedeckt. Hinterleib mit einzelnen, schwachen Härchen. Halsschild mit einem Kranze von haartragenden Höckerchen.

**VORKOMMEN.** Im Harze, in Oberschlesien, in Schweden, auch im südlichen Deutschland, wahrscheinlich überall gemein. Von Hrn. Hartig (*Jahresber.* S. 185.) ist der Käfer auch im Thiergarten bei Berlin im Frühjahr von Fichten geklopft worden. An Fichten brütend und überwinternd, und auf Waldwiesen fliegend. Später auch von Hrn. Radzay an alten, stehenden Eichen in Gallen gefunden, da wo das Cambium sich allmählig über die entriudeten Holzstellen herzog. Auch in Kiefern sahe Hr. Radzay den Käfer die alte dicke Borke nach allen Richtungen durchwühlen, ähnlich, wie es nachher von der Fichte beschrieben werden wird.

**LEBENSWEISE.** Der Käfer wurde schon oft an Fichten gesehen und von denselben geklopft, aber nur Wenige haben hier seine Brut beobachtet. Hrn. v. Pannewitz verdanken wir die ersten fortgesetzten Beobachtungen über das merkwürdige Insect, und diese dürften schon einiges Licht auf die Bedeutung desselben werfen, wenn seine Naturgeschichte auch noch keinesweges, wegen der Neuheit der Erscheinung, abgeschlossen ist. Hr. v. Pannewitz wird die Beobachtungen künftig selbst wieder aufnehmen. Im Jahre 1836 wurden ihm aus verschiedenen Gegenden Oberschlesiens eine Menge Fichtenzweige von großen und kleinen Stämmen geschickt, welche mit erbsengroßen Bläschen wie besät waren. Die mir zugesandten Exemplare erkannte ich für die, allerdings alles thierischen Ansehens entbehrenden, Höhlen eines *Coccus*, welcher zur Zeit noch nicht bestimmt werden kann. Hoffentlich werden sich weitere Beobachtungen darüber anstellen lassen und ich werde dieselben im dritten Theile dieses Werkes bei den Hemipteris (wo *Coccus* hingehört) mittheilen. Mit den Rüsselkäfern hängt diese Erscheinung folgender Maassen zusammen. In der Mitte des Juni bis zum Anfange des Juli bemerkte Hr. v. Pannewitz in jedem Bläschen, an Statt der schleimigen Substanz, welche früher dasselbe erfüllt und ein Häufchen rosafarbener Eier (die zukünftigen Schildläuse meiner Meinung nach) umschlossen hatte, eine Larve (die oben beschriebene und Fig. 6b abgebildete). Wohl 200 solcher Bläschen wurden eröffnet und in jedem fand sich die Larve. Am Ende des Juli waren die Bläschen verlassen und zeigten auf der dem Zweige zugewandten Seite eine Öffnung, durch welche der Käfer entschlüpft sein mußte. Puppen waren im Laufe des Juli ebenfalls von andern gefunden worden (s. Besch. und Abb. Fig. 6c). Aus einer Quantität besonders eingezwingerter Bläschen hatten sich auch zahlreiche Diplolepiden entwickelt, die also sicher dem Rüsselkäfer angehörten. Einzelne abgebrochene Nachrichten über das Vorkommen eines *Anthribus* in



Schildlausbläschen haben wir schon bei Frisch (*Ins. Deutschl. Th. IX.*). Nachdem derselbe (a. a. O. p. 36. XX.) „die Würmer aus den braunen Eierblasen an den Kirschen- und Pflaumenbäumen“ beschrieben und deutlich ein zur Blase gewordenes Mutterinsect sammt den aus den Eiern desselben hervorgegangenen Larven abgebildet hat, beschreibt er auch „den Käfer aus diesen Blasen (XXI)“, welcher ziemlich deutlich als *Anthrribus scabrosus* zu erkennen ist. Er scheint aber nur die Larven in den Blasen und den ausgeschlüpften Käfer gesehen zu haben. Er setzt zwar hinzu: Der Käfer nagt unten ein Loch in diese Blasen, legt ein Ei hinein und die Larve verzehrt dann die Eichen der Blase, ehe sie im Juni auskriechen; dies ist aber wahrscheinlich nur eine Ergänzung, wie er sie sich gedacht hat und nicht Beobachtung, denn sonst hätte er sie etwas mehr ausgeführt und namentlich davon gesprochen: wie die Larve die Eier frisst, wie letztere sich allmählig vermindern und ob man nicht nach Entfernung der Larve die Eier noch erziehen könne u. dergl. In der *Isis* (Jahrg. 1830. Bd. XXIII. p. 205.) wird auch ein aus den *Annales des Sciences*. nat. Vol. XIII. p. 68. von Hrn. v. Vallot entlehnter Fall erzählt, in welchem *Anthrribus marmoratus* aus *Coccus*-Bläschen der *Spiraea salicifolia* im Juli erzogen worden war. Auch Dalman und sein Bruder fanden Anthriben in *Coccus*. Spätern Mittheilungen zufolge, die auch in der ersten Ausgabe in einem Nachtrage auf S. 202. schon abgedruckt worden sind, überwintert der Käfer in der Rinde der Fichte und wahrscheinlich auch der Kiefer. Von Hrn. v. Pannewitz erhielt ich im April des sehr rauhen Frühjahres 1837, welches noch keinen Ausflug erlaubt haben konnte, Rindenstücke von starken Stämmen, welche von Gängen so durchwühlt und von (alten) Fluglöchern so durchbohrt waren, wie es Taf. XXI. Fig. 1. zeigt. In den Gängen steckten auch noch Larven von *Anobium emarginatum*, und ich vermuthete, daß der auf Rechnung des letztern allein geschobene, unschädliche Fraß (s. S. 52.) gleichzeitig durch *C. varius* verübt wird. Demnach steht die Zeit der Entwicklung wohl fest, aber noch keinesweges

die FORSTLICHE BEDEUTUNG des Insects. Denn, wenn Frisch auch angiebt, die Larve verzehre die Eier, so ist mir doch dies nicht wahrscheinlich, indem sich bisher noch kein Rüsselkäfer als Schmarotzer zeigte. Auch könnte die Menge dieser Schildläuse nicht so groß sein, wenn die Rüsselkäfer, die doch alle Bläschen nach Hrn. v. Pannewitz besetzt hatten, die Eier fraßen. Sollte nicht die ungestörte Ausbildung der Eier (welche ihre Entwicklung bei den meisten Arten schon früh im Jahre beginnen) neben der der Rüsselkäferlarve bestehen können? Letztere ist nur klein und bedarf zu ihrer Nahrung nicht viel und begnügt sich vielleicht mit dem, was die unter dem Bläschen befindliche Rindenstelle darbietet. Diese Andeutungen werden spätern Beobachtern vielleicht nützen. Wenn man im Laufe des Mai nur genau Achtung giebt und einige Dutzend Bläschen von Zeit zu Zeit untersucht, muß man dahinter kommen, ob die Larve wirklich die *Coccus*-Eier verzehrt und daher sehr nützlich wird, oder nicht.

VERWANDT sind mehrere Arten, unter diesen aber nur die größten [der 3-3,5" lange, auch schon von Bechstein p. 219. aufgeführte *C. albinus* Linn. (*Anthrribus albinus*) und der 5,5" lange *Anthrribus latirostris* Fabr.] häufiger im Forste bemerkt, immer jedoch nur in abständigen Bäumen und Stöcken, besonders Buchen.

## 2. *C. (Rhynchites) Betulae* Hb.; (*Atelabus Betulae* Linn.) Schwarzer Birkenrüsselkäfer.

CHARACTERISTIK. Der Käfer ähnelt den verwandten (folgenden) ist aber kleiner und schlanker (kaum 2" lang) und ganz schwarz. Der Rüssel ist kurz und ziemlich breit. Die Hinterschenkel der Männchen sehr verdickt. Die Larve (s. Taf. IV. Fig. B.) ist über 3" lang und 1" breit. Kopf klein, ziemlich einfarbig. An jeder Seite desselben, da wo die Augen stehen würden, sind drei äußerst kleine, schwarze Punkte: der erste außerhalb des sehr kleinen Fühler-Rudiments. Außerdem sieht man auch mehrere noch kleinere, zerstreute. Mundtheile sehr klein. Die drei ersten Ringe fast gar nicht vortretend: das erste mit einem schmalen, queren, bräunlichen Schildchen. Die beiden ersten Keilwülste wie

gewöhnlich, der dritte dagegen bis zum 9ten nur sehr klein und von einer stark erhabenen, glatten, glänzenden, die Keilwulst fast ganz verdrängenden, gleichsam in der Querfurche liegenden Nebenwulst begleitet. Behaarung deutlich.

**VORKOMMEN.** An den Blättern der Birke.

**LEBENSWEISE.** Den Käfer habe ich nur einmal im Jahre bemerkt und zwar im Mai und Juni. Man findet ihn dann auf jungen und alten Birken beschäftigt, die Blätter auf ähnliche Weise wie die verwandten Arten, selbst wie der *Apoderes Coryli* für die Aufnahme ihrer Eier vorzubereiten. Das Weibchen rollt die Blätter zusammen und legt ein Ei in eine kleine, aus abgelöster Epidermis bestehende Tasche, welche man nur bei großer Aufmerksamkeit bemerkt, hinein. Wer sich ein Vergnügen im Freien machen will, muß zusehen, wie das kleine Thierchen diese, eigentlich für dasselbe colossale, Arbeit vollführt, wie es oft mit der größten Geduld die schon beinahe vollendete und wieder aufgegangene Tüte abwärts zusammenrollt. Nachdem das Blatt, wie die zweite Figur es zeigt, zugeschnitten worden ist, beginnt das mühsame Geschäft, wobei das Thier sich so wenig stören läßt, daß ich es einst mit dem abgepflückten Blatte eine Viertelstunde weit nach Hause tragen und bei der Arbeit beobachten konnte. Wahrscheinlich benutzen sie die kleinen Stellen, welche man am Blatte hier und da ausgenagt findet, dazu, sich mit den Häkchen, welche am glatten Blatte leicht abgleiten, daran festzuhalten. Nach vollendeter Arbeit wird die Tüte verschlossen. In der Tüte fand ich die Larve schon nach wenigen Wochen und ihr Fraß, welcher quer durch alle Windungen geht, machte sich durch den schwarzgrünen, um sie her liegenden fadigen Koth bemerkbar. Die Blätter fallen dann bald von den Bäumen und die Larven verschwinden. Wahrscheinlich gehen sie in die Erde und sind wegen ihrer Kleinheit nicht zu finden. Ich suchte sie selbst vergebens in einem Birkenorte, welcher sehr reinen Boden hatte und leicht durchsucht werden konnte.

**FORSTLICHE BEDEUTUNG UND BEGEGNUNG.** Durch die Zerstörung der Blätter, von denen an einem Baume öfters kaum die Hälfte verschont bleibt, wird der Säftelauf unterbrochen und der Zuwachs muß darunter leiden. Man kann die Käfer daher in Jahren, wenn sie sehr häufig sind, merklich schädlich nennen. Die Vertilgung wird durch Sammeln der befallenen Blätter, die man leicht bemerkt, räthlich.

### 3. *C. (Rhynchites) Betuleti* (*Attelabus* B. Fabr.). Metallischer Birken-Rüsselkäfer. (Taf. IV. Fig. 2.)

**NAMEN.** Linné beschreibt diese Art schon unverkennbar, nennt sie aber *C. Betulae*. Dem vorigen giebt er aber auch den Artamen *Betulae*, weil er glaubte, dieser gehöre einer andern Gattung (seiner Gattung *Attelabus*) an. Da aber beide unzweifelhaft in eine Gattung gehören, so mußte natürlich der Artname des einen geändert werden und nur die vorige behält den Namen *Betulae*. Im Deutschen heißt er auch Birkenfelder, Birkenfreund, Drechsler, Pfeifenkäfer, zweiter Rebenstecher, stahlblauer Rebenstecher. Letztere Namen deuten auf eine Verwechselung mit *C. Bacchus*, oder beide sind dem Weinstocke schädlich. Schmidberger hält ihn für den Hauptzerstörer des Weinstockes.

**CHARACTERISTIK.** Der Käfer 2,5–3" lang. In der ganzen Form dem *Apoderes Coryli* am ähnlichsten. Rüssel etwas länger als Kopf, schwach gekrümmt. Stirn wenig vertieft. Der Halschild hat beim Weibchen vorn an der Seite einen feinen, spitzen, nach vorn gerichteten Dorn. Farben schön metallisch-blau oder grün (gewiß nicht specifisch).

Q



VORKOMMEN an den Blättern vieler Bäume. Von Bechstein schon auf Erlen, Birken, Haseln und am häufigsten auf dem Weinstocke beobachtet und von mir ausserdem noch auf Linden und auf Aspen.

Im LEBENSWEISE und FORSTLICHER BEDEUTUNG ähneln sie dem vorigen sehr, nur scheinen die Käfer zweimal im Jahre zu erscheinen, denn ich habe sie in verschiedenen Jahren bestimmt im Mai und wieder im September und selbst noch im October gesehen. Wahrscheinlich wird also die ganze Verwandlung innerhalb weniger Monate vollendet (wie bei *Apoderes*) oder sie überspringen gar ein Jahr, was mir aber unwahrscheinlich ist, da ich sie alljährlich häufig fand. Bei dem Verfertigen ihrer Tüten habe ich sie nie gesehen, wenigstens weifs ich nicht bestimmt, ob die von mir früher beobachteten und dafür gehaltenen wirklich diesem Käfer (der freilich damals in großer Menge in der Nähe war) angehörten, vermuthete es aber. Sie waren an Aspen und bestanden aus den 4-6 letzten, mit der Unterseite um die Rolle gelegten Blättern des jungen Triebes, innerhalb welcher die 4-8 gelben Eier lagen. Später habe ich die Käfer wirklich bei der Arbeit getroffen, aber erst als die Rolle von 4 Blättern fast ganz fertig war. Die interessantesten Nachrichten haben wir aus den Weingegenden, wo der Käfer ungleich häufiger ist und auch an den fünf-lappigen Blättern des Weinstockes mehr Gelegenheit hat, sein ausgezeichnetes Wickler-Talent zu zeigen. Im *Cours complet d'Agriculture* (von Rozier) T. XIII. pag. 27, welcher sehr gut unterrichtet zu sein scheint, wird die merkwürdige Operation folgendermafsen beschrieben: Der Käfer erscheint schon, wenn der Stock Ranken und Blätter treibt und nährt sich von den zartesten Blättern, wodurch er dem Triebe schon sehr schadet. Zur Legezeit, im Juni, richten sie aber den größten Schaden an. Sie suchen die größten Blätter aus, stechen den Blattstiel an und sobald das Blatt nach einigen Tagen, wegen mangelnden Salzzuflusses, anfängt welk und schlaff zu werden, wiederholt der Käfer die Operation an jeder der 5 Blatttrippen. Dann sticht er die Rippe des kleinern, äufsersten Lappens an, legt seine Eier hinein und befestigt sie mit einer klebrigen Feuchtigkeit. Dieser Lappen rollt sich dann spiralförmig zusammen, worauf der Käfer den zweiten Lappen angeht und ihn ebenfalls rollt, aber in entgegengesetzter Richtung, d. h. nach unterwärts. Mit dem 3ten und 4ten Lappen geht es eben so, so dafs 2 Lappen von der Rechten nach der Linken und 2 von der Linken nach der Rechten gerollt sind. Der 5te Lappen wird dann dazu gebraucht, die 4 übrigen zu decken (also auf ähnliche Art wie der Käfer bei uns Rollen aus mehreren Blättern an Bäumen verfertigt). Jede Rolle enthält Eier. Fünf bis sechs Tage werden zu der ganzen Arbeit erfordert. Alsdann wird das Blatt langsam trocken, bleibt aber hängen. Nach 8-10 Tagen schlüpft das Lärchen aus und nährt sich vom trocknenden Blatte. Glücklicherweise giebt es nur eine Generation, denn nur einmal findet man gerollte Blätter. Nach den von Hrn. Oken (*Naturgesch.* Bd. V. Abth. 3. S. 1650) mitgetheilten, aus süddeutschen, nicht leicht zu bekommenden Schriften entlehnten Nachrichten, legt das Weibchen auf einmal 3 Eier, ruht dann 9-10 Stunden und legt aufs Neue, bald in eine alte Rolle, bald in eine neue. Daher die so verschiedne Gröfse der Larven und natürlich auch das Erscheinen des Käfers zu so verschiedenen Zeiten im Jahre, welches leicht zu dem, jedenfalls aber ungegründeten, Verdacht einer doppelten Generation führen kann (Oken a. a. O. S. 1651.). Ich habe schon früher angegeben, dafs ich die Käfer zweimal im Jahre gesehen habe. Dasselbe führt Walther an und es ist ihm sehr wohl zu glauben, dafs die Käfer, wenn sie im Juli wiederkämen, nicht mehr die alt und hart gewordenen Weinblätter angingen, sondern andre Bäume und Sträucher, und dafs sie ebenfalls im Frühjahr, ehe der Stock ausschläge, an die zarten Schößlinge der Birn- und Apfelbäume gingen. Auch bei uns sahe ich sie an sehr verschiednen Bäumen, sowohl erwachsenen, als jungen, strauchartigen. Eben so wie sie aber bei uns nicht immer im Herbst zum zweiten Male erscheinen, so werden sie auch wohl in den Weingegenden zuweilen als Larve oder Puppe überwintern können, wenn der Sommer ihre schnelle Entwicklung nicht begünstigte. Die große Veränderlichkeit der Entwicklungszeit

bei andern Rüsselkäfern macht dies wahrscheinlich und Ortlieb's Beschreibung (s. Oken a. a. O. S. 1654.): „sie fielen im Spätjahr auf den Boden und verwandelten sich im Frühjahr“ deutet dies ganz bestimmt an. In fünf Wochen wären die Larven erwachsen und ließen sich zur Erde fallen, um sich zu verpuppen. Die ganze Entwicklungszeit vom Ei bis zum Käfer hatte Walther auf 60 Tage, bei kaltem Wetter auf  $\frac{1}{2}$  Jahr angegeben. Der Käfer soll sich besonders in Weinbergen mit trockenem Boden finden, weil ihm der schwere Boden bei der Verpuppung hinderlich sei und fette Reben zu viel Saft hätten. Auch sollen sie am liebsten kränkliche Stöcke angreifen. Wenn diese aber für ihre außerordentliche Menge nicht mehr ausreichen, so werden sie gewiß auch die gesunden nicht verschonen, denn Ortlieb (s. Oken a. a. O. S. 1654.) bemerkt, daß zuweilen kaum der 35ste Theil des Herbstes verschout bleibe. Der Schaden, welcher dadurch den armen Winzern erwächst, ist natürlich außerordentlich groß und wurde einmal in den Achtziger Jahren von Ortlieb auf 20,000 Gulden angegeben. Hr. Schmidberger (s. Kollar schädli. Ins. S. 171.) sahe auch durch den Käfer beschädigte Birnbäume. Entweder rollt er die Blätter bloß zusammen, oder er durchschneidet auch den Wipfel eines jungen Schosses, so daß er umfällt.

Hinsichtlich der FORSTLICHEN BEDEUTUNG übertrifft er den vorigen gewiß, denn er wird, wegen seiner ansehnlichen Größe und wegen der Gewohnheit, mehrere Blätter um einander zu wickeln, schon den Waldbäumen nachtheiliger und soll überdies noch am Weinstocke vielen Schaden thun. Hr. Schmidberger (*Obstbmz.* H. 1. S. 175.) nennt ihn den eigentlichen Rebenstecher und scheint geneigt, die hauptsächlichsten der berechtigten Aues-Verheerungen, welche durch Anstechen des keimenden Auges im Frühjahr (nach Bechstein S. 194. durch *C. Bacchus*) angerichtet werden, ihm zuzuschreiben, weil er den *C. Bacchus* nie auf dem Weinstocke gesehen habe. Es setzen dies auch die in den verschiedenen, über diesen Gegenstand erschienenen, Schriften gegebenen Beschreibungen des Käfers (besonders daß er bald grün bald blau sein soll) und seiner Lebensweise außer Zweifel (s. vorher).

Die VERTILGUNG kann auch bei diesem nur durch Sammeln der Käfer und der verletzten Pflanzentheile bewerkstelligt werden. Im Jahre 1756 wurden im Badenschen allein in zwei Markungen 14 Simmern und 7 Malter der Weinkäfer gesammelt. Man hat behauptet, daß das Ablesen der Käfer von Bäumen nichts helfen könne, weil diese einer andern Art angehörten (s. Oken a. a. O. S. 1653.), allein dies wird nach dem vorher Angeführten durchaus nicht überflüssig sein, obwohl es nicht das leichteste Vertilgungsmittel ist. Am besten ist es jedenfalls, der Entwicklung des Käfers zuvorzukommen, d. h. die Blattrollen zur rechten Zeit (im Juni) abzusammeln. Einmal sieht man diese sehr leicht und zweitens zerstört man so auch mit einem Griffe mehrere Käfer, abgesehen von der Unbequemlichkeit, welche die munter herumkriechenden Käfer dem Sammler noch in seiner Flasche, Büchse oder dergl. verursachen.

VERWANDT sind den beiden vorigen eine Menge von Arten, welche gewiß alle in Holzgewächsen leben, wenn sie auch nicht alle gerade Waldbäumen schädlich werden. Der No. 2. am meisten in der Form ähnelnde, aber durch stahlblaue Farbe der Unterseite, der Beine, des Kopfes sammt dem ganz geraden und runden Rüssel so wie durch rothe Flügel und Halschild ausgezeichnete *coeruleocephalus* Fabr. (*Rhynchites* c.) ist zuweilen auf Birken sehr häufig und erscheint auch (wie *Betuleti*) zweimal im Jahre, einmal im Mai und dann wieder im August. Der No. 3. in Farbe und Gestalt äußerst ähnliche *C. Populi* Linn. (*Rhynchites* P. Hb.) ist nur etwas kleiner und durch stark vertiefte Stirn ausgezeichnet und kommt mit demselben (für dessen Varietät ihn Bechstein S. 220. hält) meist zusammen, wiewohl stets in geringerer Menge, vor. Der berechtigige *C. Bacchus* Linn. ähnelt No. 3. am meisten, ist aber immer größer (3,5" lang), schön kupferroth glänzend und stark behaart. Schmidberger (s. S. 177.) bezweifelt, daß er der eigentliche Rebenkäfer sei, da er ihn nur damit beschäftigt gefunden habe, im Juli die Äpfel in seinem Garten mit Eiern zu belegen (*Obstbmz.* H. 1. S. 173.). Die Larven fraßen sich bis zur Kapsel, machten

dann wieder einen Gang bis zur Oberfläche des Apfels und vertiefen nach drei bis vier Wochen, wie sie ausgewachsen (?) waren, denselben und gingen in die Erde. Diesem *Bacchus* sind noch zwei etwas kleinere, erst in neuern Zeiten recht gewürdigte, Arten (*auratus* Scop. und *laetus* Schüpp.) so ähnlich, daß sich über den eigentlichen Thäter bei den eben erwähnten Beschädigungen wohl noch nicht ganz bestimmt etwas sagen läßt. Gewiß sind sie in der Lebensweise einander sehr ähnlich und die Aufklärung wird nicht sehr wichtig sein. Auch *C. Alliariae* Linn., welcher noch kleiner als No. 2. und ganz stahlblau ist, soll, so wie mehrere noch andre kleine (*cupreus*, *aequatus*), ebenfalls schädlich werden können. Er ähnelt dem Taf. IV. F. 2. abgebildeten Gattungsverwandten gar sehr, ist aber höchstens 2" lang, hat einen schmalen Halsschild, viel stärkere und auf den Flügeldecken sehr regelmäßig gereihete Punkte, sehr starke Behaarung und ist stets stahlblau. Hr. Schmidberger (*Obstbmz.* IV. S. 272.) gab schon ziemlich bestimmte Nachrichten über denselben. Die gründlichste Beobachtung aber verdanken wir Hrn. Richter (*Anhalt. Gart. Z.* No. 1.). Wir müssen dieselbe, wegen des bedeutenden Schadens, welchen der Käfer im Dessau'schen anrichtete, hier ausführlich mittheilen. Hr. Richter sahe viele Jahre hindurch an allen Arten von *Pyrus*, selbst den strauchartigen, wie *Pyrus salicifolia*, weniger an Pflaumenbäumen, die noch zarten und weichen, jungen Triebe, namentlich junge Pfropfreiser, wie mit der Scheere abgeschnitten neben den Bäumen liegen oder noch an einigen Fäden hängen. Im J. 1837 wo diese Verheerungen nicht bloß den Maitrieb, sondern auch die Johannistriebe trafen und die Zweige bis in den September von einem so unwillkommenen Gärtner eingestutzt wurden, waren  $\frac{2}{3}$  der diesjährigen Pfropfreiser abgeschnitten und zwar an manchen Reiseru nur 1 Auge, an vielen 2 und an einzelnen sogar alle 3 Augen. Nach jahrelangem, vergeblichem Spähen gelang es dem thätigen Manne, das Insect — denn daß ein solches den Schaden verübt haben müsse, hatte man längst vermuthet — in seinem Wirken zu entdecken. Meist fand er Männchen und Weibchen beim Abschneiden des Reises beschäftigt. Das Weibchen bohrt in Zeit von 1 Stunde mit dem Rüssel ein Loch bis in das Mark des Reises, legt ein Ei hinein und versucht es, dasselbe bis ins Mark zu schieben. Dann bringt es in 2-3 Stunden den Querschnitt  $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{4}$ " unterhalb dieses Loches bis aufs Mark zu Stande. Der Zweck dieser mühsamen Arbeit ist wahrscheinlich, den Trieb außer Saftbewegung zu setzen, damit das Ei sich ruhig darin entwickeln könne. Nach wenigen Tagen sahe Hr. Richter aus dem grünlichen Eichen die Larve ausschlüpfen, welche von dem Marke des verdorrenden oder halbverwesenden Reises lebt und dann zur Verpuppung in die Erde geht. Die ganze Entwicklung konnte er nicht verfolgen, vermuthet aber, daß sie sehr schnell gehe und daß es in einem Sommer wenigstens 2, wo nicht mehrere Generationen gebe. In diesem Punkte kann ich aber unmöglich seiner Meinung sein und erinnere an das, über Rüsselkäfer im Allgemeinen Gesagte, so wie an die Aufklärung über die vermeintliche doppelte Generation des *C. Betuleti*. Kurz vor dem Abdrucke dieser Zusätze lese ich noch Schmidberger's treffliche Beobachtungen, welche er neuerlich in Kollar's *Naturgesch.* (S. 249.) gegeben hat. Nach diesen giebt es auch nur eine Generation des Insects, wie ich gleich erwartete. Hr. Schmidberger sahe auch, daß ein Weibchen, welches noch so fleißig sei, nur zwei Triebe des Tages abschneiden könne. Das Abfallen des am Stumpfe noch hängenden Triebes bleibt meist dem Ungefahr überlassen, bisweilen fällt er aber gleich ab und in diesem Falle meint jener Beobachter, müßte das Ei oder das Würmchen vertrocknen, wenn der Trieb nicht etwa ins kühle Gras oder in den Schatten fiele. Aus dem Grunde glaubt er auch wohl: daß ein trockner Mai und Juni das Insect nicht begünstige. *Erysimum Alliaris* soll sich im Umkreise von mehr als 1 Stunde nicht finden, steht also gewiß mit dem Insect nicht in Verbindung. Feuchte Witterung und rascher Holztrieb sollen seinem Gedeihen sehr förderlich sein. Da auch stilles Wetter und überhaupt geschützte Lagen der Gärten ihn zu begünstigen schienen, so rath Hr. Richter, die jungen Bäumchen, auf welchen man den Käfer vermuthet, öfters zu schütteln. Hr. v. Meyerinck, der über die Verwüstungen der Käfer in seinen Baumschulen ebenfalls

klagt, fand, daß man sie, ungeachtet sie leicht fallen, mit einiger Vorsicht auch leicht von den Bäumen sammeln könnte und rath, auch dies nicht zu vernachlässigen.

Der *C. (R.) cupreus* F., welcher 2" lang ist und sich durch ein dunkles bläuliches Kupferroth und nicht sehr langen Rüssel auszeichnet, interessirt uns als Pflaumen-zerstörender Käfer hier weniger, obgleich er, hinsichtlich seines merkwürdigen Treibens und Anbohrens der Früchte zu den merkwürdigsten Insecten gehört (s. Schmidberger in Kollar's *schädli. Ins.* S. 243.). Nnr in Ermangelung der Pflaumen soll er die saftigen Frühlingschössle des Baumes angehen.

Noch eine andre Art, *C. nanus* Payk., [der kleinste unter allen (1,2)], stahlblau, grob und auf den Flügeln regelmäsig reihig punktirt, kahl] wurde von Hrn. Hartig (*Jahresber.* S. 157.) im Forstrevier Hammer auf Birken in der Mitte des Juni in großer Menge bemerkt.

4. *C. (Magdalis) violaceus* Linn., (*Thamnopilus* v. Schh.). Stahlblauer Rüsselkäfer. (Taf. IV. Fig. 3.)

CHARACTERISTIK. Der Käfer 1,8-2,5" lang, also außerordentlich veränderlich in der Größe! Rüssel doppelt so lang als Kopf, stark gekrümmt. Die Fühler auf der Mitte desselben, zwölfgliedrig: das erste Glied fast so lang als die Geißelfaden und die vier Glieder der Keule fast verschmelzend. Flügeldecken punktirt-gestreift, die Zwischenräume gekörnelt. Farbe rein dunkel-stahlblau (ohne Grün). Die Larve (F. 3a) bis 4" lang und 1,5" breit. Kopf klein mit einem schwarzen Augenpunkt. Die drei ersten Körperringe stark vortretend, besonders die Fußwülste. Das Luftloch des ersten, mit einem Hornplättchen versehenen Ringes deutlich. Keilwülste nicht groß. Die Querrfurche bildet eine Vorder- und Hinterwulst. Behaarung auffallend sparsam, eigentlich nur am Afterringe, an den Vorderwülsten und dem Kopfe bemerkbar. Die Puppe (F. 3c) bis 3,5" lang. Kopf über den Halsschild hinaustretend. Rüssel etwas über den Hinterrand der Vorderschienen hinausragend, auf der Mitte mit zwei längern und zwei kürzern Borstenhaaren. Fühlerschaft bis zu den Augen. Füße etwas aufsteigend, vom letztern Paare nur die Kniegelenke und Fußgliederspitzen bemerkbar. Unterflügel die Oberflügel nicht viel überragend. Halsschild auf der Oberseite mit auf Höckerchen stehenden, ziemlich langen Borstenhaaren (in der Vorderansicht vier bemerkbar). Die beiden letzten Hinterleibsringe mit mehreren, sehr kurze braune Härchen tragenden Dornhöckerchen. Die Afterdornen nur klein. Behaarung sonst nirgends bemerkbar.

VERWANDT sind: *M. duplicata* Grm., welche sich von *violacea* nur durch vertiefte Punkte der Zwischenräume der Flügel unterscheidet; *M. phlegmatica* Hb., welche länger (besonders der Halsschild) und schmaler gebaut ist, etwas grünelt und auf den sehr breiten Zwischenräumen mehrere unregelmäßige Punktreihen hat; *M. carbonaria* Grm. (bis 3" lang), welche ganz schwarz ist und Reihen sehr breiter, viereckiger Punkte und nur sehr schmale Zwischenräume hat. Die andern verwandten Arten (*Cerasi*, *Pruni* u. A.) noch nicht im Forste bemerkt. Jedoch sind sie höchst wahrscheinlich sämtlich echte Forstinsecten. *M. aerrima* F. (*Curculio stygius* Mrsh.) (1,8-2" lang, schwarz mit vorn zweispitzigem Halsschild) erhielt ich noch ganz kürzlich als einen Rüsternzerstörer von Hrn. Radzay. Der letztere hatte im Herbst des J. 1818 eine starke grüne Rüste im Forste bemerkt, welche viele trockne Äste hatte, sonst aber gesund war. In den abgeschnittenen Ästen fanden sich schon Puppen, welche noch während des Winters in der Stube zu Käfern sich ausbildeten. In dem einen, mir übersandten Aste fand ich eine große Menge von Larven, Puppen und Käfern unter der Rinde. Sie hatten sich von der Gegend einer kleinen Astnarbe aus (an welche das Weibchen wahrscheinlich gelegt hatte) in leicht geschlängelten Gängen bis 6" weit verbreitet und hier den Bast fast ganz in Wurmehl verwandelt. Die Wiegen befanden sich meist oberflächlich im Splinte und die Fluglöcher über diesen waren wie mit No. 8. oder 9. geschossen.

VORKOMMEN. *C. violaceus* ist sehr weit verbreitet und überall gemein an Kiefern, nach Hrn. Walzl in Bayern auch auf Birken an trocknen Hügeln und nach Bechstein (*Forstins.* S. 221.) auch auf

Weißdorn, Fichten und Weinstöcken. Die andern verwandten Arten kommen, nach meinen Beobachtungen, stets untermischt mit ihm vor, und entwickeln sich nur ein wenig später.

**LEBENSWEISE.** Die Flugzeit des Käfers ist im Mai. Man sieht dann eine große Menge großer und kleiner Individuen an den Kiefern, besonders jüngeren noch nicht ausgeisteten, selbst ganz jungen sitzen. Einige begatten sich, andre sitzen ganz still oder laufen träge herum und noch andre stechen die Knospen an; bei warmem Wetter sieht man sie auch wohl in ungeheuren Schwärmen die Kiefern, besonders einzelne Kusseln, unschweben. Den Stich sahe ich immer nur oberflächlich. Er brachte nie Harztröpfchen hervor. Nie konnte ich bemerken, daß ein Ei hineingelegt wurde. Im besorgten Forst. (I. S. 61.) (aus welchem auch Bechstein *Forstins.* S. 221. geschöpft hat) steht: Das Weibchen durchbohrt die Knospe, fresse sie aus (?) und lege in dieselbe, und die Made nage sich von der Knospe an durch den Zweig in das Mark. Dagegen bin ich fest überzeugt, daß die Eier auch an der Rinde abgelegt werden, denn ich fand die Larven in trocknen, ausgerissnen vier- bis sechsjährigen Kiefern-Pflanzen und Kiefern-Ästen, an welchen gar keine Knospen mehr waren. Es war im Winter und viele Larven lagen noch unter der Rinde am Ende der langen, geschlängelten Gänge, welche hier und da Alles in Wurmehl verwandelt hatten, besonders da, wo *Buprestis 4-punctata* mit ihnen gefressen hatte; andre waren aber auch schon in das Holz oder selbst bis ins Mark gegangen und zwar durch ein kreisrundes Loch, welches mit weißen Spänchen verstopft war und ihnen zum Flugcanal dienen sollte. Dieser ging gebogen von oben nach unten. Am Ende desselben lag die Larve aufrecht. Am meisten fand ich sie in der Gegend des Quirls und hier oft vier bis sechs Larven nahe bei einander. In der warmen Stube entwickelten sich die Käfer schon im Februar und März. Im Jahre 1834 fand ich das Insect auch in jungen, lebenden Kiefern und zwar mit *C. notatus* zusammen. Es war schon spät im October und die Käfer waren flugfertig. Sie standen aufrecht in der Markröhre und die Larven schienen von unten nach oben gefressen zu haben.

**FORSTLICHE BEDEUTUNG.** Das Insect ist gewiß als merklich schädlich anzusprechen. Im bes. Forst. wird es unter die mehr schädlichen gerechnet, weil, wie behauptet wird, ein Paar hinreichend seien, einen jungen Kienbaum ganz zu verderben. Hr. Zebé beobachtete, daß es mit *Curlucio notatus* (s. dort) gemeinschaftlich großen Schaden anrichtete und in ältern Stämmen mehr in der Mitte und gegen den Wipfel, in jungen, dreijährigen, schwachen Pflanzen aber auch ganz unten vorkomme. Ich fand es ebenfalls einzeln mit *C. notatus* zusammen in jungen, lebenden drei- bis fünfjährigen Stämmchen. Hr. Meyer hatte ihn im Jahr 1836 im Sorauer Revier in großer Menge. Der Käfer stach den Maiwuchs der jüngern und ältesten Kiefern an, wodurch derselbe verkrüppelte und abstarb. Nach Hrn. Brockhardt übt das Insect auch in jungen Fichtenorten, selbst an prädominirenden Stämmen, einen merklichen Schaden aus. Es haust hier am liebsten in der Nähe des Quirls und geht bis in den 2-jährigen Trieb, wie er sich denn überhaupt hier mehr im obern Theil des Stammes hält. Öfters war ein und derselbe Stamm von zwei verschiedenen Generationen nach einander bewohnt worden, so daß Larven und leere Puppenhölen zugleich da waren. In Fichten hat auch Hr. Steinhoff den Käfer wirthschaften gesehen. Im Sommer 1835 fanden sich in einer etwa 5-8' hohen Fichteupflanzung an den Seitensträngen (Knobbener Forstreviers, Inspection Uslar) ungewöhnlich viele trockne Stämme und bei näherer Untersuchung zeigte sich, daß sie von *C. violaceus* und *Bostr. chalcographus* und *Abietis* bewohnt waren, viele aber auch den *C. violaceus* allein enthielten, welcher überhaupt am häufigsten war. Von dem vorletzten Triebe an bis fast 4' über der Erde waren Käfer und Larven so häufig, daß der Splint ganz in Wurmehl verwandelt schien. Vorzüglich hatten die Larven sich in den Astwinkeln und zwischen den Quirlen gesammelt und verpuppt. Hier fanden sich immer die meisten Fluglöcher. Die Larvengänge gingen immer senkrecht von oben nach unten und griffen oft bis fast 1" tief ins Holz. Da April und Mai sehr kalt gewesen waren, so mochte wohl darin der Grund liegen, daß sämtliche Arten erst Mitte Juni's zur gehörigen Vollkommen-

heit gelangt, obgleich einzelne Individuen schon etwas früher fertig gewesen waren. Auf Verfügung des Hrn. Forstmeisters v. Seebach wurden alle befallenen Stämme sogleich abgehauen und verbrannt und dadurch unschädlich gemacht.

**BEZUGUNG** wird auch bei diesem Käfer, wie das häufige Vorkommen desselben in Kiefernreisig zeigt, durch Reinlichkeit möglich. Bei einer schon vorhandenen Verheerung kann man die Käfer im Mai oder Juni in Fangschirme sammeln und die Larven und Puppen im Herbst und Winter durch Abhauen der Zweige oder Ausreißen und Verbrennen der Pflanzen, wie bei *C. notatus*, entfernen.

**VERWANDT** sind dem vorigen Käfer und den ihm generisch verwandten andern Arten die zur Gattung *Apion* Hb. gerechneten Rüsselkäfer. Sie haben ganz ähnliche Form, auch meist stahlblau oder metallisch-grünliche Farben, haben aber elfgliedrige Fühler und sind allermeist nur 1-1,5", selten bis 2" lang. Bis jetzt hat man noch keine Art bestimmt als schädlich bezeichnet, sondern nur diese oder jene auf Baumblättern sitzend oder an Kiefern schwärmend gesehen. Vielleicht erwerben sie sich künftig einen bestimmten Platz unter den Forstinsecten. Die Zahl der Arten ist groß und ihre Unterscheidung nicht leicht.

#### 5. *C. (Thylacites) Coryli* Gyll. Haseln-Rüsselkäfer. (Taf. IV. Fig. 1.)

**NAMEN.** Unter dem Namen *Coryli* ist diese Art ganz allgemein bekannt und höchstwahrscheinlich auch von Gyllenhal (*Ins. Succ.* III. 304.) dafür genommen (entweder allein oder mit der gleich zu nennenden zusammen), obgleich Fabricius eine andre, aber äußerst ähnliche Art [die bis fast 3" lang und etwas dunkler, stets bräunelnd ist und besonders durch ganz schwarze (nackte) Vorderhälfte der Nath und etwas größere Börstchen sich auszeichnet] so nennt. Gegenwärtige belegt Fabricius mit dem Namen *C. cervinus*; da dieser aber schon von Linné vergeben war (s. verwandte No. 12.), so können wir ihn nicht für diese gebrauchen. Übrigens sind sich beide auch in der Lebensweise so ähnlich (*Coryli* Fabr., aber bei uns seltener), daß auf diese feine Unterscheidung nichts ankommt und es ziemlich gleich wäre, ob man *Coryli* Fabr. oder Gyllenhal sagte.

**CHARACTERISTIK.** 1,5-2" lang und bis 1,2" breit, sehr stark gewölbt, fast kuglig. Rüssel breit. Fühlerfurche bis unter die Augen gekrümmt. Die schwarze oder dunkelbraune Grundfarbe wird durch graue oder bräunliche, hier und da ganz weiße Schüppchen überdeckt, die sich ziemlich leicht abreiben. Die Börstchen der Punktreihen sehr kurz.

**VORKOMMEN, LEBENSWEISE UND FORSTLICHE BEDEUTUNG.** Der Käfer erscheint im Frühjahr meist in ungeheurer Menge und läßt sich im Herbst oft noch einmal sehen. Wahrscheinlich ist die Entwicklung unterdessen in der Erde vor sich gegangen, denn an den Gewächsen ist weder von Larven noch von Puppen eine Spur gefunden. Der Käfer liebt besonders Haseln, geht aber auch auf andre Hölzer. In der Elbingeröder Gegend am Harze verzehrten sie vor mehreren Jahren die jungen Triebe der Birken (Hr. Saxesen). Auch an Fichten fand ihn Hr. Saxesen nagen, an Kiefern sahe ich ihn. Im Jahre 1825 wurde schon im April in den Ämtern Siedenburg und Stolzenau die Rinde von jüngern ein- bis zweijährigen Buchen-Anwuchs unter der Blattknospe durch die Käfer so benagt, daß ganze Flächen davon abstarben. Im Bremenschen und Hoyaischen nagten sie Blätter, Rinde, Knospen und junge Triebe an jungen Eichen und Buchen ab (Hr. Wächter S. 338.). Auch neuerlich hat dieser Käfer wieder, wie ich von Hrn. Heyer erfahre, in einem, mehrere Stunden von Lüneburg entfernten, Gebölze die Zweige der Eichen entrinde. Demnach wäre der Käfer wohl merklich schädlich zu nennen.

Seine **VERTILGUNG** ist nur durch Sammeln der Käfer möglich, hat auch, da diese meist an jungen Stämmen fressen und sehr lose sitzen, keine Schwierigkeit, wenn man nur vorsichtig ist und einen Fangschirm hat.



VERWANDT sind ihm mehrere Arten, unter denen nur *C. geminatus* Fabr. (*Thylacites geminatus*) noch zu erwähnen ist, welcher meist größer (bis 3" lang und 2,2" breit), noch kugliger, auch mit längern und zahlreichern Börstchen besetzt und mehr grauweiß ist. Hr. v. Türk sah ihn an den jungen Weintrieben großen Schaden anrichten, auch zeigt er sich an Kiefern und Buchen. Hr. Klockmann sah ihn in der Mitte Aprils zugleich mit *C. glaucus* (s. No. 9) erscheinen. Versuche, welche man mit ihm wie mit *C. glaucus* anstellte, ergaben, daß der größere Theil der in ein Glas gesetzten Käfer sich sogleich auf die Maitriebe der Pflanzen begab. Hier steckten sie den Rüssel in die Scheidchen der Nadeln und kniffen diese beide theils ganz ab, theils durchschnitten sie sie so, daß dieselben umknickten. Die Triebe wurden endlich so entnadt, daß sie wie beputzt erschienen. Später wurden kleine Verletzungen an den Wurzeln bemerkt, die man ihnen zuschreiben konnte (Pfeil's crit. Blt. Bd. XI. H. 1. S. 83.). Sollte der Käfer aber doch nicht bloß aus Noth diese ungewohnte Nahrung gesucht haben?

#### 6. *C. (Brachyderes) incanus* Linn. Bestäubter Rüsselkäfer. (Taf. IV. Fig. 4.)

NAMEN. Alle Neuern nehmen diesen Käfer für den *C. incanus* Linn. Obgleich mir dies nach der Beschreibung der *Fauna suec.* sehr unwahrscheinlich vorkommt, so folge ich doch, da der Name auch den Forstleuten schon geläufig ist. Unter dem Namen *C. rufipes* Linn. wird gewöhnlich (z. B. auch bei Bechstein) eine Varietät gegenwärtiger Art verstanden. Thiersch dagegen (*Forstik.* Taf. II. Fig. 8.) nennt so unsere vierzehnte Art den *C. ater* Hb., welches, zur Vermeidung von Mißverständnissen, beachtet werden muß. Deutsch heißt er auch noch: Graner Rüsselkäfer, Stumpfdecke.

CHARACTERISTIK. 3,5" lang und 1,9" breit. Rüssel grade, sehr kurz und breit. Fühler an der Spitze lang und dünn, von der Länge des halben Körpers. Das erste Glied sehr lang und keulenförmig, die Fühlerkeule nicht sehr stark, zugespitzt. Flügeldecken fast viermal länger als Halsschild. Die schwarze (besonders an den unter Moos überwinternden, abgeriebenen Käfern sehr häufig herrschende) Grundfarbe mit einer Menge von grauen, kupferförmlich glänzenden Schuppenhärcchen bedeckt.

VORKOMMEN, LEBENSWEISE, FORSTLICHE BEDEUTUNG UND BEGEGNUNG. Der Käfer ist einer der gewöhnlichsten auf Kiefern, jedoch nicht überall, denn um Helmstädt soll er, wie ich von Hrn. Häberlin höre, gar nicht sein. Nach Bechstein soll er auch auf Fichten leben und Hr. Lehmann beobachtete ihn auf Birken. Man sieht den Käfer zweimal im Jahre: einmal in größter Menge im Mai in Begattung und zwar wegen der vorangegangenen Überwinterung unter dem Moose, in Erde und in Rindenspalten mehr oder weniger abgerieben; zum zweiten male, wenn auch weniger häufig, im Juli und August. Wahrscheinlich geht die Entwicklung binnen dieser Zeit vor sich. Mit Gewißheit weiß man darüber noch nichts, denn es ist, trotz der Häufigkeit des Insects, weder mir noch andern Freunden, denen ich die Sache empfahl, geglückt, die Larven oder Puppen zu finden. Im besorgten Forstmann (I. 62.) heißt es zwar, die Larve lebe unter der Rinde und an den Wurzeln kranker Tannen, Fichten und Kiefern, gewiß liegt dieser Angabe aber keine eigne Beobachtung zum Grunde, sonst wäre sie ausführlicher. Höchstwahrscheinlich ist es allerdings, daß die Larve sich an den Stämmen und nicht in der Erde findet. Hr. Fintelmann, welcher einst mehrere Äste kranker Kiefern mit Larven von *Curculio notatus* und *Abobium nigritum* eingezwängt hatte, fand im Juli eines Tages den Käfer munter im Zwinger umherspazieren und in der Gegend eines Quirls fand sich jetzt auch unter der Rinde eine, vorher durchaus nicht bemerkte, Puppenhöhle, welche dem Käfer wahrscheinlich gehörte. Sehr viel hat der Mangel dieser Kenntniß nicht zu sagen, denn wir würden doch das Insect in keinem Zustande leichter als im ausgebildeten vertilgen können. Die Käfer finden sich am liebsten auf jungen Kiefern und können sehr leicht in Fangschirme geklopft werden. Die geringste Bewegung stürzt sie herunter, ja sie fallen öfters schon, wenn man sich zu rasch naht, vorher herunter. Da die meisten Käfer unter dem Moose überwintern, so würde man viele

derselben auch durch Zusammenhaken des Mooses bekommen. Da das Mooshaken jedoch andre Nachtheile hat und nur in den dringendsten Fällen anzurathen ist, auch nicht einmal alle Käfer hier liegen, sondern auch tiefer in der Erde (dann jedoch immer nahe den Wurzeln), so unterlasse man es hier. Ueberhaupt gehört der Käfer nicht zu den schädlichsten, denn gewöhnlich benagt er nur die Nadeln der ältern Triebe (welche ein häßliches ausgefressenes Ansehen bekommen), seltener etwas die Knospen. Nur ein Fall ist mir bekannt, in welchem er merklich schädlich wurde. Hr. Lehmann schrieb mir nämlich über ihn im J. 1836: „Die Kiefern litten nur wenig vom ihm, da er nur Seitenzweige anging, dagegen werden die von ihm befallenen Birken gewiss trocken, wenn sie nicht abgeschnitten werden, denn die ganze Beästung ist abgeschält und auch die Blätter sind zerfressen.“ Später theilte er mir mündlich mit, daß die Birken an einem Feldwege nahe einer Kiefern-Schonung gelegen seien, welche letztere die Käfer jedoch eben so wenig wie das nicht sehr entfernte hohe Holz befielen. Die mir mitgetheilten Zweige waren öfters mehrere Zolle weit von Rinde ganz entblößt, zum Theil war aber nur die Epidermis benagt. Später erhielt ich von Hrn. Zimmermann, interimistischem Oberförster zu Neuendorf bei Wittstock, abermals den Käfer mit der Nachricht: daß er im J. 1837 eine im Frühjahr desselben Jahres angelegte Birkenpflanzung durch Abnagen der Rinde bedeutend beschädigt habe. Sehr viele Birken, welche gut angewachsen waren, starben in Folge dieser Beschädigung ab. Hr. Heyer traf ihn auch wieder in Menge auf Birken. Wenn man den Käfer im Frühjahr zahlreich in Rindenspalten der Kiefern findet, wie das häufig am kräftigsten Holze vorkommt, so braucht man für dieses nicht besorgt zu sein. Er wähle es bloß zum Winterquartiere und zieht bald ans. Sollte er auch wirklich immer in den Stämmen brüten, so wählt er dazu gewiss nur die kränksten oder wohl gar nur die Rinde, ohne bis auf den Bast zu gehen. Verletzte die Brut den Bast an gesunden Bäumen, so müßte seine Häufigkeit schon viel öfter bemerkbaren Schaden herbeigeführt haben.

#### 7. *C. (Sitona) lineatus* Linn. Liniirter Rüsselkäfer.

CHARACTERISTIK. 2,1" lang und 1" breit. Rüssel grade, sehr kurz, breit. Die Fühler am Ende desselben, kurz, röthlich, mit deutlicher, langer, starker, spitzer Keule. Flügel dreimal länger als Halsschild. Die Grundfarbe schwarz, durch braune und metallisch-kupferröthliche Schüppchen verdeckt, welche letztere drei parallele Längslinien auf dem Halsschilde bilden und sich auch meist noch über die Basis der Flügeldecken fortsetzen. Beine röthlich-braun.

VORKOMMEN U. S. F. Der kleine Käfer ist in manchen Jahren sehr häufig, besonders auf Kiefern. Hr. Fintelmann hat ihn aus Kiefernzapfen erzogen. Hr. Hartig (*F. Conv. Lex.* S. 171.) fand ihn auf frisch gemachten Ansätzen, und vermuthet, daß er die Sämereien der Nadelhölzer zerstöre.

VERWANDT sind ihm mehrere, jedoch schwer zu unterscheidende, wahrscheinlich auch in der Lebensweise übereinstimmende Arten.

#### 8. *C. Pini* Linn. (*Hylobius Abietis*). Großer brauner Kiefern-Rüsselkäfer. (Taf. IV. Fig. 11.)

NAMEN. Die beiden wichtigsten Rüsselkäfer auf Nadelhölzern sind zwei braune Arten und zwar eine große und eine kleine, eigentlich auch noch eine dritte. Die große (hier sub No. 8. abzuhandelnde) ist es nun eben, welche die Forstleute bisher *C. pini* genannt haben (von der kleinern später unter No. 16. und der dritten unter No. 15.). In den Schriften von Pfeil, Bechstein und Thiersch, in der *Forst- u. Jagdzeitung*, so wie in dem Büchelchen von Walter, wo von diesem, als dem am meisten in die Augen fallenden die Rede ist, steht *C. Pini* oben an und von *C. Abietis* liest man wenig oder gar nichts. Selbst Forstleute, welche nur wenig von Entomologie verstehen, kennen doch den *C. Pini*. Also Grund genug diesen Namen nicht untergehen zu lassen und sollte er auch durch einen Nachspruch gerettet werden

müssen und nur bei den Forstleuten gelten. Desto besser aber, wenn dies nicht nöthig ist und die Rechtmäßigkeit des Namens *Pini* für diesen nachgewiesen werden kann. In der That ist es mehr als wahrscheinlich, daß er bei Linné so hieß und nicht der kleinere. Alle Schriftsteller nach Linné haben zwar das Entgegengesetzte angenommen und zwar weil sie glauben, Linné's Beschreibung des *C. Pini* in der *Fauna suec. ed. 2.* sei aus Versehen zu *C. Abietis* gerathen und umgekehrt. Dafs beim Drucke dieser beiden Arten ein Fehler vorgefallen sei, ist augenscheinlich, aber nicht, wie ich glaube, mit der Verwechselung der Beschreibung, sondern mit der Diagnose. Ohne mich weiter in Muthmaßungen über die Ursache dieser unbegründlichen Verwechselung einzulassen, (s. meine weillängere Abhandlung in Pfeil's *crit. Bl.*) führe ich nur Folgendes für meine Annahme auf: Linné nennt, was bisher von den Entomologen gar nicht beachtet worden ist, einige Male den *C. Pini* und den *C. Abietis* bei andern Arten, deren Gröfse er vergleichend bestimmen will, und da sagt er No. 616. von *C. nucum* „*statura C. Pini sed minor*“ und No. 640. von *C. carbonarius* „*magnitudo fere C. Abietis*.“ Nun aber hat *C. nucum* jedenfalls mehr den gedrungenen, breiten Bau des großen als des kleinen, und *C. carbonarius* noch viel mehr die gestreckte Form und auch ziemlich die Gröfse des kleinen. Dabei kann sich doch Linné nicht geirrt haben! Würden wir nicht, dafs in den Ueberbleibseln der Linné'schen Insektensammlung zu London schon manche Namenszettel verwechselt sind, so würden wir dieser die alleinige Entscheidung überlassen. Hier steckt der grösse wirklich auch als *C. Pini*, wie Hr. Lichtenstein im Jahre 1833 selbst sah. Hoffentlich ist dies Rechtfertigung genug. Freilich werden sich die Entomologen daran nicht kehren, weil bei ihnen das Entgegengesetzte zu sehr eingewurzelt ist, und weil ihnen auch meistens das Interesse, welches wir hierbei haben, gänzlich abgeht, und es wird hier leider nie zu einer Uebereinstimmung kommen. Man muß sich daher in Acht nehmen und, wenn man mit Jemand zu thun hat, den man noch nicht kennt, auf beides vorbereitet sein, und lieber den einen den großen und den andern den kleinen brannen, oder jenen den *Hyllobius* und diesen den *Pissodes* nennen. Dann dürfte ich, wäre jedes Mißverstehen unmöglich.

CHARACTERISTIK. 3,5"-6" lang und bis 3" breit, also der grösste Forst-Rüsselkäfer — wenn man nicht etwa den noch grössern schwarzen, braungefleckten *C. fuscomaculatus* Fabr. zu den Forstinsecten rechnet. — Rüssel fast von der Länge des Halschildes, ziemlich dick, etwas gekrümmt, abwärts gerichtet. Fühler nahe dem Ende desselben eingefügt, kurz und dick. Die Keule rundlich-eiförmig, hellbraun, Halschild länger als breit, an den Seiten gerundet, in der Mitte erweitert, vorn verengt, mit schwacher glatter Mittelkeule. Schildchen klein, dunkel, abgerundet-dreieckig. Flügeldecken breiter als Halschild, kaum dreimal länger als derselbe, punktirt-gestreift, die Punkte grofs, viereckig. Die Zwischenräume ziemlich gleich grofs und, so wie die meisten übrigen Körpertheile, grob gerunzelt. Schenkel gegen das verdickte Ende mit starkem, aber kurzen, stumpfen Dorn. Schienen am Ende mit spitzen, etwas gekrümmten Stachel. Grundfarbe dunkelbraun, zuweilen etwas röthelnd. Ueberall stehen einzelne, rostrothe Härchen zerstreut, welche an den Seiten des Halschildes und am hintern Ende der Mittellinie desselben, an der Stirn, so wie an der Unterseite des Thorax dichter stehen und auf den Flügeln besonders zwei schiefe, schmale, aus Fleckchen bestehende Querbinden bilden, welche in der Mitte abbrechen und drüber und drunter bis an die Nath fortsetzen. Die Larve bis 9" lang und über 2" breit. Kopf grofs, rundlich, röthlich-braun, mit zwei hellern Fleckchen des Scheitels. Gabellinie mit zwei, dem ungetheilten Aste parallelen Linien. Die drei ersten Ringe etwas vortretend. Der erste mit deutlichem Luftloche und einem getheilten, schmalen, dunklern Rückenschild. Ausser der gewöhnlichen Querfurche auf den übrigen noch eine hintere, kleinere, an den Vorderrand der Keilwulst gehende. Auf der Keilwulst eine Querreihe von Härchen. An den beiden letzten Ringen, an den Fufswülsten und am Kopfe bedeutend lange, zum Theil borstenartige Haare. Die Puppe bis 7" lang und 2½" breit. Kopf über den Halschild hinaustretend, über den Augen mit zwei starken Dornhöckern. Rüssel bis zum Vorderrande der Vorderschienen

reichend, mit mehreren in eine Borste auslaufenden Dornenhöckern. Fühlerschaft bis zu den Augen reichend. Halsschild mit starken Dornenhöckern (zwoölf in der Vorderansicht). Füße stark aufsteigend, besonders die hintern, so dafs auch von den Schenkeln und Schienen viel zu sehen ist, und die Fußglieder-  
spitzen nicht die Flügel überragen. Unterflügel die Oberflügel weit überragend. Oberseite des Hinterleibs mit auferordentlich starken und zahlreichen Dornenhöckern, deren mehrere auch die Vorderansicht zeigt. Die Afterdornen, zwischen denen noch zwei kleinere stehen, sehr grofs. Behaarung sonst nicht vorhanden. An einigen kleinern Individuen (Männchen?) fehlten die Dornenhöcker des Rüssels vor der Fühler-einfügung, auch waren die Afterdornen kürzer und entfernter.

VORKOMMEN. Der grofse Rüsselkäfer ist einer der gemeinsten fast in allen Gegenden von Süd-deutschland bis Schweden (Gyllenhal) und Rußland (Ménétriés) hinauf. Mit der steigenden Cultur der Nadelhölzer nimmt auch seine Vermehrung und Verbreitung zu. Nach Hrn. Wächter (Pfeil's *crit. Bl.*) werden sie z. B. erst jetzt so lästig im Solling und den Heidegegenden, weil hier früher nur Laubholz war, und jetzt die ausgedehntesten Nadelholzanlagen entstehen. Der Käfer selbst geht zwar auch an Laubhölzer, setzt seine Eier aber nur in Nadelhölzer ab. Daher mufs er letztere immer in der Nähe haben. Auch Hr. Saxen erinnert sich, in Holstein und um Göttingen, wo gar kein Nadelholz ist, keine Spur dieses Insects gefunden zu haben. Am liebsten sind dem Käfer Kiefern und Fichten. In Oberschlesien ist er auch in einem aus melirten Tannen und Fichten bestehenden Forst (Hr. Zebe).


In der LEBENSWEISE hat der grofse Rüsselkäfer mit vielen andern, namentlich dem *C. notatus* manche Ähnlichkeit und man kann auch deshalb beide sehr leicht mit einander verwechseln. So ist es selbst Bechstein gegangen und er hat dadurch grofse Verwirrung angerichtet, dafs er bei seinen *C. Pini* bald von diesem und, ohne es zu wissen, bald von dem *C. notatus*, spricht. Man nehme die Sache daher nicht so leicht und verlasse sich nicht allein auf die Unterscheidungszeichen der Käfer (die den weniger geübten doch täuschen könnten), sondern beachte auch die feineren Züge der Lebensweise, in welchen beide abweichen, besonders den Aufenthalt der Larve.

I. Von der Entwicklungszeit des Insects. 1) Die Flug- und Begattungszeit ist in gewöhnlichen Jahren im Mai und Juni, zuweilen auch noch im Juli, wie an Fangbäumen und Fangkloben besonders deutlich zu sehen ist (s. Begegn. II. 4.). 2) Dafs sich nur Männchen und Weibchen einer und derselben Art begatten, ist schon mehrmals erwähnt. Nur deshalb, weil sie oft von so sehr verschiedener Gröfse sind, hat man sie für verschiedene Species gehalten. Ich sah oft die Pärchen von *C. Pini* und *C. notatus*, auch wohl von *C. Abietis*, dicht beisammen sitzen, aber niemals hatten sie sich verpaart. Was Bechstein in *copula* sahe, war daher auch wohl immer nur *C. Pini*, grofs und klein. 3) Vom Juli bis in den September oder gar Oktober sieht man die Begattung seltener, obgleich es noch genug frische Käfer giebt. Diese erwarten das nächste Jahr. 4) Auch von denen, welche sich bereits begattet haben, scheinen viele zu überwintern. Dafür möchte ich die stark abgeriebenen halten, welche man so häufig im Winter im Walde findet. Frisch ausgeschlüpfte sieht man in der Regel nicht vor dem Frühjahr, auch nach Hrn. Saxen's in Fichten angestellten Beobachtungen. 5) Demnach findet das Eierlegen meistens zu sehr verschiedenen Zeiten statt, folglich auch die weitere Entwicklung. Wir finden nämlich im Herbst und Winter zugleich, theils ganz erwachsene Larven und Puppen, oder wohl gar schon die ausgebildeten Käfer im Puppelager, theils erst halbwüchsige Larven. Diese rühren offenbar von einer frühern und einer spätern Eierlage her. Folge dieser verschiedenen Entwicklung ist dann auch wieder natürlich das Erscheinen einer frühern und einer spätern Menge begattungsfähiger Käfer, oft nach einer Pause von sechs bis acht Wochen mitten im Sommer, und man darf dies nicht etwa für eine doppelte Generation ansehen. Die hat kein Rüsselkäfer. Wir können bestimmt behaupten: dafs die Brut eines Pärchens meistens im Jahre ihrer Entstehung nicht mehr zur Entwicklung kommt und

wenn es geschähe, so würden sie sich doch unter keinen Umständen in demselben wieder fortpflanzen. Aber auch länger als ein Jahr dauert die Generation gewiss nicht.

II. Was den verschiedenen Aufenthalt der Käfer zu verschiedenen Zeiten betrifft, so fange ich mit dem Winter an. Wir haben (I. 3, 4, 5) gesehen, daß das Insect wohl häufig als Käfer überwintert, aber nie in derselben Menge und nie allein in diesem Zustande. Die Menge der Larven und Puppen ist immer grösser als die der Käfer. 6) Die Käfer verkriechen sich theils unter Moos, theils in die Erde. Hr. Fintelmann beobachtete, wie sich ein Käfer im Zwinger tief in die Erde eingrub. Hr. Zimmer sah früher einmal im Herbst auf Kiefernschlägen, welche in demselben Jahre ausgeführt waren, eine große Menge Käfer beisammen. Sie krochen in offen stehenden Stammlöchern am Boden herum und es schien, als wollten sie sich in den Boden eingraben. Wahrscheinlich benutzen sie unbenarbte sandige Stellen gern dazu, denn die Menge von Käfern, welche man schon sehr früh im Jahre in Sandlöchern oder in den großen Gräben neben den Wegen im Forste findet, überwintern in den Löchern und Ritzen derselben oder in eigenen Löchern. Nach solchen Stellen ziehen sich auch viele andre Käfer und andre Insekten, selbst junge Salamander. Am häufigsten findet man die Käfer im Winter unter dem Moose, mit *C. incanus* zusammen, wenn man nach Kienraupen u. dgl. sucht. Sie sind ganz erstarrt, werden aber schon in der warmen Hand wieder beweglich. 7) Aus diesem Winterschlaf erwachen sie, je nachdem es früh oder spät warm wird, früher oder später. Meist sieht man schon im April einzelne. Im Mai erscheint die größte Masse derselben und verbreitet sich über die Pflanzen. Am Tage bei warmem Wetter sitzen sie gern frei. Sie sind dann sehr aufmerksam und lassen sich, so wie Jemand naht, sogleich fallen. Bei schlechtem Wetter halten sie sich mehr an den untern Theilen der Pflanze, wo sie durch das Gras geschützt sind und selbst den Augen des aufmerksamsten Forstmaunes oft entgehen (s. *Allgem. F. u. J. Z. J. IV. S. 31, 271.*). Hier verweilen sie des Fraßes wegen. 8) Sonst sieht man sie auch wohl auf allen Wegen und Stegen, an Zäunen, in den Spitzen alter Kiefern, selbst bis in die dem Forste benachbarten Städte und Dörfer herumschwärmen, besonders bei warmem Wetter. Sehr häufig findet man sie in Sandgräben, entweder weil sie hier unversehens oder aus Neugierde hineingeriethen oder durch Wind und Regen hineingetrieben wurden und nicht wieder hinaus konnten.

III. Aufenthalt der Larven und Puppen und Fraß der erstern. Diese finden sich immer nur im Innern der Gewächse und zwar wahrscheinlich meist nur der Nadelbölzer. 9) Herr Thiersch will sie auch in faulen Buchenstöcken, die ungerodet geblieben waren, gefunden haben. Dies bedarf indessen noch weiterer Bestätigung, da einer so isolirt dastehenden Beobachtung eine Verwechslung der Larven mit andern sehr ähnlichen (selbst von *Cerambyx*-Arten) zum Grunde liegen kann. 10) Gewöhnlich findet man die Larven und Puppen nur in den Stöcken der Kiefern und Fichten, nicht bloß der stehenden frischen und ganz alten, sondern auch der schon gerodeten und auf die Holzplätze abgefahrenen, wie ich im J. 1836 beobachtete (s. auch Begegn. I.). Frische scheinen sie alten vorzuziehen, wie aus einer Bemerkung des Hrn. Zimmermann abzunehmen ist. Er fand nämlich in den Jagen, in welchen das meiste Holz im Winter geschlagen war, die meisten Käfer, dahingegen wo frische Stubben fehlten, die wenigsten. Im Harze, wo man das Stamm-Ende meist sehr lang läßt, finden sie sich bis circa 1' hoch an demselben. Ich sah sie meist nur an dem Wurzelknoten und an den



Wurzelästen, gleichviel, ob die Rinde hier sehr dick oder nur dünn wie Pappe war. 11) Die Gänge laufen geschlängelt, entweder in der Gegend des Wurzelknotens bleibend oder an den Wurzelästen bis über  $\frac{1}{2}$  absteigend. Sie greifen etwas in den Splint ein, desto mehr je dünner die Rinde ist und je mehr sie sich dem Ende der Äste nähern. Im Herbst 1836, in welchem sie, wahrscheinlich wegen der höchst ungünstigen Sommerwitterung, sehr zurückgeblieben waren und sich noch nicht eine einzige Puppe zeigte, hatten sie sich in die verstecktesten und unzugänglichsten Winkel der Wurzeläste zurückgezogen und lagen gekrümmt von den Spänchen des *Cerambyx Aedilis*, der mit ihnen gefressen hatte, ganz umhüllt, in einer ins Holz greifenden bohnen-großen Vertiefung. Das Ende eines mit Wurmmehl verstopften Ganges nebst mit Spänchen ausgefütterter Puppenhöhle unter Fichtenrinde, von Herrn Saxesen gezeichnet, stellt eine Fichte dar. Der andre Stock zeigt, ebenfalls nach Herrn Saxesen's Zeichnung, ein quer durch 10-14 Jahrringe geschnittenes, noch mit Rinde bekleidetes Stück Fichtenholz, in welchem zwei Larven bis in den Splint fraßen und sich hier, von den Jahrringen mehr (bei c) oder weniger (bei b) verdeckt, verpuppten. Auch eine Rinden-Puppenhöhle (bei d) und ein Flugloch (bei a) sieht man an dieser instructiven Darstellung. 12) Einen ganz ungewöhnlichen Aufenthalt und Fraß der Larve entdeckte Hr. Fintelman in der Gegend von Mögeln im J. 1834 und 1835. Es fanden sich hier kleine, dicht an einander liegende Bestände von 25-30 Jahren, im Ganzen etwa 80-90 Morgen groß, welche auf sehr schlechtem sandigen Boden und in zu dichtem Stande erwachsen waren und ein auffallend krüppeliges Ansehen hatten. Besonders zeichneten sich einzelne ockerhaltige Stellen aus, an denen die Stämme, die ohnehin nächstens eingegangen wären, von den Larven bewohnt und getödtet waren. An einigen derselben machten sich die Larvengänge als geschlängelte, sich hier und da kreuzende, meistentheils aufrecht steigende Erhebungen schon von außen an der Rinde bemerklich, wurden aber nach dem untern Theile der Stämme zu und da, wo die Rinde stärker war, undeutlich und verschwanden ganz. Auch war bei keinem Baume das untere Stammende bis zu einer Höhe von 3-5' eher von den Larven eingenommen als bis diejenigen, welche bisher in der Mitte und mehr oben gehaust hatten, in den Puppenzustand übergegangen waren, und die Stämme selbst anfangen zu schütten. Im September war eine ausgewachsene Larve schon bis zum Wurzelknoten vorgedrungen. An den dünner berindeten Baumtheilen war es höchst auffallend, daß sie kaum  $\frac{1}{2}$ " starke Rinde aufsprang und die Puppe, bloß von ihrem Polster umgeben, bloß lag. Auf einer Fläche von der Größe einer Manneshand zählte man 13 solcher Puppenhöhlen. 13) Finden sich in einem Reviere die angegebenen Gegenstände nicht, welche die Larven beherbergen, kann man diese also ganz entfernen, so wird man von dem Insect auch nichts zu fürchten haben. Es scheint, als meinte man hin und wieder, die Larven könnten doch wohl noch wo anders untergebracht werden. Darüber glaube ich aber einen Jeden vollkommen beruhigen zu können. Nie ist mir, wie gesagt, ein Fall vorgekommen, in welchem das unverkennbare Insect im Laubholze gewesen wäre, und noch viel weniger wird es sich in kräuterartigen Gewächsen oder in bloßer Erde generiren können (s. auch über das Vorkommen Hrn. Saxesen). Gewiß beruht auch folgende Mittheilung von Hrn. Thiersch (*Forstk.* S. 24.) auf einem Irrthum: „Nur da, wo das Weibchen Stöcke zur Fortpflanzung nicht findet, legt es seine Eier „in die Zweige junger Kiefern, in welchem jedoch das Insect, weil solche Aestchen dann, wenn sie an-



„gefressen, dem Austrocknen sehr leicht unterworfen sind, selten zur Vollkommenheit gedeiht. Die Ma-  
den verlassen daher die Zweige in der Regel, und bilden sich in dichter Grasdecke zur Puppe, von wo  
„aus wir die Käfer emporkommen sehen.“ 14) Im aufgearbeiteten (in Klaftern oder Maltern stehenden)  
Fichten- und Kiefern-Stamm- und Astholze sind sie gewiß seltener, obgleich sich ihre Verwandten (z. B.  
*C. notatus*, verschiedene *Cerambyces* u. A.) hier so häufig, sowohl noch auf den Schlägen, als auch auf  
den Holzplätzen ausiedeln. 15) Der seltenste Brutort wäre wohl der in jungen, lebenden Kiefern. Hr.  
Zebe erzog aus solchen im J. 1837 einen Käfer mit *C. notatus* und *Tortrix cosmophorana* zusammen.

IV. Rede ich vom Frasse der Käfer besonders, weil dieser dem Insect eigentlich die rechte  
Wichtigkeit giebt. 16) Die Käfer verderben nicht allein viele Pflanzen dadurch, daß sie sie am Stamme,  
an den Aesten und selbst am Wurzelknoten und den oberflächlichen Wurzelverzweigungen gefährlich  
verletzen oder die Entwicklung ihrer Knospen durch Befressen derselben verhindern, sondern auch da-  
durch indirect, daß die durch sie gemachten Verwundungen der Pflanzen, wenn dieselben noch nicht tödt-  
lich sind, andre noch gefährlichere Feinde (*C. notatus*, mehrere Arten von *Hylesinus* und *Bostrichus*) her-  
beilocken. Sie wählen, um ihrer Brut ein passendes Unterkommen zu verschaffen (s. III.) nur Nadelhöl-  
zer und zwar immer nur solche Stämme oder Theile derselben, an denen uns nicht mehr viel liegt. Wenn  
es aber ihre Sättigung gilt, gehen sie auch Laubhölzer an, wenn gleich die Nadelhölzer immer ihre Lieb-  
lingsspeise bleiben. Ich habe in unserm, mitten in Kiefern liegenden, Forstgarten Gelegenheit gehabt zu  
sehen, daß sie nicht einmal die fremden Hölzer verschonen und daß sie sogar an verschiedenen Ericen,  
welche scharfe Stoffe enthalten, pagen, obwohl es ihnen hier an anderer passenderer Nahrung nicht fehlte.  
Dabei war aber deutlich zu bemerken, daß sie die eben verpflanzten und daher kränkenden allen übrigen  
vorzogen, ja daß sie nach einigen Jahren, als Alles im besten Wuchse war und nur hier und da noch nach-  
gepflanzt wurde, sich nur selten noch an den Pflanzen sehen ließen. Bis dahin waren sie aber höchst un-  
angenehm gewesen und hatten, trotz der sorgfältigsten Aufsicht, viele Stämmchen durch Benagen der End-  
knospen wenn auch nicht getödtet, so doch in einen krüppeligen Zustand versetzt. Eben so geht es auch  
den Culturen. Sie sollen hier die Fichten den Kiefern vorziehen. Am liebsten sind ihnen die jungen  
drei- bis sechsjährigen Pflanzen. Im Erzgebirge waren i. J. 1816 schon im Mai die jungen, hoffnungsvol-  
len Pflanzungen und Anwüchse in Nadelholzschlägen vergelbt und kümmernd, und allein im Holzbacher  
Revier nächst der Sächs. Grenze traf man bis 20,000 kranke Setzlinge in den jungen Schlägen (Walter,  
*Rüsselk. Verheer.* S. 5.). In Ermangelung des jungen Gebölzes greifen sie die schönsten ein- bis zweijäh-  
rigen Triebe älterer Stämme an (Walter *Rüsselk. Verheer.* S. 8.). In den kränkenden 5-20jährigen Kiefern-  
beständen bei Mögeln benagen sie nur die jüngern Triebe, selten die einjährigen und nie die Knos-  
pen (Hr. Fintelmann). Im Herzogthum Altenburg vernichteten sie einst von 4 Ackern (50,000 □ Fufs)  
fast die Hälfte der Culturen (v. Hopfgarten in d. *Allg. F. u. J. Zeit.* IV. 272.). In den Revieren der  
Inspection Rheinsberg blieben auch die 3-6jährigen melirten Kiefern- und Birkenschonungen nicht frei.  
Der Käfer zeigte sich hier vorzüglich an kranken und durch Beschattung verkümmerten Pflanzen,  
verschonte aber auch gesunde und im kräftigsten Wuchse stehende nicht. Die jungen Birken, Elsen und  
Ebereschen, welche er befiel, bildeten zwar noch einmal Ausschläge, diese hatten aber nur einen schwäch-  
lichen Wuchs und gingen häufig wieder ein, zumal wenn sie in den folgenden Jahren wiederholt von Kä-  
fern benagt wurden (Hr. v. Löwenclau). In der Forstinspection Sorau, in welcher auch eine heurige  
Erlen- und Birkenpflanzung durch Benagen der Stämmchen über der Erde sehr leiden mußte, hatten schon  
im Mai auf einer 6-10jährigen Naturschonung viele erkrankte, junge Kiefern rothe Nadeln und die noch  
nicht getödteten trieben nur kümmerlich. Hier zeigten sich nur die vorjährigen Triebe angestochen. Die  
eben sich entwickelnden Maitriebe blieben verschont, senkten sich aber bald und vertrockneten gleich den  
Quirlzweigen (Hr. Meyer). In der Friedersdorfer Forst wurden in einigen Jagen, welche keine junge

Kiefern hatten, die Randhölzer befallen (Hr. Eyber). Zwischen dem natürlichen Anfluge und den Pflanzlingen macht er nicht Unterschied (wie im Birnbaumer Reviere bemerkt wurde, wo er Lärchen so gut wie Kiefern angriff); die 2- bis 4jährigen sind ihm die liebsten (Pfeil's *crit. Bl.* B. X. II. 1. S. 96.). Im Harze bemerkte ich ihn mehrmals ganz vorzüglich in den Fichtenpflanzbüscheln, in denen er Schutz und Versteck zu finden scheint. Oft verrathen die rothen Nadeln mitten in sonst noch grünenden Büscheln den Feind. Ich habe nur diese die Mannigfaltigkeit und Ausdehnung des Fraßes bezeichnenden Nachrichten hier mitgetheilt, obgleich ich noch zahlreiche andre, aus den verschiedensten Gegenden Preussens, in den letzten Jahren eingegangene, geben könnte. 17) Diese Verwüstungen richten sie mit dem Rüssel an, welchen sie, auf ihre kräftigen Beine gestützt, rechtwinklig gegen die Fraßstelle ansetzen. Indem sie die Oberkiefer wie horizontale Scheerenblätter bewegen, dringt derselbe immer tiefer durch Rinde und Bast bis auf den Splint und die Wunde muß wegen der zerrissenen und gequetschten Ränder das Gewächs nur noch empfindlicher verletzen. Die hervordringenden Harztröpfchen erhärten und geben den benagten Stellen ein ekelhaftes, grindartiges Ansehen. An dem 12" langen vorjährigen Höhentriebe einer achtjährigen Kiefer wurden einmal über 50 solcher Wunden gezählt. Die größten haben wohl den Umfang einer Bohne und unterscheiden sich dadurch von denen andrer Käfer. Befällt er die jungen, noch weichen, Maitriebe, so werden sie so stark verletzt, daß sie oft der Wind umbricht. Knospen, die nur ein wenig vom Rüssel berührt wurden, entwickeln sich nicht. Die Nadelbeschädigungen, welche man ihm auch wohl aufbürdet, rühren von *C. incanus* her.

V. Die Menge, in welcher dieses Insect sich findet, ist keinesweges so bedeutend, wenigstens nicht in Vergleich zu Borkenkäfern, Maikäfern u. A. Ihre Gefährlichkeit ist nur so groß und dadurch schaden sie so sehr. Käfer, welche ich mitten im Winter mit der Post erhielt, hatten die ihnen mitgegebenen Kiefernzweige ganz und gar benagt.

VI. Ueber ihre Fortbewegung ist auch noch ein Wort besonders zu sagen. Es ist schon (II. S.) bemerkt worden, daß der Käfer weit und leicht fliegt. Desto auffallender ist es, daß er oft von seiner Flugkraft gar keinen Gebrauch macht, noch dazu, wo es ihm sehr darauf ankommen müßte. Das ist in den Fanggräben. Ich habe es sehr häufig bemerkt und jeder Sammler weiß es, der seine Exemplare daher hat. Hr. Schindler hat dies aber mit der Praxis in Beziehung gebracht und versichert auch wiederholt: die Käfer müssen unbedingt in den Gräben umkommen, wenn man sie auch nicht hier sammelte oder verschüttete. Seine Vorstellung dabei ist die: die Käfer werden durch das erfolglose Bestreben die Grube oder das Fangloch zu verlassen (welches sie durch unendlich wiederholten Ansatz zum Hinaufklettern zu erkennen geben), entkräftet und können dann die Flügel gar nicht mehr gebrauchen.

FORSTLICHE BEDEUTUNG. Der große Rüsselkäfer gehört in doppelter Hinsicht zu den sehr schädlichen. Denn einmal hat er wegen seiner verschiedenen Namen (s. dort) und weil er so oft mit andern verwechselt wurde, viel Unheil angerichtet, und dann bringt er auch unzähligen Pflanzen Verderben, wie die schon bei der Lebensweise mitgetheilten, aus der Erfahrung entnommenen Fälle beweisen. Je jünger die angegriffenen Pflanzen, besonders Nadelhölzer, und je zahlreicher die Wunden sind, welche er dem Baste beibringt, je mehr der Wurzelknoten verletzt ist, besonders während trockner Jahre und auf schlechtem Boden, desto mehr wird auch die Saftbewegung gestört und das Gewächs dem Tode zugeführt. Nach geringer Verletzung verharrschen die Wunden und die Pflanzen erholen sich (s. auch Pfeil's *crit. Bl.* B. X. H. 1. S. 97.), wenn nicht, wie dies häufig geschieht, andre Rüssel- und Borkenkäfer (s. sub 16.) von der noch lange kränkenden Pflanze herbeigeloct werden und diese doch noch tödten. Der Fraß der Larve ist dagegen fast ganz unschädlich (s. III.); man nimmt aber die des *C. notatus* gewöhnlich dafür.



**BEZUGUNG.** Dies Insect gehört zu den wenigen, denen man durch Vorbaunng so gut wie durch Vertilgungs-Maßregeln zweckmäßig begegnen kann.

**I. Vorbaunng.** Es ist (sub III.) gezeigt worden, dafs die Wiege des Insects hauptsächlich in Kiefern- und Fichtenstöcken (Stücken der Härzer), zuweilen auch in einzelnen, sehr kranken Stämmen schlechtwüchsiger Bestände sei und dafs es sich wo anders nicht entwickeln könne (s. sub 13.). Daraus liefse sich schon schließen, dafs die Entfernung solcher auch der verderblichen Menge der Käfer vorbeugen würde, wenn es nicht auch durch Erfahrung schon dargethan wäre. Hr. Zebe konnte durch Ablesen die Käfer nicht vertilgen, aber das Roden aller alten faulen Stöcke half radikal. In der Oberförsterei Massin (Reg. Bez. Frankfurt) waren ihre Verwüstungen am empfindlichsten in den Naturschonungen, in welchen die Stöcke frisch eingeschlagener Stämme stehen geblieben waren, während auf reinen Blößen, die in Cultur gebracht worden, keine Spur des Käfers sich zeigte. In der Friedersdorfer Forst (Hr. Eyber) fanden sich i. J. 1834 ebenfalls in den Naturschonungen, aus denen die Stöcke wegen Mangel an Absatz nicht fortgeschafft werden konnten, die Käfer (welche man auch vorher häufig in den Stöcken gesehen hatte) sehr häufig und vernichteten den im guten Wuchs stehenden Anflug von 1-1½ Fufs Höhe fast ganz. Nachdem die Stöcke aus einem Jagen gerodet und verkauft worden waren, hatte sich der Käfer fast ganz verloren und die kleinen Stellen, welche i. J. 1834 verschont geblieben waren, erhielten sich, trotz der anhaltenden Hitze und Dürre, in freudigstem Wuchse. Hr. Thiersch (*Forstk. S. 24.*) sucht die Ursache, warum die Rüsselkäfer in Böhmen (s. deshalb auch Liebich *Allgem. F. u. J. J.* Jahrg. 4. S. 143.) und andern Nadelholzforsten weit mehr Schaden als im Erzgebirge thun, lediglich in der langsamen Benutzung des Stockholzes, so wie in der Cultur lange liegender Räumden, auf deren magerem Boden die Pflänzlinge lange kümmerlich wachsen. Interessant ist ein von ihm aus dem Oberforste angeführter Fall, in welchem der Stock einer im vorigen Jahre verschlagenen Fichte 84 Exemplare Larven und Puppen gab! Man sieht daraus, dafs der Käfer sich schwer ganz verliert, und dafs er, wenn es ihm an Brutorten fehlt, genöthigt ist, sich auf die noch übrig gebliebenen zu concentriren. Es ist also nicht zu bezweifeln, dafs die sorgfältige Stockrodung den gewünschten Erfolg haben wird und man sollte selbst in Gegenden, wo man sich der Stöcke mit Nachtheil entledigen müßte, diese gleich dem Hiebe folgen lassen, um so mehr, als man auf diese Weise gleich mehrere andre sehr schädliche Insecten zerstört, wie bei *Hyl. piniperda* und *ater* u. A. gezeigt werden wird, und es keine bessere Bodenauflockerung für die neue Cultur geben kann, als das Roden. Es könnte hiermit gleich eine Fangmethode verbunden werden, denn gewöhnlich sind die Stöcke schon mit Brut besetzt. Ist die Gegenwart derselben durch eine Probeuntersuchung (s. III. 11.) ermittelt, so unterlasse man ja nicht das Entrinden und das Bloßlegen der Brut, wenn die Stöcke nicht etwa bald verbrannt werden. Aus dem Gesagten geht aber hervor, dafs bei der Rodung sehr sorgfältig zu Werke gegangen werden muß und dafs zuletzt schon eine Prämie auf die übersehenen Stöcke gesetzt werden könnte. Sollten sich auch dann noch Käfer zeigen, so untersuche man genau, ob diese nicht von weniger ordentlichen Nachbarn herstammen. Drei Fälle, in denen dies Mittel unwirksam war (oder schien), beweisen noch nichts gegen einen wirksamen! Es versteht sich, dafs, im Falle verdächtiges stehendes Holz im Reviere sein sollte (s. sub 12.), auch dies eiligst entfernt werden muß.

**II. Vertilgung.** Kann man der Entstehung der Käfer auf den eigenen Revieren nicht Herr werden, oder fliegen sie von den Nachbarn über, so vertilge man sie durch Sammeln. Bei diesen Käfern ist aber das Abklopfen von Blumen und Sträuchern am wenigsten anwendbar, da sie sich sehr bald zerstreuen, oft sehr versteckt und tief unten an den Pflanzen sitzen und überdiß auch noch sehr aufmerksam sind und sich schnell durch Herunterfallen ins Gras und Moos retten. Wir haben gegen sie Mittel, welche wieder bei vielen andern unanwendbar sind und sich sämmtlich leichter als das Klopfen ausführen lassen. Dahin gehören: 1) Fanggräben und Fanglöcher. Im Birnbaumer Revier prüfte diese Hr. Schindler

im Vergleiche mit der zweiten Methode und fand sie wirksamer. Man eröffnete sie vom  $\frac{11}{16}$  bis  $\frac{1}{10}$ . Es wurden viele Tausend Käfer gefangen und zwar im Juni und Juli die meisten. Die Gräben waren 10' breit und 12" tief mit senkrechten Wänden, alle 10-12 Fuß mit einem Fangloche von 6-8" Tiefe. Die in den Löchern versammelten Käfer wurden Anfangs beim Graben neuer Fanglöcher zwischen den alten verschüttet, blieben später aber frei, weil sie doch nicht fort konnten. Die Gräben wurden in der befalle- nen Schonung auf der Grenze herum an einem Wege gezogen und dann quer durch, da wo der Anflug am dichtesten stand, da sich der Käfer, besonders um Mittag, gern nach den schattigsten Stellen hin zieht.

2) Die Fangbündel. Man bindet diese aus Kiefern- oder Fichtenreisig und legt sie im befalle- nen Revier aus. Die Käfer ziehen sich hinein und können täglich leicht ausgeschüttelt werden. Hr. Schind- ler, welcher sie aus frisch gebrochenen, stark benadelten Kiefernzweigen 1-1½' lang und 6-8" stark bin- den, sie (besonders im dichtern Aufzug) zerstreut auslegen und dann täglich auf Tüchern ausklopfen liefs, vertilgte auch durch diese eine große Menge Käfer, klagt aber darüber, daß, wenn sie trocken würden, die Käfer nicht mehr hineingingen, und daß man gar zu oft neue binden lassen müßte. Hr. Walter (*Rüs- selk. Verheer.* S. 10.) sah große Wirkung von solchen Bündeln (sie wurden aus Fichtenreisern locker gebunden 1½ Elle lang und ¾ Fuß dick und auf einen etwas aufgeschürften Platz gelegt, zwischen die Saaten oder die Linien der Pflänzlinge) denn 100 solcher ergaben täglich 2500 Käfer. Sie wurden des Morgens ausgeschüttelt.

3) Mit frischen Reisern bedeckte Fanggruben (also sehr zweckmäßig aus Meth. 1 u. 2 combinirt). Der Forstmeister Reichelt in Böhmen fing auf diese Art in 2 Monat 60,000 Käfer. Er liefs die Gruben auf den Culturen 1' lang und ½' breit fertigen und mit Nadelholz-Zweigen zudecken, worauf einige Knaben täglich 30-40 Käfer aus jeder nahmen (Hr. Thiersch).

4) Fang-Kloben, Bäume und Rinden. Auch diese hat man in verschiedenen Gegenden sehr bewährt gefunden. Im Pa- penbrucher Revier (Reg.-Bez. Potsdam) liefs Hr. Zimmermann in vier Tagen der natürlichen vermischten Kiefern- und Birkenschonungen Fangkloben einzeln umher auslegen und zwar 240 lnd. Fuß von frisch gefällt und 90 lnd. Fuß von im Winter gehauenen Holze, so weit die Rinde stark aufgerissen war. Da der Boden sehr beraset war, so wurden kleine Rinnen aufgehauen und in diese jedesmal eine Klobe frischen und eine alten Holzes dicht neben einander, mit der Rindenseite nach unten, gelegt. Es wurden über 4000 Käfer vom  $\frac{1}{16}$  bis  $\frac{1}{4}$  gefangen, die meisten vom  $\frac{11}{16}$  bis  $\frac{3}{4}$  und vom  $\frac{11}{16}$  an auch *C. notatus*. Dabei wurde die Bemerkung gemacht: unter die alten Kloben seien keine gegangen, sondern nur unter die frischen, und dann: es zögen sich die Käfer besonders nach solchen Stellen, welche von der obern Rinde bis auf den Baet entblößt waren, und es erleichtere das Suchen sehr, wenn man an den Kloben immer einige Stellen so entblößte. Dieselbe Bemerkung habe ich an den Fangbäumen gemacht, welche alljährlich für den Borkenkäferfang bei uns ausgelegt werden. Aber nie sah ich später Brut in denselben. Die Käfer verweilten hier einige Zeit, theils einzeln theils in Begattung und entfernten sich dann, wahrscheinlich in die benachbarten Stöcke, wo dann das Legen erst begonnen haben wird. In Fichtengegenden legt man auch 1 Fuß lange und 8 Zoll breite Streifen von Fichtenrinde (mit der Bastseite nach unten) aus und sam- melt die darunter kriechenden Käfer (Liebig *Allg. F. u. J. J.* Jahrg. 2. S. 160.).

5) Wird auch wohl ge- rathen: durch Abharken des abgestorbenen Grases, des Moores und der Streudecke die hier überwinterten Käfer fortzuschaffen. Gegen diese Maßregel ist aber einzuwenden: einmal, daß da- durch Nachtheil für den Boden entsteht, und dann auch, daß der beabsichtigte Zweck nie vollständig und sicher dadurch erreicht wird, indem die Käfer zum Theil auch in der Erde sitzen (s. sub 6.), zum Theil aber im Winter noch als Larven und Puppen vorhanden sind (s. sub 1. 5.). Von den vier ersten Vertil- gungsmitteln würde das vierte dann vorzuziehen sein, wenn zugleich *C. notatus* vorhanden ist, der auch gern an Fangbäume und Kloben geht.

6) Die Kosten, welche das Sammeln verursacht, sind nur unbedeu- tend. In der Oberförsterei Massin wurden i. J. 1835 mit Scheiten von ältern und frisch gefällten Kiefern

über 50,000 Käfer gefangen und dafür nur 10% Thlr. verausgabt! 7) Als besondere Feinde dieses schädlichen Insects habe ich noch die, dadurch immer wichtiger werdenden Laufkäfer kürzlich kennen gelernt. Hr. Schindler sandte mir mehrere Exemplare des *Carabus granulatus* (s. S. 30.) und dabei eine Menge von Rüsselkäfern, welche durch ihn getödtet waren. Er hatte die Flügeldecken abgebissen und von oben in die Brust und den Hinterleib hinein gefressen. Auf diese Weise hatte er von jedem Käfer nur sehr wenig gebrauchen können und deren daher so viele bedauert. Ob dadurch wohl eine gänzliche Vertilgung des Käfers herbeigeführt werden könnte? (S. Pfeil's *ent. Bl.* X. I. S. 95.).

9. *C. glaucus* Fabr. (*Cleonis glauca*.) Großer grauer Kiefern-Rüsselkäfer.

CHARACTERISTIK. 5,5" lang und 2,5" breit, also den größten Exemplaren des *C. Pini* ähnlich, nur etwas gestreckter. Der Rüssel etwas kürzer und dicker, mit einer scharfen, fast bis zum Ende verlaufenden Mittelleiste. Fühler sehr kurz, Flügel fast zugespitzt, punktiert-gestreift und wegen der in tiefe und lange Gruben zusammenlaufenden Punkte hier und da runzlig. Die schwarze Grundfarbe größtentheils verdeckt durch einen dichten Überzug grau-weißer und einzelner untermischer, gelbbrauner Haare, hier und da durchblickend und besonders auf den Flügeln ein Paar unterbrochene, schiefe Querbinden zeigend.

VERWANDT ist der meist eben so große aber gestrecktere und weniger zugespitzte *C. albicus* Fbr., welcher auch noch kürzeren Rüssel und nur bis zur Mitte desselben verlaufende und daselbst gablig getheilte Mittelleiste und breitere, nicht unterbrochene schwarze Flügelbinden hat. Dann der *C. sulcirostris* Linn., welcher wieder längeren Rüssel und zwei, eine Mittelfurche lassende, ganz bis zum Ende verlaufende Rüsselleisten hat.

VORKOMMEN u. s. f. Dieser findet sich nebst den verwandten in großer Menge in Kiefernforsten, gewöhnlich mit *C. Pini* zusammen. Ihre frühern Zustände und sonstigen Eigentümlichkeiten waren bis zum J. 1837 nicht bekannt. Hr. Klockmann wollte sie an Kiefern fressen gesehen haben. Den ausführlicheren Bericht kann ich erst jetzt mittheilen. In dem Buchholzer Forste, zur Schweriner Inspection gehörig, befindet sich auf ziemlich schlechtem Boden eine, 212 Preufs. Morgen große Kiefernbesamung zur Hälfte aus 5-, zur andern Hälfte aus 9-jährigen Pflanzen bestehend, welche im Jahre J. 1835 bedeutend von *C. notatus* und *violaceus* gelitten hatte. In der Mitte Aprils v. J. wurde hier auch der *C. glaucus* bemerkt und zwar in solcher Menge, daß bis zur Mitte des Juli gegen 3000 Exemplare in Fanggruben gefangen wurden. Gleichzeitig bemerkte man, daß an vielen Kiefern, die anscheinend gesund waren, die Nadeln gelb wurden und auch die Entwicklung des Maitriebes zögerte. Es wurden mehrere Exemplare in große, mit Erde gefüllte und mit 4-jährigen gesunden, eben treibenden Kiefern beplante Gläser gebracht. Viele gruben sich in der Nähe der Sträucher sogleich in die Erde, die übrigen begaben sich auf den Stamm der Kiefern und einige bloßliegende, kleine Wurzeln. Sie benagten diese sowohl wie die kleinern Zweige, jedoch ohne deutlich bemerkbare Wunden zu verursachen. Am Abend des dritten Tages waren die Maitriebe sämmtlich in spiralförmigen Gängen durchgefressen, jedoch auch dies war schon am folgenden Tage kaum mehr zu erkennen, so daß, wenn eine solche Pflanze im Freien beobachtet würde, das Absterben derselben einem bloßen Vertrocknen zugeschrieben werden müßte. Einige Käfer gingen auch die Nadeln an, die sie besonders in der Mitte benagten. So wie sie neue Nahrung durch frische Zweige erhielten, durchfrassen sie an diesen immer zuerst die Maitriebe. Hr. Klockmann schloß daraus, daß dieser Käfer, der bisher wenig beobachtet worden ist, einen wesentlichen Antheil an der Beschädigung jener Schonung habe. Ich muß hierbei dasselbe wie bei *C. geminatus* erinnern, daß der Käfer nämlich durch Hunger getrieben sein könnte, diese Nahrung zu nehmen. Ich wenigstens habe nie im Freien den Käfer auf Kiefern gese-

hen, so häufig er auch bei uns ist, weiß auch nichts von seiner Entwicklung, über die nur Hr. Saxosen schreibt, daß sie in Distelstengeln vor sich gehe.

10. *C. micans* Fbr. (*Polydrosus micans*.) Glänzender Laubholz-Rüsselkäfer. (Taf. IV. Fig. 7.)

CHARACTERISTIK. Bis 3,7" lang und 2" breit, also der größte und breiteste unter den grünen. Rüssel kürzer als Kopf. Halsschild klein. Flügel viel breiter als Halsschild, fast fünfmal länger als derselbe, hinten stark abschüssig, punktiert gestreift. Schenkel dick, die hintern gedorn. Grundfarbe, bis auf die braunrothen Fühler mit grauer Keule und die Füße, schwarz, aber überall durch grüne, schön kupferroth schillernde Härchen verdeckt. Leben etc. s. hinter No. 13.

11. *C. (Polydrosus) viridicollis* Fabr. Grünhalsiger Laubholz-Rüsselkäfer. (Taf. IV. Fig. 9.)

CHARACTERISTIK. 1,5" lang und kaum 1" breit, also einer des kleinsten. Fühlerfurche stark nach hinten und unten gekrümmt. Fühler den Halsschild wenig überragend. Geißelsfaden dick und Keule stark, eiförmig. Flügel etwas über dreimal länger als Halsschild. Grundfarbe bräunlich-schwarz an dem Kopfe, Schildchen, dem Halsschilde (besonders dessen Seiten), den ungedornen Schenkeln und der Brust mit schönen, smaragdgrünen, metallglänzenden Schuppenhärchen. Leben etc. s. hinter No. 13.

12. *C. atomarius* Ol. [*Polydrosus* s. *Metallites atomarius* (*aeratus* Kn.?)]. Blaugrauer Rüsselkäfer.

CHARACTERISTIK. 2" lang, 1" breit, also größer als *C. viridicollis*, sonst demselben ähnlich, jedoch Rüssel etwas länger, Halsschild schmaler und etwas länger, Schildchen kleiner und Flügel länger (fast viermal länger als Halsschild). Alle Schenkel gedorn. Grundfarbe heller oder dunkler braun (Beine, bis auf die Schenkel-Enden, und die Fühler, bis auf die Keule, stets hellbraun), überall verdeckt durch dichte und ziemlich lange grünliche, mehr oder weniger kupferrothlich glänzende Härchen.

VERWANDT sind wenigstens noch 10 Arten. Da dieselben aber nur umständlich zu characterisiren sind und in der forstlichen Bedeutung sehr übereinstimmen, so werden sie übergangen. Häufig sind noch wohl: *C. (Polydrosus* oder *Metallites) mollis* Grw., (*viridinens*) 3" lang und wenig über 1" breit, mit ziemlich stark gedornen Schenkeln und röthlich-brauner (besonders an Beinen und Fühlern stets sehr hell erscheinender) Grundfarbe, welche auf Flügeln, Halsschild, Kopf, Schildchen und Brust mit sehr dichtstehenden grünen oder blauen Härchen bedeckt sind. Ferner: *C. (Polydrosus) cervinus* Linn., 2,6" lang und ausgezeichnet durch schwach gedornen Schenkel, sehr lange, dünnkeulige Fühler und braunfleckige, röthlich- oder grünlich-behaarte Flügel. Leben etc. s. hinter No. 13.

13. *C. (Phyllobius) argentatus* Linn. Silberglänzender Laubholzrüsselkäfer. (Taf. IV. Fig. 10.)

CHARACTERISTIK. 2 bis 2,6" lang und 1" breit. Rüssel kürzer als Kopf (F. 10 A). Fühler ziemlich dick und lang. Flügeldecken zugespitzt, an der Spitze aber nicht vertieft, 3½mal länger als Halsschild. Schenkel stark gedorn. Grundfarbe, mit Ausnahme der hellern Beine (die Schenkel zuweilen schwarz) und Fühler, schwarz, mit grünen herrlich metallglänzenden, selten etwas röthelnden Schuppen sehr dicht bedeckt.

Unter den zahlreichen VERWANDTEN sind besonders häufig *C. (Phyllobius) Pyri* Fabr. (auch in Loudon's Gard. Magaz. Octbr. 1837. p. 465 als sehr schädlich angeführt), noch größer als *C. micans*, dann *C. (Phyllobius) maculicornis* Grm. ganz wie *argentatus*, aber mit vertieften Flügelspitzen, dunkler Keule und Schaftspitze; dann *C. (Ph.) oblongus* Linn., dem *atomarius* ähnlich, aber nicht metallisch, mit sehr langen Fühlern, dünnem Rüssel, sehr schmalem Kopf und Halsschild und gelbbraunen (Beine, Fühler und zuweilen auch Flügel) und schwarzen Farben und langen, dünnen, grauen Haaren; dann *C. (Ph.) ve-*

*speritus* Fbr., den kleinern Individuen von *micans* ähnlich (2, 3-3,5" lang), aber ausgezeichnet durch kurze, dicke Föhler, metallische, grünliche, oder röthliche, nicht stark glänzende Schuppenbekleidung, sehr helles (fast weißliches) Schildchen und ziemlich stark bewehrte Schenkel. Hierher gehört auch *C. (Polydrosus) mali* Fabr., dem *C. vespertinus* sehr ähnlich in Farbe und Gestalt, aber gewöhnlich nur 2" und höchstens bis 2½" lang und mit schwach bewehrten Schenkeln und längerem Halschilde, auch nur wenig metallisch-glänzend und mehr röthlich-grau, durch die sichtbaren Punktreihen auf den Flügeln fein dunkel-gestreift. Hegetschweiler (*Denkschr.* S. 73.) beachtete ihn zuerst, indem er ihn nach *Geometra brumata* (s. Bd. II.) für das schädlichste Obstinsect hält und sagt: daß seine Larve am *Prunus* und *Pyrus* den Fruchtknoten umnagt und die Ernte verderbe. Neuerlich hat er sich auch an Eichen schädlich gezeigt (s. nachher).

VORKOMMEN, LEBENSWEISE, FORSTLICHE BEDEUTUNG UND VERTILGUNG der zehnten bis dreizehnten Arten nebst deren Verwandten. Sie gehören zu den gemeinsten Rüsselkäfern und in der einen Gegend wird diese, in der andern jene Art gar nicht selten sehr häufig. Mit Ausnahme von *mollis* und *atomarius*, welche Hr. Saxen an Fichten und Kiefern zu Tausenden fressend und die jungen, braun werdenden, Triebe, welche Harzausfluß und theils ganz fehlende, theils stark benagte Nadeln zeigten, verderbend gefunden hat — *mollis* wurde auch von Hrn. Suffrian an jungen Fichten in den Siegenischen Haubergen an jungen Trieben fressend gefunden — sind sie alle nur an Laubhölzern, und fressen große Löcher in die Blätter, zernagen auch wohl die Knospen, sollen sogar in Obstblüthen gehen. Man findet sie mitten im Sommer. Die Larven und Puppen, welche man nie an den Gewächsen bemerkt, finden sich wahrscheinlich in der Erde. Mehrere Arten gehören zu den merklich schädlichen, besonders für junge Pflanzen. Hr. Borchmeyer sahe den *argentatus* auf einem neu angelegten Buchenschlage im zweiten Jahre die Pflänzchen so zernagen, daß viele auch nicht ein gesundes Blatt mehr hatten. Je leichter die Pflanzen standen, desto größer die Zerstörung. Im dunkeln Stande war zuweilen keine Spur von Käfern. Hr. Fintelmann bemerkte ihn in Birkenbeständen so häufig, daß die mehrsten Stämme an einzelnen Stellen ganz entlaubt waren. Auch hat Hr. Saxen schon den *C. viridicollis* an jungen Eichepflanzungen verheerend gefunden. Die Knospen waren ganz zerfressen. Auch junge Saalweiden, Aspen und Birken, selbst Himbeeren, hatten ebenfalls sehr gelitten, aber durchaus nicht die dicht dabei wachsenden Fichten, auch Birken nicht, wahrscheinlich, weil das schon zu kräftige Laub ihnen zu hart war. Auch größere Eichen von 50-70 Jahren waren dicht daneben ganz frei geblieben. *C. micans* wurde von Hrn. Suffrian und mir nur auf Haseln gefunden und *viridicollis* von Ersterem auch auf Erlen. Den *C. oblongus* beobachteten Hr. Schmidberger (*Obstb.* I. 268.) so wie auch Hr. Schmidt (*Kais. Leop. Car. Ak. T. XVII. P. I. p. 489.*) als Zerstörer von Knospen und Blättern. Hr. Schmidberger (*Kollar schädll. Ins. S. 259.*) sagt von dieser Art noch: „im Juni begeben sich die Weibchen in die Erde um ihre Eier abzusetzen. Die aus dem Ei kommenden Würmchen nahren sich von den Wurzeln der verschiedenen Wiesenpflanzen.“ Sollte Herr Schmidberger die Larven wirklich gefunden haben? Es ist weder meinen aufmerksamen Freunden noch mir selbst gelungen, je eine Larve eines *Polydrosus* oder *Phyllobius* zu finden, so sicher wir auch von ihrem Vorkommen in der Erde überzeugt waren, und so eifrig wir auch dieselbe danach oft durchsuchten. — *C. mali* hat Hr. Utsch auf diesjährigen Eichen-Pflanzungen verwüstend bemerkt. Die Lieblingsnahrung der Käfer schienen die Knospen unmittelbar vor ihrem Ausbruche zu sein, jedoch verschmähten sie auch nicht das hervortretende zarte Laub dieser Holzarten, selbst das der nahe stehenden Buchen und ihrer Knospen nicht, wenn die der Eichen aufgezehrt sind. An den mir überandten Trieben waren nur noch die Schuppen der Knospen vorhanden und die Blätter waren gänzlich herausgefressen. In seiner Gesellschaft fand Herr Utsch, jedoch in weit geringerer Zahl, den *C. Coryli*, *micans* und *argentatus*. Der Forstmann hat die in seiner Gegend häufig vorkommenden Arten daher nicht außer Acht zu lassen

und muß sie durch Sammeln vertilgen. Die Käfer lassen sich von den Pflänzchen und niedrigen Zweigen sehr leicht in Fangschirme oder auf untergelegte Tücher klopfen. Sonst ist ihnen nicht beizukommen, namentlich nicht den Larven und Puppen.

14. *C. (Otiorynchus) ater* Hb. Schwarzer Rüsselkäfer. *C. rufipes* Thiersch. (Taf. IV. Fig. 8.)

CHARACTERISTIK. Der Käfer 4" lang und 2" (Männchen?) bis 2,6" (Weibchen?) breit, dabei sehr stark gewölbt. Glänzend schwarz, mit rothbraunen (nur an den Schenkelspitzen und Fugagliedern schwarzen) Beinen und deutlich reihig-punktirten Flügeldecken; die Punkte sehr unbestimmt begrenzt und in die Canäle zwischen den Runzeln der Zwischenräume verlaufend und daher die Flügel grob gerunzelt erscheinend (zum Unterschiede von dem äußerst nahe verwandten *C. tenebricosus*, bei welchem das Braune der Beine nicht so hell und klar ist und die Punktreihen der wenig oder gar nicht runzeligen Flügel fast ganz verwischt erscheinen). Die schwarzbeinigen Individuen heißen *C. unicolor* Hb. — Larve (F. 8 a) kurz und gedrungen. Kopf sehr groß, mit deutlicher Gabellinie. Lefze etwas vertieft. Die Leibesringe fast wie bei *C. Pini*, nur sind die Keilwülste kleiner, die Vorder- und Hinterwulst aber größer und überdies noch durch eine kleine, untere Wulst auseinandergedrängt. Behaarung sehr ausgezeichnet. Sehr lange Haare stehen auf kleinen, quergereichten Dornenhöckern. Auf der Unterseite fehlt den Haaren die dornenähnliche Basis. — Puppe (Fig. 8 c) 5" lang, 2,4" breit. Kopf nicht über den Halsschild her austretend. Fühlerschaft weit über die Augen hinaufsteigend. Geißel fast senkrecht herabhangend. Erstes und zweites Fußpaar fast wagrecht, das dritte ziemlich stark ansteigend und mit den Fußglederspitzen die Flügel etwas überragend. Unterflügel die Oberflügel kaum überragend. Halsschild, Kopf und Kniegelenke mit äußerst starken, dunkelbraunen Borsten, zum Theil auf Dornenhöckern. Die Dornen auf der Oberseite der zwei ersten Hinterleibsringe unbedeutend, dann aber häufiger, bis ein Kranz außerordentlich starker den After umgibt. Unterseite mit wenigen zerstreuten, kurzen Härchen.

VORKOMMEN, LEBENSWEISE, FORSTLICHE BEDEUTUNG UND VERTILGUNG. Bisher mir nur aus Gebirgsforsten (Harz, Solling, Schlesien, Erzgebirge, Schwarzwald) zugekommen, wo der Käfer an Fichten und wahrscheinlich auch an andern Nadelhölzern lebt. Hr. Saxen hat indessen noch neuerlich Nachrichten darüber erhalten, daß er auch in der Ebene (Burgdorf zwischen Hildesheim und Celle; dann auch in der Lüneburger Heide) vorkomme. Nach Thiersch (*Forstk.* S. 23.) soll er im Erzgebirge noch häufiger als *C. Pini* sein und eben so wie dieser schaden. Auch von Walter (*a. a. O.* S. 13.) ist er dort beobachtet und wie *C. Pini* vertilgt worden. In der Lebensweise, in welcher er besonders mit *C. Pini* übereinstimmt, unterscheidet er sich wesentlich dadurch, daß die Larven und Puppen in der Erde leben, wie Hr. v. Berg (*Allg. F. u. J. Z.* J. 3. S. 555.), Hr. Oberförster Meyer zu Zellerfeld und Hr. Saxen entdeckten. Larven und Puppen liegen in kleinen, inwendig glatten Erdböhlungen, stets in der Nähe der Wurzeln. Hr. Saxen fand sie hier z. B. einmal im Anfange des Septembers. Die wenigen, schon ausgebildeten Käfer waren aber noch ganz weich, und es ist daher gewiß, daß sie erst im nächsten Frühjahr hervorkommen. Ich wundere mich also nicht, daß ich bei meinen Herbststreisen im Harze immer so äußerst wenige von diesem sonst so gemeinen Käfer fand. Sowohl die Larve wie der Käfer wird schädlich. Obgleich noch Niemand die Larve an den Wurzeln fressen sahe (was auch sehr schwer zu beobachten sein möchte), so ist doch nicht zu zweifeln, daß sie sich so nähren, denn die genannten Herren versichern es einstimmig. Einmal fanden sich Larven und Puppen an eingegangenen Pflanzen (1 bis 2 p. Stamm) auf einem verlassenem Saatkampe. Ein andres Mal fiel das Absterben zahlreicher Stämmchen in einer jungen Fichtenanpflanzung auf. Man sahe nach und fand die Larven, aus denen der Käfer gezogen wurde. Alsdann hat man den Käfer auch schon zahlreich in 12-20jährigen Beständen gefunden, wo er doch auch

ausgekommen sein mußte, da er nicht fliegen kann und keine jungen Fichten in der ganzen Gegend sind. Nach Hrn. Saxen und Hrn. Pape verwüstet aber der Käfer noch ärger, indem er theils an der Rinde frisst, theils an den jungen Trieben, wenn diese sich eben verlängern. Sobald die Ausschlagesschuppen abgeschoben sind, frisst er sich in die dichte Masse der jungen Nadeln an einer Seite eine Höhlung bis auf die Rinde. Vertilgen kann man ihn nur durch Sammeln der Käfer, vielleicht auch der Larven und Puppen durch Ausgraben derselben im Herbst.

VERWANDT ist der an Knospen der Obstbäume und des Weines oft schädende *C. raucus* Fabr., 3" lang und beinahe 2" breit, fast ganz kuglig mit deutlich geleisteten Halsschilden, durch die dichten grauen und braunen Schuppenhärchen bunt. Noch andre Arten zum Theil nur am Obste, zum Theil nur südlicher z. B. *C. (O.) Zebra*. Es werden immer mehr Arten aus dieser Gattung der Rüsselkäfer bekannt. So ist noch *C. (O.) sulcatus* Fabr. von Westwood (*Gard. Magaz. Apr.* 1837, p. 158. mit hübschen Holzschnittbildern der Larven und Puppen) als an krautartigen Gartengewächsen und dem Weine schädlich beobachtet worden. Den *C. (O.) laevigatus* Fabr. (dem *C. ater* sehr ähnlich, aber kaum 3" lang, ganz schwarz) sahe Hr. Richter (*Anhalt. Gart. Z. No. 1.*) auf ähnliche Art die Pflaumenbäume beschädigen, wie *C. Albinæ* das Kernobst verletzt.

#### 15. *C. (Pissodes) notatus* Hb. Weißpunkt-Rüsselkäfer. (Taf. V. Fig. 1.)

NAMEN. Da der hier abzuhandelnde Rüsselkäfer unbezweifelt der *notatus* von Herbst, Fabricius (der ihn zu *Lixus* rechnet) und allen folgenden Schriftstellern ist, auch den Forstleuten unter diesem Namen ziemlich bekannt wurde, so wollen wir nicht weiter untersuchen: ob ihn nicht etwa schon Linné gekannt habe. Sonst dürfte in No. 615. der *Fauna suec.* eher dieser als ein andrer beschrieben sein, so dafs am Ende dieser das größte Anrecht auf den Namen *C. Abietis* Linn. hätte, obgleich er in Fichten gar nicht vorkommt. — *C. castaneus* De Géer und *brunneus* Pnz. mögen abgeriebene Exemplare (die allerdings wie eigene Arten aussehen) gewesen sein.

CHARACTERISTIK. 2,7 bis 3,1" lang und 1,1" breit. Rüssel des Weibchens mehr als doppelt so lang als der Kopf (T. V. F. 4 A), gekrümmt, der des Männchens etwas kürzer und weniger gekrümmt. Die Fühler in der Mitte trageud. Halsschild ziemlich gewölbt und dick, mehr punktiert als gerunzelt. Flügel reihig-punktiert, die Punkte wegen der zahlreichen Schuppenhaare undeutlich, abgerundet-viereckig, die Zwischenräume fast gleich breit. Grundfarbe meist dunkel, röthlich-braun, mehr oder weniger durch die Schuppenhaare verdeckt, welche grösstentheils grauweifs sind und auf dem Halsschilde acht grössere und kleinere grauweisse Punkte bilden. Auch das Schildchen grauweifs, so wie das innere und äufsere Ende der hinteren Flügelbinde, deren mittlerer (gröfster) Theil rostroth ist. Ein ähnlicher, aber kleinerer rostrother Fleck bildet eine vordere Binde, innerhalb welcher auch oft viele weifsliche (gegen das Schildchen mehr zerstreut verlaufende) Härchen. — Larve (T. V. F. 1 B und 1 K) bis 4" lang und 1 1/4" dick. Kopf (im Vergleich zu *C. Pini*) ziemlich klein, abgerundet-viereckig, vorn jedoch ein wenig schmaler, mit zwei noch den Hauptast der Gabel begleitenden Linien. Fufswülste wenig vortretend. Der erste Ring mit ziemlich undeutlichem, gelblichen Rückenschilden. Eine, bei *C. Pini* gänzlich fehlende, ausserordentlich feine Behaarung der Unterseite, besonders der Fufswülste, zeigt sich unter der einfachen Loupe nur als seidnartiger Schimmer. — Die Puppe (T. V. F. 1 C). Kopf nicht über den Halsschild hinaustretend. Rüssel bis zur Mitte der Mittelschienen. Fühlerschaft kaum bis zu den Augen. Geißel fast rechtwinklig unter den Halsschild gelegt. Füsse aufsteigend, besonders die hintern, daher die Fufsglieder ganz versteckt. Unterflügel die Oberflügel weit überragend. Kopf, Halsschild und Kniegelenke mit Dornenhöckern. An der Unterseite des Hinterleibes starke Dornen.

VORKOMMEN nur auf und in Kiefern und daher auch nur in Gegenden, wo diese sind. Im Harze, wo die Fichte herrscht, ist er daher nur selten. Neuerlich hat er sich aber auch an 6-10jährigen gepflanzten Weymouthskiefern der Freiherrlich v. Adelsbensen'schen Forsten am Solling in außerordentlicher Menge und sehr schädlich gezeigt.

Die LEBENSWEISE stimmt in Vielem mit der des *C. Pini* überein und zeigt besonders folgendes Bemerkenswerthe:

I. Die Generation ist auch meist nur eine einjährige, wird höchstens dann und wann eine anderthalbige, gewis nicht eine doppelte. Seit dem Erscheinen meiner Abhandlung (*Leop. Carol. Acad. Tom. XVII. Pars I. S. 346.*) habe ich, auf neue Beobachtungen und Mittheilungen gestützt, meine Ansichten etwas ändern müssen. Für Regel halte ich es auch jetzt noch, daß die Käfer im Nachsommer oder Herbst ausschlüpfen, überwintern und sich im Frühjahr begatten, so daß man die Brut im Laufe des Sommers sich vollständig bis zum Käfer entwickeln sieht. Oft ist es aber auch anders, und Hr. Zeb e hatte sogar immer erst im Herbst und meist noch im April des folgenden Jahres ausgewachsene Larven, hält auch deshalb die Ueberwinterung des Käfers nicht für Regel, weil er denselben nie im Winter gefunden habe, sondern nur immer im Frühjahr und dann im reinsten Kleide. Meiner Meinung nach erklären sich seine Beobachtungen aus einer anderthalbigen Generation, welche mir auch schon neuerlich vorgekommen ist (s. auch *C. Hercyniae*). Im Jahre 1836 war die Flugzeit ziemlich allgemein Ende Juni (s. *C. Pini* Begegn. II. 4.) auch bei uns, wo ich schon im April einzelne Puppen fand. Der Sommer war sehr unfreundlich, der vorige, welcher die Entwicklung der Larven bewirkt hatte, aber desto wärmer gewesen. Wenn wir auch bei diesem, wie bei *C. Pini*, verschiedene Flüge in Einem Sommer finden, so erklären sich diese aus dem langsamen Legen des Käfers. Hr. Zimmer, welcher die Käfer nur täglich oder nach längeren Zwischenräumen ein Ei legen gesehen haben will, beobachtete einmal, daß eingesperrte Käfer noch in der zweiten Hälfte des August legten, und ich fand i. J. 1834 den 30sten Mai an einem und demselben Stämmchen frisch gelegte Eier (das Weibchen noch in der Nähe) und Larven, welche schon angefangen hatten, zu fressen. Die neuesten Beobachtungen von Hrn. Burckhardt beweisen die Unregelmäßigkeit der Generation noch mehr. Im Winter und Frühjahr 1838 gab es nur Larven in den nach und nach roth gewordenen Stämmchen und im Frühjahr darauf erschienen die Puppen und Käfer. Im Herbste desselben Jahres zeigten sich Stämmchen mit eben bleich werdenden Nadeln, welche ganz junge (also von einem Nachsommer-Satze herrührende) Larven beherbergten, die erst ganz kurze Strecken in der Salthaut gefressen hatten, und dann gab es zugleich noch Stämmchen mit abgestorbenen Nadeln, welche theils ausgebildete (also von einem Frühjahrssatze herrührende) Käfer, theils aber noch Puppen und ausgewachsene Larven enthielten. Also wieder ein Beweis, daß man nie den gewöhnlichen Angaben Einer Flugzeit folgen darf, sondern daß man bei gewissen Gattungen auch auf Ungewöhnliches gefaßt sein und stets selbst von Zeit zu Zeit nachsehen muß.

II. Hinsichtlich des Aufenthaltes des Käfers hat Hr. Zimmer die hübsche Entdeckung gemacht, daß der Käfer am stehenden Holze überwintert. Er sahe ihn stets nur an jungen, sehr wuchsfähigen Stämmen von 3-6" Durchmesser in der Erde oder dicht über der Wurzel zwischen den Ritzen der Borke, gewöhnlich von Waldstreu, Moos und Gras geschützt (ganz ähnlich wie *Hyl. piniperda* s. dort). Unter dem Moose wie *C. Pini* fand ich ihn nie. Im Frühjahr erscheinen die Käfer gewöhnlich schon im April, und man sieht sie dann auf Holzplätzen und im Walde auf Kiefern, an Stöcken, nie aber an Laubbäumen.

III. Der Aufenthalt und Fraß der Larven bietet die wichtigsten Eigenthümlichkeiten und begründet die hohe forstliche Bedeutung des Insectes. Die Larven leben nämlich nicht allein in Stöcken (hier sogar selten), in geschlagenem Kiefernholze (Klaftern) und unter der Rinde kränklicher Kiefernstan-



gen (15-30jähriger nach Hrn. Fintelmann), sondern auch, und ganz vorzüglich gern, in lebenden, kränkenden und gesunden Kiefernplanzen, besonders in 4-8jährigen. Gewöhnlich fressen sie hier unterhalb des ersten Quirls, zuweilen aber auch weiter oben. Die Gänge gehen in der Regel von oben nach unten und sind sowohl unter der Rinde als auf dem Holze zu sehen. Sie sind leicht geschlängelt und werden allmählig breiter und immer mehr mit braun und weiß gemengten wurstähnlichen Abnageln verstopft. Am Ende derselben gräbt sich jede Larve eine elliptische, 5" lange, 2" breite und 2" tiefe Höhle in das Holz, welche bei dünnen Stämmchen oft bis ins Mark reicht. Von den weissen, Charpie ähnlichen, Holznageln bereitet sie sich ein weiches Lager und ein dickes, gegen die Rinde gekehrtes Polster. Beim Ausschlüpfen mußt dies sowohl wie die Rinde vom Käfer mühsam durchnagt werden, und man bemerkt daher das Flugloch, meist wie mit No. 6 oder 7 geschossen, in beiden. Auf unsrer Taf. VI. Fig. 1. ist ein fünfjähriges Kiefernstämmchen, welches von 25 Exemplaren besetzt und getödtet war, bis zum ersten Quirl abgebildet und zeigt an der obern Hälfte vier Fluglöcher in der Rinde und an der untern, von Rinde entblösten, Hälfte die Endigungen der Larvengänge und die Puppenhöhlen. Der oberste, entblöste Gang ist noch zum Theil mit Wurmehl verstopft. Die Puppenhöhlen sind, bis auf die schon zwischen den Wurzelstien liegende, entblöste, mit dem Polster bedeckt. Eins hat noch kein Flugloch und birgt noch die Puppe. Zu den Eigenthümlichkeiten des Aufenthaltes gehört noch das Vorkommen in Kiefern-Zapfen, jedoch nur auf schlechtem Boden erwachsener Kusseln. Hr. Hartig sahe in der Hasenheide bei Berlin, daß die Hälfte, oft drei Viertel aller Zapfen eines Baumes befallen war. Meist ist nur eine Larve in jedem, doch sahe ich auch bis drei, die sich freilich kümmerlich behelfen mußten, wie Fig. 2. an einem in zwei Hälften zerschnittenen zeigt. Solche Zapfen erlangen wohl die normale Gröfse, erscheinen aber immer mehr zugespitzt, von mehr grüner, nachher ins Gelbgraue übergehender Farbe und zeigen, wegen mangelhafter Ausbildung der Nüsse, die Schuppen nicht so deutlich vortretend. Bemerkenswerth ist, daß Hr. Zimmer auch in den Stöcken junger, im Frühjahr gefällter, Kiefern die Larven fand.

IV. Der Fraß der Käfer zeigt wenig Abwechselung hinsichtlich der Gewächse, indem sie nur solche angehen, in denen die Brut lebt. Das Benagen ist dagegen eigenthümlich. Die zuerst im Frühjahr bemerkten gehen nur ihrer Nahrung nach, später verbinden sie damit das Geschäft des Eierlegens. Sie ziehen aus jedem Bohrloche nur wenig Nahrung und gebrauchen daher so viele. Eine mir mitten im Winter bei ziemlicher Kälte übersandte Zahl Käfer hatte unterwegs die mitgegebenen Kiefernzweige jämmerlich zerstoßen. Sie liefen sich auch bei Eröffnung der Schachtel nicht stören und mehrere hätten den Rüssel bis an die Augen schießend durch die Rinde in den Bast bis auf den Splint gesenkt. Nachdem sie kurze Zeit in der Stube gestanden hatten, begatteten sie sich sogar. Ihre Bohrlöcher gleichen feinen Nadelstichen und können nicht mit den Verwundungen irgend eines andern Insectes verwechselt werden.

Die FORSTLICHE BEDEUTUNG dieser Art ist größer noch als die des *C. Pini*, denn er sticht nicht allein die Kiefernplanzen an, sondern belegt sie auch mit Eiern. Das, was von seinem Vorgänger verursachten Wunden noch ausgeheilt hätte, muß nun sterben. Anfangs geht er nur kränklische Planzen an, später, wenn diese zur Aufnahme der Brut nicht mehr ausreichen, auch gesunde. Bei uns that er in mehreren Jahren (besonders in dem warmen Jahre 1834) auf mit 4-5jährigen Kiefern gut bestandenen Culturen empfindlichen Schaden, gewöhnlich mit *Hylesinus ater*, *Bostrichus bidens* und *Laricis* zusammen. Bei Bortin verwüstete er einen 5-8jährigen jungen Kiefernschlag ganz. In einer 15-20jährigen gut bestandenen Schonung beschränkte er sich sogar auf die gesündesten Randblüme und diejenigen, welche innerhalb der Fläche frei erwachsen waren (Hr. Fintelmann).

Die BEGRENZUNG fällt hinsichtlich der Vorbeugung mit den gegen *C. Pini* empfohlenen Anstalten zusammen. Das zeitige Stockroden, Entfernung von Klaftern und kränklichen Stangen aus den Revie-

ren, die Erziehung kräftiger, nicht im Drucke oder im Schatten erwachsener Pflanzen, so wie die sorgfältige Verpflanzung derselben, besonders wenn sich passende, nicht zu trockne Witterung dazu findet, verhindern die Nahrung seines Vorfressers und seine eigne. Auch die Vertilgung (s. dort Begegnung II. 4.) ist zum Theil dieselbe, zum Theil muß sie aber auch besonders betrieben werden: durch Entfernung der von den Larven und Puppen befallenen Stämmchen. Die Zeit dazu ist, wie gesagt, nach dem jedesmaligen Stande der Brut zu bestimmen, gewöhnlich Juni und Juli, denn man findet alsdann meist die überwinterte Brut ausgebildet oder die heurige halbwüchsig. Große Mühe und Kosten verursacht dies nicht einmal, denn ein kräftiger Arbeiter zieht 4-6jährige Pflanzen mit leichter Mühe aus. So wie die Larven einige Zeit unter der Rinde gefressen haben und das Stämmchen kränkelt, lassen die Wurzeln leicht los. Gewöhnlich röthen sich die Nadeln schon nach kurzer Zeit und verrathen den Feind von weitem. Es versteht sich, daß die ausgerissenen Pflanzen verbrannt werden müssen, denn sonst würde sich das Insect, selbst wenn die Larve noch nicht angewachsen wäre, doch entwickeln und ausfliegen. Einen Versuch, welchen Hr. Radzay mit einer Art von Fangbäumchen anstellte, muß ich doch noch anführen, da er leicht zu einem anwendbaren Verfahren gegen die übergroße Vermehrung dieses schädlichen Insects führen könnte. Während der Culturen des Frühjahres 1838 hatte er sehr viele Käfer bemerkt, die ihre Brut in Reisig und kränkelnde Stämmchen abzulegen schienen. Er haute 7 Stück 1-3' starker, 3' hoher Stämmchen ab und entastete sie nur oberflächlich ohne die Rinde zu verletzen. Drei Stücke setzte er  $\frac{1}{2}$  -  $\frac{1}{4}$  tief in trocknen, sandigen Boden und 4 Stücke an den gleich daranstoßenden Bruch, wo er besonders zahlreiche Käfer bemerkt hatte. Nach 8 Tagen hatten hier schon eine Menge Käfer gelegt und später fanden sich in dem einen Stämmchen 15, in einem andern 24 Puppen u. s. f. Die am Bruche in feuchtem Boden stehenden waren weit mehr als die im Trocknen stehenden mit Brut besetzt. Man sieht daraus, daß die ersteren sich länger frisch erhalten und die Käfer mehr angelockt hatten.

Sehr nahe verwandt, aber nur 2" lang und auf den Flügeln nur weißgefleckt ist *C. (Pissodes) piniphilus* Hb. Er ist jedoch, meinen Erfahrungen zufolge, sehr selten und wurde von Hrn. Hartig bei Berlin an kränkelnden, 20-30jährigen Kiefern gefunden.

16. *C. (Pissodes) Abietis* Linn. Kleiner brauner Kiefern-Rüsselkäfer. (Taf. V. Fig. 2.)

NAMEN. Ueber die Verwechslung der Namen *Pini* und *Abietis* ist schon bei No. 8. genug gesagt. Nur um diese beiden dreht sich der Streit. An *C. notatus* (s. No. 15.) hat aber Niemand gemacht. Desto besser! Gegenwärtiger kommt doch in Fichtengegenden vor, *notatus* aber ist nie in Fichten, wäre also ein schlechter *Abietis*. Ob der Tannen-Rüsselkäfer von Hrn. Feistmantel (*Forstw.* I. 361.) hierher gehören mag?

CHARACTERISTIK. Bis 4" lang und 1,9" breit. Dem vorigen sehr ähnlich, aber etwas größer, gedrungener, breiter. Rüssel (T. V. F. 24.) etwas länger und weniger gekrümmt. Der sehr dicke Halsschild grob gerunzelt. Punkte der Flügelreihen größer und deutlicher viereckig. Mehr rein röthlich-braun wegen fehlender grauweißer Schuppenhärcchen. Letztere fast nur roströth. Auch die Flügelbinden kleiner, besonders die hintern nach außen schmaler, auch auf dem Halsschilde, zwischen den vier Mittelpunkten eine 3 Zeichnung durchziehend.

VORKOMMEN. Immer nur sparsam, jedoch nicht bloß an Kiefern, sondern auch an Weymuthskiefern (Hr. v. Bernuth in Pfeil's *crit. Bl.* B.X.) und an Fichten (Hr. Melsheimer in der *Allg. F. u. J. Z.* VI. 24.). Hr. Warnkönig sahe ihn vom Mai bis August einmal ziemlich häufig an frisch gefälltem Kiefernholz, aber nicht an Fichten und Tannen. Auch Hr. Kellner fand ihn häufig auf den Kiefern der Vorberge, aber nie an Fichten, und es ist auch wohl sehr zu bezweifeln, daß er wirklich je an diesen gefunden worden wäre.

**LEBENSWEISE UND FORSTLICHE BEDEUTUNG.** Da er noch nie in größerer Menge vorgekommen ist, was doch bei einem so großen und von so vielen Sammlern verfolgten Käfer hätte bemerkt werden müssen, so ist er ganz gleichgültig, und er hat hier nur eine Stelle erhalten (und auch wohl verdient) wegen der viel besprochenen Verwechslung mit *C. Pini* und der Ähnlichkeit mit *C. notatus*. Er scheint übrigens ganz so wie *C. notatus* zu leben. Die Gänge unter der Rinde eines von Hrn. Fintelman her stammenden Stockes einer 30jährigen Kiefer, aus welchem *C. notatus* und einige Exemplare von *C. Abietis* ausgekommen waren, konnte ich durchaus nicht unterscheiden. Hr. v. Bernuth beobachtete ihn in geschlagenem Holze der Weymuthskiefer und zwar in den äußeren Splintlagen, etwa 3" tief, also etwa wie *C. Hecyniae* Taf. VI. Fig. 4 und 7.

17. *C. (Pissodes) Piccae* Ill. Weifstannen-Rüsselkäfer. (Taf. V. Fig. 3.)

Der NAME sehr passend, wegen der sehr bestimmten Nahrungspflanze. Ein noch wenig bekannter und beachteter Käfer, wahrscheinlich weil man ihn in wenigen Schriften, auch nicht von Bechstein, beschrieben findet:

**CHARACTERISTIK.** Bis 4,2" lang und 2" breit, also sehr gedrungen. Auf den ersten Blick von dem vorigen, sehr ähnlichen, verschieden durch abwechselnd sehr breite und sehr schmale Zwischenräume der Flügeldecken. Die durch den schmalen Zwischenraum getrennten Reihen der Punkte (welche sogar größer und regelmäßiger viereckig als bei *Abietis* sind) öfters ganz zusammenfließend. Auch der Rüssel (T. V. F. 3a) etwas dicker. Grundfarbe schmutzig dunkel-röthlich-braun. Halschildpunkte und Schildchen bräunlich-weiß. Flügelbinden schmutzig-hellbraun. Die hintern, besonders in der Mitte, sehr breit, die vordern undeutlich und abgebrochen. — Larve (T. V. F. 3b) bis 6" lang und fast 2" dick, der von *C. notatus* am ähnlichsten, nur schlanker. In den Parallelen der Kopf-Gabellinie (T. V. F. 3c) fehlen die Punkte. Rückenschildchen etwas deutlicher. Haare sparsamer und kleiner, aber die Sammhärchen deutlicher, selbst auf der ganzen Oberseite. — Puppe (T. V. F. 3c) 5½" lang und 2½" breit, sonst der von *C. notatus* sehr ähnlich. Dornhöcker stärker. Rüssel (des Weibchens?) länger. Halschild mehr abgesetzt.

**VORKOMMEN.** Nur in Weifstannen, jedoch, wie es scheint, überall da, wo diese sind (z. B. Thüringen, Schlesien, Schwarzwald, Bayern).

Über **LEBENSWEISE, FORSTLICHE BEDEUTUNG UND BEGEGNUNG** werden wir erst dann gehörig belehrt werden, wenn die Art überall bekannt sein wird, namentlich wäre es wichtig zu erfahren: ob das Insect die Weifstannen-Culturen (welche bekanntlich so vielen Widerwärtigkeiten unterworfen sind) wie unser *C. notatus* die Kiefern belästigt. Daß er in manchen Jahren sehr gemein ist, davon überzeugte ich mich im Jahre 1835 im Thüringer Walde, wo wir Hr. Kellner Ausgangs September alte, gefällte und geworfene Weifstannen zeigte, welche fast über und über mit Larvengängen besetzt waren. Auf Taf. VI. Fig. 6. sieht man ein daher stammendes Rindenstück mit den Gängen und Fig. 9. ein kleines, mit dem Flugloche von ausen von Hrn. Saxen, welcher die Excursion mitnachte, gezeichnet. Ein Larvengang ist ganz und gar verfolgt, auch wie er einige Male sich ganz im Baste versteckt. Zwei Polster (s. *C. notatus* Leb. III.) sind noch undurchbrochen, die übrigen Puppenhöhlen waren verlassen. Ein Flugloch ist am Rande und eins in der Mitte deutlich zu sehen. An andern Stellen des Baumes war die Puppenhöhle im Splinte und das Polster gegen die Rinde gekehrt. Sollten die Larven am vorliegenden Rindenstücke eine Ausnahme gemacht haben, weil dieses sehr dick war und von dem schwachen Käfer nur schwer hätte ganz durchbrochen werden können? Die Larven hatten sich hier übrigens verspätet, da die ganze übrige zahllose Brut schon ausgeflogen war. Auch dies erklärt vielleicht mit. Fig. 7 und 8. zeigt die Profil-Ansicht zweier durch Rinde und Splint geführten Längsschnitte, wodurch in jedem das Puppenlager entblößt

wurde: in Fig. 7. war es im Splint und das der Rinde zugekehrte Polster mußte durchbrochen werden vom ausschließenden Käfer, in Fig. 8. hingegen war es in der Rinde und das Polster, dem Splinte zugekehrt, blieb unversehrt.

18. *C. (Pissodes) Hercyniae* Hbs. Härzer Rüsselkäfer. (Taf. V. Fig. 4.)

CHARACTERISTIK. 2,5" lang und 1" breit. Mit abwechselnd schmalen und breiten Zwischenräumen und großen Punktreihen. Sonst von allen verschieden durch gestrecktere Form, ziemlich stark gekrümmten, dünnen Rüssel (F. 4 a) und dunklere, fast ganz schwarze Grundfarbe mit hellgelblich-braunen, fast weißlichen (sehr feinen) Punkten und (sehr schmalen und unvollständigen) Binden; hinter der letzten noch mehrere sehr deutliche Fleckchen. Die Larve (Taf. V. Fig. 4 b) bis 4" lang und 1" breit, wieder der von *C. notatus* ähnlich, aber schlanker und mit stärkern Fußwülsten. Am Kopfe (Fig. 4 b) fehlen die Parallelen der Gabellinie, aber die hellen Punkte nicht. Behaarung äußerst kurz und fein, kaum an den Fußwülsten bemerkbar, auch die Sammhärchen schwächer. Puppe (F. 4 c) 3" lang und 1½" breit, den vorigen sehr ähnlich, nur mit weniger vorragenden Unterflügeln und schwächeren Dornenhöckern.

VORKOMMEN nicht bloß im Harze (wo er allerdings am häufigsten ist) sondern auch in vielen andern Fichtengegenden, namentlich Thüringen, Schwarzwald, Schweden, Liefland (Ménétr.), aber nur an der Fichte und der einzige *Pissodes* an dieser.

LEBENSWEISE u. s. f. nicht wesentlich verschieden, so viel man bis jetzt weiß, von der der vorigen drei Arten. Hr. Saxen hat halbwüchsige und ausgewachsene Larven, auch schon verpuppte, zum Winter gefunden (s. Hrn. Zebes Angabe über *C. not.* I.) und hält diesen für den gewöhnlichsten Winterzustand. Er hat sogar in dem schönen und langen Sommer 1835 ganz deutlich eine anderthalbige Generation beobachtet, denn im August flog der Käfer in Menge und im Herbst gab es schon wieder halb-wüchsige Larven. Das spricht auch sehr dafür, daß bei *notatus* ebenfalls häufiger eine Larven- als eine Käferüberwinterung Statt finden würde. Hr. Saxen hat die Larvengänge und Puppenhöhlen in ihren verschiedensten Bildungen Taf. VI. gegeben. Fig. 3. zeigt ein Stück Fichtenrinde von der innern Seite mit den Larvengängen und Puppenhöhlen, die eine mit einem Schmarotzer-Cocon besetzt, und Fig. 4. die Profil-Ansicht eines durch Rinde und Splint geführten Längsschnittes, wodurch die, ganz im Splinte liegende von dem der Rinde zugekehrten Polster bedeckte, Puppe entblößt wurde, und Fig. 5. das Flugloch auf der Außenseite der Rinde. Er glaubt, daß einzelne abgestorbene, mit diesem Käfer besetzte Fichten, durch ihn getötet seien. Im Thüringer Walde sahen wir Gänge, welche bald nach der Krone, bald nach der Wurzel stiegen und ein und derselbe ging auf- und abwärts. Daß das Insect merklich schädlich werden kann, wenn es sich stark vermehrt, ist nicht zu bezweifeln. Hr. Saxen sahe im Oktober 1836 am Eisersberge unter einer Menge gefällter wurmtrockner Bäume, die sämtlich einzelne Exemplare des Insects zeigten, auch einige, welche allein durch dasselbe getötet waren. Die völlig frische Rinde zeigte stellenweise 8-10 Larven auf ½ □ Fufs! und die Bäume waren von oben bis unten voll, nur hier und da war *Callidium luridum* dabei (s. Bockkäfer).

19. *C. (Balaninus) nucum* Linn. Haselnufs-Rüsselkäfer. (Taf. V. Fig. 10 a der Kopf.)

NAMEN. Es ist keinesweges leicht, über den *C. nucum* Linn. ins Reine zu kommen und die Meinungen der Entomologen werden in dieser Hinsicht vielleicht immer abweichen. Daß der hier zu beschreibende, der im Berl. Museum seit längerer Zeit als der echte steckte, wirklich der Linné'sche sei, wird auch aus einer Bemerkung Schönherr's wahrscheinlich: „certe *nucum* Linn. verus, quemadmodum *nultus alius ex affinis in Suecia occurrit.*“ Gyllenhal verläßt uns leider diesesmal, denn einmal ist seine Beschreibung, trotz ihrer Länge, nicht bezeichnend genug und dann vermengt er die Autoritäten so sehr

und citirt ausdrücklich noch im 4ten Bande den Germar'schen *nucum* (der doch *glandium* ist), dafs wir eher glauben müssen, er habe einen andern Käfer (*C. glandium*) vor sich gehabt. Dies ist um so unannehmer, als auch von andern, namentlich Germar (der unsern *nucum* für *gulosus* Fabr. hält, s. Anm. zu den verwandten), dieser *C. glandium* für den *nucum* Linn. gehalten wird. Dafs Linné übrigens sehr starke, breitschultrige Individuen vor sich gehabt haben mufs, scheint mir noch aus den von ihm angestellten Vergleichen hervorzugehen (s. S. 129. Namen des *C. Pini*).

CHARACTERISTIK. 2,5" bis 3,2" lang und bis volle 2" Schulterbreite. Rüssel bis zur Furche haart, ziemlich stark gekrümmt, besonders an der letzten Hälfte auch plötzlich, am Männchen (ohne die Krümmung gemessen)  $\frac{1}{2}$ , am Weibchen  $\frac{1}{3}$  der Körperlänge. Fühler mit auffallend kurzen und dicken, überall abstechend kurzborstigen Gliedern, beim Weibchen der Basis, beim Männchen auf der Mitte, oder der Spitze des Rüssels etwas näher eingefügt. Schildchen gros. Flügel fast dreieckig (beide zusammen), oben bis über die Hälfte fast der ganzen Breite nach eben. Die (nur an Füfsen, Fühlern und Rüssel hellere, bräunliche) dunkle, fast schwarze Grundfarbe ist überall gedeckt durch dicke Härchen, welche dunkelbräunlich-grau sind und auf den Flügeldecken mit hellen grauen oder braunen, theils in schiefs Querbinden geordneten, theils einzeln, zahlreichen Flecken erscheinen. Schildchen ganz hell, meist mehr braun.

VERWANDT sind zwei einheimische Arten und zwar sehr nahe, aber beide sogleich zu unterscheiden dadurch, dafs die Fühlerglieder nur am Ende (hier allerdings zuweilen auffallend lange) Borsten, sonst aber nur dünne, anliegende Härchen haben und länger und dünner sind, auch an der Rüsselbasis nicht so dichtstehende Schuppenhaare zeigen: 1) *C. Balaninus glandium* Marsh. (T. V. F. 5.) (*turbatus* Schh.), (2,5 bis 3" lang und bis fast 2" breit), dem *nucum* in der Form am ähnlichsten, aber noch stärker und breiter niedergedrückt und hinten etwas mehr gerundet (bei einigen Individuen aber auch mit ziemlich großen Seitenrindern), jedoch auffallend verschieden durch den äufserst langen, sehr dünnen und stark gekrümmten Rüssel (F. 5A), welcher schon beim Männchen  $\frac{1}{2}$  der Körperlänge und beim Weibchen mehr als die Körperlänge hat und beim erstern die Fühler ziemlich auf der Mitte, beim letztern gewöhnlich am ersten Viertel trägt. 2) *C. venosus* G. r. m. (\*) (T. V. F. 6.) (2,1-3,1" lang u. bis 2" Schulterbreite) unterschieden durch ein sehr kleines Schildchen und den kürzesten Rüssel (welcher beim Männchen nur  $\frac{1}{3}$ , beim Weibchen auch nur  $\frac{1}{2}$  der Körperlänge hat und beim erstern die Fühler der Spitze näher und beim letztern der Basis näher oder grade auf der Mitte trägt), so wie auch durch die noch gradlinigeren, dreieckigen Flügel, welche nur wenig hinter dem Schildchen niedergedrückt erscheinen, sonst hoch gewölbt (von der Seite etwas zusammengedrückt), fast einen scharfen Kamm an der Nath bildend. Farben bei allen beiden bald mehr in

---

(\*) Bei dem Namen des *C. nucum* (s. oben) geschah schon des *gulosus* Fabr. Erwähnung und bei dem *venosus* komme ich noch einmal auf ihn zurück, um ausdrücklich mich zu rechtfertigen darüber, dafs ich ihn für keine der beschriebenen Arten gebrauchte. Er scheint mir nämlich so zweideutig zu sein, dafs er auch künftig einem steten Wechsel unterworfen bleiben würde, während doch die oben gebrauchten, besonders *venosus*, feststehen. Fabricius scheint nämlich selbst mit sich nicht recht einig wegen dieser Art gewesen zu sein, indem er, wie auch Schönherr bemerkt, einen andern als den in seiner Sammlung steckenden beschreibt. Noch vorsichtiger bin ich dadurch geworden, dafs Hr. Erichson den Germar'schen *venosus* in Fabricius's Sammlung als *gulosus* gesehen hat und Hr. Germar unsern *nucum* nach Fabricius's Exemplaren als dessen *gulosus* bestimmt hat. Da ich Exmpl. durch die Güte beider Hll. erhielt, so kann hier wenigstens keine Täuschung mehr obwalten. — Dafs endlich der *turbatus* Schh. der Marshall'sche *C. glandium* ist, geht aus mehreren bestimmten Bezeichnungen in Marshall's Beschr. (Ent. Brit. t. p. 284.) hervor, so wie auch aus dem Umstande, dafs die Individuen, welche wir dafür halten, theils auch aus Eichenen gezogen wurden, theils nur in Eichenegenden sich fanden (s. Leb.). Als *glandium* Stephan steckt bei Hrn. Germar ein *venosus* (Expl. von Hope in England).

Grau, bald (wie bei *venosus* und *glandium* am häufigsten) mehr in Braun variirend. — Die Larven (wahrscheinlich von *glandium*) (T. V. F. 5a) sind bis 6" lang und fast 2" dick. Kopf ziemlich groß, röthlich-braun mit den gewöhnlichen Gabelnlinie und den beiden hellen Flecken. Die drei ersten Ringe wenig vortretend. Rückenschildchen kaum bemerkbar. Auf den folgenden Ringen schiebt die Querturche einen Zweig an den Hinterrand der Keilwulst, so dafs zwischen dieser und der Vorderwulst noch eine kleinere eingeschoben ist. Behaarung ausgezeichnet. Auf dem Kopfe, ersten Ringe, den Keil- und Hinterrüsten und an den Fußwülsten, Luftloch- und Unterwülsten dunkle Borstenhaare und ausserdem noch sehr kleine, feine Härchen. — Puppe (F. 5c) bis 3,3" lang und fast 2" breit. Kopf weit über den Halschildrand hinaussteigend, tief versenkt. Der ausserordentlich stark gekrümmte Rüssel bis an das Ende der weit vorragenden Unterflügel, welche sein Ende gewöhnlich verdecken, reichend. Fühlerschaft bis zu den Augen reichend und die Geißel spitzwinklig absendend. Die beiden ersten Fußpaare sehr wenig, das hintere ausserordentlich stark aufsteigend, daher auch einen grofsen Theil über dem Kniegelenke unbedeckt zeigend, die Fußglieder aber ganz versteckend. Hinterleib, Halschild, Kniegelenke, Scheitel und Stirn, selbst der Rüssel mit langhaarigen Dornhöckern. Afterdornen entfernt, gekrümmt, lang.

VORKOMMEN UND LEBENSWEISE. Wahrscheinlich kommt bald die eine bald die andre der genannten Arten in Eichen sowohl wie in Haselnüssen vor, wenigstens sind nun schon *C. nucum* und *C. venosus* in Haselnüssen und *C. glandium* in Eichen bestimmt gefunden, und höchst wahrscheinlich ist es, dafs auch *C. nucum* und *venosus* in Eichen leben, da sie in Gegenden, wo gar keine Haseln sich fanden, von Eichen geklopft wurden. Die meisten Exemplare sah ich von *glandium* (13 Weibchen und 9 Männchen), weniger von *C. nucum* (4 Weibchen und 9 Männchen) und *venosus* (7 Weibchen und 6 Männchen). Auch mit ihrer Generation sind wir noch nicht im Klaren. So viel ist gewifs, dafs das Eierlegen im Juni oder Juli geschehen mufs, denn früher wären die Nüsse zu klein und später zu hart dazu (\*). Auch sind die von mir selbst so wie von meinen Freunden gefangenen Exemplare sämmtlich aus dieser Zeit. Herr W. Schmidt, der alle 4 Arten um diese Zeit in Pommern fang, sah sie mehrmals schon von fern auf Eichenblättern sitzen und bemerkte, dafs sie schon bei der leisesten Annäherung herunter fielen. Kürzlich theilte mir noch Hr. Zebe mit, dafs er in der Mitte des Juni mehrere Käfer im Garten auf Haseln eifrig umherlaufen und nach Nüssen suchen gesehen habe. Leider wurde er verhindert, ihnen länger zu folgen. Auch von Hrn. Schlotthauber (der übrigens alle 3 Arten auf Haselnüssen, und zwar *glandium* und *venosus* auch auf Lambertsnüssen, fing) erhalte ich noch bestimmtere Nachrichten. Im J. 1825 im Anfang des Juni bemerkte er, wie ein Käfer an der kleinen Nufs eines Lambertsstrauches ein tiefes Loch durch die *cupula* hindurch bohrte. Eine Störung verhinderte die Fortsetzung der Beobachtung. Im September sind die meisten Larven in Nüssen und Eichen vollkommen ausgebildet. Sie fallen später mit denselben zur Erde und nagen sich mittelst eines kreisrunden Loches durch und gehen in die Erde. Wie sie sich hier verhalten, kann ich nach zwei verschiedenen Beobachtungen berichten. Im Jahre 1835 im Herbst wurde in unserm Forstgarten auf sehr lockern Boden im Schatten von Sträuchern eine ziemlich Menge magerer Nüsse und Eichen ausgesetzt und eine ähnliche auch in einem mit Erde gefüllten Kasten. Letztere vertrockneten während des Winters gaux. Im Forstgarten dagegen hatten sich schon zum Winter die Larven her-

(\*) Wahrscheinlich verfährt das Weibchen beim Legen wie andre Rüsselkäfer (z. B. *C. Bacchus*, dessen Verfahren dabei so schön von Schmidberger beobachtet wurde), d. h. es nagt mit dem Rüssel (der dazu auch wohl so lang sein mag) ein Loch durch die noch weiche Nufschale, legt dann das Ei in den Canal und schiebt es mit dem Rüssel tief in das Innere der Nufs. Dabei gestanden hat meines Wissens noch Niemand und wenn Bechstein (S. 321.) es auch so beschreibt, als hätte er es gesehen, so sagt er es doch nicht ausdrücklich. Es wird auch sehr schwer sein, das Legen selbst zu beobachten, weil die Käfer so scheu sind.

ausgebohrt und waren in die Erde gegangen, im Frühjahr sogar bis 1 und  $1\frac{1}{2}$  Fufs tief! Wenn ich sie herausgegraben und mehr oberflächlich hingelegt hatte, so gingen sie doch bald wieder so tief wie vorher. Zu meiner Verwunderung ging aber bis zum Sommer nicht die geringste Veränderung mit ihnen vor. Im August endlich, als ich sie schon aufgegeben hatte, sahe ich noch einmal nach und fand zu meiner Freude mehrere Puppen. Einige wurden zur Zeichnung von Fig. 5 c gebraucht und die andern starben, obgleich sie gar nicht mit den Händen berührt worden waren, so dafs ich leider nicht die Art, zu welcher sie gehörten, bestimmen konnte, doch aber aus der Kleinheit der Puppe und dem langen Rüssel derselben auf *glandium* schliesse. Hr. Hartig, welcher ebenfalls im Jahre 1835 madige Eicheln ausgesetzt hatte und zwar in einem grossen, mit jungen Eichenpflanzen besetzten Topfe, fand im September 1836 einen lebenden Käfer (*glandium*) nebst mehreren Puppen darin. Von diesen werden wahrscheinlich im Jahre 1837 noch mehrere auskommen. Daraus würde also ziemlich bestimmt auf eine zweijährige Generation zu schliesen sein, so aber: dafs die Käfer bald vor, bald nach dem zweiten Winter ausschlüpfen, im Freien und in günstigen Jahren aber häufiger vor Winter, worauf auch Hrn. Bouché's Beobachtung des Ueberwinterns des Käfers hindeutet. Roesel (*Insectenbelust.* Th. III. S. 390.) erzog den Käfer aus vorjährigen Larven auch erst am Ende des August. Hr. Hartig (*Jahresber.* S. 190.) vervollständigt die mir früher mitgetheilten Beobachtungen folgendermassen: Der erste, im J. 1836 ausgekommene Käfer war auch der einzige, denn bei der Untersuchung des Topfes fanden sich aufser ihm nur Larven. Dennoch gab es am Ende des Februar 1837 wieder 6 Stücke fertiger Käfer. Im Sommer 1837 nach der Schwärmzeit hielt er die Untersuchung für geschlossen, fand aber beim Ausschütten der Erde aus dem Topfe zu seinem Erstaunen noch über 20 unveränderte Larven, aber keine Puppen und Käfer. Bei wiederholter Untersuchung am Ende des Novembers 1837 fanden sich wieder 6 Käfer mit ziemlich erhärteten Flügeldecken. Ihre Schwärmzeit wäre also im nächsten Jahre 3 Jahre nach der Schwärmzeit der Eltern gewesen. Eine seltsame Erfahrung theilte mir Hr. v. Meyerinck mit. Im Jahre 1835 fand sich im October beim Öffnen von Nüssen plötzlich ein *C. venosus* auf dem Teller. Die Nufs, aus welcher er muthmafslich hergestammt, war ganz ausgefressen und zeigte nur ein ganz kleines Löchlchen. Sollte er von einem ganz vorzüglich früh gelegten Ei herrühren und vielleicht durch Hülfe der Stubenwärme entwickelt worden sein? Der Käfer scheint auch vor und nach dem Eierlegen der Nahrung zu bedürfen, denn Hr. Erichson beobachtete einst denselben an noch nicht entwickelten Haselknospen nagend, und Hr. Häberlin traf einen *glandium*, wie er ein tiefes Loch in eine reife Frühbirne frafs.

**FORSTLICHE BEDEUTUNG UND BEGEGNUNG.** Das Insect ist oft so häufig, dafs  $\frac{1}{2}$  bis  $\frac{1}{3}$  aller Haseln- und Eicheln-Früchte von den Larven ausgefressen ist und zwar oft so: dafs über die Hälfte der Kotsyledonen zerstört ist und ein Keimen nicht mehr möglich wird, dafs es also merklich schädlich wird. In dem Falle wären die madigen Früchte, sobald sie herunterfallen, zu sammeln und zu zerstören, damit die später sich herausbohrenden Larven nicht zur Verwandlung in die Erde geben, wo man ihnen nicht bekommen kann. Auch ist an Sammeln der Käfer, die so vorsichtig sind, nicht zu denken.

**VERWANDT** ist *C. (Balaninus) villosus* Fabr. (dem vorigen ähnlich, aber nur 2" lang, mit fast körperlängem Rüssel, schwärzlich-grau und weifslich gefleckt), welcher von Hrn. Hartig (*Jahresber.* S. 191.) in apfelförmigen Terminalgallen der Eichen gefunden wurde. Im J. 1837 zog Hr. Suffrian im Januar ebenfalls zahlreiche Exemplare aus den Eichengallen an den kleinen in den Siegen'schen Haubergen wachsenden jungen Eichen. Ob dieser Aufenthalt nicht blofs Nothbehelf ist und ob der Käfer nicht eigentlich auf Eicheln angewiesen ist?

29. *C. (Anthonomus) pomorum* Linn. Apfel-Rüsselkäfer. (Taf. V. Fig. S.)

CHARACTERISTIK. Der Käfer 1,8" lang. Rüssel (F. 8a) gekrümmt, dünn, fast dreimal so lang als Kopf, beim Männchen nicht viel kürzer als beim Weibchen. Fühler bei beiden der Spitze näher. Fühler dünn, Keule dick. Augen sehr stark vortretend. Halsschild klein. Flügeldecken am hintern Drittheil breiter, mit schmalen Punktreihen und breiten Zwischenräumen, welche durch dicht liegende, ziemlich lange Härchen sehr verdeckt sind. Schenkel mit äußerst spitzem und langen, besonders an der Basis breiten Dorn. Grundfarbe dunkelbraun, fast schwarz. Die grauen und röthlich-braunen Härchen decken dieselbe fast überall und bilden am hintern Drittheil eine schiefe, von der dunklen Grundfarbe schmal eingefasste Binde, welche am Rande hellgelblich-weiße Flussschen zeigt. Die Larve (F. 8b) 3" lang und  $\frac{1}{2}$ " breit. Kopf ziemlich groß, schwarz. Fufswülste stark vortretend. Rückenschildchen schmal, schwärzlich. Die übrigen Ringe mit Vorder- und Hinterwülsten und stark vertiefter Querfurche. Der letzte mit stark nach unten vorragendem After kugelförmig endend. Behaarung deutlich, besonders an den Fufswülsten, am Kopfe kaum bemerkbar. Die Puppe (F. 8c) 2,5" lang, 1" breit. Kopf nicht bis zum Halsschildrande hinaustretend. Rüssel bis über das zweite Fufspaar reichend. Füße stark ansteigend, vom letzten Paare die Kniegelenke und Fufsglieder zeigend. Unterflügel die Oberflügel ziemlich weit überragend. Afterdornen sehr genähert, sehr lang. Am Hinterleibe nur Härchen, nicht Dornenhöcker. Am Halsschilde kurze Dornenhöcker, die größten ohne Haare. Am Vorderrande desselben mehrere, im Halbkreise gestellte. Auf dem Scheitel einige ganz kleine Höcker.

VORKOMMEN auf Apfelbäumen, einzelne auch auf Birnbäumen (Schmidberger), vom südlichen Deutschland bis Schweden und Rußland hinauf.

LEBENSWEISE. Die Käfer überwintern nach Gyllenhal unter Apfelbaumrinde und wie Hr. Schmidberger (*Erzieh. der Zwergb.* S. 181.) vermuthet, unter der Erde, unter Steinen und Blättern. Er sah sie immer im April vom Boden den Stamm hinaufwandern. Die Begattung sieht man auf den Zweigen selbst, meist in der Nähe der Tragknospen. Hr. Obristlieutenant v. Glasenap will in seinem schönen Garten zu Freyenwalde beobachtet haben, daß die Käfer am liebsten sich auf kränklichen Bäumen begatteten, namentlich im J. 1835 auf solchen Apfel- und Birnbäumen, die durch den harten Winter am meisten gelitten hatten. Schmidberger sah, wie das Weibchen mit dem Rüssel in die Tragknospe ein Loch bohrte, ein Ei hineinlegte und mit dem Rüssel hinunterschob, wozu etwa drei Viertelstunden gebraucht wurden. Dies wiederholen sie an einer Knospe mehrmals oder sie gehen zu einer andern, ruhen sich dann etwas und wiederholen das Legen. Sobald die Knospen stark aufschwellen, müssen sie das Legen einstellen. Als Grund dafür könnte man Folgendes anführen: Hr. Schmidberger beobachtete, daß die Larven zu Grunde gingen, wenn sie erst nach dem Aufblühen der Knospe ausschlüpfen, weil sie in diesem Falle des schützenden, durch ihr zeitiges Erscheinen bedingten Daches entbehrten. Die Menge der abgelegten Eier, folglich auch der verletzten Knospen, richtet sich also nach dem mehr oder minder raschen, durch Witterung begünstigten oder verhinderten Treiben der Knospen, kann nur 8 Tage, aber auch bis 3 Wochen dauern. Nie gab es bei uns mehr Käfer und weniger Äpfel als in dem sehr kalten Jahre 1836! Nach dem Entfallen der Knospe findet man die Larven in den Blütenknospen. Sie liegen im Grunde derselben und zerstören Staubgefäße und Fruchtknoten. Auch die Blumenblätter benagen sie etwas, wodurch wahrscheinlich die Entfaltung derselben verhindert wird. Diese werden allmählig braun und bilden ein dicht geschlossenes Dach über dem Thiere. Sobald der Käfer entwickelt ist (gewöhnlich 4-5 Wochen von der Eilage an), durchbohrt er sie an der Seite und entschlüpft, wie Fig. 5x auf Taf. V. zeigt — ein Apfelzweig mit einer Blumendolde, welche nur 2 gesunde Blumen zeigte. — Nachher sieht man sie nicht mehr. Nach Hrn. Stephens findet man sie im Sommer noch in den Blumen des Weisdoms



und anderer Pflanzen (Loudon's *Gard. Magaz.* Octbr. 1838. S. 468.). Wahrscheinlich treiben sie sich an den Bäumen herum und nagen an den Blättern unmerklich, bis sie überwintern.

**BEDEUTUNG UND BEGEGNUNG.** Dieser Rüsselkäfer hat für den Gärtner mehr Interesse als für den Forstmann, jedoch darf er letzterem, wenn er Kernobst im Reviere hat, auch nicht ganz unbekannt sein. Erscheint er nicht zu häufig, so ist er den Bäumen eher nützlich als schädlich, indem er sie vor zu großer Last der Früchte sichert; in Menge zerstört er jedoch zuweilen einen großen Theil der Ernte. Alsdann muß man ihn zur Begattungszeit im April durch häufiges Anstoßen der Bäume herunterstürzen und dadurch beim Legen stören, oder man muß die Bäume durch Theerbänder im Anfange des April vor diesem wie vor dem Frostschnetterlinge im Spätherbste sichern. Hr. Schmidberger hat nämlich die hübsche Erfahrung gemacht, daß der Käfer nur zu Füße die Bäume besteigt. Er biegt nur bei sehr warmen Wetter von Baum zu Baum. Die Theerbänder hatten auffallenden Nutzen und die dadurch geschützten Bäume blühten immer viel voller als die ungeschützten. Einige hatten sich doch eingefunden, wahrscheinlich durch ihre Flügel getragen, oder sie hatten schon auf den Bäumen überwintert. Nach Frisch (*Ins. Deutschl.* I. 34.) müssen die Bäume beschnitten oder durch Düngung gekräftigt werden, weil, seinen Erfahrungen zufolge, die schwächsten Bäume am meisten vom Käfer leiden, die gesunden aber, deren Knospen nicht von Kälte litten, wenig oder gar nicht.

**VERWANDT,** aber durch den graden Rüssel (Fig. 7A) sogleich zu unterscheiden ist 1) der etwas kleinere zimtbraune (T. V. F. 7.) abgebildete *C. (Anthonomus) druparum* Linn., welcher in den Steinfrüchten des *Prunus Padus* vorkommt und wahrscheinlich auch in Kirschkernen, die man so häufig madig findet. Ob der berühmte Kirschenverderber dieser? Auch gehört hierher 2) *C. (Anthonomus) pedicularis* Linn. (*Ulm* Gyll.) nur 1,5" lang, dem *A. pomorum* ähnlich, aber mehr rothbraun und die Flügel-Querbinden so wie das Schildchen und die Mittellinie des Halsschildes weiß. Von Mr. Curtis ist er auf blühenden Äpfeln gefunden, und nach Hrn. Westwood's Meinung (Loudon's *Gard. Magaz.* Octbr. 1838. S. 469.) ist dieser es auch, von dem Salisbury spricht, daß er seine Eier in die Blütenknospen der Äpfel lege, obgleich die Schilderung der Lebensweise vermuthen ließ, daß hier eine Verwechselung mit einem Wicker vorgefallen sei. Es wird noch hinzugefügt, daß *A. druparum* und *incurvus* den Vogelkirschen (*birdcherry*) und andern Steinf Früchten nachtheilig sei und daß *A. Ulmi* (?) die Rüstern bewohne, in deren Knospen die Larve leben und Ende Mai's gefunden werden soll (?). Unter dem Namen *Anthonomus (Curculio) Piri* Kllr. führt Hr. Kollar (*schädl. Ins.* S. 257.) noch einen Käfer auf, welcher dem *pomorum* zum Verwechseln ähnlich sein, aber die ganze Blüten-, und selbst Blüten- und Blattknospe zusammen wählen soll. Sollte dies nicht doch nur eine Varietät des *pomorum* sein? Mit dem großen *Pyr* Fbr. (s. S. 141.) ist er nicht zu verwechseln.

## 21. *C. (Brachonyx) indigena* Hbs. Kieferscheiden-Rüsselkäfer. (Tafl. V. Fig. 9.)

**CHARACTERISTIK.** Der Käfer 1,1" lang und 0,6" breit. Rüssel (F. 9A) fast dreimal länger als Kopf, stark gekrümmt, dünn. Augen kuglig vorragend. Halsschild länger als breit. Flügeldecken punktirstreift. Die Punkte ziemlich breit und tief. Die sehr schmalen Zwischenräume so wie die meisten übrigen Körpertheile mit ziemlich steifen, bräunlich-gelben Härchen. Grundfarbe, bis auf Rüssel, Augen, zuweilen auch Fühlerkeule und meist auch Brust und Bauch (welche dunkel, fast schwarz sind) hellbräunlich-gelb. Schenkel ungedornt. Die Larven (F. 9B) 1,5" lang und 0,5" breit. Kopf groß. Fußwülste nicht auffallend. Quersfurche an den Hinterrand der sehr deutlichen Keilwülste. Behaarung ansehnlich. Die Puppe (F. 9C) 1,5" lang und 0,6" breit. Kopf bis an den Halsschildrand hinaustretend. Rüssel bis zum zweiten Fußpaare. Füße aufsteigend, das letzte Paar fast ganz versteckt. Unterflügel die Oberflügel

weit überragend. Afterdornen entfernt, divergirend. Die Dornenhöcker des Hinterleibs und des Halschildes mit sehr langen Haaren.

VORKOMMEN nur in Kiefern, wie es scheint, auch nur im nördlichen Europa, in Menge bemerkt in Pommern (Hr. Schmidt), bei Lüneburg (Hr. Saxesen), in Sachsen (Hr. Zimmer), in Schweden und bei uns. Bechstein kannte ihn nicht.

LEBENSWEISE, FORSTLICHE BEDEUTUNG UND BEGEGNUNG. Der Käfer treibt sich noch den ganzen Herbst auf Kiefern (wo ich ihn oft geklopft habe) herum und überwintert (wahrscheinlich in Baumritzen) dann. Er geht im Mai, so wie die Maitriebe sich verlängern, diese an, um die Rinde zu seiner Nahrung zu benagen (wodurch, wie ich selbst sahe, die Triebe öfters merklich beschädigt werden) und dann die noch ganz kleinen Nadeln anzubohren und jede mit einem Ei zu belegen, gewöhnlich viele an einem und demselben Triebe. Man merkt bald, daß diese im Wuchse zurückbleiben gegen die andern. Die beiden Nadeln öffnen sich nicht wie die gefunden und die Scheide wird daher nicht zurückgedrängt, sondern bleibt ungewöhnlich lang. Im Juli ist die Larve erwachsen und verpuppt sich, und im August schlüpfen die Käfer aus. Fig. a zeigt das noch uneröffnete (zwischen x und z die Puppe) und g das der Scheide beraubte und aus einander gelegte (bei g die Puppe zeigende) Nadelpaar und d das Flugloch in der Scheide eines vom Käfer schon verlassenen Paares. Diejenigen Nadeln, in denen die Larve noch frist, zeigen beide innerhalb der Scheide einen 2-3" langen und  $\frac{1}{2}$  breiten, etwas geschlängelten Gang, in welchem hier und da braune Kothkrümchen hängen. Die Larven bereiten ihn so: daß sie an beiden Enden desselben noch in das Innere der ziemlich aufgeblähten Nadeln hineinkriechen konnten. Daher zeigt sich auch das hier liegende Holzbündel befressen und braun. In denjenigen Scheiden, welche das Insect schon verpuppt enthalten oder an dessen Stelle eine kleine *Diplolepis*, erweitert sich der Gang nach unten in eine bis dicht an den Nadelgrund reichende, ovale 3" lange und bis 1" breite Puppenhöhle. Alsdann ist fast das ganze untere Drittheil beider Nadeln zerstört und verräth sich von außen, selbst wenn die Nadeln noch grün sind, durch eine unnatürliche Auftreibung. Das Flugloch (d) ist unregelmäßig ausgefressen, am obern Drittheil der Scheide. Die so verletzten Nadeln röthen sich schon im August, und selbst diejenigen, welche nicht so weit zerstört wurden, indem die Larve schon jung starb, fallen spätestens im Winter ab. Ich sahe das Insect nur an jungen Kiefern auf Culturen, nach Hrn. Zimmer (Pfeil's crit. Bl. B. VII. H. 1. S. 58.) lebt es auch auf kräftigem, gesunden Holze, welches starke Nadeln hat, so wie auch auf Kiefern-Unterholze. Um sich merklich schädlich zu zeigen, müßte es schon einmal in großer Menge erscheinen. Man würde dann bald im Juli so viel Übung im Erkennen der kranken Triebe erhalten, daß man sie ganz abschneiden oder der angestochenen Nadeln berauben könnte. Im Mai würde man auch durch Abklopfen viele Käfer vertilgen können.



22. *C. Fagi* Gyll. (*Orchestes* s. *Salix Fagi*.) Schwarzer Buchen-Rüsselkäfer. (Taf. IV. Fig. 14.)

NAMEN. Buchenweider, Buchenspringrüssel. Ob *Curculio Fagi* Linn. (Faun. No. 609.) und *Rhynchaenus Fagi* Fabr. hierher gehören, ist gar nicht mit Sicherheit zu sagen. Linné's *C. Fagi* soll sogar bestimmt nach Kirby's Beschreibung ein *Apion* sein. Dagegen ist *R. calcar* Fabr. dieser gewis, und der Name wäre daher vorzuziehen, wenn *Fagi* nicht schon so allgemein gebräuchlich (namentlich auch bei den Forstleuten) und auch sehr bezeichnend wäre.

CHARACTERISTIK. 1,3" lang, 0,6" breit. Rüssel fast doppelt so lang als Kopf (F. 14 A), etwas gekrümmt, die kurzen dicken Fühler auf der Mitte tragend. Augen sehr groß. Halschild klein, vorn stark eingeschnürt. Schildchen deutlich. Flügeldecken reihig-punktirt, die Zwischenräume fast glatt. Der

U

ganze Körper mit bräunlich grauen Haaren und bräunlich-schwarz, ausgenommen Fühler und Fußglieder, welche röthlich-braun sind. Scheukel gedort und besonders von dem äußerst ähnlichen ungedortnen *C. Populi* Fabr. unterscheidend. Die Larve (F. 14 B C) 2" lang und 0,6" br. Gabelnlinie schon vom äussersten Kopfrande an getheilt. Quersfurche und Keilwülste fehlen! Statt deren auf der Mitte des Rückens warzige (fast an *Crambix*-Larven erinnernde) Erhabenheiten, mittelst deren sie sich wahrscheinlich in den engen Gängen fortziehen. Am letzten Ringe noch ein kleines, kegelförmiges, nach oben gerichtetes Glied. Erster Ring mit queren, getheilten, dunklen Schildchen. Behaarung äußerst schwach, nur an den Luftlochwülsten bemerkbar. Puppe (F. 14 C) 1,3" lang u. 0,6" breit. Kopf bis an den Halschildrand. Rüssel bis zum zweiten Fußpaare. Fühlerschaft nicht bis zu den Augen, die Geißel rechtwinklig absendend. Beine aufsteigend, besonders die hintern. Unterflügel weit über die Oberflügel vorragend. Hinterleib die Flügel weit überragend. Afterdornen sehr genähert. Nur am Kopfe einige Dornenhöcker, sonst überall nur feine Haare.

VORKOMMEN. Sehr weit verbreitet, wahrscheinlich so weit die Buche geht. Im Harze von Herrn Saxen auch an der Fichte gefunden (hier doch wohl zufällig).

LEBENSWEISE, FORSTLICHE BEDEUTUNG, U. REGENUNG. Der Käfer überwintert, wie man aus der Menge im Frühjahr plötzlich erscheinender sieht, und zwar an der Erde unter Blättern, im Moose, wo man ihn im Winter einzeln findet, wahrscheinlich auch in Baumritzen, unter Borke u. s. f. So wie die Knospen der Buchen anschwellen, sieht man sie an denselben beschäftigt. Kaum entwickeln sich die ersten Blätter und die Fruchtknoten der weiblichen Blüten, so zernagen sie dieselben. Die Fruchtknoten bekommen große Löcher und verderben, und die Blätter werden am Rande braun und verschrumpfen, als hätten sie vom Froste gelitten. Hr. Wittwer (S. 559.) bemerkte schon beim Ausbruch des Laubes den Sitz der Eier in der Mitte des Blattes. Wahrscheinlich werden sie dahin schon gelegt, wenn die Blätter noch nicht ganz entfaltet sind, denn man sieht die Käfer in die halb geöffneten Knospen ein- und ausgehen. Hr. Fintelmann schreibt mir darüber Folgendes: „Man findet Anfangs Mai die fressenden und besonders in den Morgenstunden sich begattenden Käfer fast nur zwischen den Falten der an ihrer Spitze „zusammengekniffen und daselbst ganz vertrocknet aussehenden Blätterchen, selten auf der freien Fläche „derselben. Wie es scheint, ist dieses Kniffen schon mehrere Tage vor der Begattung von dem Weibchen „besorgt worden. In den ersten Tagen des Mai sahe ich auch schon an solchen Blättern mehrere gelbliche, weisse Eier und an mehreren ins Wasser gestellten Zweigen den 9ten Mai die ersten Larven.“ In drei Wochen sind dieselben erwachsen und in der Mitte des Juni fangen die Käfer schon an auszufliegen. An dem auf Taf. IV. Fig. 14 x abgebildeten Blatte sieht man den Verlauf des Larvenganges im Diachym. Am Ende desselben liegt der kleine kuglige Cocou (die Larve hat Spinnwerkzeuge) dicht unter der Epidermis. In vielen Blättern liegen 2-3 Puppen. Die ausgeschlüpften Käfer springen noch eine Zeit lang auf den Blättern herum und verschwinden gegen den Herbst. Eine zweite Generation habe ich nie bemerkt. Hr. Fintelmann vernmuthet sie, weil er im Mai aus zweien vorjährigen Blättern den noch nicht vollständig gefärbten Käfer hervorholte. Allerdings eine seltsame Erscheinung! Dann und wann sind die Käfer so häufig, dass ihr Frass an den Buchen nicht ganz gleichgültig ist, und sie merklich schädlich genannt werden dürften. In jungen Orten, welche durch hinzugekommenen Frost in dem kalten Frühjahr 1836 ganz roth geworden waren, sah Hr. Fintelmann viele Stämme ganz eingehen. Leider ist die Vertilgung sehr schwer, denn die geringe Grösse der Käfer und das Springen derselben machen das Abklopfen von Bäumen fast unmöglich. Aus demselben Grunde wird man auch nicht viele durch Zusammenhaken des Laubes fortschaffen. Wirksamer und leichter ausführbar ist das Sammeln der mit Brut besetzten Blätter, natürlich nur an jüngern Pflanzen, die auch am meisten leiden. Alte Stämme, wo man sie nicht erreicht, leiden auch nicht so sehr. Kalte Winter und Spätfröste schaden ihnen sehr, besonders brüngen

sie letztere oft auf mehrere Jahre zum Verschwinden. So erschienen sie z. B. nach dem kalten Winter 1837-38 und dem Junifrost von 1838, der weit und breit das schon ganz entwickelte Buchenlaub getödtet hatte, nur sehr sparsam. Wahrscheinlich war die Brut getödtet worden.

Von den VERWANDTEN leben noch mehrere auf Bäumen, wie schon die Namen *C. (Orchester) Salicis*, *Quercus*, *Populi*, *Alni* u. A. zeigen, von allen diesen habe ich aber erst eine Art *C. Quercus* L. (*viminalis* F.) in auffallender Menge und bemerkbare Verletzungen anrichtend gefunden. Sie ist größer als *C. Fagi* (1,6<sup>te</sup> lang) und unterscheidet sich auch noch durch die (besonders bei frisch ausgeschlüpften Individuen sehr) helle, bräunlich-gelbe, nur an der Brust und den Augen schwarze Farbe, starke Behaarung und 8-10 starke, dunkle Dornen am Innenrande der Schenkel. Ihre Larven minirten die Blätter junger, von Kiefern überwachsender Eichen auf ähnliche Art wie *C. Fagi* es an den Buchenblättern thut, aber noch viel bemerkbarer, so daß die Menge der weißscheckigen Blätter den von *Tinea complanella* (s. Bd. II. bei dieser Motte) angegangenen ähnelte. Generation dieselbe wie bei *C. Fagi*. — Den schon vorher genannten, durch gelb-rothe Beine und Fühler sehr ausgezeichneten *C. Populi* fand Hr. Schlotthauber auf den Weiden den Leine-Ufers so häufig, daß in Gesellschaft der *C. Vitellinae* die Blätter gänzlich ihres Parenchyms beraubt wurden.

23. *C. Laphi* Linn. (*Cryptorhynchus Laphi*). Bunter Weiden-Rüsselkäfer. (Taf. IV. Fig. 13.)

Den NAMEN erhielt er von dem großblättrigen Ampher (*Lapathum* der Alten), auf dem er zuweilen sitzt. In Schlesien heißt er Erlenwürger.

CHARACTERISTIK. Fast 4<sup>te</sup> lang und 2<sup>te</sup> breit, also unverkennbar! Rüssel mäÙig, gekrümmt. Schwarz mit weißen Flecken und Binden, und oben mit Längsreihen schwarzer, Haarschuppen tragender Höcker. Schenkel des Männchens mit zwei kurzen Dornen, die hinten des Weibchens fast wehros.

VORKOMMEN u. s. f. Der Käfer lebt auf verschiedenen, selbst krautartigen Pflanzen (auf die er jedoch wohl nicht besonders angewiesen ist), vorzüglich auf Weiden (*Saxen*) und Erlen (*Gyll.*) Beide soll er zuweilen ganzer abfressen. Im Juli 1824 war in der Nähe von Liegnitz ein ganzer Eisenbestand angegriffen und selbst eine Anzahl zum Hiebe bestimmter Stämme war davon nicht verschont geblieben. In den beschädigten Stämmen (wo?) fand man im Juli  $\frac{1}{2}$  bis  $\frac{1}{4}$  lange Larven, welche gewiß einem Rüsselkäfer angehörten (*Allg. F. u. J. Z.* Jahrg. 1825. No. 63). Hr. Suffrian hat den Käfer bei Aschaleben und Dortmund stets auf Weiden gefunden, aber nie gesehen, daß er fraß. Das Thier hatte die Äste der Länge nach so umklammert, daß es wie ein Haken oder Auswuchs des Astes aussah und die Sammler deshalb täuschte. Nach dem, was bis jetzt darüber bekannt ist, kann nur Vertilgung durch Abklopfen angerathen werden.

## A n h a n g.

Als Übergang zu den Holzfressern mag hier noch eine besondere Stelle erhalten die schon S. 115. hinlänglich characterisirte und von Hrn. Hartig vermiste Gattung *Cossonus* Fabr. Da aber höchst wahrscheinlich sämtliche Arten nur zu den unmerklich schädlichen gehören und kaum eine merklich schädlich werden dürfte, so characterisire ich sie nur so kurz wie möglich, und behalte mir Ausführlicheres für die Zeit vor, daß einmal die eine oder andere Art sich wichtiger gezeigt hat. *C. linearis* Fabr. unterscheidet sich schon durch die ansehnliche Länge (bis 3<sup>te</sup> lang) von den übrigen und lebt im Holze der Weiden und Pappeln. — *C. crassirostris* Dej. (*porcatus* Grw.) kaum 2<sup>te</sup> lang, unterscheidet sich durch die glänzend schwarze Farbe, die äußerst groben und isolirten Punkte des Halsschildes, so wie durch den sehr kurzen, dicken, ungefurchten Rüssel, und lebt in Kiefern unter Rinde, so wie im Splinte, oft weit und breit Alles

in Mulm verwandelnd (Hr. Haffelder) sehr gemein. — *C. chloropus* Fabr. nur 1,6<sup>mm</sup> lang, auffallend schmal, mit (besonders gegen das Ende) deutlich gefurchtem, niedergedrückten Rüssel, bald schwarz, bald braun, in Buchen und Eichen. — Die beiden in anbrüchigem Holze verschiedener Laubbölzer, z. B. der Boche, des Ahorns, herumwühlenden *C. lignarius* Mrsh. und *C. truncorum* Grm., beide stets braun und der erstere, etwas kleinere (1,6<sup>mm</sup> lang) durch längeren, dünneren, sogar etwas gekrümmten Rüssel und hinten schräg abschüssigen Form dem zweiten, etwas größern und untersezttern, kurz- und dickrüsseligen, hinten senkrecht abschüssigen unterschieden. Nachträglich bemerke ich noch: daß *C. lignarius*, von welchem Hr. Schlotthauher mir Exemplare übersendet, bei Bühen sich als verderblicher Kiefernbastkäfer gezeigt haben soll.

## Zweite Familie.

### Holzresser. (*Xylophaga*)

NAMEN. Der Name für diese Familie rührt von Latreille her, und ist sehr passend, da sämmtliche hierher gehörige Insecten nur im Innern der, vorzugsweise so genannten, Holzgewächse, wenn auch nicht immer im eigentlichen Holze (*lignum*) — viele leben auch in und unter der Rinde — sich aufhalten und selbst im ausgebildeten Zustande nur selten, und immer nur kurze Zeit ausserhalb derselben zu sehen sind, eine Eigenthümlichkeit, welche bei keiner größern Käfergruppe sich wieder in dem Maasse findet.

CHARACTERISTIK UND EINTHEILUNG. Latreille hat in diese Familie so vieles Verschiedenartige zusammengebracht, daß hier gar kein so kurzer allgemeiner Character, wie bei den Rüssel-, Bock- und Blattkäfern gegeben und nur gesagt werden kann: sie sind weder Rüssel-, Bock- noch Blattkäfer. Diese Verschiedenartigkeit wird aber nur dadurch erzeugt, daß zu dem wahren Kern dieser Familie noch Insecten gebracht werden, welche eigentlich bloß dem künstlichen Character (der Fußgliederzahl) nach, dahin gehören, nach allen übrigen Kennzeichen aber sich bald den Heteromeren, bald den Pentameren anschließen. Von diesen letztern ist glücklicher Weise nur sehr wenig für uns wichtig, und wir fassen sie daher in einer besondern, zuletzt vorzunehmenden Unterfamilie (mit deutlich gesonderten letzten Fühlergliedern und sechsbeinigen Larven) zusammen und geben jetzt zunächst zu dem Stamm der Familie der

#### Ersten Unterfamilie der echten Holzresser.

CHARACTERISTIK. Durch ansehnliche, aus mehreren nicht abgesetzten Gliedern bestehende Fühlerkeulen, beinlose Larven und regelmäßige, schöne Gänge unterscheiden sie sich nicht bloß auf den ersten Blick von den unechten Xylophagen, sondern auch von den Anobiiden und Ptilinen (S. 44.), mit denen sie, wenn man bloß auf die ganze Form und das Leben im Holze und unter der Rinde sieht, die größte Ähnlichkeit haben. Auch die feinern Unterschiede zeigen uns in ihnen ganz andre Käfer: Kopf kugelig oder nach vorn etwas rüsselartig verlängert, auf der Stirnseite mehr oder weniger flach, oder wohl gar etwas vertieft. Die Mundtheile zeigen, mit Ausnahme der Gattung *Platypus*, nur geringe Abweichungen bei den verschiedenen Gattungen. Sie ähneln wegen der mangelhaften Ausbildung mancher Theile am Meisten denen der Rüsselkäfer. Von Fehle nicht eine Spur. Die Oberkiefer (T. XII. F. b) stark und hornig von außen gewölbt, von innen etwas gehöhlt, am Scheidenrande gekerbt oder gezähnt. Unterkiefer (Fig. d) fein behaart, ebenfalls ungewöhnlich fest, mit horniger, brauner, außen gewölbter, S-förmig geschwungener (bei *Platypus* (T. X. F. 13 c) fast linearer) lange und starke, sehr regelmäßige braune

Wimpern zeigender Lade und viergliedrigen (bei *Platypus* nur dreigliedrigen) Tastern, welche kurz und dick (bei *Platypus* die beiden untersten blattartig dünn und groß) sind und die Lade bald etwas überragen, bald kürzer sind. Lippe (T. XII. F. e u. T. VII. F. 1 du. 1 d' u. T. X. F. 14 du. 14 d') sehr klein, außen zwischen der Einfügung der Taster abgestutzt, nach innen in einen lang behaarten Lappen (Zunge?) verlängert, welcher bei *Eccoptogaster* (T. X. F. 4 d) aber ganz fehlt. Die Taster bei *Hylesinus*, *Bostrichus* und *Platypus* stark genähert, bei *Eccoptogaster* aber mehr entfernt, dreigliedrig, kurz. Die Augen sind (mit Ausnahme von *Platypus*) nie rund und stark gewölbt vorragend, sondern immer mehr flach und mehr oder weniger nierenförmig. Die Fühler dicht vor den Augen und nur bei rüsselartigem Kopffortsatze etwas entfernt, sehr kurz (kürzer als der Kopf), meist etwas gekniet, d. h. der Schaft, welcher den aus 4-7 Gliedern bestehenden Geißelfaden an Länge übertrifft, bildet mit demselben oder dieser mit der Keule, welche immer stark angeschwollen und bald sehr flach zusammengedrückt oder rundlich und entweder fest oder viergliedrig ist, einen Winkel (z. B. T. XII. F. e-h). Die meisten Haare an der Keule, die längsten am Schaft und am Wendegliede. Der Halsschild nicht gerandet, mit abgerundeten Winkeln, stark gewölbt, meist ganz walzig und punktiert, höckerig, runzlig (nur bei *B. villosus* und *cryptographus* Männchen ganz flach und glatt). Flügel den Steifs ganz deckend, stark gewölbt (mit Ausnahme von *B. villosus* und *cryptographus*), höchstens doppelt so lang oder etwas länger als der Halsschild, hinten flach oder stark abschüssig und hier oft gezähnt oder gehöckert, etwas gewölbt, eben oder eingedrückt. Zwischen je 2 Punkten einer Reihe eine Brücke und zwischen je 2 Punktreihen (die höchst selten ganz verschwindend sind) ein Zwischenraum, letzterer glatt, punktiert oder gerunzelt. Unterseite ganz gewölbt oder (*Eccoptogaster*) am Hinterleibe nach hinten aufsteigend. Beine kurz, nur bei dem Männchen von *B. dispar*, *villosus* und *cryptographus* lang. Fußglieder kurz, nur bei *Platypus* ausnehmend lang und zerbrechlich. Das dritte Glied ganz oder zweilappig. Am Ende desselben ein kleines, verborgenes (5tes) s. Taf. XII. Fig. i, k. Der ganze Körper mehr oder weniger, oft vollkommen (*Platypus*, viele *Bostrichus*) walzig, meist mit deutlichen Haaren, oft auch mit Schuppenhärcchen. Farben eintönig, (nie metallisch) gelb, braun, rötlich oder schwarz, oft bei einer und derselben Art (bei frisch ausgeschlüpften Individuen) gelb und (bei älteren) braun oder schwarz, selten halb dunkler halb heller, sehr selten bunt gefleckt (durch Schuppenhärcchen). Nur wenige etwas über 3" lang, viele unter 1". Geschlechter oft sehr gut zu unterscheiden und zwar da, wo an dem abschüssigen Theile der Flügel Zähne sich zeigen, hat sie das Weibchen kleiner oder gar nicht. Bei Einigen die (sehr selten) Männchen (*B. dispar*, *villosus*, *cryptographus*) durch flachern und ganz andern Bau, oder (bei *B. eurygraphus*, *dryographus* und *monographus*) durch vorn eingedrückten und stärker vorgezogenen Halsschild ausgezeichnet. Die allgemeine (nicht örtliche) Behaarung der Männchen meist länger. Bei mehreren (*Eccoptogaster*) Stirn und Hinterleib der Männchen ausgezeichnet. Dagegen ist bei vielen das Geschlecht von außen durchaus nicht unterscheidbar (höchstens im Leben durch stärkeren Hinterleib der Weibchen) und dann nur durch Untersuchung der Geschlechtstheile (\*) oder durch Beobachtung der Copula zu ermitteln. Höchst auffallend ist die ungleiche Zahl der Männchen und Weibchen bei einigen Xylophagen. Während bei *Eccoptogaster Scolytus* 30-40 Männchen auf ein Weibchen kom-

(\*) Diese Thiere sind zwar sämmtlich nur klein und eine Eröffnung und Unterscheidung der innern Theile ist nicht ohne Schwierigkeit möglich. Indessen ist ja hier, um den forstlichen Zweck zu erreichen, keine feine Präparation nöthig, sondern es reicht schon hin, nur die Theilung der Eierstöcke, oder nur die Bläschen am Ausgange der Scheide bei dem Weibchen gesehen zu haben. Als Männchen werden sich die Individuen zu erkennen geben, wenn sie einen hornigen, von 2 hornigen Klappen begleiteten Penis, der bei allen auffallend groß (bei *Eccoptogaster* gewöhnlich noch vor dem Tode lang herausgestreckt) ist, am Ende des Hinterleibes zeigen. Derselbe tritt (z. B. bei *H. piniperda*) schon nach einem geschickten Drucke mit den Fingern, der das Thier zugleich tödtet, bemerkbar hervor. Alle Individuen, bei denen kein Penis hervortritt, waren also Weibchen.

men (wie ich durch Auszählungen zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten weiß), fand ich bei *B. monographus* und *dyographus* immer mehrere Hundert Weibchen auf 1 Männchen (welche letztern daher auch so ausnehmend selten sind). Eine andere in dieser Beziehung sehr interessante Art ist *B. dispar*, und da wir jetzt über das quantitative Verhältnisse der Geschlechter zu einander ganz befriedigende Nachricht durch Hrn. Heyer erhalten haben, so will ich diese hier mittheilen. Er erzog im J. 1838 vom 5. Juli bis zum October 58 Männchen und 220 Weibchen, so daß auf ein Männchen circa 4 Weiber zu rechnen sind. Die Männchen sind bei dieser Art also doch nicht so selten wie man immer geglaubt hat. Die Larven der meisten (T. XIV. F. 1–32), besonders der Hylesinen und Bostrichen, ähneln denen der Rüsselkäfer sehr. Sie sind stets gedrunken (doch etwas weniger als die der meisten Rüsselkäfer), vollkommen walzig. Kopf (z. B. T. XIV. F. 2, 5, 5.) stark gewölbt (immer stärker als bei den Rüsselkäferlarven), mit der gewöhnlichen Gabellinie. Die Gegend über dem Kopfschild nicht so breit wie bei den Rüsselkäfern. Föhleranlage etwas deutlicher. Oberkiefer etwas schwächer, hornig, gezähnt, von dem weit hervortretenden Kopfschild und der abgerundeten, behaarten und gewimperten Lefze bedeckt. Unterkiefer (T. XIV. F. a) denen der Käfer sehr ähnlich, nur die Taster zweigliedrig (bei *Eccoptogaster* (T. XIV. F. c.), die Borstenwimpeln der Lade nicht spitz, sondern abgestutzt). Lippe (F. b, d) fleischig mit zweigliedrigen Tastern. Auffallend klein die Mundtheile von *Platypus*, besonders die Unterkiefertaster, so wie die nur mikroskopisch sichtbaren Lippentaster, nur eingliedrig. Ohne Beine und an Stelle derselben hervortretende, immer stärker behaarte Wülste zeugend. Auch die Keilwülste, wie auch die durch die Querfurche gebildeten Vorder- und Hinterwülste sind vorhanden, jedoch nie accessorische, oder nur mit einer Wulst hinter der Keilwulst (gegen Rüsselkäfer). Das erste Luftloch am ersten Ringe, jedoch so äußerst dicht am Hinterrande desselben, daß es dem zweiten Ringe anzugehören scheint. Die übrigen 9 vom 4ten bis 11ten liegen etwas höher und haben die Luftloch- und Unterwülste unter sich. Nie giebt es hier so auffallend lange Behaarung, wie bei den Rüsselkäferlarven. Die herrschenden Farben gelblich-weiße oder, wenn der Darm gefüllt ist, rüthlich-weiße, mit Ausnahme der gewöhnlich dunkler gefärbten Theile. Die Puppen sind kurz und gedrunken und erscheinen es deshalb noch mehr, weil die Flügel über den größten Theil des Hinterleibes, bei einigen fast bis zum Ende desselben, reichen. Die Unterflügel überragen die Oberflügel weit und beide verstecken das letzte Fußpaar meist gänzlich. Die Schienen der beiden ersten Paare absteigend. Die Föhler ziemlich grade oder nur wenig gekrümmt, nie gebrochen, gehen spitzwinklig vom Kopfe ab und reichen oft bis zum Vorderschenkel. Dornhöcker sparsamer als bei den Rüsselkäfern, oft nur am Hinterleibe, doch auch hier kurz und nie mit langen Härchen.

Über VORKOMMEN und LEBENSWEISE haben wir seit einigen Jahren, seitdem die Kenntniß und übereinstimmende Benennung auch unter den Forstleuten sich mehr verbreitete, die auffallendsten und interessantesten Erfahrungen gemacht. Besonders sind wir über die Lebensweise des bertiichtigten 8zähligen Borkenkäfers (*typographus*) zu einem seltenen Grade von Erkenntniß gekommen, und ich verweise daher auch hier an vielen Stellen auf jenen, weil in den Hauptpunkten große Übereinstimmung zwischen den verschiedenen Arten der Xylophagen Statt findet.

I. Die ächten Borkenkäfer zeigen eine größere geographische Verbreitung, als irgend eine andere Familie, indem sie nämlich außerordentlich weit nach Süden wie nach Norden und auch auf hohe Gebirge hinauf gehen und wahrscheinlich überall, wo noch Holzwuchs ist, gefunden werden. Die gemeinsten, wie *B. typographus*, *chalcographus*, *Laricis* u. A. kommen auf den Schweizer Alpen (Hr. Heer, obs. p. 30.), wie in Schweden und Rußland, selbst in Sibirien vor. Von Hrn. Feldjäger v. Werder erhielt ich Exemplare des Bostr. *Laricis* und *chalcographus* so wie des *Hyl. palliatus*, welche in den Tyroler Alpen zwischen 7000 und 8000' an stehenden Fichten und Lärchen gesammelt werden. Dagegen erleiden sie eine Beschränkung dadurch, daß sie von krautartigen Gewächsen gänzlich ausgeschlossen sind, denn, ob Hy-

*lesinus Trifolii* wirklich an Klee (-Wurzeln?) lebt, ist mir noch sehr zweifelhaft. Nicht einmal schwärmen sieht man die Borkenkäfer auf Krautgewächsen und es ist mir nur ein einziger hierher gehörender Fall bekannt. Hr. Suffrian fand nämlich ein Individuum des *Hylesinus Fraxini* in der Blumenkronen-Röhre von *Lamium album*. Unter den Holzgewächsen wählen sie meines Wissens nie Kleinsträucher und überhaupt nicht Sträucher, sondern sie lieben vorzugsweise die Bäume und unter diesen wieder bei weitem mehr die Nadelbäume als die Laubbölzer, welchen letzteren jedoch auch wieder, was sehr merkwürdig ist, 2 Gattungen (*Eccoptogaster* und *Platypus*) ganz anzugehören scheinen. Arten, welche beide zugleich bewohnen, sind mir (außer *Bostr. Saxeseii* und *lineatus*, welcher sämtliche Nadelhölzer und auch Birken bewohnt) nicht bekannt. Einige gehen junge Pflanzen so gut wie alte Stämme an (*B. Laricis*), andre wählen dagegen nur alte (*B. typographus*) oder nur junge (*B. bidens* allermeist), oder sie machen auch wohl noch einen Unterschied zwischen schwachen (*B. Abietis*) und starken Bäumen (*B. typographus*), den Ästen und dem Stamme (*B. chalcographus* und *typographus*), ja sogar den Wurzeln (*Hyl. ligniperda*, *ater* und *opacus*) und dergl., welches selbst bei der Artenbestimmung zu Statten kommt, natürlich aber zur Zeit einer großen Vermehrung einzelne Ausnahmen findet. Einige Arten (*B. typographus*) wählen sich nur eine einzige Holzart und können durchaus in einer andern nicht fortkommen. Andere dagegen gedeihen in mehreren (*B. lineatus* z. B. in Kiefern, Fichten, Tannen). In dieser Hinsicht habe ich auch die merkwürdige Erfahrung gemacht: das gewisse, einander ganz besonders ähnliche Arten sich gegenseitig ersetzen in den Gewächsen. So fehlt in unsern von Fichten ganz entblößten Gegenden der *B. typographus*, wogegen der bei uns gemeine und dem *typographus* zum Verwechseln ähnliche *B. stenographus* wieder in den Fichten ganz fehlt oder doch nur als seltener Fremdling erscheint. Beide leben nur an den Stammtheilen. So ist es auch mit *B. chalcographus* (in Fichten) und *B. bidens* (Kiefern), welche man sogar nie ihre Holzarten vertauschen sahe. Ja, von diesen läßt sich sogar noch das Merkwürdige beobachten, das sie wieder die stellvertretenden Formen in den schwächern Stammtheilen (Ästen, Zweigen) sind. Ganz kürzlich habe ich noch eine hierher gehörige Erfahrung gemacht, die das Stellvertreten an noch einem andern Stammtheile darthut: *H. ater* lebt dicht über dem Wurzelknoten der Kiefernpflanzen und der höchst ähnliche *H. cunicularius* nach Hrn. Kellner über dem Wurzelknoten junger Fichten. Wahrscheinlich werden sich später noch mehrere ähnliche Erfahrungen hier anreihen.

II. Ganz besonders wichtig für die forstliche Bedeutung, wie auch, können wir hinzusetzen, für die Unterscheidung der Arten, ist die Gewohnheit, nur gewisse Systeme der Baumorgane anzugehen, d. h. nur allein die Rinde zu bewohnen — ja einige Arten unterscheiden sogar wieder die eigentliche Rinde und den Bast — oder allein den Holzkörper anzugreifen (s. S. 164. V.). Sie sind demnach bald physiologisch bald technisch schädliche. Technisch schädliche finden sich z. B. nur in den Gattungen *Bostrichus* und *Platypus*. *Hylesinus* und *Eccoptogaster* sind dagegen durchweg nur physiologisch schädlich. Sehr merkwürdig ist es, das die meisten schon durch einen eigenthümlichen Körperbau dazu eingerichtet zu sein scheinen. Andre Theile der Holzgewächse werden nicht von Borkenkäfern bewohnt, mit Ausnahme der Markröhre, welche *H. piniperda* (jedoch bestimmt nicht zum Zwecke der Fortpflanzung) ausfrisst (s. dort.)

III. Ein andrer wichtiger Punkt, der sich am besten hier anschliesst, ist: „Ob die Borkenkäfer „nur kränkliche oder auch gesunde Bäume angehen?“ Diese Frage, welche bisher immer nur in Beziehung auf den *typographus* aufgestellt wurde, und die größte Fehde veranlaßt hat, die vielleicht je unter den Forstännern Statt hatte, erörtere ich hier schon zum Theil im Allgemeinen, weil ich erfahren habe, das auch andre Arten, als der *typographus* (der allerdings viele gewichtige und die für die Praxis einflussreichsten Beläge liefert, weshalb auch dort darüber nachzusehen ist, besonders Leb. II. 11. und forstl. Bed. Ann.), hier etwas in die Waagschale zu legen haben. Das die meisten Borkenkäfer (aber gewiss nicht



alle, s. *Hyl. Frazini*) am liebsten krankes, stehendes oder schon liegendes, Holz angehen, darüber kann kein Streit sein. Eben wegen des Vorzuges, welchen sie diesem geben, mag es auch wohl gekommen sein, daß eine Partei (Krankheitsvertheidiger) behauptet hat: sie könnten auch nur krankes Holz, selbst wenn sie in ungeheurer Menge da wären, angehen, und das vom Borkenkäfer befallene, früher für gesund ausgegebene, Holz könne nur scheinbar gesund gewesen sein. Ohne uns hier zu weitläufig auf die Prüfung aller der pro et contra vorgebrachten Sätze (welche schon ganze Abhandlungen gefüllt haben) einzulassen und dem Leser dadurch die Hauptpunkte, auf die es ankommt, zu entrücken, wollen wir nur diese in einer Anmerkung hervorheben (\*). In wie fern es für den Forstmann wichtig ist, sich von der

(\*) Die Krankheitsvertheidiger glauben (und das ist die Hauptsache), der Natur werde von der andern Partei (den Gesundheitsvertheidigern) durch Annahme einer Abweichung von dem einmal vorgezeichneten Wege (Hr. Krutzsch S. 16.) Zwang angethan. Sie weichen aber (was sehr wohl zu beachten ist) darin von einander ab: daß die Einen (Hr. Krutzsch) das Übernehmen der Borkenkäfer aus einer von Jugend auf schon bestehenden Säftezerresung der Bäume — also doch von einer unheilbaren Krankheit — (durch fehlerhafte Erzielung hervorgebracht) ableiten, die andern aber (Hr. Thiersch) von einer vorübergehenden — also doch heilbaren — (durch temporäre Witterungseinflüsse erzeugten) Kranklichkeit. Die Gesundheitsvertheidiger benutzen nur die an Bäumen gemachten Erfahrungen als Criteria und glauben dahin wirken zu müssen, die Bestände (gleichviel ob gesunde oder nur scheinbar gesunde) so lange wie möglich zu erhalten und vor den Angriffen der Borkenkäfer zu sichern. Daß ihnen dies gelingt, ist bei *B. typographus* (Begegnung) zweifellos und erscheint mir als eine Hauptwaffe gegen die Gegner. Da ich mich auch zu den Gesundheitsvertheidigern schlage, so will ich Alles das, was mir gegen die andre Meinung zu sprechen scheint, hier zusammenfassen. 1) Es ist actenmäßig erwiesen, daß das Absterben ganzer großer Waldflächen (s. *typographus* Begegn. Ann.) Folge verkehrter Malsregeln, wohl gar der Annahme der Krankheits-Theorie war, und daß bei entgegengesetzten Malsregeln solche Verwüstungen nicht mehr vorkommen und auch wahrscheinlich nicht mehr vorkommen werden. 2) Können meines Erachtens auch Jedem, auf das Augenscheinlichste die gesunden Bäume nanhaft gemacht werden, welche von Borkenkäfern befallen wurden. Hr. Schmidberger, welcher als ein glaubwürdiger Mann erscheint, besonders was seine Obsthäuser betrifft, die er gewiß so genau kennt, wie ein Hirte seine Schaafe, sagt: daß der *B. dispar* (s. dort) bei seinem ungewöhnlichen Angriffe auf die Apfel-Topfbäume keinen Unterschied in Hinsicht des Alters oder des Gesundheitszustandes mache und daß keiner der von dem Käfer befallenen Bäume vorher krank gewesen sei, indem alle Kränker im vorigen Herbste ausgemäzt worden wären (s. *Obsthäuser*. IV. S. 217.). Auch kann man in Berlin bei Hrn. Bouché noch heute Eschen sehen, an welchen weder der scharfsichtige Besitzer derselben noch ein anderer einen Unterschied hinsichtlich des vortrefflichen Gesundheitszustandes bemerkt, und doch sind einige dieser Bäume von *Hylesinus Frazini* bewohnt (aber nur von einer kleinen Familie und wahrscheinlich erst seit kurzer Zeit, weil die Bäume sonst schon mehr gelitten haben müßten). Im J. 1838 untersuchten wir die immerfort im üppigsten Wachsthum stehenden Bäume abermals genau, fanden jetzt aber nicht eine Spur von Käfern darin. Sie waren also gar nicht dazu gekommen, hier förmlich zu brüten, vielleicht weil ihrer zu wenige waren, um die Bäume so stark zu verletzen, daß sie zur Aufnahme der Brut geeignet geworden wären. So schrieb mir auch Hr. Rafmann, daß bei dem i. J. 1836 in Ostpreußen vorgekommenen Fraße derselbe Käfer grade die gesündesten und wüchsigsten Stämme ausgesucht habe (s. auch die neuen Nachrichten sowohl über *H. Frazini* als auch über *B. dispar*). Sollte man demnach nicht auch berechtigt sein, solche, später vom Wurm befallene, Bäume im Forste, (nicht bloß einzelne, sondern auch ganze Bestände), die das kräftigste, gesündeste Ansehen haben, z. B. Fichten, welche Zapfen ansetzen, für wirklich gesunde zu halten? Die Krankheitsvertheidiger stützen sich zwar darauf: daß bei Menschen zuweilen hinter einer äußeren, scheinbaren Gesundheit grade eine recht böse Krankheit versteckt sei. Jedoch finden so seltnen Fälle, abgesehen von dem Unpassenden des Vergleichs, hier gewiß nicht Anwendung. Auch ist es den Vertheidigern dieser Meinung bisher ganz unmöglich gewesen, den angeblichen Krankheitszustand durch irgend ein Kennzeichen, ein chemisches Reagens u. dgl. augenfällig zu machen, denn die weiten Versuche mit Lackmuspapier haben durchaus nicht den gewünschten Erfolg gehabt (Hr. v. Berg in Pfeil's *crit. Bl.* X. S. 119.). Es wird durch die Säfte gesunde wie kranker Fichten, ja der ersten noch mehr, geröthet. 3) Kann ich auch in den Angriffen gesunder Bäume durchaus keine Abweichung von dem einmal vorgezeichneten Wege finden. Es ist sehr schwer, den Weg zu erkennen, welchen die Natur den Thieren vorgeschrieben hat. Entweder kennen wir die Verzweigungen dieser Wege noch nicht hinlänglich, oder, was noch wahrscheinlicher ist, die Natur hat die Wesen gar nicht so sehr beschränkt und sie zu solchen Maschinen gemacht, wie man vermuthet. Man denke nur über die Vorsicht nach, mit welcher der *typographus*

Krankheitstheorie fern zu halten, liegt am Tage und ist auch bei *typographus* umständlich erläutert (forstl. Bedeut.). Indessen muß ich hier doch noch der Vermuthung erwähnen, die Einige hegen und die ich im-

(s. Leb. II. 11. u. III. Anmerk.) und nicht bloß dieser, sondern auch mehrere andre Arten, von denen ich es schon beobachtete, bei Anlegung seiner Gänge in saftreichen Bäumen zu Werke geht. So stoßen wir noch täglich auf die Entdeckung eines oder des andern noch nicht bekannten Bienenkörpers oder Aufenthaltes oder Frases oder dgl. eines Thieres. So fiel es dem *Bostr. dispar* mit einem Male ein, Hrn. Schmidberger's Apfelbäume anzukommen, nachdem er immer vorher ruhig in den benachbarten Laubwäldern gewohnt hatte, und mir auch sonst sein Vorkommen in Apfelbäumen noch nicht bekannt geworden ist. So ist erst kürzlich einmal der *Bostr. stenographus* in Fichten gefunden worden, obgleich man ihn lange, aber immer nur in Kiefern, kennt und scharf beobachtete. Eben so sind einzelne, seltne Fälle bekannt, in welchen der *typographus* auch in Kiefern ging. Noch andre gehen (wie *Bostr. lineatus*) eben so gern in Fichten wie in Kiefern und *B. stenographus*, den ich bei uns stets nur an todtten Kiefernholze sahe, ist von Bechtstein oft an lebendem bemerkt u. s. f. Ist es also so ganz undenkbar: daß ein Borkenkäfer eben so gut gesunde wie kranke Stämme angehen sollte? Und wäre der Sprung von den kranken zu den gesunden Stämmen wohl größer als der von todtten zu lebenden, den doch alle Borkenkäfer fast täglich zeigen? Gewiß nicht! 4) Ist auch wohl bei starker Vermehrung der Käfer dem Zufalle viel beizumessen. Wirft ein Windstofs die Schwärme auf einen gesunden Ort (s. *typogr.* Leb. VIII. Anmerk.), so sind sie so ermattet, daß sie nicht weiter können und ihnen keine Wahl bleibt. 5) Sind auch die ausgezeichnetsten Auctoritäten, namentlich praktische Forstmänner, welche hier die wichtigste Stimme haben, so wie auch angesehene Naturforscher (z. B. v. Berg, Gmelin, Illiger, Pfeil, Saxsen), Gesundheitsvertheidiger und unter den Gegnern nur allein die Hrn. Krutzsch, Liebich (V. 91.), v. Lincker und Thiersch von Bedeutung. Zu meiner Verwunderung und Betrübniß sehe ich, daß die Zahl der letztern sich noch jetzt wieder vermehrt hat und zwar mit einer Auctorität, Hrn. Prof. Wiegmann sen. So sehr ich diese auch, was Chemie und Botanik betrifft, achte und so gern ich den verdienstlichen Mann auch den Kummer eines harten Widerspruchs erspäre, wenn es einem meinem Fache weniger verwandten Gegenstand betroffen hätte, so kann ich doch bei der Borkenkäfer-Frage, die er, da er weder Forstmann noch Entomolog ist, nicht zu beurtheilen versteht, nicht schweigen. Hr. Wiegmann bekennt selbst, daß er früher, als er diesen Gegenstand berühren mußte, mit der Literatur desselben gänzlich unbekannt gewesen sei und daß er erst später die Schrift von Hrn. Krutzsch und von Hrn. Bohutinsky, auf die er sich besonders stützt, gelesen habe. Obgleich es ihm allerdings zum Vorwurf gereichen muß, daß er nicht weitere Belehrung gesucht hat, wenn er einmal darüber schreiben wollte, so ist es dennoch wieder die einzige Entschuldigung: daß er den hochwichtigen Gegenstand nicht gekannt und die Folgen nicht berechnet hat, welche sein Ausspruch haben könnte. Wollte man sich in den Braunschweig'schen Hainforsten auf seine Meinung berufen, so würde ihn vielleicht bald ein hatter Vorwurf treffen. Leider fürchte ich, daß auch selbst über die Grenzen von Braunschweig hinaus, noch dazu da dies so höchst bequem ist, es bald heißen wird: „Wiegmann hat ja wieder die Krankheit aller vom Borkenkäfer befallenen Bäume bewiesen und wir brauchen uns daher mit diesem lastigen Ungeziefer nicht zu quälen.“ Wollte Gott ich könnte nun wenigstens für immer die Krankheitstheorie zu Grabe tragen. Daher mit allem Nachdrucke zur Sache selbst. Mit den gänzlich unhaltbaren Sätzen, welche Hr. Wiegmann anführt, wie er in Süddeutschland und Frankreich gehört haben will, kann ich mich, da leider schon zu viel Raum für den Borkenkäfer in Anspruch genommen wurde, nicht aufhalten, auch legt der Berichterstatter selbst weniger Werth darauf als auf die Meinung der Herren Krutzsch und Bohutinsky. Mit den Krutzsch'schen Ansichten glaube ich mich früher (s. S. 160.) schon hinreichend beschäftigt zu haben, und es bliebe nur noch übrig, den Aufsatz des Böhmischen Herrn Forstmeisters J. Bohutinsky „über Ursache und Entstehung der Baumtrockniss, ein auf vielseitige eigne „Beobachtungen und Versuche gegründeter Beitrag zu der Frage: Geht der Borkenkäfer nur „kranke oder geht er auch gesunde Bäume an?“ zu prüfen. Der Berichterstatter hat allerdings viel Mühe auf die 43 Seiten starke Erörterung der Frage verwendet und muß dadurch so wohl, wie auch durch die 43-jährige Erfahrung, welche er zu haben vorgibt, den Laien — und vielleicht auch Forstmänner — nothwendig gewinnen. Es werden aber wenige Zeilen beweisen, wie ich, abgesehen von der Einseitigkeit seines Standpunktes, die nothwendigen Kenntnisse über die Lebensweise der Insecten in dem Grade abgehen, daß er nicht den geringsten Anspruch auf die Auctorität in der Frage im ausgedehntesten Sinne machen kann. 1) Geht die ganze Tendenz der Abhandlung offenbar nur dahin, zu beweisen, daß in den Revieren des Herrn Berichterstatters innerhalb 43 Jahren kein gesunder Baum vom Käfer ergriffen worden sei. Wenn wir dies auch nicht näher untersuchen wollen (obgleich sich nachher bedeutende Zweifel gegen die Glaubhaftigkeit des Satzes finden werden), so sieht doch gleich jeder ein, daß es darauf nicht ankomme, zu beweisen: Hrn. Bohutinsky's Forsten seien 43 Jahre lang von einer allgemeinen Wurmtrunkniss verschont geblieben —

mer mehr anfangs zu theilen. Es sollen nämlich gewisse Schwärme von Borkenkäfern Angriffe auf gesunde Stämme machen, um sie in einen Krankheitszustand zu versetzen. Denn sobald sie sich bis auf den

was sich ja auch neuerlich Gottlob! im Harz ereignet hat —, sondern, um die Frage in ihrer Totalität zu erledigen, die hauptsächlich in Untersuchung gezogen werden muß: ob die gänzliche Verwüstung unbeschädelter Forsten, die doch historisch aus mehreren Gegenden festgestellt wurde, auch auf ein allgemeines und gleichzeitiges Einwirken vieler Tausende und Millionen von Stämmen zurückgeführt werden könnte? Hatte Hr. Bohutinsky eine solche Wurmtrockniss, wie sie in den Achtziger Jahren im Harze wüthete, erlebt, er wäre gewiss anderer Meinung gewesen. Hr. B. behauptet zwar, daß bei ihm oft ungeheure Schwärme von Borkenkäfern gewesen wären, allein diese würden sich zu denen, welche den unglücklichen Harz einst heimsuchten, doch nur wie einige Tropfen zu einem Meere verhalten. Da also hier der Gesichtspunkt, aus welchem die Sache genommen werden muß, ganz verfehlt ist, so will ich mich bei dem Übrigen nicht aufhalten, sondern gleich übergehen 2) zu den Versuchen, welche Herr Bohutinsky anstellte. Bei diesen muß ich am längsten verweilen, weil grade Versuche der verschiedensten Art in neueren Zeiten so viel Gewicht in der Naturgeschichte erhielten und die Meisten schon ehrsüchtig zurückweichen, wenn sie von einem Versuche hören, ohne zu untersuchen, wie und warum sie angestellt wurden. So geht es auch hier. Zuerst hat Hr. Bohutinsky versucht, gesunde (?) Tannen, denen ein Rindenstück ausgeschitten wurde, ein gleich großes, mit Käfern, Larven und Eiern inficirtes Rindenstück zu appliciren, um zu sehen: ob sich die Brut bis unter die gesunde Rinde ausbreiten würde. Dafs sie dies in allen 5 Fällen nicht that, glaube ich gern, denn wer kann es den armen Borkenkäfern verdenken, wenn sie aus diesem überall verpichten Aufenthalt (selbst die Bohlöcher hatte der Experimentator mit Wachs verpicht!) je eher je lieber herauszukommen suchten, und wer würde den ganzen Versuch nicht gleich für einen höchst unpassenden erkennen? Wie kann man ein Insect, und namentlich die so empfindliche, nur auf gewisse Baumarten angewiesene Borkenkäfer, die öfters eine so unerklärliche Wahl der Stämme treffen (*s. B. typographus* Lb. II. besonders No. 4.), wie Baumaugen oder Pfropfreiser einimpfen wollen, welche letztere ja nicht einmal auf allen Bäumen gehen? Dafs diese Versuche gar nichts beweisen, hatte doch Hr. Bohutinsky selbst annehmen können, denn sie zeigen, dafs auch auf kranken Bäumen die Impfung nicht hatte. Wer wird den sub a) beschriebenen Impfung („eine 8" stücke an der Nördlichen Seite vom Windstürme gehobene und gegen den Boden verschoben hängende Weistanne“) nicht gleich als einen kranken erkennen? Wenn man solche Bäume nicht als krank anerkennen will, dann bleibt Alles der grenzenlosten Willkür anheim gestellt. Doch nun zum zweiten Versuche, den ich mit den Verfassers eignen Worten geben will, um mir nicht eine Entstellung zu Schulden kommen zu lassen. Pag. 27 heifst es: „Um zu versuchen, ob der Borkenkäfer in vollkommen gesundem Holze nicht unbemerkthaus, liefs ich am 19. Novemb. 1828 eine frische, gesunde Weistanne von 11" Stärke auf Scheitholz aufarbeiten, und davon die Klippeln theils zur Hälfte gespalten, theils aber ungespalten in einer gleichförmig mit 8 Grad Wärme geheizten Stube aufstellen; aber es kam, obgleich in Folge der immer gleich unterhaltenen temperirten Wärme der Saft in Gährung und Faulniss übergegangen war, kein einziger Käfer zum Vorschein. Am 27. December waren die Scheite saftlos und ganz eingetrocknet. An diesem Tage wiederholte ich denselben Versuch mit folgender Aenderung. Ich liefs nämlich aus demselben Holzbestande eine ebenfalls ganz gesunde, an Größe und Stärke der zum ersten Versuche gefallten ziemlich gleichen Tanne zu Scheitholz aufarbeiten und in der in gleichem Grade warm geheizten Stube aufschichten, zugleich aber in die obere Schichte aus einem im Frühjahr geschlagenen Kieferholzstosse ein rundes Scheit, in welchem sich der Borkenkäfer vorfind, mit einschichten. Nach Verlauf von 4-5 Stunden, nachdem der Käfer durch die empfundene Wärme aus seinem Winterschlaf in das thätige Leben geweckt worden, krochen 9 Käfer an der Oberfläche der fraglichen Scheithölzer und unterhielten diesen Gang fort, ohne sich einzubohren. Erst am 11. Januar des nächsten Jahres, wo nach meinem Bemerken der Saft der in die warme Stube gebrachten Scheithölzer in die Gährung übergegangen war, indem dieselben einen sauerlichen und faulen Geruch verbreiteten, verschwand der vorher so lange ganz unthätig herumgekrochene Borkenkäfer, und schon am 13. Januar fand ich die Spuren, dafs sich derselbe in die Rinde der aufgeschichteten, frischen Scheithölzer eingebohrt hatte. Am 3. Hornung liefs ich nun die Rinde von mehreren Scheiten dieses Holzes abschalen, und fand, dafs der Borkenkäfer allgemein verbreitet war, indem die Rinde nicht allein viel Eier enthielt, sondern sich auch bereits Larven und Käfer entwickelt hatten.“ Der Sinn dieser Worte laßt sich also kurz dahin fassen: der Borkenkäfer hat sich in Mitten des Winters bei 8° Wärme innerhalb 21 Tage generirt. Die allbekannten Erfahrungen kehren aber, dafs selbst bei dem günstigsten Sommerwetter jeder Borkenkäfer allerwenigstens 6 Wochen, bei ungünstigem wohl 13 Wochen gebrannt, um eine Brut zu Stande zu bringen. Was soll man also von diesem Versuche denken? Das Gelindeste ist doch: dafs der Experimentator getauscht wurde und dafs man ihm schon mit Bruf besetzte Stücke untergeschoben habe. Leider muß man daneben auch die Glaubwürdigkeit der übrigen

Bast durchgebohrt haben, gehen sie schnell wieder zurück, bis sie oder ihre Nachfolger es später wagen können, wirkliche Gänge in den verletzten Bäumen anzulegen, wobei sie denn allerdings immer noch die bei *B. typographus* (II. 11. 13.) erzählte Vorsicht gebrauchen.

IV. Überwinterung und Begattung der Borkenkäfer und Entwicklung ihrer Brut. Sobald im Frühjahr nur einige recht warme Tage auf einander folgen, sieht man die Borkenkäfer aus ihren Winterquartieren hervorkommen und in der Nähe derselben langsam umherschwärmen. Geschieht dies schon im Februar oder März (wobei natürlich, wie bei der ganzen Entwicklung, hohe oder niedrige, nördliche oder südliche Lage fördernd oder hindernd sind), so hört es auch mit der Rückkehr der Kälte eben so plötzlich wieder auf und die Käfer verkriechen sich aufs Neue. Erst wenn das Wetter auffallend warm zu werden verspricht (worin sich die Käfer jedoch auch oft genug täuschen) folgt dem Schwärmen die Begattung, welche bei einigen (*Hyl. ater*, *piniperda* u. A.) schon aufsen an dem Stamme, bei andern (*s. typographus* Leb. III. 1.) höchstwahrscheinlich erst in denselben (in der Rammelkammer) vollzogen wird. Wahrscheinlich geschieht auch bei *Eccoptogaster* (*s. dort*) die Begattung in den Gängen und hat gewiss viel Eigentümliches (wahrscheinlich rückwärts). (Über verschiedene Zahl der Männchen und Weibchen *s. S. 155.*) Das Eierlegen und die Entwicklung der Brut beginnt und verläuft ziemlich allgemein auf die beim *typographus* (Leb. I.) angegebene Weise und wird unter ähnlichen Umständen befördert oder verzögert. Eine und dieselbe Art kann also, ohne dafs wir Widersprüche darin zu suchen brauchen, einmal eine einfache und ein andres Mal eine doppelte oder eine anderthalbige Generation haben, aber nie eine vollständige dreifache, wie man häufig annimmt; denn, wenn wir nur durchschnittlich den geringsten Satz für eine Brut: 8 Wochen (welche nur in sehr warmen Jahren und in der wärmsten Jahreszeit hinreichen) annehmen, so müßte ja das Brüten ununterbrochen vom Mai bis in den November fortgehen. Erstens findet ein so ununterbrochenes Brüten nicht Statt, weil das Aus- wie das Anfliegen sehr häufig verzögert wird und weil die Entwicklung der Brut im October, selbst in den Ebenen

Mittheilungen beurtheilen, um so mehr als mehrere sehr auffallende Widersprüche vorkommen. So z. B. sagt der Verfasser zu Gunsten seiner Meinung S. 14. „sowohl die Larven wie das vollkommene Insect widerstehen der Kälte und der Hitze“ und auf S. 29. paßt es ihm wieder mehr zu behaupten „die Kälte tödtete die vorhandenen Larven“. Obgleich er hin und wieder behauptet, um das Unantastbare seiner gesunden Stämme ins hellste Licht zu stellen, man hätte das inficirte Holz dreist in den Schlägen stehen lassen, so warnt er doch zum Schluß mit den Worten „es ist nicht meine Absicht, durch vorliegende Schrift alle Vorsichtsmaßregeln, die gegen die Vermehrung dieser Insecten möglicher Weise getroffen werden können, für überflüssig zu erklären.“ Aus welchem andern Grunde kann er es aber für nicht überflüssig halten, als um die gesunden oder wenigstens gesund scheinenden Bäume nicht zu gefährden?

Die Sache der Gesundheitsvertheidiger gewinnt also wieder dadurch, dafs die Aussichten und Gründe ihrer neuen Widersacher entkräftet wurden. Noch mehr, ich bin im Stande, ihrer Behauptung neue Stützen in mehreren neuen Erfahrungen (s. bei *Bostrichus dispar*, *Hylesinus fraxini* und *Eccoptogaster scolytus*) zu geben und ihnen neue Auctoritäten zuzuführen. Oken hat sich in seiner neuen Allgemeinen Naturgeschichte (V. 3. S. 1681.) für sie ausgesprochen, und der berühmte und vielerfahrne Graf Caspar Sternberg ebenfalls. Der Letztere wurde durch eine Abhandlung des berühmten Ornithologen, Hrn. Brehm (in Oken's Isis 1829. p. 578.), welcher sich ebenfalls zu den Krankheitsvertheidigern geschlagen hatte, veranlaßt, seine 40jährigen, in den bedeutenden Forsten seiner Güter gesammelten Erfahrungen zu veröffentlichen (Isis Jahrg. 1830. Bd. XXIII. pag. 313.). Wir heben hier nur folgenden, von ihm erzählten, merkwürdigen Fall heraus. In seinem Garten zu Regensburg befanden sich 5 schöne Weymuthskiefern, die er selbst aus Samen gezogen hatte. Zwei Tage nachher, als Holz aus einer benachbarten Wurmtröcknuß zur Stadt gefahren worden war, bemerkte der Graf, dafs seine lieben Bäume die Nadeln schlaff hängen ließen, und fand, dafs die Rinde wie mit Schwart angeschossen war. Sogleich wurden die Löcher mit Oel verschmiert und mit Lehm umkleistert. Wirklich wurden auch vier Stämme dadurch gerettet, der fünfte aber starb. Er schloß damit, die Brehm'schen Satz Schritt vor Schritt zu widerlegen und ihre Annahme mit Flecht als höchst gefährlich zu schildern. Selbst im Auslande, wo die Frage neuerlich ebenfalls angeregt wurde, haben sich die größten Auctoritäten für die Gesundheitsvertheidiger erklärt (*s. Ecc. Scolytus*).

Deutschlands, schon fast ganz still steht und, wenn sie auch schon im April beginnen sollte, zu dieser Zeit doch wegen der kalten Nächte und der überhaupt noch nicht regelmäßigen Witterung (die ja meist auch noch in den Mai hinein so fort dauert) nur sehr langsam fortschreitet. Dagegen giebt es viele Borkenkäfer, welche bestimmt nur eine Generation machen. Ohne Ausnahme findet dies z. B. bei *Hyl. piniperda* (s. dort) Statt, wahrscheinlich auch bei den meisten übrigen Hylesinen und ganz bestimmt bei allen holzbohrenden Bostrichen. Ausnahmsweise sieht man auch wohl die Brut aller (bis auf *piniperda*), selbst der Holzbohrer überwintern und dann gestaltet sich Manches anders (s. *typographus* Leb. I.). Man sieht freilich die Borkenkäfer noch in den letzten Monaten des Sommers munter herumschwärmen, selbst bei uns noch an schönen Octobertagen. Dann sahe ich sie aber nie mehr sich einbohren um zu brüten — und wo man es beobachtete, geschah es nur sehr unvollkommen (s. *typographus* Leb. I. Anmerk.) — sondern nur, um für den Winter unterzukommen. Im bloßen Moose überwintern sie wohl nur ausnahmsweise. Dagegen haben wir wohl Beispiele einer länger als ein Jahr dauernden, einer fast zweijährigen Generation. Einmal glaubt Hr. Keller bei *Hyl. decumanus* (s. dort) so etwas beobachtet zu haben, und dann findet sich eine höchst bestimmte Andeutung bei Schmidberger (s. in Kollar's *schäd. Ins.* S. 272.). Er beobachtete nämlich einen Apfelbaumstamm, welcher von *Ecc. rugulosus* in der Mitte Mai's befallen worden war, in der Stube und fand, daß auch hier (also ungeachtet alle feindliche Witterungseinflüsse abgehalten worden waren) erst im Spätherbste die Larven vollständig erwachsen und erst Ende Februars im nächsten Jahre einige Käfer erschienen, so daß die ganze Brut nicht früher als April ihre Wohnung verlassen konnte. Um wie viel mehr würde sie sich verspätet haben, wenn sie nicht den ganzen Winter in der warmen Stube gewesen wäre! Wahrscheinlich kommt diese kurze Entwicklung auch noch bei andern Xylophagen vor, ohne daß wir es aber bestimmt nachweisen können. Es ist immer sehr schwer, recht viele Stämme, die gleichzeitig von einer und derselben Art angebohrt wurden, zu finden, so daß sie nach und nach untersucht werden könnten.

V. In der Auswahl der Bohrstelle, in der Anlage ihrer Gänge und dem Ausfluge zeigen sie die bewundernswürdigste Eigenthümlichkeit. Sie wissen wohl, daß Wärme und vermünderte Kraft des Saftlaufes ihrer Brut besonders willkommen ist und sie wählen daher am liebsten sonnige Plätze (an hohen Bäumen sehr oft die Gipfel) und die Gegend, wo starke Äste abgehen. Worin es liegt: daß einzelne Stämme ihnen besser gefallen als andre, ganz gleich erscheinende, dicht daneben liegende oder stehende, die sie nicht berühren, während sie jene von oben bis unten dicht bedecken, wissen wir nicht und dürfen es auch manchmal gewiß dem bloßen Zufalle zuschreiben. Immer geben sie dem durch die Rinde führenden Bohrloche eine solche Richtung, daß das Eindringen des Wassers möglichst verhindert wird. Auch vor dem zu starken Harzflusse wissen sie sich wohl zu hüten (s. *typographus* Leb. II. 11.). Einige treiben das Bohrloch nur bis in oder unter die Rinde (Borkenkäfer), oder bis ins Holz (Holzkäfer). Unter den ersteren gehen einige wieder nur bis in die eigentliche Rinde (Rindenkäfer) oder bis auf den Bast (Bastkäfer). Bei vielen Rinden- und Bastkäfern sieht man am Ende des Bohrloches eine Erweiterung, welche bei *B. typographus* (Leb. III. 2.) wegen der muthmaßlich darin Statt findenden Begattung Rammelkammer genannt wird. Bei den Holzbohrern aber bemerkt man eine solche Erweiterung nicht. Die Rinden- und Bastkäfer nagen nun von der Rammelkammer aus mehr oder weniger lange und der Breite des Thieres entsprechende Gänge (Muttergänge oder Gänge), in welchen sie rechts und links abwechselnd an jeder Seite ein Grübchen aufressen, in welches ein Ei gelegt und mit Wurmehl verklebt wird. Sobald die Larven aus den Eiern kommen, fressen sie sich Gänge (Larvengänge) abwärts (recht- oder spitzwinklig) von dem Muttergange und bereiten sich am Ende derselben eine Höhlung (Wiege), um sich daselbst zu verpuppen. Bei den Holzkäfern ist es ebenso, nur mit dem Unterschiede, daß schon die Verlängerung der Bohrlöcher oder auch Seitenarme derselben im Holze (welche oft die wunderbarsten dendri-

tischen Verzweigungen bilden) die Muttergänge sind, neben welchen die Eier gelegt werden. Eine große Verschiedenheit findet nun aber darin Statt: welche Gestalt, Länge und Lage die eine oder andre Art ihren Gängen giebt. Bei den Rindenkäfern sind dieselben am unregelmäßigsten. Es ist nämlich dabei Folgendes zu bemerken: Entweder bleiben Mutter- und Larvengänge in der Rinde (*cryptographus*), oder letztere kommen auch wohl bis auf den Bast (*B. Abietis*, *bicolor* und *pustillus*). Bei den allermeisten Bastkäfern hingegen unterscheidet man auf dem Baste die Muttergänge sehr bestimmt von den Larvengängen an der grössern und gleichmäßigen Breite. In der Regel gehen mehrere Muttergänge von einer Raumkammer ab, selten bloß einer. Sie laufen entweder (wie bei *Hyl. Fraxini* und *minor*) wagerecht (Wagegänge) oder (wie bei *typographus* und den meisten) lothrecht (Lothgänge) oder mehrere laufen sternförmig auseinander (Sterngänge) wie bei *Bostr. bidens* und *chalcographus*. Wenn man diese Gänge auf der abgenommenen Rinde von der Bastseite her betrachtet, so scheinen sie (besonders im Anfange des Brütens) keinen Zusammenhang zu haben. Das kommt daher, weil die Kammerkammer nicht immer ganz bis auf den Splint vertieft wird (s. *typographus* Leb. III. Anmerk.). Bei den allermeisten Arten frisst sich eine jede Larve von diesem Gange aus ihren gesonderten Larvengang und sie vermeiden sorgfältig jede Berührung. Bei einem Bastkäfer dagegen (*Hyl. micans*) machte Hr. Saxesen die interessante Entdeckung, daß die Larven in ganzen Truppen dicht gedrängt vorrücken und nur einen, aber sehr breiten Larvengang (Familiengang) fressen. Ähnlich ist es bei *Bostr. cryptographus*, nur daß dieser ein Rindenkäfer ist. Hier liegen Larven und Puppen auch in ganzen Klumpen beisammen im Innern der Rinde. Noch mehr: die Erscheinung wiederholt sich auch bei den Holzkäfern, denn ich habe schon mehrmals die Larven von *Bostr. Saxesenii* mitten im Holze auf einer Fläche von 3-4" Länge und 2-3" Breite gedrängt beisammen gefunden und eben so später die Käfer. Bei den Holzkäfern haben die Larvengänge eine höchst auffallende Kürze und werden später zur Wiege. Noch habe ich nicht mit Bestimmtheit dahinter kommen können: ob die Larven gleich nach ihrem Auskommen daran gearbeitet oder ob sie erst zur Verpuppung bereitet. Bei *Platypus* habe ich wenigstens mit Bestimmtheit gesehen, daß viele Larven dicht hinter einander in dem Muttergange saßen und sich sehr schnell darin bewegten. Und dann ist die Wiegenhöhle doch wohl zu klein, als daß sie zur Ernährung der Larven während ihres ganzen Wachstums Stoff genug hätte hergeben können (s. Stock bei *B. lineatus*). Es ist aber auch wieder nicht recht zu begreifen, wie die kleine, schwache, auskommende Larve den Holzdamm überschreiten kann, welchen die Mutter durch das Ausfressen des Eilochs zwischen diesem und dem Muttergange läßt. Nachdem ich noch zahlreiche Exemplare von Gangstücken des *Bostrichus lineatus* und *domesticus*, so wie des *Platypus cylindrus* verglichen und die Brut auch noch öfters lebend angetroffen habe, bin ich zu der Überzeugung gekommen, daß anfänglich die Larven bei diesen Arten allerdings nicht im Muttergange leben, daß sie später aber, wenn sie beinahe ausgewachsen sind, wohl in denselben gelangen können. Ich habe nämlich alle Übergänge in der Größe der Seitenhöhlen vor mir. An einzelnen Stellen, an denen das Ei gar nicht zur Entwicklung gekommen war, sieht man bloß die kleine, wie mit einer starken Nadel tief eingestochene, schön schwarze Höhlung, welche der Mutterkäfer zur Seite des Mutterganges genagt hatte. Als dann findet man an andern Stellen (s. auch den Stock zu *B. domesticus*) diese Höhlung in verschiedenem Grade erweitert, und zum Beweise, daß die Larve gleich nach ihrem Ausschlüpfen daran gearbeitet hatte, noch immer durch einen hohen, wenn auch nur sehr dünnen Holzdamm von dem Muttergange gesondert. Da hingegen, wo diese Höhlen die größtmögliche Ausdehnung erreicht und sich ganz schwarz gefärbt hatten, da fehlte auch der Damm und hier, möchte ich annehmen, sind die Käfer zur Entwicklung gekommen und haben sich, schon während sie ausgewachsene Larven waren, einen Weg zum Muttergange geholt. Daß nicht erst der Käfer den Damm wegnagt, möchte ich aus der Lage der Puppen schließen, welche ich bei *B. lineatus* bald mit dem After, bald mit dem Kopfe gegen den Muttergang hin gerichtet fand. Es wäre auch nur in diesem

Fälle das Erscheinen der Larven im Muttergange, welches ich bei *Platypus* beobachtete, zu erklären. Leider ist es lange her, daß ich so glücklich war diesen Fund zu thun, und ich war damals noch nicht darauf aufmerksam: wie sich die Seitenhöhlen verhielten. Daß es bei *B. dispar* gewiß und bei *B. monographus* und *dryographus* wahrscheinlich anders ist, findet man diesen ausführlich erwähnt. Es wurde daher nöthig, diesen auffallend verschiedenen Gangbildungen verschiedene Namen zu geben und ich habe für die des *B. domesticus* etc. wegen der Ähnlichkeit derselben mit der Zeichnung einer Leiter, wie sie hier und da üblich ist, den Namen Leiter-Holzgänge, und für die des *B. dispar*, wegen der Zweitheiligkeit derselben, den Namen Gabel-Holzgänge gebraucht. Auch wird es gut sein; die Familiengänge in Holz-Familiengänge und Rinden-Familiengänge zu unterscheiden. Bei den Rinden- und Bastkäfern pflegt auch viel Beständigkeit darin zu herrschen: daß die Wiege im Innern der Rinde (*Hyl. piniperda*), oder im Baste (*Bostr. Laricis*), oder wohl gar oberflächlich im Splinte (bei den meisten Arten von *Eccoptogaster*, und denen Bastkäfern mit Wagegängen, auch wohl ausnahmsweise bei *Bostr. bidens* und *chaleographus*) angelegt wird. Sobald die Käfer die Wiege verlassen, geben sie entweder wie z. B. die Holzkäfer durch die Bohrlöcher und Muttergänge heraus, oder, wie die Rinden- und Bastkäfer, aus neu gefressenen Fluglöchern, gewöhnlich erst, nachdem sie eine Zeit lang noch in der Rinde herumgewühlt haben, so daß die Fluglöcher keine bestimmte Ordnung gegen die Muttergänge beobachten. Nur bei denen, welche Wagegänge haben, macht dies eine Ausnahme, denn hier gehen die Käfer meist ohne Umwege grade durch die Rinde, und die Fluglöcher liegen ziemlich parallel den Muttergängen. Nach dem Ausfluge verweilen sie nie lange draußen, sondern sie suchen immer gleich wieder in oder unter der Rinde oder im Holze Schutz, mit Ausnahme des markzerstörenden *H. piniperda* (s. dort).

VI. Die Menge, in welcher sie erscheinen, ist nach den Arten sehr verschieden. Einige haben entschiedene Neigung sich leicht in unermesslicher Menge zu vermehren (*typographus*, *piniperda* u. A.), andre dagegen nicht, z. B. *H. micans*. Wie viele Arten aber immer selten sind, läßt sich zur Zeit noch nicht bestimmen, denn wir machen immer mehr die, freilich für den Forst nicht sehr erfreuliche Erfahrung: daß sonst für selten gehaltene, ja kaum gekannte Arten (*Bostr. Abietis*, *pityographus*) mit einem Male, wahrscheinlich aber nur nach sehr langen Pausen (Hr. Saxenat hat den i. J. 1834 und 1835 sehr gemeinen *B. Abietis* in den 10 vorhergehenden Jahren kaum in einem Dutzend Exemplare gefunden) sehr häufig werden.

VII. In Gesellschaft kommen meist mehrere Arten mit einander, und auch mit andern (schädlichen und gleichgültigen) Holzinsecten vor. Merkwürdig ist es, daß man *Colydium*, *Lymexylon*, *Rhizophagus*, *Hypophloeus* fast immer nur in der Nähe der Holzfresser und oft entschieden in deren Gängen schnarnter antrifft. Beweglichkeit und Lebenszähigkeit bei den meisten wie bei *typographus*.

FORSTLICHE BEDEUTUNG UND BEGEGNUNG richten sich nach der Häufigkeit der verschiedenen Arten, nach ihrer verschiedenen Flugzeit, den verschiedenen Gewächsen und deren Theilen, welche sie befallen, ferner danach: ob sie technisch oder physiologisch schädliche sind (s. S. 159.) u. dgl. In keiner Familie giebt es so viele und so sehr schädliche Arten, wie in dieser, und sie kann daher eine sehr schädliche genannt werden. Es sind (s. VI.) Arten, welche man für selten hielt, mit einem Male merklich schädlich geworden, und andre häufige Arten, die sich gewöhnlich nur gleichgültig zeigen (*B. stenographus*) auch merklich schädlich geworden, indem sie unvermuthet lebendes, gesundes Holz angingen, während sie sonst nur in totem leben. Keine Art ist daher für jetzt als absolut gleichgültig zu betrachten. Wenigstens müssen weitere Beobachtungen darüber erst entscheiden. Da jedoch in keiner Familie die Unterscheidung der Arten schwieriger ist und kein Buch von allen genügende Beschreibungen, noch viel weniger Abbildungen, giebt, so ist darauf hier die größte Sorgfalt und Ausführlichkeit verwendet. Bis jetzt kennen wir noch nicht für jede Art ein besonderes Begegnungsmittel, dieselben vervielfältigen sich doch

aber immer mehr, wenn auch nur in der verschiedenen Anwendung eines und desselben, je mehr wir die Arten unterscheiden und ihre Naturgeschichte genauer kennen lernen. Es wird sich also auch von dieser Seite eine gründliche Arten-Kenntniß belohnen. Das hauptsächlichste Mittel gegen alle besteht immer in der Vorbauung, d. h., abgesehen von der überall nöthigen Erziehung gesunder, besonders gut (namentlich bei Fichten durch zeitige und öftere Durchforstung bewirkte) in den Wurzeln befestigter Bestände, in der sorgfältigen Entfernung aller bruthbegünstigenden Gegenstände im Walde, also der Stöcke, Lagerhölzer etc. (s. *typographus* Leb. II.). Da jedoch Umstände (wie z. B. Wind- und Schneebrüche, Mißrathen der Culturen in Folge widriger Witterungs-Einflüsse, gewisse lästige Servitute, welche das Überhalten von Abstäudern, das Verwahren von Deputathölzern im Forste u. dergl. fordern) eintreten können und selbst bei der geregelten Forstwirtschaft diese Entfernung so schnell unmöglich machen, so werden wir doch auch immer von Zeit zu Zeit zu gewissen Vertilgungsmaßregeln schreiten müssen. Öfters fallen sie mit den gegen andre Insecten genommenen zusammen. So z. B. sind die Verheerungen, welche *Bostr. bidens* und *Bostr. Laricis* so wie *Hyl. angustatus* und *ater* auf Kiefern-Culturen anrichten, den durch *Curculio notatus* verursachten ganz ähnlich, ja alle diese vereinigen sich öfters an Einem Stämmchen und wir vertilgen sie daher zusammen durch Ausreissen und Verbreunen der Stämme. So findet sich unter den Holzfressern *B. chalcographus* fast immer mit *B. typographus* zusammen u. s. f., und diese vertilgen wir dann auch wieder gemeinschaftlich. Ein Mittel, welches nicht genug empfohlen werden kann, besteht in der Anwendung der Fangbäume. Sie belehren uns über die Menge der vorhandenen Borkenkäfer und liefern den größten Theil derselben in unsre Gewalt (s. *typographus*). Sie sind bei allen Nadelholz-Borkenkäfern, selbst den holzbohrenden, anwendbar, nur mit dem Unterschiede: daß letztere die außer der Saftzeit gefällten vorzuziehen scheinen (s. *Bostr. lineatus*). Gegen Laubholz-Borkenkäfer sind Fangbäume aber unwirksam, denn einige (wie z. B. *Hyl. Frazini*) gehen gar nicht in sie, und andre (wie z. B. *Bostr. monographus*) so langsam und so spät, daß sie schon deshalb ihren Zweck verfehlen. Es ist daher noch eine wichtige Aufgabe für den practischen Forstmann, auch für diese Fangapparate zu erdenken. Jedoch darf man sich auch wieder nicht allein auf die Fangapparate verlassen, denn öfters gehen die Käfer dicht neben ihnen, stehende und sogar ganz gesunde Bäume an, in denen sie, wenn man seine Aufmerksamkeit nicht überall hin wendete, sich ungehindert entwickeln und eine Pflanzschule für andre Bäume bilden würden. Auch darf man nicht unnöthig eine zu große Menge derselben fällen, weil dadurch die Untersuchung erschwert wird (s. weiter bei *typographus*). Es versteht sich, daß bei der Anwendung der Fangapparate hauptsächlich die Entwicklungszeit in Betracht kommt, daß wir nämlich dieselben nicht zu früh (in welchem Falle sie zu sehr vertrocknen) und nicht zu spät (wenn die Käfer schon wo anders angelogen sind) auslegen, daß wir sie zur rechten Zeit (wo möglich vor oder spätestens während der anfangenden Verpuppung der Brut) entrinden und daß endlich auch die Rinde sehr vorsichtig zerstört werde (s. *typographus* Begegn.). Als Feinde der Borkenkäfer sind auch hier noch einmal die schon oft genannten Raubkäfer zu erwähnen, ganz besonders *Clerus formicarius*. Unter den Vögeln beweisen sich ohne Zweifel die Spechte als die nützlichsten, obgleich man ihre Verdienste zu schätzeln gesucht hat. Die Sache ist interessant und darum erwähne ich sie schon hier ausführlich. Hr. Thiersch nämlich (*Forst. S. 21.*) beobachtete vom Spechte wie mit einem Spitzhammer eingehauene, wagerecht um den Baum in verschiedener Höhe herumgehende Löcher, welche wir auch hier an der Kiefer öfters sehen, an, nach seiner Meinung ganz gesunden, Fichten und hatte selbst Gelegenheit, den Schwarzspecht bei der Arbeit zu beobachten. Er vermuthet daher: der Specht sorge durch diese Verletzungen für den Anflug von Borkenkäfern, wenn er in der Gegend brüte und Insectenmangel fürchte, und fragt, warum der Specht die Löcher so regelmäßig mache, wenn er nach Insecten suche? Die Regelmäßigkeit der Löcher scheint mir aber noch nichts dafür zu beweisen, denn ich fand kürzlich wagerechte Reihen solcher



(wie mit Schrot No. 6 u. 7 geschossener) Löcher an Birkenrinde, unter welcher bei genauer Suchung Brut von *E. destructor* fraß.

Die EINTHEILUNG und BESTIMMUNG der ächten Xylophagen hat deshalb nur Schwierigkeit, weil die meisten Arten so klein sind, daß man sonst leicht erkennbare Theile wie Fühler (die auf den Tafeln vergrößert dargestellt sind) nur mit Hülfe von Mikroskopen gehörig untersuchen und dann doch noch irren kann, andrer kleinerer gar nicht zu gedenken: die danach so schön entworfenen Gattungen von Herrn Erichson (in Wiegmann's *Arch. f. Zool.* II. 1. S. 45.) können dem Forstmanne daher auch wenig bei der Bestimmung helfen, und ich muß, die analytische Übersicht derselben übergehend und sie bloß für die Synonymie benutzend, zu den ältern, auch neuerlich wieder von Gyllenhal benutzten, Eintheilungen von Herbst und Fabricius zurückkehren, um so mehr als die von diesen aufgestellten Gattungen und deren Namen die bekanntesten und von den meisten Forstleuten längst angenommenen sind. Daher können auch die von Latreille und andern Franzosen gemachten Änderungen der ältern Gattungen und Versuche neue zu bilden (*Tomicus*, *Hylurgus* u. A.) hier nicht berücksichtigt werden. Warum man nicht auch Linné's Gattung *Dermestes* ansprechen kann, davon ist S. 34 schon ausführlich gesprochen. Da übrigens grade die kleinsten Xylophagen oft viel leichter der Form und Skulptur nach als den Gattungs-Kennzeichen nach zu unterscheiden sind, so wird man oft am leichtesten geradezu nach den Abbildungen bestimmen können. Bei den wichtigsten Arten werden schon die Hölzer und die Gänge, in denen sie leben, die Bestimmung allein möglich machen oder wenigstens sehr erleichtern. So z. B. kommt in der Fichte mit Sterngängen nur *B. chalcographus* und mit breiten Lothgängen nur *typographus*, so in der Kiefer mit Sterngängen nur *B. bidens*, und mit breiten, graden Lothgängen nur *B. stenographus*, mit Wagegängen nur *H. minor* vor, in der Weifstanne mit Wagegängen nur *B. curvidens* u. s. f.

<i>Xylophaga genuina</i>	Alle Fugsglieder ganz	länger als die Schienen . . . . .	Gatt. <i>Platypus</i> .	Hbs.
		kürzer als die Schienen . . . . .	Gatt. <i>Bostrichus</i> .	Fabr.
	das 3te Fugsglied zweilappig	Unterseite des Hinterleibes vom 2ten Ringe an aufsteigend; Flügeldecken hinten nicht abschlüssig . . . . .	Gatt. <i>Eccoptogaster</i> .	Hbs.
		Unterseite des Hinterleibes nicht vom 2ten Ringe an aufsteigend; Flügeldecken hinten ab- schlüssig . . . . .	Gatt. <i>Hylesinus</i> .	Fabr.

#### Erste Gattung.

#### *Bostrichus* Fabr. Borkenkäfer. (Taf. XII., XIII., XIV.)

NAMEN. Der Name *Bostrichus* (von *βόστρος* Haarlocke?) bezeichnet gar nichts Wesentliches, eben so wenig der deutsche Name (es gehören ja sogar Holzkäfer hierher!), welcher nur wegen des langen Gebrauchs beibehalten wird.

CHARACTERISTIK. Die kurzen, ganzen Fugsglieder geben das durchgreifendste Kennzeichen bei den Käfern. Sonst characterisiren sie auch noch (besonders im Vergleich mit den Hylesinen) die meist vollkommen walzige Form, besonders des Halsschildes, welcher vorn nur verschmälert, aber nicht (oder nur unmerklich) eingeschnürt ist und daher kapuzenförmig über den Kopf sich wölbt. Kopf fast ganz kuglig, ohne Rüsselspur. Die Fühler daher dicht vor den (deshalb auch ansehnlich gebuchteten) Augen. Flügeldecken höchstens anderthalbmal länger als Halsschild. Unterseite des Hinterleibes vollkommen gewölbt, nie aufsteigend. Vorderhüften dicht an einander liegend. Die Geschlechter bei vielen leicht unterscheidbar und zwar durch Form des ganzen Körpers und des Halsschildes, so wie durch Behaarung und Zähne (s. S. 157.).

VORKOMMEN u. s. f. Die allermeisten sind Nadelholzfresser, jedoch giebt es auch Laubholzfresser unter ihnen und zwar verhältnißmäßig mehr als unter den Hylesinen. Die meisten leben zwischen Bast und Splint, ziemlich viele (Laub- und Nadelholzfresser) im Holze und auch einige in der Borke. Ihre Gänge theils Wage-, theils Loth-, theils Sterngänge, nur bei *curvidens* Wagegänge mit Splintwiegen (s. übrigens das Allgem. S. 164.). Unter ihnen sind die wichtigsten und verheerendsten Borkenkäfer und zwar für die Fichte. Technisch schädliche sind nur allein unter ihnen und kommen weder bei *Hylesinus* noch bei *Eccoptogaster* (nur bei *Platypus*) wieder vor.

EINTHEILUNG. Es giebt mehrere sehr gute, ohne Loupe wahrnehmbare Kennzeichen, nach denen wir die Borkenkäfer eintheilen können. Die schwierige Betrachtung der Gliederzahl der Fühler (bei deren Angabe ich hier und da von Hrn. Erichson abweiche) ist daher nicht nöthig beim Bestimmen. Hr. Erichson führt die mit 4gliedriger Keule versehenen hinter einander auf und nennt die mit 1gliedrigem Faden (T. XIII. F. b.) *Cryphalus*, die mit 5gliedrigem (T. XII. F. ef von *B. <sup>4gliedrig</sup> bistrichus*) *Bistrichus*. Dann folgen die mit fester Keule, welche er *Xyloterus* [mit viergliedrigem (T. XII. F. gh)] und *Crypturgus* [nach ihm mit 2gliedrigem, nach mir mit 4gliedrigem Faden (T. XIII. F. a von *B. pusillus*)] nennt.

#### A R T E N .

+ Nur in oder unter der Rinde lebende;

o an der abschüssigen Stelle (wenigstens beim Männchen) spitze Zähne.

1. *B. typographus* Linn. (Achtzähliger Fichten-Borkenkäfer.) (T. XII. F. 1 a-k T. XIV. F. 1-3 u. a, b).

NAMEN. Auch hier handelt es sich, wie bei *Curculio Pini* (s. S. 129.), um die Erhaltung eines Linné'schen Namens, des wohlbekannten *typographus* (und zwar, wohl zu merken, für gegenwärtige Art), weil derselbe bei den Forstleuten in der Mund- und Schriftsprache eingebürgert ist. Wir könnten ihn also nicht verwerfen, wenn er auch in anderer Hinsicht ganz unhaltbar wäre. Das ist er aber keinesweges, denn wenn es auch wahrscheinlich wird, daß Linné mehrere verschiedene Borkenkäfer unter dem Namen vor sich hatte, so ist doch mit Bestimmtheit anzunehmen, daß dieser der gemeinste bei ihm gewesen ist. Dafs er namentlich den (auch im Ganzen viel seltneren und in Fichtengegenden fast gar nicht vorkommenden) großen Kiefern-Borkenkäfer (*B. stenographus*) nicht vor sich gehabt hat (auf welchen Fabricius den Namen *typographus* bezogen haben will), geht aus der Bemerkung (*Faun.* ed. 2. No. 418.) „*elytra retusa marginato tridentata*“ (der obere sehr kleine Zahn wurde gar nicht mitgerechnet) hervor, so wie daraus, daß er den *piniperda* (der doch viel kleiner als *stenographus* ist) mit seinem *typographus* in der Gröfse vergleicht. — Borkenkäfer, Fichten-Borkenkäfer, Fichtenkäfer, Buchdrucker, Buchdrucker-, Capuz- oder Capuzinerkäfer, Rindenkäfer, fichtenzerstörender Rindenkäfer, Fichtenkrebs, Holzwurm, Tannenwurm, schwarzer oder fliegender Wurm, Buchstaben machender Hautfresser. Franz.: *le typographe*. Holld.: *Letzersetzer*. — Die durch ihn erzeugte Krankheit und Zerstörung der Fichten heifst: Baumtrocknifs, Wurmtrocknifs, Trocknifs, Wurmfrafs, Fichtenkrebs, Sohrung, Darre, Dürwerden, auch heifst sie frische während der noch nicht vollständig erfolgten Entwicklung der Brut, und alte nach dem Ausfluge derselben. Nach Herrn Wiegmann sen. heifst die Krankheit auch im nördlichen Frankreich *Teigne de Pins* (Fichten-Grind) und in der Schweiz Baumdürre. Die trocknenden Bäume heifsen auch hier und da Dürllinge. — Den *B. Cembrae* Heer bin ich, obgleich er sich in der Zirbel (*Pinus Cembra*) fand, doch geneigt hierher zu bringen. Er unterscheidet sich nämlich von den meisten Exemplaren des echten *B. typographus*, wie ich aus, mir von Herrn Heer gütigst mitgetheilten Exemplaren sehe, nur durch etwas gestrecktere Form, hinten ziemlich grob punktirten Halschild, eine vollständige Punktreihe der Zwischenräume und runzlich-punk-

trite, glänzende (nicht matte, feinpunktirte) schräger abschüssige Stelle der Flügeldecken. Allein bei genauerer Musterung meiner ganzen Vorräthe von *typographus* finden sich Exemplare genug (meist kleine) welche dieselbe Bildung und Übergänge zu derselben zeigen (s. auch Heer *obs. ent.* p. 28. Tab. V.)

CHARACTERISTIK. 2" bis 2,7" lang und 1,2" breit, fast ganz walzig und gedrunken, vorn und hinten nur wenig und plötzlich verschmälert. Halsschild bis auf eine sehr schmale, glatte Mittellinie punktirt und höckrig. Schildchen klein, eben und glatt. Abschüssige Stelle stark eingedrückt, am Rande jederseits mit 4 Zähnen, deren dritter der grösste ist. Die Weibchen sind grösser und etwas breiter als die Männchen, haben ein kleineres Körnchen über der Mitte des Kopfschildraudes (T. XII F. 1 u. a.), überhaupt rauheren und mehr höckrigen Kopf und (frisch) etwas schmalere, spitzere Keule der weniger stark behaarten Fühler (F. L.), auch stärker behaarte Stirn. Die Farben variiren vom hellsten Strohgelb bis zum dunkelsten Braunschwarz (s. die 3 color. Fig. in natürl. Grösse neben Fig. 1.).

VORKOMMEN nur in der Fichte, diese aber bis auf hohe Gebirge und weit nach Norden begleitend. In andern Nadelhölzern ist er nur äusserst selten, bei uns in Kiefern nie. Ohne den Berichterstattnen, wegen der leicht möglichen Verwechselung, grosse Vorwürfe damit zu machen, müssen wir ihre Angabe darüber meist für unzuverlässig erklären. So soll er nach Bechstein (S. 176.) und Feistmantel (*Forstwiss.* I. 355.) auch in Kiefern, Tannen und Lärchen, selbst in fremden Nadelhölzern sein. Nach Gleitsch (*Abhdl.* S. 120.) soll er sogar Kiefern verwüsten. v. Sierstorpf (*Wurmtrocknu.* S. 22.) entdeckte ihn während der grossen Wurmtrocknuis nur auf wenigen Kiefern und Lärchen, welche auch, wahrscheinlich weil seine Brut darin nicht ausgebildet wurde, bis auf eine Lärche, nicht davon vertrockneten (\*). Im Elwang'schen, wo er mit Fichtenholz in die Dörfer gekommen war, soll er (aber gewiss *Eccoptogaster*) sich sogar in Pflaumenbäume eingebohrt haben (Hartig *F. u. J. Arch.* J. I. H. IV. S. 82.). Nach v. Lyncker (*bes. Forstm.* I. 58.) wären sogar einmal Käfer und Larven in dem eines Fingers dicken, halb verfauten Schafte des *Viscum album* gewesen! Unbezweifelt ist es, dass er in aus Kiefern und Fichten gemischten Beständen vorkommt (der prakt. Forstm. in Krutzsch *Borkkäf.* S. 74. und Hartig's *Forst. u. J. Arch.* H. IV. S. 58.) und einzelne Fichten in grossen Laubholzrevieren befällt (Hr. v. Berg in Pfeil's *crit. Bl.* X. 1. S. 126.). Dagegen ist es auffallend, dass der Käfer einzelne, freistehende, von grossen Beständen entfernte Fichten nicht befällt. So ist er z. B. im Thale'schen Reviere auf den einzelnen Fichten der Klippen noch nicht bemerkt (Hr. Pfeil), eben so wenig in den einzelnen Stämmen um Clausthal, wo so viele Käfer mit dem Holze angefahren werden (Hr. Saxesen).

LEBENSWEISE. I. Von der Entwicklungszeit und dem Einflusse, welche Witterung und Ortslage darauf haben. So verschieden, wie die Angaben über Generation der Borkenkäfer überhaupt sind, so verschieden sind sie auch beim *typographus*. Glücklicher Weise sind in den neuesten Zeiten Beobachtungen angestellt, denen wir trauen können. Sie rühren von Hrn. v. Berg (Pfeil's *crit. Bl.* B. X. H. 1. S. 122.), Hrn. Thiersch (*Forstk.*) und Hrn. Pape (*Manusc.*), so wie auch Hrn. Rettstadt (Liebich *a. a. O.*) her. Diese sahen den Beginn der Brut am Anfange oder in der Mitte des Mai, selten schon im April. Schwärmen die Käfer dort früher (Hr. v. Berg beobachtete dies schon einmal im Februar!), so fliegen sie doch nicht gleich an, sondern die wiedereingetretene Kälte vertreibt sie noch einmal. Die Brut gebrauchte nach Hrn. Pape und Hrn. Thiersch (\*\*) 12-13 Wochen bis zum Ausfluge

(\*) Was er an einem andern Orte (*inl. Holz* II, S. 96.) von dem Vorkommen in Kiefern sagt, ist wohl das Zuverlässigste und Interessanteste. Die Käfer hatten hier nämlich Gänge gefressen, welche von jenen in Fichten ganz verschieden waren und auch nur wenige Eier entwickelt hatten. Die Kiefern hatten zwar trockne Stellen und gelbere Nadeln, schienen aber doch nicht trocken zu werden.

(\*\*) Hr. Pape hatte in den bruthelfördernden Jahren 1833 u. 34 an einem südöstlichen, ziemlich tief am Innerst-Thale, also günstig liegenden Abhange die ersten flugfertigen Käfer nach 8 Wochen, <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Anflug, <sup>1</sup>/<sub>2</sub> die ersten 4 Eier,

(am Ende des Juli bis in den August), nach Hrn. v. Berg (a. a. O. S. 123.) auch wohl nur 10-11 Wochen. In noch kürzerer Zeit dürfte jedoch selten die vollkommene Ausbildung einer Vorsommerbrut erfolgen [wobei ich selbst die an hiesigen Borkenkäfern gemachten Erfahrungen (s. *Hyl. piniperda*) zu Hülfe nehmen möchte]. Länger kann sie dagegen in ungünstigern Jahren dauern (nach Hrn. Rettstadt 14-16 Wochen). Ereignet sich demnach das Maximum der Brutzeit (meist wohl mit schlechtem Sommer vereint) und ein später Ausflug, so gäbe es, wenn wir den September und oft schon im Gebirge den August, als der Brutentwicklung ungünstig erachten, eine einfache, beim Minimum dagegen (wobei also Witterung des ganzen Sommers und besonders beim Anfange der Brut und bei der Verpuppung u.s.f. in Anschlag zu bringen wäre), eine doppelte Generation oder eine anderthalbige. Tritt der Anfang der zweiten Brut schon früh, im Juli, ein, so kann die Ausbildung, wenn das Wetter günstig ist, auch desto eher erfolgen, nach Hrn. Pape bequemt in 6-8 Wochen, also in kürzerer Zeit als die Vorsommerbrut, wobei die gleichmäßigere Wärme um diese Zeit, besonders die warmen Nächte, in Anschlag zu bringen sind (\*). Sollte diese Brut auch noch zum Ausfluge kommen (in Ostpreußen bemerkte Hr. Pfeiffer in dem sehr warmen Herbst 1835 noch  $\frac{1}{2}$  das Schwärmen der Borkenkäfer auf freiem Felde an den Waldrändern und Hr. Rettstadt im Harze das Anbohren einzelner Käfer der 2ten Generation an Nordseiten noch Mitte Septembers und an Südostseiten bis zu der Mitte des Octobers), so wird sie sich gewiß nicht mehr begatten (s. auch v. Wedekind *N. Jahrb. d. Forstk.* H. 12. S. 139.). Von 3- und 4facher Generation kann also nicht die Rede sein. Man nimmt dann jeden neuen Ausflug für eine neue, diesjährige Brut. Es können aber den ganzen Mai und Juni, ja selbst im Juli noch, nach Hrn. Pape, Käfer anfliegen, welche von zu verschiedenen Zeiten des vorjährigen Nachsommers angefangenen Bruten herrühren und sich nach der Localität sehr verschieden entwickeln. Grade die überwinterten Larven entwickeln sich sehr ungleich und meist sehr langsam, viele derselben gehen sogar ganz ein und daher will Hr. Rettstadt die Pause des Anfliegens erklären, welche häufig im Juni bemerkbar wird. Demnach sind die wichtigsten Auctoritäten dafür: daß die Regel eine einjährige und nicht eine doppelte Generation sei.

II. Von der Auswahl der Brutplätze und des Brutmaterials. Sobald die Käfer durch zu erwartendes, beständiges Frühlingswetter (gewöhnlich mit dem Entfallen der Buchenknospen) in ihren

abgelegt:  $\frac{1}{2}$  schon 20 Eier abgelegt;  $\frac{1}{2}$  schon 58 E. abgelegt und die ersten Larven da:  $\frac{20}{100}$  in dem (nun 5 $\frac{1}{2}$  langen) Gange 82 E. (die letzten) abgelegt;  $\frac{1}{2}$  die ersten und  $\frac{1}{2}$  die letzten Puppen;  $\frac{11}{100}$  junge hellgelbe Käfer;  $\frac{1}{2}$  bräunliche Käfer. Sie gebrauchten aber noch 28 Tage (also bis Ende Juli, so daß sie fast 13 Wochen alt wurden) um sich gehörig zu erhitzen, zu brennen und auszufliegen. Im J. 1834 flogen sie noch einmal an und erreichten ihre Vollkommenheit zu Verhältniß der Ortslage in 6-8 Wochen. Hr. Thiersch (*Forstk.* S. 2 und 9.) erhielt in den weniger günstigen J. 1826 (bei 2000' Höhe) ein ganz ähnliches Resultat, indem der Ausflug  $\frac{1}{2}$  geschah und  $\frac{1}{2}$  die ersten und Ende August die letzten jungen Käfer ausflogen. Er sah sogar in den günstigen J. 1826, 27 u. 28 nur eine einzige Generation mit großer Bestimmtheit, denn die Käfer flogen immer erst im nächsten Frühjahr aus, wie die ausgelegten Fangbäume zeigten. Im J. 1816 fanden sich im Juli noch Larven und Puppen (Hr. Saxsen und Hr. v. Hammerstein), die Brut wird also nur so eben reif geworden sein. — Was die Art und Weise betrifft, wie obige Beobachtungen angestellt worden sind, so bemerke ich Folgendes: Es wurden entweder ganze Stämme oder 3 Ellen lauge und 30-35" starke Klötze dicht am stehenden Holze hingelegt. Sobald der Ausflug bemerkt war, wurden die gleichzeitig gemachten Bohrlöcher gezeichnet und nun von Zeit zu Zeit ein Gang geoffnet, natürlich immer ein neuer, aber von demselben Alter.

(\*) Über das verschiedene Verhalten einer 2ten Brut theilt uns Hr. Rettstadt folgende interessante Beobachtungen mit: An 6 Fangbäumen waren  $\frac{1}{2}$  noch mehrere Käfer angefliegen, sie zeigten aber eine geringere Lebensfähigkeit als die des Frühjahrs, machten kürzere und weniger regelmäßige Gänge und in den Bohrlöchern und Rammelkammern fanden sich einzelne todt oder scheinodt, auch in den Muttergängen waren sie nicht so zahlreich. Die Entwicklung der Brut ging bis Ende Octobers immer noch vor sich, aber sehr langsam, und nur bis zum Larven-Stadium.

Winterquartieren oder den Schlopfwinkeln, welche sie nach einem zu voreiligen Ausfluge suchen mußten, geweckt werden, oder wenn ihre Kinder zeitig genug im Sommer ausfliegen [was gewöhnlich bei stillen, wolkenlosen, warmen Tagen nach warmem Regen gegen Mittag geschieht (die Abendswärme sind mehr als die ersten Proben der Flugkraft zu betrachten)] beziehen sie entweder sogleich die Brutplätze, oder sie erheben sich, wie es scheint, um die passenden erst auszuspähen, in dichten Schwärmen hoch in die Luft. Was nun diese Auswahl der Brutplätze betrifft, so findet da wieder die größte Verschiedenheit Statt, wie ebenfalls bereits mit allgemeinen Zügen S. 132 angedeutet wurde. 1) Die Käfer hausen, wie Bechstein und Thiersch (*Forstk.* S. 4.) sagen, lieber in den hintern (tiefern), als in den vordern (Rand-) Wäldern und zwar, weil sie dort immer mehr passende Brutörter als hier finden, wo Nutz- und Brennholzer, die hier dem Stehlen mehr ausgesetzt sind, nicht lange stehen bleiben, auch, wegen der bequemern Abfuhr, mehr Holz (also auch das kränkelnde) verschlagen wird. Daher sind auch, wie Bechstein (*Forstins.* S. 177.) richtig bemerkt, die gesunde Bäume in den Vorwäldern viel eher der Gefahr ausgesetzt und wir sehen hier die Käfer sich zuerst an 80-100jährige Stämme einbohren. Diese werden dann oft viele Jahre bewohnt und erhalten, oft aber auch sogleich zerstört. 2) Sie fliegen lieber sonne als schattige (\*) Stellen, namentlich vor Haugungen, welche südlich in Thälern liegen, so wie in angelichteten oder durch Windfall lückigen Beständen, an; lieber trockene, hoch gelegene als niedrige sumpfige. An Bruchränder konnte man sie nicht einmal mit Fangbäumen huiolocken (Hr. Pfeiffer). In Gebirgen halten sie sich im Ganzen lieber und häufiger, und werden öfter gefährlich als in der Ebne, wahrscheinlich weil sie dort wegen der häufiger und heftiger einwirkenden Stürme, welche auf dem flachgründigen Boden überdies die Bäume leichter umwerfen, eher das geeignete Material zur grössern Vermehrung finden. 3) Sie wählen lieber liegendes als stehendes Holz. Zu dem liegenden Holze rechnen wir die ganzen Stämme, (Verfalle, Hollenden, Bauholzer, Blocher, Brunneuröhren, Wind- und Schneebrüche), die Klastern oder Maltern (deren einzelne Stücke Kloben, Scheite oder Klüfte genannt werden) und dann auch noch die ungerodeten Stücke, welche besonders da, wo man das Stammende sehr lang läßt, den Käfer anziehen, sogar (jedoch selten) starke abgehauene Äste, in welchen Hr. v. Berg den Käfer sahe. Neuere Nachrichten von Hrn. Pape geben einen hübschen Beitrag zur Aufstellung von Zahlenverhältnissen. Im Laufe des Sommers 1837 wurden z. B. im ersten Lautenthaler Forstreviere in Folge der Borkenkäfer-Anfälle geschätzt: a) Anscheinend gesunde Stämme = 1. b) Kranke, d. h. von Stürmen u. dgl. beschädigte = 58. c) Verfalle, d. h. mit den Wurzeln aus der Erde gebrochene, also zum Theil noch vegetirende Stämme = 3948. d) Hollenden, d. h. über der Wurzel abgebrochene Stämme = 3986. 4) Unter den Verfällen ziehen sie die auf dem Stamme abgebrochenen den mit der Wurzel umgeworfenen, und unter den liegenden Hölzern ziehen sie wieder die frisch gefällten den frisch geworfenen oder gedrückten, geschoben und sonst verstümmelten (denen sie wieder die stehenden wurzelranken vorziehen) vor, ja Thiersch (*Forstk.* S. 4.) sahe sie schon 2 Stunden nach der Fällung die kräftigsten Stämme mit der größten Begierde anbohren und

(\*) Wenn man sie auch mitunter an den dunkelsten Stellen des Waldes findet, so ist dies gewiß nur eine Ausnahme und kann in Mancherlei seinen Grund haben. Der Käfer kann solche Stellen besonders zu einer Zeit gesucht haben, wo ihn an freier Stellen zu große Hitze belästigte und wo sich grade hier die Rinde frisch erhalten hatte. An Klastern kann man auch nicht immer wissen, ob sie nicht schon mit der Brut an solche Stellen kamen u. dgl. Wie sehr die Käfer sonst sonnige Stellen (besonders wenn kränkelige Bäume dort sind, Wurmpflanze genannt) den beschatteten vorziehen, zeigt besonders der von Thiersch (S. 6.) angeführte Fall. Drei Fichten waren durch das schnell nöthig gewordene Herausnehmen mehrerer Nutzholzer an ihren Gipfeln der Mittagssonne bloßgestellt worden und zeigten bald darauf hier den Käfer, während 23 Ellen hoch über dem Boden nichts von ihm zu merken war (hier hatte sich *Sirex* eingestellt). Auch in Gmelin (*Wurmr.* S. 38. und Anhang S. 45.) findet man dies bestätigt. S. auch Hr. Rettsstadt in Liebig *Allg. F. u. J. J. T. V.* S. 91.

sie aus weiter Ferne her aufsuchen. Nach Hrn. v. Sierstorff (*Wurmtr.* S. 35.) suchen sie unter den Windfällen und dem gefällten Holze stets das frischeste aus und verlassen ein altes Stück, in welches sie sich schon eingehohlet hatten, wieder, um frischeres zu suchen; verlassen auch die einzeln von ihnen bewohnten lebenden Stämme, sobald man ihnen gefälltes grünes Holz hinwirft (S. 44.), (daher auch die Wirksamkeit der Fangbäume). Die Zeit, in welcher abgestorbenes Holz nicht mehr von ihnen angegangen wird, genau zu bestimmen, ist sehr schwer (s. Begegnung). Die Erfahrungen, welche man darüber gemacht hat, sind bisher unerklärlich geblieben. Manche Stämme werden nicht angerührt und andre dicht daneben ganz bedeckt (Sierst. 47.), eben so wie am stehenden Holze oft stark verletzte, angeharzte Stämme und halb abgebrochene stehen bleiben und ganz unverletzte dicht daneben angegangen werden (v. Sierstorff S. 37.). 5) Da nur die Rinde Nahrung für ihre Brut giebt, so wählen sie möglichst vollständig berindete Stämme oder Stammtheile und meiden die entrindeten oder auch nur streifenweise geschälten, welche letztere (besonders wenn die Streifen breiter als 2" sind) im Nothfalle jedoch auch angegangen werden. 6) Stücke wählen sie zum Brüten ungern, wenigstens entwickelt sich die Brut in diesen nur unvollkommen und sie sind in dieser Hinsicht weniger gefährlich als anderes Material. 7) An Klaftern werden in der Regel die untern Kloben, wegen Mangel der gehörigen Wärme, verschont und nur die obern Reihen besetzt, wovon ich mich selbst beim Sammeln der Käfer im Harze überzeugt habe. Jedoch ist darauf nicht unbedingt zu vertrauen, denn Hr. v. Berg (Pfeil's *crit. Bl.* X. 1. S. 127.) und Hr. Rettstadt fanden die Käfer, besonders im heißen Sommer, auch in der Mitte und unten. 8) Das im Saft gefällte Holz zieht er dem alten, mehr oder weniger getrockneten, vor, weshalb auch frische Fangbäume (welche nie zu alt sein dürfen) so wirksam sich zeigen, eben so wie auch die im Herbst abgedornten Stämme den Borkenkäfer-Angriffen weniger ausgesetzt sind, als die früh im Jahre abgestorbenen (Borhütinsky in v. Wedek. *N. Jahrb. d. Forsth.* H. 10. S. 12.). 9) Auch das im Winter gefällte Kastenholz (welches sich ja eigentlich von den im Winter geworfenen Windfällen in Nichts unterscheidet) wird im Frühjahr nicht verschont, wobei jedoch die Zeit, welche es zum Austrocknen hatte, wie auch das Spalten in gröbere und feinere Kloben (s. Leb. VI.) sehr in Betracht kommen (v. Berg a. a. O. S. 120.). 10) Unter den stehenden Bäumen wählen sie lieber kranke als gesunde, und wenn es auch einmal umgekehrt ist (s. II. 4.) so geschieht das doch nur ausnahmsweise, ist aber immer auffallend (s. auch Hrn. Rettstadt in Liebig J. V. S. 91. und Jester in Hartig's *F. u. J. Arch.* H. IV. S. 56.) und kann nicht immer bloß in etwas Zufälligkeit seinen Grund haben (besonders in geschlossenen Beständen), sondern in dem Zustande der Baumäfte, in der mehr sonnigen oder schattigen Lage der Bäume. Bei beschränkter Verbreitung des Insects kann man immer an den von ihm befallenen Bäumen eine Krankheit nachweisen. Entweder sind einige Wurzeln trocken, obgleich der Baum noch grün und sonst gesund aussieht (Hr. Pape), oder die Stämme sind unterdrückte und überwachsene (Kruttsch S. 73.), oder ihre Gipfel oder einzelne Gegenden derselben wurden plötzlich licht gestellt (Thiersch), in welchem Falle nur eine lokale Krankheit vorhanden sein kann, oder endlich viele Bäume sind auch gleichzeitig durch Lüftenrauch in einen kränklichen Zustand versetzt (s. v. Berg I. 1. 125.). Köhlerr Rauch, selbst wenn er in dichten Wolken durch die Bestände zieht, hat gar keinen Einfluß auf den Käfer, wie ich selbst erfuhr, selbst in Schwefel- und Arsenikdämpfen soll sich der Käfer ganz wohl befinden (v. Sierstorff *Wurmtr.* S. 28.). 11) Das Lackuspapier giebt aber kein Zeichen für eine Krankheit, denn dasselbe wird vom Saft gesunder wie kranker Fichten geröthet, ja sogar mehr von saftreichen und weniger von wurmfräßigen (gewöhnlich welkeren, saftleeren) Stämmen (Hr. v. Berg in Pfeil's *crit. Bl.* X. 1. S. 119.). 12) Der Käfer wählt lieber gesunde, zuerst besonders vor den geschlossenen Orten an der Sonnenseite oder auf kleinen Blößen stehende, als gar keine Bäume. Gar keine kann man wohl dann sagen, wenn keine, zur Aufnahme seiner ungeheuer vermehrten Brut geeigneten mehr da sind, oder das außer den gesunden Stämmen vorhandene Holz schon zu sehr ausgetrocknet oder

schon von andern Käfern zerstört und durchwühlt ist. Ob er die gesunden aus Hunger oder Bruttrieb oder sonst Etwas wählt, ist hier gleichgültig, genug er befällt sie, wie die Geschichte (s. Begegnung) lehrt. Ob die befallenen wirklich gesund oder nur scheinbar gesund sind, ist hier auch gleichgültig und nur das wichtig: daß sie ohne den Borkenkäfer nicht gestorben wären (wie ja selbst Hr. Thiersch zugesteht). Ob wir jemals Bestände werden erziehen lernen, die dem Borkenkäfer, wenn man ihm freien Lauf läßt, unzugänglich sind, steht sehr zu bezweifeln, denn man hat ihn, wie die Geschichte lehrt, in dichten wie in lichten, in alten wie in jungen, in Berg- wie in Ebenen-Beständen, auf gutem wie auf schlechtem Boden gehabt. Auf derselben Stelle, wo man am Harze nach jedem Windbruche Anfälle von Wurmtrockniss hatte und von Zeit zu Zeit ganze Bestände einbüßte, weiß man jetzt nichts mehr von so ungeheuren Schäden, trotz Dürre, Frost und Stürmen, welche in den letzten Jahren doch beisspiellos wütheten und eine den Borkenkäfern erwünschte Pflanzen-Epidemie hätten herbeiführen können. Warum nicht? Weil man seit jener Zeit den Käfer nicht mehr aufkommen läßt (s. auch Begegn. Schlufs). Wie er die gesunden Stämme bezwingt, ist auch nicht so sehr schwer nachzuweisen und es ist dabei gar nicht einmal eine solche Niederlage der zuerst Stürmenden im Harze, die man gewöhnlich annimmt (denn gesehen hat davon Niemand viel), nöthig. Der Käfer verfährt dabei mit solcher Vorsicht (s. Anmerk. zu III. und die Zusätze zum Allgemeinen III der Holzfresser), daß man wohl sieht, er ist auf etwas nicht Gewöhnliches gefaßt. Schon in einem ältern Buche (v. Haas *Borkkifer* S. 57.) heisst es: „Wenn der Käfer einen frischen Baum angreift, so bleibt er anfänglich nur in der trocknen Rinde, wo sich ihm kein Hinderniss entgegenstellte. Er macht sich zuerst in dieser einige Gänge mit mehreren Öffnungen (die Muttergänge mit den Luflöchern). Bedarf er einer Fütterung, so nimmt er sie bei einer oder der andern Öffnung von der zarten Basthaut. Der Saft tritt nun zwar aus, doch fließt er nicht so schnell und der Käfer hat Zeit, in seinen Gang zurückzugehen, ohne daß er erstickt wird.“ 13) Der Käfer soll selbst Fichten in dichtem Schlufs, von kraftvollem Wuchs, einer Länge von 70 Ellen, befallen, die schlankesten am meisten (der prakt. Forstn. in Kru t z s ch *Borkk.* S. 53., Gmelin *Wurmt.* S. 35.). 14) Er geht lieber altes als junges Holz (unter 50 Jahren) an, wahrscheinlich weil ihm dies zu schnellwüchsig ist (Hr. Kellner), oder auch weil er ein leichteres Austrocknen der dünnern Rinde fürchtet. Zuletzt werden aber auch die schwächsten Stangenhölzer [selbst die sogenannten Picktannen (s. v. Sierstorpff S. 30.)] befallen, wobei jedoch die andern Arten (*B. chalcographus*, *Abietis*, *pusillus* u. A.) das Meiste thun mögen (v. Berg l. l. S. 119.). 15) Die von ihm befallenen lebenden Stämme sterben allermeist sehr bald (meist noch in demselben Jahre), können jedoch auch, wenn die Angriffe nicht zu heftig waren, noch Jahre lang fortleben. Nach Hrn. Saxen giebt es am Eyersberger Stämme, welche allmählig von oben nach unten absterben und absichtlich übergehalten werden, damit sie eine Schutzwehr gegen den Hüttenrauch bilden. Hr. Thiersch (l. l. S. 5.) kennt auch Bäume, welche nur oberflächliche Bohrlöcher zeigen, so daß die Rinde wie mit einem nicht scharf schießenden Gewehre angeschossen schien (l. l. S. 5.) (doch nicht *Anobium emarginatum*? s. S. 52.). Im Ganzen sind diese Beispiele aber wohl bei *B. typographus* selten zu nennen, denn Hr. Kellner, der auch viel gesehen hat, fand stets, daß da, wo sich *B. typographus* einmal eingefunden hatte, die Stämme auch gewis im 2ten Jahre abstarben.

III. Von der Auswahl der Bohrstellen und der Anlegung der Gänge. Es scheint, als wenn die Bohrstelle dem Käfer nicht gleichgültig wäre, denn man sieht sie öfters vor dem Einbohren emsig umherkriechen, wobei so mancher von *Clerus formicarius*, von Libellen und Laufkäfern erschreckt, Sierstorpff (S. 16.) sahe ganze Schwärme zugleich sich an einem Stamme einbohren und die schon nach einer halben Stunde nicht mehr sichtbaren frassen in der Rinde mit hörbarem Geräusche. Unter günstigen Umständen ist das Bohrloch in einigen Stunden vollendet, bei kaltem Wetter und in dicker Borke alter Stämme manchmal erst nach einer Woche (Hr. Rettstadt). 16) Am liebsten fliegen sie die Bäume in ansehnlicher Höhe an, gewöhnlich da, wo die untere Beästung anfängt oder auch am Gipfel (nur wahr-

scheinlich deshalb, weil hier die Rinde dünner und glatter ist), nach Hrn. Förtsch nur dann das Stammende, wenn unvorteilhafte Witterung das hohe Schwärmen verhindert; besonders fangen sie (wie die meisten Borkenkäfer) in den Quirlgegenden gern an (wahrscheinlich, weil hier die Säfte langsamer fließen). Daher darf man diese Partien nicht übersehen und den Baum nicht für frei halten, wenn unten am Stamme nichts zu sehen ist (Kennzeichen s. b. Begegn.). 17) Sie fangen gern bei alten starken Bäumen unter einer etwas abstehenden Schuppe an zu bohren und vermeiden es klüglich, nicht unnütz dabei auf zu zahlreiche Rindenschuppen zu treffen (v. Berg). Das (nach Thiersch vom Weibchen allein gefertigte) Bohrloch geht im stehenden Holze schräg nach oben (so daß Wasser nicht hineinläuft). Unmittelbar unter der Rinde wird (etwa in 3 Tagen nach Hrn. Pape) die Rammelkammer angelegt, in welcher (und nicht wie Bechstein angiebt, in der Luft) auch nicht aufsen auf dem Stamme (welches Thiersch und v. Berg in Abrede stellen) die Begattung vollzogen wird. In der Rammelkammer findet sich wenigstens 1 Käferpaar, aber auch deren mehrere, wohl 10-11, so daß Hr. Pape sie ganz voll gepfropft von Käfern fand. Herrn Rettstadt's (Liebich a. a. O. S. 92.) Vermuthung, daß einige der hier befruchteten Weibchen wieder herausgingen und neue Bohrlöcher und Muttergänge anlegten, findet deshalb besonders Glauben, weil man oft Muttergänge (einarmlige) ohne Rammelkammer sieht. Von der Rammelkammer führen, je nachdem viel oder wenig Käfer darin waren, die Muttergänge (\*) nach unten und oben, zuweilen nur einer, aber gewöhnlich deren mehrere bis 5. In jedem Muttergange (worin Hr. Rettstadt 1 Männchen und 2-3 Weibchen fand) werden 2-5 Luftlöcher angelegt, welche die äußerste Rinden-Schicht nicht ganz durchdrehen. Die zu jeder Seite (die ersten 4-6" von der Rammelkammer entfernt) abgelegten Eier (20-60, nach Hrn. v. Berg und Hrn. Thiersch auch wohl über 100 bis 130!) werden mit Wurmehl verklebt. Die auskommenden Larven machen zierlich geschlängelte, auch auf dem Splinte mehr oder weniger bemerkbare, immer breiter werdende Gänge und verpuppen sich am Ende derselben im Baste oder in der Rinde. Die Muttergänge sind 2-6" lang. Nach Hrn. Pape ist der Muttergang am unregelmäßigsten und kürzesten, dabei auch die Eier am gedrängtesten (gleich als ob der Käfer das ganze Geschäft hätte beschleunigen wollen), wenn der Saftandrang dem Käfer zu stark ist, oder auch wenn der Käfer noch ungewöhnlich spät im Nachsommer anflieg. Wenn 2 oder mehrere Gänge neben einander hinlaufen (was man sehr häufig sieht, so z. B. an einem Stücke kaum die Breite von 6" einnehmend, so auch die untere Partie der beige gedruckten Abbildung) so fallen sie höchst selten in einander, und wenn es dennoch geschieht, so verfolgen beide Käferpaare nicht Einen Gang, sondern das eine entfernt sich sogleich durch Anlegung eines neuen Ganges (Hr. Pape). Hrn. Pape verdanke ich eine Sammlung seltener, abnormer Gangbildungen, unter welchen besonders die von 2 Rammelkammern ausgehenden, einen geschlossenen Kreis von 6-8" Durchmesser bildenden und dann einige strahlenförmige Zweige mit Luftlöchern abschickenden ☐ die


(\*) In jedem Gange sieht man 1 Käferpaar, ausnahmsweise auch wohl 3 Individuen, welche gemeinschaftlich an der Verlangung des Ganges arbeiten. Beide bewegen sich dicht hinter einander rückweise, zerkrösen dabei den Bast und schaufeln die Abfälle hinter sich. Haben sich letztere sehr angehäuft, so werden sie von einem oder auch von beiden Käfern bis zur Rammelkammer zurückgestoßen und hier zum Bohrloche hinausgeworfen. Dies ist das, Anfangs so lange es noch feucht ist, dunklere, später hellere Wurmehl, welches man an wurmtrocknen Bäumen hängen sieht. Hr. Pape, dem ich diese genauen, schätzbaren Beobachtungen verdanke, vermutet, daß die Käfer, vielleicht einer wiederholten, nur an diesem geräumigern Orte möglichen Begattung wegen, von Zeit zu Zeit nach der Rammelkammer zurückkehren und daselbst verweilen, weil letztere besonders bei vollsaftigen und diekborkigen Bäumen Anfangs nur in der Rinde liegt (s. auch II. 11.) und erst später nach und nach bis auf den Splint vertieft wird, wodurch ihre Höhe also immer bedeutender wird (II. 11.). Während des Eierlegens findet man sehr häufig einen Käfer das Eingangsloch so versperrend, daß der abschüssige Theil der Flügeldecken mit der äußeren Rinde in einer Ebene liegt. So wie die Entwicklung der Brut sehr von dem Wetter abhängt, so auch das Fortschreiten des Ganges: bei fortwährend günstigem Wetter rückt er rasch vorwärts und bei schlechtem wird die Arbeit unterbrochen.



merkwürdigsten sind. An einem Stücke ist sehr schön zu sehen, wie schwer es dem Käfer (wahrscheinlich wegen des Saftandranges) geworden ist, bis auf den Bast zu gelangen und wie er hin und her und immer etwas tiefer durch die Rinde gedungen ist, bis auf den Bast, und wie er auch hier äußerst vorsichtig und ganz oberflächlich die Muttergänge angelegt hat. Noch andre Stücke sind durch die tief in den Splint greifenden Gänge ausgezeichnet. Hr. Rettstadt beobachtete 2 zu einer Rammelkammer gehörende Muttergänge, welche nicht in gerader Linie lagen, sondern ein Knie bildeten. Hr. Pape schreibt mir über solche Anomalien noch Folgendes: „Wenn frühere Beobachtungen ergaben, daß zwei neben einander angelegte Muttergänge selten zusammenfallen etc., so habe ich jetzt Gelegenheit gehabt, den dabei leitenden Instinkt des Thiers bei einer analogen Erscheinung wieder zu erkennen und zu bewundern. Für den Zweck einer Untersuchung hatte ich nämlich mehrere, abgespaltene, mit Käfern besetzte Holzstücke im Hause. Eines dieser Stücke (Spälke) lag einige Zeit, ehe es zur Hand genommen wurde, wobei es sich denn ergab, daß dasselbe nahe vor dem noch nicht vollendeten Muttergange abgehauen war. Der Käfer hatte nun aber den Gang in dieser Richtung nicht mehr verlängert, sondern hatte einen Bogen gemacht, dessen Verlängerung ihn neben dem bereits gefertigten Gange wieder heruntergeführt haben würde, wenn er nicht durch meine Untersuchung gewaltsamer Weise daran gehindert worden wäre. In den auf der folgenden Seite beigedruckten, von Hrn. Saxen so schön ausgewählten und gezeichneten Figuren sind die am häufigsten vorkommenden Fälle berücksichtigt. Die lange, schmale Figur links zeigt: wie die Rinde der Länge nach, von außen links (der Seite der Rindenschuppen), nach innen rechts (der Bastseite) durchschnitten ist, so daß getroffen sind: das Bohrloch und die (deutlich über einer unverletzten Bastschicht liegende) Rammelkammer, so wie der nach oben und der nach unten führende Muttergang, jeder mit einem fertigen (der untere noch mit einem angefangenen) Luftloche und einem, mit dem Ablegen der, auch im Stiche angedeuteten Eier beschäftigten Weibchen (welches jedoch aus Versehen umgekehrt, d. h. mit den Beinen gegen die Rinde gekehrt, gestellt ist) (\*). Die große Figur rechts zeigt das Innere (die Bastseite) eines Rindenstückes, welches von mehreren Familien bewohnt war. Diese waren durch 4 Bohrlöcher (1, 2, 3, 4) eingedrungen. An zweien derselben (2, 4) ist die das Bohrloch verdeckende Bastschicht (s. auch die schmale Figur in der Mitte) weggenommen, an den beiden andern aber nicht. Von dem Bohrlöche 3 haben sich 3 Käferpaare entfernt: das eine begegnet dem von No. 2. kommenden (bei X.). Nach Hrn. Saxen's Meinung ist No. 2. rechts abgewichen und No. 3. umgekehrt. Die Brut, welche von No. 4. und dem obern Gange von No. 3. sich begegnete, ist von beiden Theilen ziemlich gut davon gekommen, wogegen von den übrigen sich begegnenden Bruten entweder nur die eine oder gar keine (so z. B. zwischen dem untern linken Gange von No. 3. und No. 1.) Raum und Nahrung genug hatte, um sich vollständig zu entwickeln. Am untern Ende sieht man ein Stück Rinde umgeschlagen und hier mehrere Fluglöcher, welche jedoch in größerer Zahl und in der Stellung, wie sie mehrmals zum Muttergange gefunden wurden, in einer beson-


---

(\*) Über die Stellung der Käfer im Muttergange, während sie arbeiten und legen, schrieb mir Hr. Pape später Folgendes: „Es ist, wie sich denken läßt, nicht eben leicht, den Käfer in seiner natürlichen Stellung zu finden. Man kann indessen bestimmt von dem Aufschneiden der Rinde wissen, daß, wenn dieselbe dick abgeschnitten wird, die Käfer die Füße nach der Rindenseite wenden, bei dünnerer Schälung hingegen nach dem Stamme hin. Da dies zu keinem sichern Resultate führte, so schlug ich mit dem Nacken eines Beins so auf die Rinde, unter welcher ich den Käfer wußte, daß derselbe auf den ersten Schlag getödtet, aber nicht ganz zerschmettert war. Ich fand ihn dann in allen Lagen, vorzugsweise aber so, daß seine schmälern Seiten, die eine dem Stamme, die andre aber der äußern Rinde zugewandt waren, und es findet sich in einer ähnlichen Lage auch die Puppe. Auch solche junge Käfer, welche im Winter abgestorben sind, finden sich nicht immer in übereinstimmender Stellung. Dagegen sitzt der Käfer, welchen man findet, wie er mit seinem Hintertheil das Einbohrloch versperrt, mit den Füßen nach dem Holze zugewandt. Der Kopf des Käfers findet sich natürlich immer dem Ende des Ganges zugewandt.“



den großen (auf S. 178. befindlichen Figur dargestellt wurden. Die Richtung des auf- und niedersteigenden Mutterganges (der untere ungewöhnlich gekrümmt), wie sie sich auf dem Baste fand, ist durchpunktirt. Bei a das in der Rammelkammer endende Bohrloch und bei c ein Paar Luftlöcher. Auf T. XV. F. 1. ist noch ein von der (abgebrochenen) Rammelkammer nach oben und nach unten führender Muttergang, mit nach links vollständig ausgebildeten Larvengängen (an deren Ende die Larven bereits durch die angedeuteten Löcher zur Verpuppung in die Rindengängen) dargestellt, theils wegen der auffallenden Größe der Gänge, der Menge der Luftlöcher und ganz besonders des Zusammenvorkommens mit *Bostr. chalcographus*, welche man so oft vereinigt sieht. Bemerkenswerth ist hier noch, daß der Käfer, wenn er in einem Baume (vielleicht durch die Erschütterung beim Fallen) beim Anlegen der Gänge gestört wird, wohl an einen andern geht und sein Brutgeschäft dort vollendet, daß er aber nicht nach gänzlich vollbrachtem Legegeschäfte dieses noch einmal wiederholen kann, wie Einige glauben. (Sierstorppfinkl. Holz. II. 193.)

IV. Von dem Aufenthalt des Käfers außer der Fortpflanzungszeit. Wenn die Eltern ihre Brut untergebracht haben, bleiben sie noch längere oder kürzere Zeit in den Gängen (in welchem Falle man sie an der größern Trägheit erkennt) und sterben dann entweder in denselben (Hr. Thiersch, v. Sierstorpff) oder kommen heraus (s. v. Sierstorpff, S. 17.) auch wohl am Ende des noch verlängerten Mutterganges, den sie hier durchbohren und dann sterben (Bechstein, Warnkönig). Ist die Brut ausgebildet, so fressen die jungen Käfer noch eine Zeit lang in der Rinde unregelmäßige, mit Wurmehl vollgestopfte Gänge und machen die Mutter- und Larvengänge dadurch oft ganz unkenntlich. Ist es spät im Jahre, so bleiben sie hier, um zu überwintern. Werden sie hingegen durch gutes Wetter hervorge lockt und machen keine neue Brut, so beziehen sie gewöhnlich eigne Winterquartiere in Stämmen, Stöcken und an Wurzeln, nach Einigen in Ritzen und an Rindenschuppen, nach Andern in eigens gebohrten Löchern (Thiersch S. 5. oben). So sahe sie Hr. Saxesen sogar hoch an stehenden Bäumen und zwar in Bohrlöchern, die nicht bis auf den Bast gingen und grade groß genug waren, einen Käfer zu beherbergen. Äußerst sonderbar war aber das Vorkommen an Stöcken mit noch frischer, saftiger Rinde. Die Käfer hatten hier förmliche Muttergänge gebildet und (das Auffallendste) auch seitwärts gehende, Larvengängen ähnliche. Es war dies am Ende des Oktobers und an neue Brut deshalb nicht zu denken! Einer merkwürdigen Beobachtung des Hrn. v. Sierstorpff (*inl. Holz.* II. S. 93.) zufolge fanden sich im August in einem kleinen 15jährigen platzweise vertrockneten Picketannenorte viele alte (wie es schien sehr träge) Käfer in der Borke, welche wahrscheinlich hier schon die Winterquartiere genommen hatten. Hr. v. Sierstorpff erklärt sie für Flüchtlinge. Der



selbe sahe in den warmen Frühlingstagen i. J. 1799 auf den Orten, wo zuvor die Trockniss von 1798 aufgehauen ward, eine entsetzliche Menge Käfer aus dem Moose und an den Bäumen in die Höhe kriechen, von wo sie dann bei wärmerem Wetter weiter flogen. Es sind uns also hier eine Menge von Winterquartieren im Forste selbst nachgewiesen, und ich möchte darin eine Übereinstimmung der Lebensweise des Fichtenborkenkäfers mit der unser Kiefernborckenkäfer finden: dafs diese letztern auch grösstentheils im Forste überwintern, theils unter der Rinde der Stöcke, der stehenden abgestorbenen und lebenden Stämme, theils im Reisig, im Moose. Dennoch genügen diese Überwinterungsplätze Hrn. Pape noch nicht und er glaubt im Frühjahr öfters eine viel zu grosse Menge von Käfern zu sehen, als dafs man mit der Annahme der eben erwähnten Winterquartiere ausreichte. Da dies Bedenken von einem sehr erfahrenen Manne ausgeht und die Praxis auf wichtige Untersuchungen leiten könnte, so wollen wir es, nach seinem neueren Briefe, hier ausführlich mittheilen. Er stützt sich nämlich darauf, dafs im Frühjahr oft eine entsetzliche Masse von Käfern aufliege, ohnerachtet man im vorigen Jahre die sorgfältigste Vertilgung vorgenommen hätte. Er vermuthet daher, dafs der mit den Blach-, Schacht-, Bau-, Feuer- und Röstehölzern nach den Werken und Höfen der Holzempfänger brachte oder mit den Verkaufshölzern ins Land verfahrne Käfer oft das Frühjahr erlebt und dann in seine heimatlichen Wälder zurückkehrt und einen Theil des neuen Anfluges dasselbst bildet. Dies verdient um so mehr Beachtung, als Hr. Pape bemerkt haben will: dafs in der Nähe solcher Holz-Stapelplätze im Lande befindliche Bestände, welche zur Aufnahme des Käfers vollkommen geeignet schienen, gar nicht von demselben befallen worden wären. Der Gegenstand ist deshalb wichtig, weil viele Forstmänner glauben, sie hätten sich nach der Abfuhr der mit Brut besetzten Hölzer des schädlichen Insects nun gänzlich entledigt (s. Forstl. Bedeut. u. Begegn. III. die neuerlich mitgetheilte Mafsregel des Hrn. Thiersch). Vielleicht liefse sich auf diese Weise auch die von Hrn. Bohutinsky mitgetheilte Erfahrung erklären. Es sollen nämlich alljährlich in den sogenannten Holzgärten in Prag grosse Schwärme von Borkenkäfern, welche aus den Forsten mit den abgefahrenen Hölzern dahin kommen, sich finden, ohne dafs die Nadelholzbäume in den Lustgärten und Parks und die benachbarten Wälder davon angegriffen würden (v. Wedek. *N. Jahrb. d. Forstk.* 10. pag. 33.). So viel steht fest, dafs der Käfer höchst ungern einzeln stehende Bäume befallt (s. Vorkomm. am Ende), aber nicht etwa, weil sie ihm zu gesund wären, sondern weil er ein Unterkommen sucht, wo nöthigenfalls für eine zahlreiche Nachkommenschaft Vorrath wäre.

V. Von der Menge, in welcher dieser Borkenkäfer zuweilen erscheint, kann man sich wohl, ohne selbst die Wurmtrockniss gesehen zu haben, keine Vorstellung machen. Es ist gewifs nicht Übertreibung, wenn gesagt wird: die Schwärme der Käfer bildeten ordentliche kleine Wolken (Sierst. S. 15.), oder schwärmten wie die Bienen, denn bei mässiger Verbreitung darf man nur an den Fangbäumen ein Stück Rinde aufheben und die Familien oder die ganze Brut zählen. So zählte ich an einem, gar nicht einmal besonders ausgewählten Stücke von 1' Länge und 6" Breite über 30 Muttergänge (die natürlich, wegen der Nahe, in welcher die meisten sich befanden, nicht alle Larvengänge zur Entwicklung gebracht haben konnten. Hr. v. Berg (*l. l.* S. 124.) fand an einem Rindenstreifen von 12" Länge und 12" Breite 1220 Stück völlig entwickelter Larven und Puppen! Gmelin (*Wurmtr.* S. 37.) berichtet, dafs an 4 Fichten 2300 Paare Käfer gezählt worden wären und macht danach die Berechnung, dafs in kurzer Zeit an 100 Bäumen 1,437,500 sein könnten! Noch mehr. Hr. v. Sierstorpff (*inl. Holz.* Th. II. S. 92.) zählte einst an Fichten die Käferpaare auf 1' lang aus und fand deren 350 bis 390, welche mit der Brut beschäftigt waren. Und so waren die meisten Bäume bis auf 60' lang besetzt und Ein Stamm mochte durchschnittlich wohl 23,000 Paare bergen! Darf man sich da noch wundern, wenn bei günstiger Witterung und nochmaliger Fortpflanzung solcher Schaaften, an Tausenden von Bäumen, die viele Fulse weit so bedeckt sind, auch gesunde

Bäume angefallen werden und das Tausende ja Millionen von Käfern im Harze ersticken können, ohne das sie merklich abnehmen?

VI. Ist noch die Lebensfähigkeit des Insekts ein wichtiger Punkt. Am empfindlichsten sind die Eier, Larven und Puppen, besonders wenn sie der Einwirkung der Sonne ausgesetzt werden. Sie sterben dann — aber auch nur dann und nicht etwa auch an einem schattigen, kühlen Orte, wo man sie in nackter Rinde sich entwickeln sahe (Rettstadt) — in kurzer Zeit (die Larven in einer Viertelstunde nach Hrn. v. Berg), und es ist daher gar nicht nöthig, die von den Stämmen geschälte Rinde, wenn man sie an der Sonne ausbreitet, zu vergraben oder zu verbrennen. Man hat sogar gemeint, wenn das Holz klar gespalten und an die Sonne hingelegt würde, so trocknete es so sehr aus, das man es gar nicht zu entrinden nöthig hätte, um die Brut zu tödten (s. Vertilg.). Der Käfer, selbst der noch ganz weiche (sobald er nur seine Beine und Flügel gebrauchen kann), ist stets unempfindlicher; am wenigsten beim Brutgeschäft, wo ihn das geringste, nur wenige Stunden dauernde, nafskalte Wetter schon träge und unbeweglich macht, (Hr. Pape, Gmelin *Wurmtr.* Anhang 37.), am meisten im Winter, wo ihn Schnee, Eis und Nässe nicht tödten. Die in der Rinde eingefrorenen Käfer leben, so wie sie in die Wärme kommen, wieder auf, und sie können ohne Gefahr für sie selbst im blofsen Moose überwintern. Selbst in geföfstem Holze, welches über 3 Wochen lang eingefroren gelegen hatte, waren sie gut erhalten und flogen nachher zur rechten Zeit aus (v. Sierstorff *Wurmtr.* S. 21.). Larven und Puppen sind, so lange sie noch am Stamme durch die Rinde geschützt waren, und nicht Nässe zu anhaltend auf sie einwirkte, gewöhnlich (denn zuweilen hat man sie auch schon über Winter zahlreich eingehen gesehen) ebenfalls gegen Erfrieren gesichert, nicht aber in abgeschälter Borke. Feuchte und kühle Witterung im Sommer soll für sie am verderblichsten sein (Thiersch S. 11.).

VII. In Gesellschaft sieht man ihn am häufigsten mit *Bostr. chalcographus* (s. dort), oder mit *Hylesinus palliatus*, auch mit *Curculio Hercyniae*, der seine Gänge bald ganz unkenntlich macht.

VIII. Auch die Beweglichkeit der Käfer ist hier wieder zu berücksichtigen. Sie sind im Ganzen mehr schwerfällig als beweglich, schwärmen auch gewöhnlich nur niedrig. Sie können sich aber auch über die höchsten Fichten erheben, besonders bei warmem Wetter und wahrscheinlich dann, wenn es ihnen an geeigneten Brutplätzen mangelt, die sie suchen. Alsdann werden sie wohl vom Winde mehrere Stunden weit getrieben (v. Sierstorff S. 15.) und wenn sie daher irgendwo unerwartet einfallen, selbst auf die Strafsen der Städte (Sierst) so darf man dies nicht ihrer Laune heissen, sondern blofs dem Zufalle, dem ich auch wohl viel bei den schon oft erwähnten, so unerklärlichen Anfällen auf einzelne, nicht für sie geeignet scheinende Bäume zuschreiben möchte (\*) (s. Leb. 4.). Hr. v. Sierstorff (S. 46.) vermuthet daher auch gewifs mit Recht, das die Lage der Gebirge sehr viel zur Verbreitung der Käfer beitragen könne.

---

(\*) Sehr merkwürdig und wegen der nothwendigen Übereinstimmung in den Verjüngungsregeln mit den Nachbarn (s. forstl. Bedeut. u. Beg. III.) sehr zu beherzigend, ist, was der Förster Rettstadt zu Zellerfeld (Gmelin *Wurmtr.* Anh. S. 262.) darüber noch sagt: „In diesem Jahre (1786), da der Käfer durch den Ost- und Südwind aus der Dietrichsberger Trockniß nach dem angrenzenden Mittelberg übergeführt ward, nahm ich bei sehr schwülen Wetter wahr, das der Wurm in so ungeheurer Menge angeflogen kam, das ich gar betäubt stehen blieb und dem Zuge, welcher gegen Abend ging, ganz erstaunt zusah. Da es eben anfang zu donnern, so war ich begierig zu erfahren, wie sich das Insect bei dem Gewitter verhalten würde. Auf einmal drehte sich der Wind und trieb das Gewitter gegen Osten, dabei kam auch das ganze Insect in solchen Schwärmen zurück, und so wie selbigen über den Hay zurück und die ersten Tannen vor dem Orte, wo ich stand, erreichte, so fielen sie an die grünen (völlig gesunden) Tannen. Am andern Tage sahe ich wieder zu und fand mit Erstaunen, das der Käfer sich über eine Viertelstunde lang und breit festgesetzt hatte, in Folge dessen später 63,280 Stämme trocken wurden!“ Hr. v. Rottenberg hat eine ganz ähnliche Erfahrung gemacht und gesehen, wie ein Borkenkäfer-Schwarm, der in der Höhe von 30' um alte Fichten andershalb

Stehen in diesen, meint er, die angestochenen Bäume in der Richtung, daß die daraus ausfliegenden Käfer mit den wärmern Süd- und Westwinden zu den gesunden Bäumen und den stehenden Orten getrieben werden, so wird dadurch der Flug sehr erleichtert, und es sei daher eine an der Süd- und Westseite sich zeigende Trockniß gefährlicher als an den entgegengesetzten Seiten der Gebirge (s. auch Gmelin *Wurmtr.* S. 34.). In den unglücklichsten Jahren sahe er im Harze die Käfer immer in der bezeichneten Richtung ankommen.

FORSTLICHE BEDEUTUNG UND BEGEGNUNG. Ohne Frage gehört *typographus* zu den sehr schädlichen Forstinsecten. Denn, wenn er sich auch meist mit Abfällen und kränkelnden Bäumen begnügt (Leb. 3 bis 10.) und oft Jahre lang ohne merklichen Schaden lebende Bäume bewohnt (Leb. 15.), so geht er doch auch unerwartet gesunde, brauchbare Stämme an (Leb. 11, 12.) und tödtet sie. Es entstehen dadurch nicht allein gefährliche Lücken in den Beständen, sondern letztere werden auch wohl ganz zu Grunde gerichtet. Holz und Rinde sind nicht einmal mehr zu gebrauchen (s. Pfeil *Forstschutz* S. 173., v. Sierst. S. 53. und Wittwer *A. F. u. J. Z.* 10. 556.). Tausende von Menschen, denen das Holz Beschäftigung bringt, kommen in die äußerste Noth. Bergwerke stehen still. Es entstehen ungeheure Blößen auf den Revieren und der Boden fängt an sich zu verschlechtern. Kein Wunder also, wenn in einem, schon i. J. 1705 erschienenen Gebetbuche steht: „Gott möge die Forsten, Wälder und Holzungen für Sturmwinden, schädlichen Wurmern und andern Unfällen bewahren.“ Deshalb ist es keine müßige Beschäftigung, zu untersuchen, ob der Borkenkäfer nicht bloß krankes, sondern auch gesundes Holz angeht? und es mußte der Erörterung dieser Frage an mehreren Stellen (s. d. Allgem. u. Leb. II. 11.) ungewöhnlich viel eingeräumt werden, damit der Forstmann nicht nöthig habe, wider seine Überzeugung den oben aufgestellten Grundsatz anzunehmen (\*). Die Annahme desselben ist aber unerläßlich, denn die Erfahrung hat gelehrt: daß

Stunden lang abwechselnd geschwärmt und sich auf gesunde Fichten gesetzt hatte, durch einen plötzlich aus Nordwesten hereinbrechenden Orkan in der Richtung von SO. über eine Blöße von 300 Schritten weggetrieben worden war und sich dann in einem beschatteten Jagen angesiedelt hatte.

(\*) Nicht kann aber wohl diese Überzeugung mehr befestigen, als die Nachrichten aus der Geschichte der Wurmtröckniß. Es ist unbegreiflich, wie die Krankheitsvertheidiger bei dem Ueberblicke so colossaler Beläge, wie sie schon in Gmelin und Sierstorff sich finden, nicht viel schneller von der Unhaltbarkeit der Kranktheorie überzeugt werden mußten, als jener Förster (Gmelin S. 51.), der beim Anblicke einer einigen kahl abgeessenen Wand ganz unbefangen und gewiß sehr natürlich auftriet: „Wenn nun dieser Wurm nicht sollte im Stande sein, eine gesunde „Tanne trocken zu machen, so müßten derzeit lauter ungesunde Tannen an selbigem Orte gestanden haben.“ Denn wer hat jemals von solchen Epidemien bei Pflanzen und Thieren gehört, die gleich alles Lebende hinwegraffen? Und wollte man die Disposition zur Tröckniß von Natureignissen, wie von Stürmen u. dergl. herleiten, so würde man immer nur einen gewissen Theil als dadurch erschüttert betrachten können, nie aber ganze, große Bestände. Am Oberharze, besonders im Hasselfeld'schen, war doch auch alles Holz im Anfange dieses Jahrhunderts in Folge der Tröckniß verschwunden, weil man dort von der Unanständigkeit der gesunden Bäume überzeugt war und die Kosten der Aufräumung nicht daran wenden wollte. Hr. Pfeil faßte, wie er mir sagte, diese Revierre damals recht scharf ins Auge, im Vergleiche mit den unversehrt gebliebenen Herzberger Revieren, in welchen Hr. v. Uslar, der Vater, stets die Windbrüche ungesäumt hatte aufarbeiten lassen. Dieser Contrast mag wohl hauptsächlich dahin gewirkt haben, daß jetzt am Harze kein einziger Kranktheitsvertheidiger mehr ist und daß daher jetzt auch keine so ausgebreitete Tröckniß mehr vorkommt. Bei Gmelin handelt fast der ganze II. Abschnitt von den Verheerungen, welche dort und in andern Gegenden von dem Borkenkäfer angerichtet wurden, und im Anhange findet man die mit großen Tabellen über die, in Folge der Tröckniß, entstandenen Holz- und Kohlenvorräthe, die dabei gebrauchten Arbeiter u. dergl. belegten Acten. Weitere Aussätze würden hier zu sehr zerstreuen. Nur ein Paar Zahlen aus v. Sierstorff (*inl. Holz.* II. 99, 102.). Anno 1782 waren in der Zellerfelder und Bedenbäuser Forst allein beinahe 4000 Morgen, worauf man wenigstens 360,000 Stämme rechnete, wurmtrocken und im Communionharze und auf den angrenzenden, ehemaligen Cluharungswäldern waren die Tröckniß auf weit mehr als 1,000,000 Stämme angeschlagen. Im J. 1783 (wo das Übel noch arg wurde) mögen wohl allein am Harze über 2,000,000 Stämme trocken geworden sein, indem in der Nähe angestochener Gegen-

nur bei dem entgegengesetzten so viel Unglück für die Forsten sich ereignete. Diesen vertheidigen heißt annehmen: der Borkenkäfer geht nur kranke Bäume an, welche von selbst gestorben oder wenigstens ohne seine Erscheinung so kümmerlich fortgewachsen wären, daß man besser gethan hätte, sie herunterzubauen und durch neue, kräftigere zu ersetzen! Ja es müßte den Schutzbeamten sogar in Beziehung zum Borkenkäfer Vollmacht gegeben werden, unverzüglich und ohne vorher eingeholte Genehmigung der vorgesetzten Behörde die nöthige Anstalt zur Begegnung zu treffen, weil das Übel öfters erst so spät entdeckt wird, daß es schon nach wenigen Wochen zu spät sein würde, demselben kräftig Einhalt zu thun. Um diesem Feinde stets sicher begegnen zu können, ist nun dreierlei zu beachten: I. Die Umstände, unter denen Wurmtrocknifs zu fürchten ist. II. Die Erkennung der eintretenden oder schon verbreiteten Trocknifs. III. Die Unterdrückung der schon vorhandenen oder die Vorbauung gegen zu fürchtende.

I. Die Umstände, unter denen Wurmtrocknifs zu fürchten ist, liegen in dem Vorhandensein günstiger Brutplätze und geeigneten, zahlreichen Brutmaterials für den Käfer (s. Leb. II.), so wie in der Witterung (Leb. I.) und der Aufmerksamkeit der Schutzbeamten. Werden die Holzvorräthe nicht zur rechten Zeit, d. h. vor dem Ausfliegen des Käfers im April und Mai (und dann auch wieder, wenn im Saft gehauen wird, vor dem durch Untersuchung zu ermittelnden Ausfliegen einer möglichen zweiten Brut), oder doch vor der Ausbildung der in ihnen enthaltenen Brut (s. III. die Mafsregel des Hrn. Thiersch) abgefahren, verkohlt, verläßt, ertrindet oder bewaldrechtet (was ja der eigne Vortheil der Käufer von Nutzhölzern ist, indem letztere auch bald von Holzinsecten angegangen werden), so braucht sich das vorhandene Insect nicht mehr auf die wenigen Brutörter, welche ein ordentlich bewirthschafteter Forst nur haben darf, und in denen es oft viele Jahre bleibt (s. z. B. von 1816-1825 im Erzgebirge Thiersch) zu beschränken, sondern es kann sich mehr ausbreiten und zahlreicherer Nachkommenschaft Gedeihen sichern. Wird diese nun vollends durch passendes Wetter begünstigt, so kann sie schon in der Mitte des Sommers in ungeheurer Menge das Treiben der Eltern wiederholen und den Grund zu einer Insectenmenge legen, für welche dann selbst die größte Masse kranken Holzes nicht mehr ausreicht. Hr. Wächter (*Hannöv. Mag.* No. 35. S. 322.) rechnet zu den Gelegenheitsursachen noch den Reichthum an ausgewachsenen Beständen. Auch werden die hin und wieder üblichen Kahlschläge, besonders wenn sie in einer solchen Richtung geführt werden, daß sie den herrschenden Winden gefährlichen Zugang verstatteten, dahin zu rechnen sein (s. v. Schultes in v. Wedek. *N. Jahrb.* H. 12. S. 142.). Da hierbei jedoch mehrere Umstände zusammenwirken müssen, so ist leicht einzusehen: warum meist nur nach längeren Pausen Trocknifs entstehen und nicht jeder warme Sommer für sich allein, oder jeder Windbruch und dergl. dieselbe erzeugen werde.

II. Die Erkennung der beginnenden Trocknifs erfordert einigen Scharfblick, weil nicht immer das (gewöhnlich am Gipfel beginnende und dann auf die Äste übergehende) Gelb- und Rothwerden der Nadeln den Feind verräth. Hr. v. Berg sagt: daß die Fichte, wenn sie auch ganz und gar vom Käfer angegangen sei, doch noch oft sehr lange, selbst den ganzen Winter hindurch, die grünen Nadeln behalte,

---

den kein junger, auf dem stärksten Zuwachs stehender Fichtenort, selbst die Picketannen-Orte nicht, vom Wurme verschont blieben. Überhaupt scheinen die Jahre 1781-1783 die argsten gewesen zu sein, da auch in mehreren andern Gegenden Deutschlands, vorzüglich in Sachsen und Schwaben, die Trocknifs sehr bedeutend war (s. auch Hartig's *J. f. F. u. J. P.* 1807. S. 226. über die Verheerung ganzer Waldstriche aus dem Thüringer Walde u. s. f., auch *F. u. J. Z.* Jahrg. 3. S. 546.). In den Jahren 1810-15 wurden in Ostpreußen die Fichtenforsten verheert (Jester), auch wieder i. J. 1825 (Hr. Reufs). Die Anweisungen, wie das beschädigte Holz zu behandeln ist (worüber u. A. Hr. Pfeil in *Ins. Schad. u. Forstsch.* handelt), kann ich hier wohl übergehen.

und daß nur der Stamm eine mehr graue Farbe erhalte und die Schuppen etwas abblättern, welches beides aber nur für ein sehr geübtes Auge erkennbar sei. So wie aber der *Hyl. palliatus* (wahrscheinlich auch *B. chalcographus*) zugleich anbort, ist kurze Zeit nachher die kenntliche rothe Farbe der Nadeln da, weil nun die Zweige, also dem Sitze der Nadeln nähere Stellen, ergriffen seien. Es ereignet sich aber auch das Entgegengesetzte: daß die Nadeln nämlich außerordentlich schnell, noch grün, herunterfallen (Hr. Meix.). Oft blättert auch die Rinde in der Mitte des ganzen Stammes ab (Hr. Pfeiffer), welches freilich meist Folge der Nachsuchungen des Spechtes (dem man also auch immer folgen muß) sein mag (Hr. Saxen). Sind die Bohrlöcher weiter unten, so wird man sie wegen ihrer Größe (wie mit No. 6. oder 7. geschossen) leicht erkennen und selbst wenn sie, wie gewöhnlich, so hoch oben sind, daß man sie nicht sieht, wird sich das aus ihnen herausgefallene Bohrmehl theils am Fuße des Stammes, theils an den Flechten des Baumes in Spinnengewebe und dergl. hängend, bemerklich machen, oder beim Anprallen mit der Art (wobei es, besonders bei warmem feuchten Wetter, einen dumpfigen Geruch verbreiten soll) herunterstäuben. Durch anhaltenden Regen wird es weggespült und unkenntlich gemacht (s. nachher bei den Revisionen). Auch hängt das aus ihnen hervortretende Harz oft in langen Tropfen herunter. Immer ist es gut, wenn man die Gegenden, wo die starken Äste abgehen, besonders beachtet, weil hier der Käfer am liebsten anfängt und sich hier auch die Rinde leichter ablöst. Hier und da läßt man auch wohl einen verdächtigen Stamm, wenn man unten nichts sieht, fällen, um den Gipfel zu untersuchen. Es versteht sich, daß die Erkennung immer leichter wird, je mehr der Käfer überhand nimmt. Im höchsten Grade seiner Verbreitung tritt an die Stelle der herrlichen, grünen Waldflächen öde Wüste. Diese Kennzeichen sind bei den Revisionen zu benutzen, welche von Zeit zu Zeit, oder ununterbrochen, angestellt werden müssen. Was die Zeit solcher Revisionen betrifft, so macht Hr. Pape darauf aufmerksam: daß man sie nicht bloß im Sommer und Herbst des Trockniß-Jahres anstellen müsse, sondern auch, weil doch noch viele Käfer der sorgfältigsten Recognoscirung entgehen, im nächsten Frühjahr, wo dann auch die Farbe der Nadeln sicher leitet. Auch hält er, späteren Mittheilungen zufolge, Folgendes für sehr wichtig. Man soll die Revisionen, ganz besonders bei sehr ausgebreiteten Verfall, wo möglich dann anstellen, wenn der Käfer den Muttergang noch nicht vollendete, wobei man also die Zeit des Schwärmens und Anbohrens sehr genau zu beachten hätte. Er fügt sehr richtig hinzu: man würde alsdann selbst nach einem Regen suchen können, weil zu dieser Zeit immerfort Wurmmehl aus den Bohrlöchern geschafft würde (s. Lebensweise III. Anmerk. zu 17. u. I. zweite Anmerkung). Ist dieser Zeitpunkt verstrichen und es wird kein Wurmmehl mehr ausgeräumt, so ist das Suchen mühsamer und der Erfolg, besonders bei sehr einzelnem, zerstreuten Anfluge, ungewisser. Auch über den Ort ist noch zu sagen, daß in Gebirgsgegenden die Aufsicht über den Gesundheitszustand der Bäume durch die Gänge sehr erleichtert wird. Von der entgegengesetzten Seite überseht man dieselben mit einem Blicke und ich habe oft einen einzigen wurmtrocknen Baum aus der schönen, grünen Wand, an welcher ein Gipfel immer den andern überragt, wohl auf eine halbe Stunde weit herüber leuchten gesehen. Auch sind hier einzelne Örter wegen ihrer besonders sonnigen Lage oder andrer, dem Käfer angenehmer Eigenthümlichkeiten wegen, vorzüglich verdächtig, und man muß sie vor allen im Auge behalten. In gewöhnlichen Jahren werden die Forstofficianten und Lehrlinge, besonders wenn sie in der Erkennung der Wurmholzer geübt sind, diese Revisionen gelegentlich mit abmachen können. In Jahren dagegen, welche die Verbreitung des Käfers begünstigen, können sie ein großes Revier, besonders wenn es sehr bergig ist, nicht allein übersehen und es sind immer zuverlässige Arbeiter (denen man eine, oben mit einem Eisen versetzte Stange zum Untersuchen der höhern Partien der Bäume mitgiebt) nöthig, welche auch zugleich für die Vernichtung der aufgefundenen Käfer sorgen müssen. Nach Hrn. v. Berg's von dem besten Erfolge gekrönten Anordnung wurden deshalb im Lauterberger Reviere immer auf 4000 Morgen ein Mann angelegt, welcher täglich 6 gr. bekam und nach der



Beschaffenheit der Witterung, schon im Februar oder März anfangen mußte, den Wurm, welcher im vorigen Jahre entwischt sein mochte, aufzusuchen. Zur Controle mußte jeder Baum und Stock, jede Klobe, jedes Stück Baubolz u. s. f., worin der Käfer sich fand, mit dem Datnm bezeichnet werden (Pfeil *crit. Bl.* B. X. H. 1. S. 126.). Zum Abhocken wurden dann noch andre Leute genommen, damit jene bei einer vorwährenden Nachlässigkeit sich nicht etwa mit solchen Nebengeschäften entschuldigten. Diese Controle (so wie auch die geschilderte Abwendung begünstigender Umstände) gehört schon

III. Zu den Mitteln, deren wir uns gegen dies schädliche Insect bedienen und zu denen wir noch das Schonen insectenfressender Vögel (besonders der Spechte und Meisen), sorgfältige Durchforstungen, Fangbäume (\*), frühe Beendigung der Holzschläge, wenn es möglich ist, rechnen, und auch noch die Vorsicht: daß man nicht die Klaffern an den Bäumen, sondern frei aufstelle und dadurch das unmittelbare Ankriechen des Käfers (welches Hr. Rettstadt schon beobachtete) verhüte. Hr. v. Bulmerincq schrieb mir im vorigen Jahre aus Eibenstock im Erzgebirge: „Nicht unwichtig scheint mir das Verfahren des Hrn. Thiersch zu sein, welches er seit einer Reihe von Jahren mit Erfolg ausübt, um ohne Kosten eine Menge von Fangbäumen in seinem Reviere zu vertheilen und abfahren zu lassen. Da sein Oberforst fast nur Fichten enthält und die Haungen alljährlich an sehr vielen Orten Statt finden, so findet sich sehr viel Nutzholz, welches im Winter gleichzeitig mit dem Brennholze gefällt wird, aber nicht eher als im Junius abgefahren werden darf. So lange sucht er die Käufer des Holzes hinzuhalten, was ihm auch gelingt, da der Frühling im obem Gebirge spät eintritt und eher kein Nutzholz verarbeitet werden kann. Durchaus müssen die Stämme, welche, wie ich selbst gesehen, nun mit dem brütenden Insect überfüllt sind, aus dem Walde abgefahren werden, und jedem Käufer wird bemerkt gemacht, daß er sogleich, wenn sein Holz nicht verderben solle, es zu Hause auf dem Bau- oder Ablage-Platze entrinden und die Rinde verbrennen müsse.“ Diese Maferegeln dürfen in Fichtenrevieren nie unterbleiben, weil hier immerwährende Gelegenheit zur unerwarteten Verbreitung des Käfers ist (s. I.). Sie stehen mit einer guten Holzwirtschaft in der genauesten Verbindung. Durch sie wird einer großen Gefahr immer vorgebaut werden können, wenn auch ein kleiner Schaden dann und wann nicht abzuwenden ist. Es verdient hier noch Erwähnung die Übereinstimmung in den Maferegeln mit den Nachbarn. Denn, wenn in des Nachbars Forsten nichts geschieht, um den Käfer immer zur rechten Zeit zu unterdrücken, so müssen wir doch ein Überfliegen (s. Leb. VIII. Anmerk.) befürchten, namentlich wenn, wie Hr. Pape meint, dort schon längere Zeit hindurch betriebene Haungen eingestellt wurden oder das stehende Holz zur Aufnahme des Käfers nicht geeignet war. Er giebt einen recht schlagenden Beweis: daß der Käfer zuweilen viel lieber das Revier seines Nachbarn als dasjenige, in welchem er geboren wurde, sucht, um sich fortzupflanzen. Zehnjährige Erfahrungen lehrten ihn nämlich, daß im Elender Reviere, welches große Flächen habenden Holzes, aber wenig mittelwüchsiges enthält, nur ein einziges Mal einige stehende Bäume vom Käfer befallen worden wären, obgleich zur Vertilgung der in Verfallenen etc. befindlichen Brut wenig oder gar nichts gethan war. Wo waren also die Käfer geblieben? Sie waren doch sicher zu den Nachbarn ausgewandert und hatten manchen stehenden Baum ergriffen. Ist durch Vernachlässigung derselben bereits Gefahr für

(\*) Hr. v. Berg benutzt dazu Windfalle. Er läßt sie vor den Haungen oder an Orten, wo Windfallplätze den Käfer vermuthen lassen fallen, und etwa alle 50 Schritte einen (am besten mit den vollen Ästen) auf untergelegte Stücke und Steine (damit sie nicht den Boden berühren) hinlegen. Vom ersten Schwärmen an, und so oft der Käfer wieder erscheint, muß man damit fortfahren. Sieht man, daß an einem Orte die Stämme voll Käfer sind, so muß man noch frische fallen lassen. Daß man sie zur rechten Zeit schalt und sich auch nicht allein auf sie verläßt, indem der Käfer immer noch anderswo aufliegen kann, versteht sich von selbst. Hr. Pape macht bei der Gelegenheit noch wieder darauf aufmerksam, daß Käfer, obgeachtet sie abgebrochene Stämme (also natürliche Fangbäume) genug hatten, dennoch ganz in der Nähe stehende Stämme befielen, die nur in der Wurzel erschüttert worden waren.

die Bestände eingetreten, so ist die Abwendung der letztern äußerst schwer und kann nur mit großen Opfern an Geld und Holz erkaufte werden. Während wir sonst nur mit der Wegräumung des für den Käfer angenehmen Materials zu thun haben, so gilt es jetzt die Vertilgung des bereits in unermeßlicher Menge vermehrten Insects. Auf das Holz kann dann oft gar nicht mehr Rücksicht genommen werden, denn die Erfahrung hat gelehrt, daß, wenn man sich nur mit Aufräumung der alten Trockniss beschäftigte, das Übel in der frischen unterdessen angestrichen Fortgang nimmt (wie denn z. B. 1776 zu Zellerfeld sogar förmlich festgesetzt wurde: „in sämtlichen Forsten solle die alte Trockniss zuerst und die „frische erst nachher aufgearbeitet werden,“ welcher ganz zweckwidrigen Verordnung man die nachherigen traurigen Folgen der Trockniss vorzüglich zu verdanken hatte, v. Sierst. *inl. Holz.* II. S. 98.). Es kommt also Alles darauf an, wenn man beide nicht zugleich berücksichtigen kann, zuerst die frische vorzunehmen. Es ist ungemein schwer und erfordert die größte Umsicht, in solcher Zeit (s. Ann. S. 149), wo nicht Arbeiter genug da sind, die ganze Trockniss aufzuarbeiten, die Reihenfolge des Hiebes (da der Käfer bald hier bald dahin überspringt) zu bestimmen (\*). Auch die fernere Behandlung der Stämme ist nicht gleichgültig, indem es sich immer noch um die sichere und leichte Tödtung der Brut handelt, denn von dem Fallen stirbt diese noch nicht. Man hat, weil das glänzliche Entrinden oder Abborken etwas kostspielig ist (Hr. v. Berg zahlte pro Malter à 80 Cub. F. 1 Gr. und bei den Rundhölzern in den Stämmen incl. Entästen und Hauen pro Spanne = 10' Umfang 4-5 Pf. Schälerlohn) allerlei andere Ausalten empfohlen, z. B. das Welken der Scheithölzer (s. Leb. II. 9. u. VI.) und (s. auch Hr. v. Schultes in v. Wedek. S. 144.) das Abschälen einzelner Streifen (s. Leb. II. 5.). Versuche durch Hrn. v. Berg und Hrn. v. Kellner angestellt zeigten indessen, daß diese Mittel, wenn sie auch nicht ganz unwirksam sind, doch nicht ganz untrüglich genannt werden können und daß das vollständige Entrinden in der Salftzeit immer noch das einzige sichere bleibe. Die Rinde muß, wenn das Insect schon die Verpuppung überstanden haben sollte, selbst wenn die Käfer noch ganz weich und weißlich wären (s. Leb. VI.), verbrannt oder vergraben werden. Nur wenn die Verpuppung noch nicht völlig überstanden ist, also noch Puppen und Larven da sind, ist das Verbrennen unnöthig und die Brut stirbt in der an die Sonne oder bei mäßig kaltem Wetter hingelegten Rinde. Sind die Käfer schon ausgebildet, so ist noch mit großer Vorsicht, besonders bei warmem Wetter, zu verhüten: daß nicht ein Theil derselben beim Abborken herunterfalle oder sich verkrieche, oder nachher noch aus der schon im Feuer aufgehäuften, noch nicht

(\*) Bei dieser Gelegenheit entsteht die wichtige Frage: In welchem Zustande muß das Holz sich befinden, wenn es der Käfer nicht mehr angeln soll? Ich habe mir darüber Auskunft von Hrn. v. Berg erbeten und von ihm darüber Folgendes erfahren: Ist das Holz angefaul, so geht der Borkenkäfer dasselbe gar nicht mehr an. Sonst ist anzunehmen, daß es sich noch, bis daß die Rinde völlig aufgetrocknet ist, darin hält. Bei liegenden Bäumen ist das natürlich sehr verschieden, je nachdem eine feuchte, gegen die Sonne geschützte Lage, oder bei Windbrüchen die an den Wurzeln befindliche Erde, das Leben in denselben noch erhält. Bei aufgearbeiteten Hölzern aber findet man oft die Ränder der Scheite ganz ausgetrocknet und an einzelnen, oft nur einige Hande großen Stellen dennoch den Käfer ausgeflogen und die Brut ausgebildet. Nach der Zeit des Fallens kann man von vorn herein den Zeitpunkt bestimmen, da oft in einem Malterhaufen die obern Klüfte ihn nicht mehr aufnehmen, wohl aber noch die mittlern oder untern. Eben so ist es mit Langhölzern. Diese sind oft an der Seite, wo sie vor der Sonne liegen, schon trocken und auf der andern entwickelt sich noch die Brut. Witterung und Lage so wie die Stärke der Bäume u. s. f. sind dabei natürlich auch wichtig. So floß in einem Falle der Käfer noch Scheithölzer auf einem freien Haye an, welche schon im vorigen December gefällt worden waren. Um also sicher zu sein, bleib, wenn man nicht alles Holz schalen lassen will, was, auch abgesehen von den Kosten, doch nicht immer geht, nichts übrig, als fleißig alle Vortheile visitiren zu lassen und einzeln die befallenen Klaffern zu schalen. — Über den Vorschlag, welchen der Borkenkäfer den einen oder andern Holze giebt, s. Leb. II. Dabei ist aber (bei den Verfallen, Klaffern u. s. f.) immer auf die Zeit, seit welcher sie liegen, zu sehen, ferner darauf: ob sie ganz ohne Salzbewegung liegen oder noch dieselbe durch einige Wurzeln unterhielten u. s. f., wonach sich die Käfer-Anfälle sehr zu richten pflegen.

vollständig gereinigten Borke entwische (s. auch Lcb. IV. am Ende). Man hat gesehen, daß Käfer, die noch ganz hell waren, sich doch gleich wieder einbohrten. Deshalb mußs auf Tüchern (Fangschürzen) abgehört und dazu kühles Wetter abgewartet werden (\*). Alsdann mußs von den Scheiterhaufen ein Rand von glühender Asche, der die Ausreißer nicht fortläßt, gezogen werden, oder diese müssen mit Besen in das Feuer, welches man immer hell lodern lasse, zurückgekehrt werden. Äste und Zweige, die sich nicht leicht abborken lassen, müssen, da sie meist auch (wenn auch nur von kleinern Arten) bewohnt sind, mit verbrannt werden, wo möglich sammt den Stöcken. Im Lauterberger Oberforste, wo man i. J. 1834 bis 106,000 Stämme Windfall hatte, betrugen die Kosten für Visitation, Vertilgen und Schalen 2508 Thlr. 13 gr. 10 Pf. Allerdings eine bedeutende Summe. Sie kommt aber nicht gegen den unendlich größern Schaden in Betracht, der ganz bestimmt entstanden wäre, wenn man jene Ausgabe gespart hätte! „Eine sorgfältige Vertilgung des Borkenkäfers, sagt Hr. Pfeil (*Forstschutz* S. 124.), ist um so dringender zu empfehlen, als er nicht, wie die Raupen, periodisch erscheint und von selbst wieder verschwindet, sondern vielmehr sich so lange vermehrt und erhält, als er noch Holz zu seiner Fortpflanzung tauglich vorfindet.“ Zu den unpractischen Vertilgungsmitteln gehört das vorgeschlagene Abbrennen der ganzen Orte in frischer Trocknis und das Schalen auf dem Stamme (*Medicus*) (wie soll man so hoch langen!) (s. v. Sierst. *inl. Holz.* II. 101.), oder wohl gar die Anwendung chemischer, so wie andrer, gar nicht nennenswerther, Mittel älterer Zeiten.

## 2. *B. stenographus* Dftschm. Grofser Kiefernborckenkäfer. (Taf. XII. Fig. 2.)

**NAMEN.** Es ist schon (bei *B. typographus* Namen) erwähnt, daß gegenwärtiger von einigen Schriftstellern für den *typographus* Linn. gehalten wird, namentlich von Fabricius. Warum diesem auch Gyllenhal (*ins. Suec.* III. 351.) folgt, ist nicht recht zu begreifen, da er selbst (*Obs.* p. 353.) vermuthet, Linné habe unter *typographus* den Szähnigen verstanden. Bechstein giebt ihm einen ganz andern Namen: *B. Pinastris*. Dieser ist zwar schon in der ersten Ausgabe des Bechstein'schen Werkes gebraucht worden, allein das Dufschmid'sche, in welchem der Name *stenographus* gebraucht wird, ist eben so alt und wurde früher und allgemeiner verbreitet, enthält auch bessere Beschreibungen als das Bechstein'sche. Wahrscheinlich gehört hierher auch *B. decumanus* Ill. (*Braunschv. Mag.* S. 775.)

**CHARACTERISTIK.** 2,7" bis 3,2" lang und bis 1,4" breit, weniger vollkommen walzig als *typographus*, weil Halsschild und Flügeldecken am Ende sich merklicher verschmälern. Halsschild im Verhältniß zu den Flügeldecken länger und in der Mittellinie hinten ganz glatt. Schildchen groß, gefurcht. Punktireihen der Flügeldecken stärker. Eindruck flacher und schmäler, am Rande jedersits mit 6 Zähnen, deren 4ter der größte. (Der 1ste öfters sehr klein oder, wenn auch nur auf einer Seite, fehlend, die beiden auf den größten folgenden aber immer deutlich.) Über dem Kopfschildrande, wie bei *typographus*, ein Körnchen und über demselben ein glattes Querstückchen. Beide beim Männchen sehr stark, beim Weibchen schwächer, besonders das Körnchen. Die Farbe ist bald dunkler bald heller, braun.

**VORKOMMEN.** Nur in Kiefern in Menge, und zwar von Rußland und Schweden bis Süddeutschland (Süd-Bayern Hr. Wall, Carlsruhe Hr. Warnkönig, aber nicht Schwarzwald) hinunter. In und an Fichten ist er auch schon mit Bestimmtheit (namentlich in Gesellschaft von *Hyl. micans* und zwar bei Lautenthal und am Tannenhay bei Clausthal, entfernt von allen Kiefern (einmal von Hrn. Saxesen) gefunden, aber nur äußerst selten. Was Gyllenhal davon sagt („*pinetorum pestis*," während er vom

(\*) Hr. v. Berg machte, um diese Vorsicht als sehr nöthig darzustellen, folgenden Versuch: Es wurden 20 Klüfte auf untergelegten Laken geschalt und dann die Rinde vor dem Verbrennen sorgfältig nach Käfern durchsucht. Es fanden sich nur 286 darin. Als dagegen die Laken, auf denen geschalt worden war, nachgesehen wurden, fanden sich hier mehr als noch einmal so viel (655), die also entwischt waren, wenn man auf bloßer Erde geschalt hätte.

szähligen nur sagt: „*sat frequens*“) beruht gewiss auf Verwechselung. Bechstein, der ihn, wie es scheint, viel zu beobachten Gelegenheit hatte, fand ihn auch nur in Kiefern. Hr. Höss (*Forstins.* S. 37.) erwähnt des Käfers auch in der (allerdings der Kiefer sehr nahe verwandten) Schwarzföhre und zwar sowohl in geschlagenem und lange liegendem Bau- und Kastenholze, als auch in eingegangenen Pflanzlingen (?). Nachher fügt er noch hinzu, daß der Käfer noch nicht gesunde Schwarzföhren angegriffen habe.

Die Lebensweise ist mit der des szähligen Fichtenborkenkäfers ganz übereinstimmend, nur daß er eine andre Holzart bewohnt und nie so häufig geworden ist wie jener. Bei uns sieht man ihn alljährlich, aber nie in Menge und immer nur an Kläftern und liegenden Stämmen. Er schwärmt später als die übrigen, hiesigen Borkenkäfer, mag auch etwas mehr Zeit zu seiner Ausbildung gebrauchen, denn ich fand die Brut immer ziemlich spät, mehrmals in der Mitte des Juli erst halbwüchsig. Seine Gänge würden sich von denen des *typographus*, wenn man auch nicht auf die Nahrungspflanze achtete, schon allein durch die Größe unterscheiden, denn sie sind die größten unter allen echten Nytophagen. Von der Rammelkammer (welche Ähnlichkeit mit der von *B. laricis* hat, und die ich immer bis auf den Splint erweitert sahe) geht ein Mittergang nach oben und einer nach unten (also Lothgänge). Beide liegen in einer graden Linie und messen (ganz frisch am Stamme) zusammen bis 15" Länge, dabei sind sie 1,5" breit! Die Larvengänge (80-100 an beiden) sind ziemlich geschlängelt und haben, schon 3" von ihrem Ursprunge entfernt, fast 1" Breite und an ihrem Ende 2". Am häufigsten fand ich ihn in Gesellschaft von *B. laricis*.

FORSTLICHE BEDEUTUNG UND BEGEGNUNG. Von mir so wie von mehreren meiner Zuhörer (u. A. Hrn. Feldjäger Wiese, der ihn in der Elbgegend über die frisch geschlagenen Kiefern herfallen und sie sogleich mit Wurmehl überdecken sah) ist er nur als gleichgültig beobachtet worden. In hiesiger Gegend (im Brahlitzer Reviere) soll er dagegen einmal an lebenden Kiefern schädlich geworden sein (s. auch Pfeil's *Anleit. Forstsch.* S. 163.) und Bechstein (*Forstins.* S. 185.) führt ihn sogar unter den mehr schädlichen auf, weil er ihn auch in stehenden, gesunden Bäumen (und zwar in alten mehr als in jungen) fand. In der Dreifsigacker-Waldung soll er starke Bäume (selbst 2" dicke Rinde durchbohrt er) einzeln mehrere Jahre bewohnt haben und in einem nahen Meininger Forst hat er einen mit Kiefern und Lärchen gemischten District so stark befallen; daß die Kiefern sämtlich abstarben und ausgehauen werden mußten. Besonders soll er sich im Gefolge der Forleule und des Spanners efinden. Bechstein empfiehlt die gegen den Fichtenborkenkäfer wirksamen Mittel auch gegen ihn. Neuere Nachrichten setzen die Schädlichkeit dieses Käfers außer allen Zweifel, ja er wird durch sie fast zu den sehr schädlichen gebracht. Hr. Heyer, der ihn oft, und namentlich im Sommer 1838, sehr zahlreich unter der Rinde liegender Kiefern fand, sogar mit *B. typographus* zusammen, erzählt noch folgendes, seine Angriffe auf gesunde Stämme Bezeugende. In einzelnen, gesund scheinenden Kiefernarten um Lüneburg fanden sich hier und da an Stämmen von sehr verschiedenem Alter, von einigen Fußten über der Erde an bis zu der Höhe von mehr als 12 Fußten, verhärtete Harzkümpchen mit einzelnen Überresten von *Hylesinus piniperda*. Am 27. Juli gelang es dem emsigen Forscher endlich einen Kiefernhorst zu entdecken, welcher ein gemischtes Gehölz an der Südwestseite begrenzte und von dem *B. stenographus* angegangen war. An einem Stamme fanden sich Exemplare von diesem Käfer und von *Hylesinus piniperda*. Die mit Harz gefüllten Bohrlöcher sowohl als auch die trocknen oder harzfreien befanden sich sämtlich an der Nordostseite und es wird vermuthet, daß die Käfer aus jenen Löchern ausgeflogen seien, nachdem die Rinde bereits abgestorben war und das Harz nicht mehr floß. Die entgegengesetzte Seite des Baums stellte sich bei genauer Untersuchung als durchaus gesund dar. Es waren zwar noch einige benachbarte Bäume angefallen, wie man an dem Harzausfluß erkennen konnte, allein die Rinde saß fest und die Brut schien sich noch nicht recht ausgebreitet zu haben. Die ganze Baumgruppe, in welcher der Käfer hauste, besteht aus Bäumen von ausgezeichnet schönem Wuchse und bedeutender Höhe, und wenn es auch wahr ist, daß der

bekannte Sturm vom 29. Nov. 1836 dieselbe bedeutend dadurch verkleinerte, daß er zahlreiche Stämme knickte, so steheu die noch vorhandenen doch so fest, daß keine Spur einer Statt gehabten Wurzelbewegung wahrzunehmen ist. Grade die am Rande des Gehölzes befindlichen, mithin dem Sturme am meisten bloßgestellten Bäume sind von den Käfern verschont geblieben und die mehr geschützten angegriffen worden. — Zufolge einer Nachricht des Hr. Dr. Zimmer zu Darmstadt (v. Wedek. *N. Jahrb. d. Forstk.* H. 10. S. 35.) hatte er sich vor mehreren Jahren im Reviere Schiffenberg, Forsts Giesen, in 80-90jährigen Kiefern eingefunden, welche vor ihrer Fällung entästet worden waren. Auf die andern, welche man nicht entästet hatte, war er nicht gegangen. Einer meiner Zuhörer, Hr. Denicke, überbrachte mir Käfer aus dem Reviere Liesburg bei Nienburg im Hannöverschen, welche ganz gesunde Kiefern in Menge getödtet hatten. Man hatte hier sogar Mafsregeln gegen ihn ergreifen müssen.

### 3. *B. Laricis* Fabr. Vielzähntger Borkenkäfer. (Taf. XII. Fig. 3.)

**NAMEN.** Die schon von Hellwig herrührende und dann von Fabricius aufgenommene Benennung ist zwar sehr unpassend, weil der Käfer unter allen Nadelhölzern am seltensten in der Lärche zu finden ist, hat aber doch einmal das Dürgerrecht erlangt. Daß dieser als *Laricis* auch von Gyllenhal, Duftschmid u. A. genommen wird, davon überzeugen mich Beschreibungen und Exemplare. In Süd-deutschland nennen ihn Einige (jedoch ganz mit Unrecht) auch wohl *denticulatus* (und dann unsern *curvidens* (s. No. 4) *Laricis*), was wohl zu beachten ist.

**CHARACTERISTIK.** 1,7" bis 1,9" lang, von der Gestalt des *typographus*, aber noch walziger und besonders ausgezeichnet durch den an der hintern Hälfte weitläufig punktirten Halsschild, und den fast vollkommen kreisrunden, breiten Eindruck der abschüssigen Stelle, welcher jederseits mit 3-6 kleinen, nicht gekrümmten Zähnen besetzt ist. Innerhalb des 2ten und 3ten Zahns steht noch ein besonderer, gleichsam der Anfang eines inneren Zahnkreises.

**VORKOMMEN.** Ob *B. Laricis* wirklich in der Lärche lebt, weifs ich nicht, wenigstens habe ich ihn nie in den von mir durchsuchten Bäumen gesehen. So viel ist aber gewifs, daß er hier nicht häufiger sein kann, als in der Kiefer, in welcher — in der alten sowohl wie in der jungen — er zu den gemeinsten gehört, entweder ganz allein oder mit *Hylesinus piniperda* oder mit *Bostrichus stenographus* zusammen, sogar, wie Hr. Heyer meint, mit *B. typographus* in Gesellschaft in liegenden Stämmen. Er scheint auch eine ungewöhnlich grofse geographische Verbreitung zu haben, denn im Berl. Museo stecken selbst aus Portugal Exemplare. In Südbayern (Hr. Waltl) und im Schwarzwalde (Hr. Waruk), sehr gemein. Übrigens ist er auch in der Fichte gemein und eben so in der Weifstanne. Ein wichtiger Einwand gegen das Vorkommen in letzterer führt von Hrn. Kellner her, der ihn nie in dieser, den Thüringer Wald so sehr auszeichnenden Holzart fand und daher wohl mit Recht vermuthet: es könne hier eine Verwechselung mit dem (besonders in den grofsen und weiblichen Individuen) sehr ähnlichen *B. curvidens* zum Grunde liegen.

**LEBENSWEISE, FORSTLICHE BEDEUTUNG UND BEGEGNUNG.** *B. Laricis* ist mir besonders deshalb aufgefallen, weil er die einzige hiesiger Gegenden ist, von dem ich bestimmt eine doppelte Generation nachweisen kann, denn ich habe von ihm Brut im Vorsommer und wieder im Nachsommer (einmal Ende Juli Eier und junge Larven) gesehen, einmal sogar im October eine noch nicht ganz entwickelte, welche nothwendig von einem, in demselben Jahre ausgekommenen Elternpaare herrühren mufste. Man unterscheidet ihn (namentlich von dem oft mit ihm zusammen lebenden *H. piniperda*) dadurch: daß die von der (auch ein Paar kurze Seitenäste zeigenden) Rammelkammer nach oben und nach unten gehenden beiden, 2-4 Luftlöcher zeigenden, Muttergänge (welche über 1" Breite und oft bis 7" Länge haben) nicht gerade, sondern stets geschwungen, oder mehrmals geschlingelt sind (s. T. XV. F. 2). Die sehr gedrängten am Ende über 1" breiten Larvengänge gehen oft bis 4" weit. Die Puppen sitzen gewöhnlich ganz oberflächlich im

Baste, so daß sie beim Entrinden meist auf dem Holze liegen bleiben, was ich bei dem so häufig benachbarten *H. piniperda* nie bemerkte. Zuweilen bemerkt man sogar einzelne oberflächlich im Splinte. Fluglöcher wie von No. 10 oder 11 geschossen. Gewöhnlich bewohnt der Käfer nur Kiefern und gefällte Kiefern, dann und wann geht er aber auch auf den Culturen die jungen Kiefern an und zerstört sie in Gesellschaft des *Bostr. bidens* und des *Hyl. ater* und *angustatus*, so wie des *Cure. notatus*. Nach Bechstein (*Forstins.* S. 187.) soll er auch in alten Bäumen Zerstörungen anrichten und Thiersch [*Forstk.* S. 19. wo wirklich von *B. Laricis* die Rede ist und nicht von *B. lineatus* (s. unter No. 1. Vorkommen)], fand einmal unter einer Fläche Fichtenrinde von 144 □ Zoll 612 Exemplare Larven, Puppen und Käfer! Er ist daher mit gutem Rechte zu den merklich schädlichen zu rechnen. Man kann ihm wie dem Szählenden Borkenkäfer begegnen, besonders durch Fangbäume, an die er gern geht, oder ihn auch bei Vertilgung des *Cure. notatus* (s. dort) gelegentlich vernichten.

VERWANDT sind: 1) der dem *Laricis* sehr ähnliche (auch in der Bildung der Gänge übereinstimmende) meist aber etwas kleinere und schlankere 1,4" bis 1,7" lange *B. suturalis* (T. XII. F. 4.), welcher aber einen dichten punktierten Halsschild, schwächere Punktreihen der Flügeldecken und nur einen sehr schwachen, schmalen Eindruck hat, an welchem auch nur jederseits 3 und noch dazu der Nath parallele stumpfere Zähne stehen, der unterste etwas tiefer als bei *Laricis* (\*). 2) Der dem *Laricis* ebenfalls ähnliche, (1,4" bis 1,9" lange), aber noch gedrungener, viel schwächer punktirt, ebenfalls in Kiefern sogar in unserer Gegend (jedoch wohl nicht häufig und in was für Gängen?) wohnende *B. acuminatus* Gyll. (*iconographus* Kug. nach dem Berl. Mus.) (T. XIII. F. 4.) sehr ausgezeichnet durch den Mangel einer glatten Halsschild-Mittellinie, einen breiten, aber nur flachen Flügeleindruck, welcher am Rande jederseits 3 Zähne hat, deren oberster nur ein kleines Höckerchen und deren unterster, etwa in der Mitte des Rand-Halbkreises stehender, ein spitzer, ziemlich langer Zahn ist. — 3) Der nur 1,1 bis 1,2" lange, sehr schlanke und auffallend parallel-opipedische *B. bispinus* Meg. (T. XIII. F. 5.). Der Halsschild ist weitläufig aber tief punktirt und hat eine lange, glatte Mittellinie. Auf den Flügeldecken die Punkte der Zwischenräume fast eben so stark und dicht wie die der Reihen. Bei dem stark behaarten Männchen die abschüssige Stelle deutlich eingedrückt, jederseits am obern Drittheil mit einem starken spitzen Zahne, bei den Weibchen aber (*B. sculptor* Dahl, *retusus* Ol.) ist sie nur neben der stark vorragenden Nath unmerklich eingedrückt und zeigt hier 2 Reihen (die Fort-

---

(\*) Schon früher (*Leop. Carol. Akad.* Vol. XVII. P. I. S. 466.) hielt ich diesen *suturalis* sammt dem *nigritus* Gyll. (welcher sich nur durch schwarze Farbe, etwas stärkern Eindruck und etwas mehr nach außen gerückte Zähne unterscheidet, von Gyllenahel selbst aber noch als zweifelhafte Art hingestellt wird) nur für Varietäten des *B. Laricis*, weil ich unmerkliche Übergänge zwischen ihnen fand. Jetzt bin ich auch deshalb von dieser nahen Verwandtschaft überzeugt, weil ich die Gänge beider kenne und sie durchaus nicht unterscheiden kann. Allerdings habe ich mehrmals Gänge gefunden, in welchem nur dem *suturalis* ähnliche Käfer sich fanden, wie denn auch, und bei Weitem häufiger, nur *Laricis* ähnliche für sich vorkommen, jedoch waren auch wieder beide öfters zusammen, dann aber immer *B. Laricis* der häufigste und *B. suturalis* nur einzeln darunter. Zu den wichtigsten Widersprüchen, welche ich noch kürzlich deshalb gefunden habe, gehören die des Hrn. Kellner, welcher beide Arten stets gesondert gefunden haben will. (*B. tyroglyphus* findet sich ja aber auch klein und groß in ganz gesonderten Familien). Der *B. Laricis*, welchen er mir mitsendet, ist freilich größer als die dabei befindlichen kleineren Exemplare von *B. suturalis*, jedoch kommen die letztern, welche alle Übergänge des Eindruckes, der Zahne und der Halsschild-Punktirung schön zeigen, im Übrigen ganz nahe. „An einem Kieferstamme, sagt Hr. Kellner, habe ich gesehen, daß sich von *B. suturalis* nicht allein „Käfer einige Linien tief, wie *B. curvidens*, eingefressen hatten, sondern auch Larven traf ich, welche sich in dem „Splint eingefressen und dort verpuppt hatten.“ Also wieder eine neue Anomalie. Bei uns sah ich sie, wie gesagt, ganz wie *Laricis*, in leicht geschwungenen Gängen, welche so oberflächlich im Baste liefen, daß die ganze Brut beim Abheben der Rinde auf dem Splinte liegen blieb. Bei *bidens* sieht man sie ja aber auch zuweilen ausnahmsweise ins Holz eingefressen (s. auch Pfeil's *crit. Bl.* VII. t. 67.).


setzungen der der Nath am Nächsten stehenden Punktreihen) von äußerst kleinen Körnchen. Vorkommen noch nicht bekannt, wie es scheint nicht diesseit des Harzes.

4. *B. curvidens* Grm. Krummzähniger Tannen-Borkenkäfer. (Taf. XIII. Fig. 1, 2.)

NAMEN. Diese Art hat mindestens 5, und noch dazu gleich stark gebrauchte Namen, den: *Larici* gar nicht mitgerechnet (s. No. 3. Nam.). Als *Larici* (dem er auch sehr ähnelt) mag er bei den Forstleuten wohl schon oft angesprochen worden sein, denn sonst wäre das Schweigen der Schriftsteller über diesen in Weistannen so gemeinen Borkenkäfer ganz unerklärlich. Germar (in seinem Magaz. v. J. 1822) war der Erste, welcher ihn beschrieb, aber Männchen (*B. curvidens*) und Weibchen (*B. pilonotus*) als verschiedene Arten. Gleich darauf beschrieb Duftschmid (*Faun. Austr.* III. 91.) wieder Männchen (als *calligraphus*) und Weibchen (*orthographus*) als verschiedene Arten und dann endlich findet man das Weibchen noch in manchen Sammlungen als *B. Abietis* Ziegl. und als *B. capillatus* Meg. Germar's Name als der älteste gedruckte bleibt, und zwar der vom Männchen hergenommene (*Pfeil crit. Bl.* B. X. 1. S. 105.). Beinahe hätte die Verwechselung der Geschlechter eine neue Confusion gegeben, denn, selbst nachdem ich die langzähligen nacktsirnigen als Männchen und die kurzzähligen einen Stirnschopf zeigenden als Weibchen erkannt hatte, wollte man die langzähligen für die Weibchen nehmen.

CHARACTERISTIK. 1" bis 1,6" lang. Vor allen ausgezeichnet durch außerordentlich starke Punkte der Flügelreihen, deren natthändige sogar eine stark vertiefte Furche bildet, so wie durch den Eindruck hinten, welcher beim Männchen stärker ist und jederseits 6-7 Randzähne (der 1ste, 2te u. 5te die längsten, hakig nach oben oder nach unten gekrümmt), beim Weibchen aber nur 3 recht deutliche (auch kürzere, stumpfere) und mehrere verschwindende zeigt. Der Vordertheil des Halsschildes stark höckrig, von dem eine glatte Längslinie zeigenden, etwas weißläufig punktirten, stark glänzenden Hintertheil ziemlich deutlich abgeschnürt. Das Weibchen hat einen ausgezeichneten Schopf langer goldgelber Haare, das (sonst über und über stärker behaarte) Männchen aber nur ganz gewöhnliche. In einigen Sammlungen, welche nur wenige Exemplare dieser Art enthielten und zwar große stark gezähnte und kleine geschopfte, glaubte man die letztern wegen der geringern Größe für die Männchen halten zu müssen. Eine sehr große Menge von Exemplaren jedoch, welche ich nach und nach aus den verschiedensten Gegenden erhielt, hat mir große und auffallend kleine von beiderlei Bildung zugeführt, so dafs es also hier große und kleine Männchen giebt, eben so wie z. B. bei *bidenis*. Von diesem letztern habe ich ein Pärchen von kaum 1" Länge neben einem Männchen von 1,4" Länge aufgeklebt.

VORKOMMEN, LEBENSWEISE, FORSTLICHE BEDEUTUNG UND BEGEGNUNG. Nur in Weistannen, aber diesen auch höchstwahrscheinlich in alle Gegenden und in alle Lagen folgend, denn seitdem die Art ordentlich bekannt geworden ist, hat man von ihr aus Bayern, Schlesien, aus dem Schwarzwalde und Thüringer Walde schon gehört. Höchstwahrscheinlich ist der von HH. Grüter und Gr. v. Sponneck (*Hartig Journ. f. J. u. F.* Jahrg. 1806 S. 428. und Jahrg. 1808 S. 113.) als Weistannenzerstörer erwähnte Käfer dieser. Der Käfer überwintert nach Hrn. Kaboth unter der Rinde des stehenden Holzes und liegt sehr früh, nach Hrn. Zebe, der auch eine doppelte Generation vermuthet, schon in der ersten Hälfte des April (bald nach *H. piniperda*). Hier sind, wie auch auf dem Thüringer Walde, wo ich die Käfer selbst beobachtete, und in dem von Grüter gemeldeten Falle die Weistannen mit Fichten, und dann und wann auch mit Kiefern gemischt, welche aber nicht vom Käfer angegangen werden. Der Käfer besfällt nach Hrn. Kaboth, Meix, Zebe, immer zuerst die Gipfelpartien und tödtet den Baum von oben nach unten, so dafs an Stämmen, welche oben schon trocken waren, doch noch die untern Äste grünen (HH. Kaboth, Kellner, Meix). Hr. Kaboth kennt Stämme in alten haubaren Weistannen, welche schon 10 J. lang vom Käfer bewohnt sind. Die Wipfel sehen krank aus und die untern Theile des Stammes sind ganz gesund




mit grünen Ästen besetzt. Im Innern der Bestände, besonders geschlossener, nicht durch Plänterwirthschaft gelichteter (Hr. Zebe) fand er sich weit seltener als an den Rändern der Schläge, und wenn er, wie er sich in Oberschlesien mehr in Folge großer Dürre (den J. 1834 und 1835) als großer Windbrüche ereignete, auch dort einbrach, bezwang er nicht die Stämme, sondern er wurde durch den zu starken Harzausfluß erstickt und nur einzelne, wahrscheinlich schon kränkelnde Bäume giengen ein, immer aber erst im folgenden Jahre. Im Leobschlützer Stadforste war nach Hrn. v. Pannowitz der durch ihn angerichtete Schaden bedeutend. Ganz kürzlich erhielt ich noch wieder interessante Nachrichten über diese Art von Herrn Baron Schott v. Schottendorf. Er hatte denselben in den Jahren 1834 bis 1836 zu beobachten Gelegenheit gehabt zwischen Stuttgart und Elwangen im Schorndorfer Forste (in den beiden Forstrevieren Plüderhausen und Adelberg) und zwar in endloser Menge. Der Käfer wüthete daselbst meist in alten Stämmen und zwar so fürchterlich, wie wir es noch in keinem andern Falle gehört haben. Die Weistannen wurden gewöhnlich schon in 14 Tagen roth und kränkelten zuweilen schon den zweiten Tag nach dem Aubohren. Es mußten in der Zeit alljährlich von trockenem Holze bis 400 und 500 Klaftern (zu 144 Cub. F.) gefällt werden. Seine Gänge sind T. XV. F. 3. abgebildet. Sie sind (oft bis 3" sich ausbreitende 0,5" breite) doppelterartige Wägegänge, bald vollkommen wagerecht, bald mehr diagonal und unregelmäßig verlaufend, oft auch Doppelfiguren von diesem Ansehen  bildend (so dafs also von einem Bohrlöche ein Käferpaar auf- und das andre absteigt). Der Eingang meistens sehr lang (bis 7"). Die Wiegen im Baste oder oberflächlich im, schon von den Larven tief gefurchten, Splinten. Fluglöcher wie mit No. 11. oder 12. geschossen. Demnach kann auch diese Art immer mit zu den merklich schädlichen, ja nach den obigen Mittheilungen zu den sehr schädlichen gezählt werden, um so mehr als es das einzige bis jetzt bekannte, die Weistanne in größerer Menge tödtende Insect ist (*Curculio* und *Botrachus Piceae* sind doch lange nicht so häufig). Es scheint aus allen Berichten hervorzugehen, dafs in gut bewirthschafteten, geschlossenen Beständen nicht viel von ihm zu befürchten sein wird, dafs er dagegen in durchplänterten und verhaueuen viel Schaden anrichten kann. In einem so durchhaueuen Forste von 100-150jährigen Tannen zeigte er sich nach Hrn. Zebe sehr schädlich. Junge Stangenhölzer von 5-6" sah ihn Hr. Kaboth ebenfalls angehen, er wurde aber durch den Saftausfluß zurückgetrieben und die Stangen blieben gesund. Die Vorbauung ergibt sich also hieraus von selbst. Vertilgungsmafsregeln sind noch von Niemand angegeben worden. Wahrscheinlich geht er aber, eben so gut wie andre Borkenkäfer, in Fangbäume und kann so zerstört werden.

5. *B. chalcographus* Linn. 6zähliger Fichten-Borkenkäfer. (Taf. XII. F. 13, 14. Taf. XIV. F. 4-6.)

CHARACTERISTIK. 0,9" bis etwas über 1" lang, ausgezeichnet durch äufserst feine, gegen das Ende der Flügeldecken ganz verschwindende Punktreihen und grösstentheils glatte Zwischenräume, so wie auch durch die 3 Zähne an der abschüssigen, nur neben der Nath etwas eingedrückten Stelle, welche beim Männchen lang, spitz und deutlich nach oben und innen gekrümmt, beim Weibchen aber nur als mehr oder weniger verschwindende, auch näher an einander (gegen das Flügelende hin) rückende, selten spitze Höcker erscheinen. (V. Gyllenhal u. A. werden die grofszähligen für die Weibchen genommen, s. Pfeil's crit. Bl. VII. t. S. 84.) Der Halsschild vorn bedeutend verschmälert, fast eingeschnürt. Der ganze Körper fettglänzend, am Halsschild und der Flügelbasis meist dunkel-, übrigens hell röthlich braun.

VORKOMMEN u. s. f. In allen Fichten- (und wahrscheinlich auch Weistannen-) Wäldern vom Schwarzwalde bis nach Skandinavien (Gyllenhal) und dem Ural (Hr. Ménétrés) hinauf. Er ist ein treuer Begleiter des *typographus*, theils mit ihm unter einer Rinde wohnend und zwischen seine Gänge sich ausbreitend, theils, und noch häufiger, nur die Spitzen großer Bäume und ihre Äste suchend, oder auch die





löcher mehrerer Familien. Das Bohrloch ist das untere der beiden durch eine Linie verbundenen. An dünnen Ästen läuft ein Gang des Sterns öfter rings herum. Hinsichtlich der forstlichen Bedeutung und Begegnung gilt das bei *typographus* Gesagte auch für diese sehr schädliche Art (s. auch Pfeil's *critische Blätter* VII, 1.85.).

geringen Stangenhölzer vorzugsweise (besonders wo im Dickicht viel Windbruch ist) angreifend, oder endlich auch starke Fichten von oben bis unten allein bewohnend, wie ich mich am Einersberge in Gesellschaft des Herrn Saxen selbst überzeugte. Man trifft von ihm wie von diesem Larven und Puppen auch im Winter, so daß es denn auch späte Frühjahrsflüge, welche neue Generationen simuliren, giebt. Hr. Thiersch will bemerkt haben, daß seine Entwicklung langsamer als die des *typographus* vor sich gehe, weil an Bäumen, die von beiden gleichzeitig angebohrt worden waren, noch nach 3 Wochen, nachdem *typographus* denselben verlassen hatte, *chalcographus* sich vorfand. Seine (Stern-) Gänge sind sehr ausgezeichnet. In der größeren der hier beigezeichneten Figuren, welche die Bastseite eines dünnen Rindenstückes darstellt, sind 6 von einer (schon bis auf den Bast vertieften) Rammelkammer aus führende Gänge mit am Anfange derselben schon ganz und am Ende nur wenig entwickelten Larvengängen dargestellt, und in der kleinern, welche dickere Rinde zeigt, ist eine nur 4strahlige Gängegruppe mit größtentheils noch gar nicht entwickelten Larven zu sehen. Die Rammelkammer war noch durch eine bedeutende Bastschicht verdeckt, so daß die Gänge erst in ziemlicher Entfernung von derselben auf der Splintseite des Bastes zum Vorschein kommen. Auf T. XV. F. 1. sieht man die Nachbarschaft mit *typographus*. Alle Gruppen zeigten sich an diesem (von Lauterberg herstammenden) Stücke 5strahlig. Luftlöcher sind nicht in allen Gängen vorhanden. An der dritten hier beigezeichneten Figur sieht man die, wie mit dem feinsten Schrot geschossenen Flug-

6. *B. bidens* Fbr. Zweizähniger Kiefern-Borkenkäfer. (T. XII. F. 11, 12.)

NAMEN. Nur das Weibchen (welches allerdings sehr verführerisch ist) wurde einmal verwechselt (*B. chalcographus* Payk.). Das Männchen ist immer *bidens*, aber von Herbst *bidentatus* genannt.

CHARACTERISTIK. 0,9" bis 1,1" lang, ausgezeichnet durch den vorn fast so stark wie bei *chalcographus* verengten, beinahe eingeschnürten und mit einer wirklichen, glatten Leiste versehenen Halschild, die überall punktirten Zwischenräume und überall deutlichen Flügelreihen, zwischen deren Punkten jedoch (besonders beim Männchen) auffallend breite, glatte Brücken stehen. Das Männchen hinten mit deutlichem aber nur flachem Eindrucke, an dessen Rande ganz oben jederseits ein sehr stark nach unten gekrümmter Haken. Meist steht über jedem noch ein Höckerchen und selten am untern Viertel des Eindruckrandes noch ein spitzes Zähnchen jederseits (*B. quadridens*). Diesen merkwürdigen, von Hrn. Hartig (*Conversat - Lex.* S. 109.) zuerst erwähnten Käfer fand ich im Winter 1837-38 wieder in Kiefernreisig und zwar in einem Knüppel so häufig, daß eine eigne Familie von solchen Vierzähligen zusammengelegt zu haben schien. Die Gänge waren genau die des *B. bidens*. Als eigne Art kann ich ihn indessen eben so wenig wie den *B. suburalis* gelten lassen, wenn er auch noch in folgenden, unwesentlichen Merkmalen von dem eigentlichen Zweizahn abweicht. Die Punkte, sowohl an der hintern Hälfte des Halschildes wie auch auf den Flügeln, sind etwas schwächer und das Höckerchen, welches bei *bidens* über dem Hakenzahn steht, fehlt meist, ist aber doch bei einem Exemplar auf der linken Seite vorhanden. Beim Weibchen fehlen die Haken und Höckerchen gänzlich und statt des Eindruckes findet sich neben der Nath nur eine schmale Furche, welche nach aufsen von der wulstig vortretenden, abschüssigen Stelle begrenzt wird. Schwarz oder am Halschild dunkel, an den Flügeln hell-braun. Behaarung nicht stark.

VORKOMMEN u. s. f. Nur in Kiefern, in diesen aber wahrscheinlich sehr weit verbreitet, namentlich auch durch Schweden und Rußland. Der Käfer ist in der Mark überall sehr gemein und wird den Kiefern-Culturen zuweilen sehr schädlich, hat auch, wie mir Hr. v. Pannewitz gütigst mittheilte, in Ober-Schlesien i. J. 1836 einen großen Theil einer diesjährigen, anfänglich gelungenen, Kiefernplantation zerstört. Er findet sich nämlich nicht bloß auf Holzplätzen im Kiefern-Knüppelholze (immer in den kaum armdicken Asttheilen vorzugsweise) sondern auch auf Kiefern-Culturen und Schlägen. Hier ist er allerdings am liebsten in den Astabgängen und ausgerissenen Pflanzen, selbst den kaum fingerdicken und den schon modernden, geht aber auch, ohne daß man einmal sagen könnte, es fehlte ihm an Reisig, in die lebenden Pflanzen und zerstört diese gemeinschaftlich mit *Curculio notatus*, mit *Bostrichus Laricis* und mehreren Hylesinen. Von allen diesen unterscheiden ihn gleich seine Gänge, welche Sterngänge (s. hierneben), wie die von *chalcographus* sind. Sie sind aber meist länger (bis 2"), geschlungener und greifen sammt der Rammelkammer tief in den Splint. Die Larvengänge meist weitläufiger. An sehr dünnen Stämmchen und Ästen ist der auf- und absteigende Gang gewöhnlich länger als die seitwärts herumlaufenden. Zur Verpuppung gehen die Larven sowohl in die Rinde wie auch ins Holz. Ich holte die Käfer (welche bald senkrecht bald wagerecht liegen) öfters aus dem Innern des ersten Splintringes hervor. Die anderthalbige Generation scheint hier Regel zu sein, denn ich fand fast in jedem Winter Larven und Puppen und im Mai doch schon schwärmende Käfer. Als



Bb

Vorbauung ist, wie man sieht, Reinlichkeit wieder am meisten zu empfehlen. Wird eine Vertilgung nöthig, so reisse man die befallenen Pflanzen vor dem Juli aus und verbrenne sie. Letzteres darf nicht unterbleiben, da die Brut sich auch unter der dünnsten Rinde vollständig ausbildet, diese mag trocken oder feucht sein. In Fangbäumen habe ich ihn nie bemerkt, wie er überhaupt jede, nur etwas dickere, Rinde vermeidet.

•• Die abschüssige Stelle der Flügeldecken ohne spitze Zähne;

\* Halsschild punktiert, oder auch an der Vorderhälfte unregelmäßig gehöckert.

7. *B. autographus* Kn. (*B. villosus* Gyll.). Zottiger Fichten-Borkenkäfer. (Taf. XIII. Fig. 6.)

NAMEN. Unter dem Namen *autographus*, so wie unter der Bezeichnung *Pinastri* Znk. stecken Harzer und Hannöversche Exemplare, welche vollkommen den von mir in Fichten so häufig gesammelten und denjenigen gleichen, welche Gyllenhal unter dem längst vergebenen Namen *villosus* beschreibt. Wahrscheinlich gehört auch der *villosus* von Herbst (V. 121.) und Duftschmid (III. 93.) hierher. Alle diese, so wie auch Bechstein (S. 216.) (der sich sehr kurz und undeutlich ausdrückt), citiren Fabricius, und doch ist dessen *villosus* ein ganz anderer, ein Laubholz-Borkenkäfer.

CHARACTERISTIK. Gröfse, Gestalt und Farbe des *B. Laricis*, doch meist etwas kleiner und gedrungenet, und ausgezeichnet durch einen überall weitläufig und grob punktierten, hinten etwas verschmälerten und daher fast oval erscheinenden Halsschild, so wie auch durch deutlich vorspringende Schulterecken, grofse tiefe Punkte der Flügelreihen und eine feine Punktreihe auf jedem Zwischenraume. An der abschüssigen Stelle, wo die Punktreihen undeutlicher werden, kein Eindruck, sondern nur eine Vertiefung neben der Nath.

VORKOMMEN, LEBENSWEISE U. S. W. Sehr verbreitet [vom südlichen Deutschland (Hr. Warnkönig) bis hinauf nach Rußland und Schweden gefunden], wahrscheinlich aber nur in Fichten oder doch nur ausnahmsweise in Weifstannen (in welchen ihn Hr. Warnkönig fand). In Fichten habe ich ihn selbst schon in großer Menge gefunden. In Ostpreußen (Hr. v. Burgsdorf) fand man ihn in großen Haufen beisammen und unter dem Moose freiliegend und zwar wo wurmtrocknes Holz gefällt worden war. Was Bechstein unter *B. villosus* versteht, ist weder aus seiner Beschreibung noch aus der sehr kurzen Darstellung der Lebensweise zu entnehmen. Noch muß ich wegen seiner Gänge Folgendes erwähnen. Hr. Saxesen sowohl wie Hr. Kellner, mit denen ich im Thüringer Walde gemeinschaftlich die Käfer in großer Menge fand, aber vergeblich nach den Gängen derselben suchte, versicherten, dafs sie letztere auch früher, obgleich ihnen der Käfer schon lange bekannt war, nicht fanden und dafs es sehr wahrscheinlich sei, er schmarotze in fremden Gängen, oder er brüte nur in der Rinde (also wie der so nahe verwandte *cryptographus*) und gebe erst später bis auf den Bast. Wir fanden ihn z. B. in den Gängen von *Hyl. decumanus*, die übrigens auch schon so sehr zerfressen waren, dafs man wenig mehr von ihnen erkannte. Seine forstliche Bedeutung ist demnach noch nicht mit Sicherheit festzustellen. Häufig genug ist er, um merklich schädlich werden zu können.

VERWANDT und zwar sehr nahe [auch als Rindenfresser (s. Allgem. S. 135.)] sind: 1) der, 1,3" lange, in abgestorbenen Schwarzpappeln im Innern der meist schon verwesenen, sehr feuchten Rinde gedrängt beisammen lebende *B. cryptographus* Kugelan, welcher einen fast ganz kreisrunden, bis über die Hälfte scharf gehöckerten Halsschild und so kleine Punkte der, hinten neben der Nath etwas gefurcht-eingedrückten, Flügelreihen hat, dafs die Reihen der Zwischenräume ihnen fast gleichen und die Flügel auferst dicht reihig-punktiert erscheinen. 2) Der (1,4" bis 1,5" lange), in Eichen lebende *B. villosus* Fabr. (T. XIII.

F. 7, 8.), welcher einen längern, nach hinten gar nicht verschmälerten, überall dicht geböckerten Halsschild und sehr große Punkte der Flügelreihen und sehr feine der Zwischenräume, so wie auch eine stark eingedrückte Furche jederseits neben der Endnath hat und sich durch die stärkste und längste, fast goldgelbe Behaarung des Körpers auszeichnet. — Beide Arten zeigen auch darin sehr nahe Verwandtschaft, daß sie höchst auffallend gebildete Männchen haben, welche so selten sind (\*), daß sie noch gar nicht bekannt zu sein schienen, wir wenigstens auch unter den zahlreichen Sendungen seltener Xylophagen aus allen Gegenden, so wie aller mir bekannten Museen nicht zu Gesichte kamen. Sie sind ganz flach gewölbt, haben einen durchaus glatten und glänzenden Halsschild, auffallend lange Beine und außerordentlich lange, aber nicht sehr dicht stehende Haare. Auch ist die Punktirung der Flügel im Verhältniß zu der der Weibchen sehr schwach und die Punkte der Zwischenräume bilden eben so starke Reihen wie die der Hauptreihen selbst. An der (hier sehr schwach) abschüssigen Stelle ist auch ein kleiner Eindruck zu erkennen, bei *villosus* (s. T. XIII. F. 8.), der sich auch durch ganz parallele Halsschildränder von *cryptogr.* unterscheidet, noch etwas deutlicher als bei diesem. Die beiden Individuen, welche ich besitze, sind durchaus gleich groß und nur 0,9" lang und kaum 0,4" breit. Sie sind ganz hell strohgelb, also frisch entwickelt. Über die Lebensweise des *B. villosus* fand ich im September 1838 auf einer Reise durch das westliche Mitteldeutschland, wo ich ihn in Westphalen, im Forstreviere Holz (Regierungsbezirk Trier) und im Spessart traf, Gelegenheit meine Kenntnisse zu erweitern. Im ausgegrabenen Stocke einer starken Eiche sah ich in dem ziemlich langen Stockende zahlreiche Familien des Insects, welche theils aus schon fertigen Käfern, theils noch aus Larven und Puppen bestanden. Die Gänge waren deutliche, tief in den Bast eingreifende Wüggänge von 2-3" Länge. In den sehr gedrängten, auf- und abwärts laufenden Larvengängen steckten noch eine Menge Larven (wahrscheinlich von einem verspäteten Sommersatze herrührend). Die weichen Käfer krochen noch auf dem Splinte herum, dagegen hatten sich die mehr erhärteten schon in das Innere der Rinde hineingefressen. Wahrscheinlich hatten also alle Exemplare, welche ich früher in Eichenrinde fand, schon ihre Wiege verlassen und ich war dadurch veranlaßt worden, sie für Rindenkäfer zu halten. Nachher stieß ich wieder auf den Käfer in den aus Eichen und Buchen gemischten herrlichen Hochwaldbeständen des Holzer Reviers. Hr. Forstinspector Wasserburger machte mich hier auf die (später auch von mir im Spessart bemerkten) circa 200jährigen Eichen aufmerksam, welche auf eine eigenthümliche Weise absterben und wegen des Mangels an Ästen und des zugespitzt endenden Stammes Spiefse hier genannt werden — eine Benennung die auch anderswo, wenn ich nicht irre im Spreewalde, vorkommen soll —. Die Rinde löst sich so vollständig von oben her gegen den Fuß des Stammes hin, daß der nach und nach entblößte und ausgetrocknete, allmählig ganz weiß werdende, Stamm wie ein Gespenst von weitem herleuchtet. Wir untersuchten an mehreren Stämmen, welche untenher noch mit Rinde bekleidet waren, diese letztere und fanden sie auf der Bastseite ganz von Insekten zerfressen, auch glückte es mir, mehrere zwar schon abgestorbene, aber doch noch deutlich erkennbare Exemplare des *B. villosus* aus den Abnageln hervorzuziehen und überdies auch an den breiten und großen Gängen zu erkennen, daß *Phaenocarpa bombyx cossus* und einige *Cerambyces* hier gewirthschaftet hatten. Unter diesen Verwüsten dürfte der *Bostrichus* nebst dem *Cossus* wohl die erste Berücksichtigung verdienen. Wenn auch nicht anzunehmen ist, daß sie allein an dem Untergange der Stämme Schuld seien, so ist doch höchstwahrscheinlich, daß sie die Anfangs aus unbekannten, andern Ursachen kranken Bäume schnell dem Tode zuführten.

---

(\*) Von *cryptographus* erzog ich in einem Rindenstücke eines Schwarzapfelstockes eine ganze Familie, welche aus 66 Weibchen und einem einzigen Männchen bestand. Auch aus mehreren Eichenstöcken, in welchem viele Weibchen des *villosus* steckten, erhielt ich nur 1 Männchen.

8. *B. bicolor* Hb. Kleiner Buchen-Borkenkäfer. (Taf. XII. Fig. 9, 10.)

NAMEN. Nach Exemplaren des Berliner Museums ist dieser der, auch ziemlich kenntlich beschriebene *B. bicolor* von Herbst (Nat. V. S. 116.). Gyllenhal muß die Rechte dieses Namens nicht gekannt haben, denn er beschreibt die Art als *B. fuscus* (weil sie bei Marsham *Ips fuscus* heißt) und führt im 4ten Bande noch *B. retusus* Dej. als Synonymon an (welches auch durch Schwed. Exmp. in Hrn. Germar's Sammlung bestätigt wird). Der letztere Name kann aber auf keinen Fall bestehen, denn er ist von Olivier entlehnt und dieser hat (wie ich aus Exemplaren, die nach Olivier's Sammlung bestimmt waren, weiß) das Weibchen von *B. hispinus* dafür genommen.

CHARACTERISTIK, VORKOMMEN u. s. f. 0,9" bis 1" lang, also einer der kleinsten und durch sein Vorkommen unter Rothbuchenrinde (sehr selten unter Weißbuchenrinde), wo er der einzige, bis jetzt bekannte, *Bostrichus* ist, ausgezeichnet. Er ist ziemlich gedrungen. Halsschild vorn höckerig, hinten dicht punktiert ohne irgend eine glatte Mittellinie. Flügel mit sehr dichten und großen Punkten der Flügelreihen und einer starken Punktreihe der hier und da ein wenig gerunzelten Zwischenräume, hinten sehr stark und plötzlich abschüssig (s. T. XII. F. 10.) und mit etwas vortretender Nath. Überall mit bräunlich-grauen steifen und kurzen, hinten sogar büstenartig abstehenden Haaren besetzt. Entweder einfarbig hell- oder dunkel schmutzig-braun, oder zuweilen vorn heller, hinten dunkler (daher *bicolor*). Die Stirn des Männchens etwas eingedrückt, mit dichter, kurz geschornen, bräunlich-gelber Haarbürste; das Weibchen mehr gewölbt, nur mit einzelnen, aber ziemlich langen Haaren. Die zerstreuten kleinen Gänge (s. T. XXI. F. 5.), welche man zwischen den Höckern der Markstrahlen auf dem Baste bemerkt, rühren wahrscheinlich nur von den Larven her und die Muttergänge finden sich nur im Innern der Rinde. Man trifft fast zu allen Zeiten Brut. Allermeist geht er nur unter die Rinde abgestorbener Bäume; der verstorbene S. Weber will aber auch Stämme gesehen haben, die durch ihn getödtet wären. Überall gemein.

9. *B. (Crypturg.) pusillus* Gyll. Schmalere Fichten-Borkenkäfer. (Taf. XIII. Fig. 16. Taf. XIV. Fig. 7-9.)

CHARACTERISTIK. Nur 0,5" lang und sehr schmal, also wohl der kleinste Borkenkäfer in der Fichte! Auch ist er ausgezeichnet durch außerordentlich geringe und kurze Behaarung und einen Fettglanz des ganzen Körpers. Der Halsschild am ganz vordern Drittheil verschmälert, und auch hinten etwas verengt-gerundet und daher fast oval, weitläufig punktiert und der ganzen Länge nach von einer glatten Mittellinie durchzogen. Die Punkte der hinten allmählig gewölbt-abschüssigen Flügel groß und rund, die Zwischenräume aber nur mit sparsamen Punkten.

VORKOMMEN. Der *Bostrichus pusillus* scheint nur Fichten zu bewohnen und wieder sehr weit südlich und nördlich zu gehen. Neuerlich hat ihn jedoch Hr. Radzay auch in der Weißstanne gefunden. In den vom Wipfelende entnommenen Rindenstücken, welche ich von ihm erhielt, hatte der kleine Käfer mit *B. curvidens* zusammen gebauset. Gyllenhal nennt ihn häufig und Hr. Waltl fand ihn in den letzten Jahren zu Millionen an verschiedenen Orten in Bayern und versichert, daß er große Strecken verheert habe. Auch im Harze und Thüringer Walde, in Schlesien und Ostpreußen ist er häufig, und ich fand ihn hier zum Theil selbst, zum Theil erhielt ich ihn in großer Menge. Hr. v. Burgsdorf fand ihn nur in jungen (20-40jährigen) Hölzern (mit *Hyl. polygraphus* zusammen) und zwar am meisten an den äußersten und zartesten Trieben, wie auch selbst noch in abgeplatteter Rinde, wenn sie nur noch saftig war, Hr. Saxen dagegen auch in starken Stämmen und Stöcken. Ihm schien es, als benutzte der Käfer Anfangs wohl die Eingänge von *Hyl. palliatus* und mache dann erst in und auf dem Baste seine eignen. Er sahe immer nur sehr verworrene Gänge. Die auf der Splintfläche des Bastes befindlichen schienen ihm immer nur vom Käfer gefressen, während die Larven nur immer im Innern des Bastes lebten. An Ostpreußen

sehen und Bayerschen Stücken glaube ich aber auch Larvengänge auf der Bastoberfläche zu sehen. Sie halten sich aber ganz in der Nähe des Ganges und haben Alles bunt zerstört. Der Anfall des Käfers auf die Fichten ist erwiesen und wir rechnen ihn mit Grund zu den merklich schädlichen, obgleich er von andern abhängt und ohne deren Gänge nicht die Rinde durchdringen kann, was noch der Kleinheit des Käfers wegen Glauben verdient.

VERWANDT sind: 1) *B. (Crypturgus) cinereus* Hb. (T. XIII. F. 15.) (nach dem Berl. Museum, aber nicht nach Herbst's Beschreibung, wohl aber nach der Gyllenhal'schen kenntlich), etwas größer als *pusillus* und etwas gedrungener und besonders ausgezeichnet durch hinten äußerst wenig und vorn auch nur schwach verschmälerten, äußerst fein punktirten, nur an der hintern Hälfte eine glatte Mittellinie lastenden Halsschild und sehr breit gezogene große Punkte und gar nicht punktirte Zwischenräume der fast gerunzelt erscheinenden, fein (und besonders an der Mitte der abschüssigen Stelle deutlich goldgelb) behaarten Flügeldecken. In Kiefern, nicht bloß alten, sondern auch nach Hrn. Radzay in jungen, 15jährigen, in Folge von Raupenfraß eingegangenen, wo er bald im Innern der Rinde haust, bald aber auch mit einzelnen vertikalen oder diagonalen Gängen bis auf die Bastoberfläche kommt und an der Kleinheit derselben zu erkennen ist. — 2) *B. pityographus* [der Name *micrographus* Linn., Fbr. u. A., welchen Gyllenhal, wie ich aus Germar's Exemplaren weiß, auf dies Thier bezieht, ist schon so oft verschieden gedeutet worden, daß ich ihn lieber ganz aufgab und durch *pityographus* ersetzte; *B. melancholicus* Chevrolat (T. XIII. F. 3.)] 0,9" lang, also einer der kleinsten und ausgezeichnet durch sehr geringe Behaarung, vorn stark verschmälerten, fast eingeschnürten, (fast concentrisch-) geböckerten, hinten weitläufig punktirten, kaum in der Mitte etwas glatten Halsschild, durch große goldgelbe Strabürste des Männchens und durch deutliche, gegen die Nath sogar verbreiterte Punktreihen und ganz glatte Zwischenräume der Flügel, an deren abschüssiger Stelle die Peripherie stark gewulstet aber glatt, die Gegend neben der Nath bis hoch hinauf aber schmal vertieft erscheint (\*). Um Hanau (Hr. Waltl), im Harze (Hr. v. Erdmann), in Pommern (Hr. Hartig), Ostpreußen (Hr. v. Burgsdorf), Oberschlesien (Hr. Zebe) und Schweden (Gyllenhal) an Fichtenstangen und 6-jährigen Pflanzen, an letzteren mit *B. Abietis* zusammen zerstörend. Später ist der Käfer auch im Solling von Hrn. Förster Steinhof in Fichten gefunden worden. Das Pommersche Exemplar allein (s. Hartig's *Jahresber.* S. 194.) soll in einem Kiefernreviere gefangen worden sein. Es wäre daher doch noch denkbar, daß es sich aus einzelnen Fichten, an denen es dort gewis nicht fehlt, verfliegen habe, und es ist dies um so wahrscheinlicher, als alle Beobachter, welche das Insect im Baume antrafen, es nur aus Fichten erhielten. Gänge höchstens 1" lang, vereinzelt, geschlängelt, 0,4" breit, meist wagerecht oder diagonal, mit sehr zerstreuten weitläufigen (oft nur 2-4) Larvengängen. — 3) Der 1" lange *B. Lichtensteinii* (dem um die Forstinsecten so verdienten Berliner Gelehrten zu Ehren genannt), dem *pityographus* in der Gestalt sehr ähnlich, auch beim Männchen am Umkreise der vertieften Stirn eine, aber mehr graugelbe, Haarwulst zeigend, ausgezeichnet jedoch durch den noch stärker geböckerten und plötzlich durch eine Einschnürung absetzenden Vordertheil des Halsschildes und die stärkeren Punktreihen der Flügeldecken. Letztere hinten noch tiefer und breiter neben der Nath eingedrückt und hier glatt, so daß an der Peripherie keine so breite Wulst bleibt, sondern eine gerundete Kante, auf welcher man jederseits beim Männchen eine (von der nachstündigen Punktreihe geschwungen herkommende) Reihe von 4-5 haartragenden Körnchen, beim Weibchen aber nur die Härchen bemerkt. Außer den einzelnen mir aus dem Hannoverschen und Bayerschen zugekommenen Exemplaren habe ich zahlreichere kürzlich aus dem Thüringer

(\*) Sehr nahe verwandt (gedrungener, aber nicht größer als *pityographus*) ist *B. exsculptus* Waltl, ausgezeichnet durch sehr tiefen Eindruck hinten neben der Nath und sehr scharf und gekerbt hervortretenden Umkreis, auch durch etwas weniger vorn verengten Halsschild und deutlichere und größere Punkte der Flügel.

Walde von Herrn Kellner erhalten, und was noch mehr werth ist, auch die genaue Schilderung der Lebensweise dieses kleinen Borkenkäfers. Herr Kellner fand die Käfer zuerst im März des J. 1838 an jungen Kiefern der Vorberge, namentlich des Ringberges (zwischen Finsterbergen und Engelsbach). Sie kamen hier stets in gesonderten Gängen vor, während *B. bidens* wieder seine eignen Zweige bewohnt. Die Gänge sind aber denen von *B. bidens* außerordentlich ähnlich und ich möchte nur einen Unterschied darin finden, daß der *B. Lichtensteini* seinen Stämmen zahlreiche Strahlen (oft bis 8!) giebt und dieselben, wie mir scheint, auch tiefer ins Holz hineinarbeitet. Die Muttergänge haben, im Vergleich mit dem sehr kleinen Käfer, eine sehr ansehnliche Breite ( $\frac{1}{2}$ "). Auch bemerkt man daran, daß viele Larven vor ihrer Verpuppung sich ungewöhnlich tief in das Holz eingraben (durch 3-4 Ringe hindurch).

\*\* Halsschild mit einem nach hinten verschmälerten, regelmäßig gereihten Körnchen tragenden (fast rhomboidalen) Flecke.

10. *B. (Cryphalus) Abietis*. Gekörnter Fichtenborkenkäfer. (Taf. XIII. Fig. 17. Taf. XIV. Fig. 12-14.)

NAMEN. Man hatte ihn schon längere Zeit in Deutschland bemerkt und ihn für den *asperatus* Gyll. (s. unten) gehalten, bis ich durch Gyllenhal'sche Exemplare in Hrn. Germar's Sammlung den ächten *asperatus* kennen lernte und gegenwärtigen zu trennen genöthigt war.

CHARACTERISTIK. 0,7" lang, gedrungen und stark gewölbt. Halsschild fast kuglig, an den Seiten und hinten sehr fein punktiert. Die Körnchen des vorn sehr schmalen Rhombus weitläufig und nur hier und da (besonders hinten) Reihen bildend. Flügeldecken etwas mehr als zweimal so lang als Halsschild, mit deutlich vertieften Punktreihen und äußerst fein punktierten Zwischenräumen, überall mit äußerst feinen, anliegenden, rötlich-braungrau schillernden Schuppenhärchen und sehr sparsamen, abstehenden, kurzen (hinten kaum bemerkbaren) Haaren bedeckt (unabgerieben daher matt). Beine und Fühler hell rötlich-braun, sonst schwarzbraun.



VORKOMMEN, LEBENSWEISE U. S. W. Auch diese Art lebt in Fichten. Bis jetzt fand ich ihn nur in Ober-Schlesien, Ostpreußen, dem Thüringer Walde und dem Harze. Wahrscheinlich sieht man ihn aber auch in andern Fichtenwäldern, wenn man ihn ordentlich kennt. Er gehört sogar zu den merklich schädlichen, denn ich sahe 8-12jährige, schon abgestorbene, Fichten, unter deren Rinde es von ihm wimmelte. Auch einzelne junge 2-6jährige Pflanzen in Büscheln zerstört er. Seinen Sitz nimmt er zuerst in der Nähe der Äste. Die Gänge haben immer nur das Ansehen, wie in der beigedruckten, die Abseggend eines Rindenstückes von einer jungen Fichtenstange darstellenden Figur, d. h. man bemerkt nur Larvengänge von einer größeren und breiteren ausgefressenen Stelle (dem Muttergange) ausgehend und unregelmäßige Figuren bildend. Hr. Feldjäger v. Erdmann hatte ihn im Harze mit *B. ptygographus* zusammen gesehen und Hr. Saxen (der ihn den frühesten Borkenkäfer, der, während noch Schnee liegt, schon hervorkommt, nennt) fand ihn mit *B. chalcographus* zusammen an Fichtenstämmen. Im J. 1838 hat ihn Hrn. Burckhardt im Solling entdeckt. Der Käfer zeigte sich in außerordentlicher Menge 1) in unterdrückten Fichten mit *B. pusillus* zusammen, 2) in dominirenden, jungen Fichten, selbst in bevorzugten Stämmen mit *Curculio violaceus* zusammen, 3) in Gesellschaft des *B. typographus* und *chalcographus*, des *Hylesinus palliatus*, *ptygographus* und *polygraphus*, in allen Höhen an den 15" starken Fichten, und endlich 4) mit *Bostrichus bidens*, *violaceus* und *notatus* zusammen in 6-10jährigen Pflanzen der Weymouthskiefer.

VERWANDT sind: 1) *B. (Cryphalus) asperatus* Gyll., dem *Abietis* äußerst ähnlich, aber etwas grösser und gedrungener und ausgezeichnet durch den Rhombus des Halsschildes, welcher vorn schmal ist und aus sehr weitläufigen, fast gar nicht regelmäßige Reihen bildenden, großen Körnchen besteht, so wie durch die, nur äußerst feine Punkthöhen aber keine Punktreihen, höchstens einige nachständige Andeutungen von Längsfurchen an Stelle der Punktreihen zeigenden Flügel, auch durch dichtere und längere feine, an der abschüssigen Stelle kaum bemerkbare Härchen und schmutzig hellbraune Beine. 2) *B. (Cryphalus) Piccae*. Am meisten dem *Abietis* ähnlich, aber noch gedrungener, auch meist größer. Körnchen des vorn ziemlich breiten Rhombus in regelmäßige (5-6) gedrängte Reihen geordnet. Flügel ziemlich deutlich punktfleischig. Ganz besonders unterscheiden die großen (besonders an der abschüssigen Stelle) absteigenden graugelben Borstenhaare und schmutzig braunen Beine. Auf dem Baste von Weisstannenrinde in Oberschlesien und Baiern. Hr. Kellner verdanke ich von Hr. Beauregard herrührende Rindenstücke, welche sehr häufige Bohrlöcher zeigen. Sie enden auf der Bastfläche in rundliche oder gekerbrandige (1-2" große) ausgefressene Stellen, wahrscheinlich Rammelkammern. Vermuthlich sollte das Brüten eben beginnen. — 3) *B. (Cryphalus) binodulus* Web. (Taf. XIII. No. 18.). Etwas kleiner als die vorigen und ausgezeichnet dadurch, daß der Vorderrand des Halsschildes in der Mitte 4 vorspringende Körnchen zeigt und daß die übrigen Körnchen vollkommen concentrische Linien bilden und stellenweise fast zu scharfen Leisten verschmelzen, so wie durch wenige, nur nach außen deutliche, gegen die Nath verschwindende Punktreihen der Flügel und 2 Höckerchen an der abschüssigen Stelle (außerhalb des kleinen Eindruckes neben der Nath), welche beim Männchen sehr deutlich, beim Weibchen aber nur schwach gewölbt sind. Füße und Fühler schmutzig hellbraun, sonst glänzend schwarz, mit sparsamen Schuppenhärchen und kurzen, weitläufigen Haaren, welche auf den breiteren beschuppten, mit nackten schmalern Furchen abwechselnden Zwischenräumen stehen. 4) *B. (Cryphalus) granulatus* (von mir wegen des stark gekörnten Halsschildes so genannt (T. XIII. F. 19.). Etwas über 1" lang, glänzend schwarz (nur Fühlerfäden und einige Fußtheile heller) mit 4 Körnchen des Vorderrandes und in concentrische, sehr lange Halbkreise verschmelzenden Körnchen, deutlich punktiert-gestreift, ziemlich dicht, aber kurz behaarten Flügeldecken, an denen an der abschüssigen Stelle neben der Nath die erste und 2te Punktreihe etwas eingedrückt erscheinen. — 5) *B. (Cryphalus) Tiliae* Fabr. (T. XIII. F. 20.). Der kleinste und gedrungenste unter allen verwandten, auch mit 4 vorstehenden Vorderrandkörnern und sehr ausgezeichnet durch sehr kurze (nur 3-4) schwach gebogene Körnchenreihen, deren hintere 2-3 leistentartig verschmolzen und deren vorderste 1-2 unterbrochen und durch deutlich reihig-punktierte, an der abschüssigen Stelle nicht eingedrückte Flügeldecken, welche mit weitläufigen grauen Schuppenfurchen und Reihen von äußerst kurzen Börstchen bedeckt sind. In Linden und Weißbuchen (Hr. Waltl), jedoch nur in wenigen Gegenden [um Passau, Linz, in Schweden (Gyll.)], wo er aber in einem Baume ist, häufig.

→ Bis ins Holz gehend (Holzkäfer). (S. S. 169.)

11. *B. (Xyloterus) lineatus* Gyll. Liniirter Nadelholzkäfer. (Taf. XIII. Fig. 11. Taf. XIV. Fig. 10, 11.)

NAMEN. Da er von einem andern, jedoch wegen des Vorkommens in Laubholz (worauf freilich selten geachtet wird!) nicht zu verwechselnden (*B. domesticus*) zuweilen nicht ordentlich unterschieden wird, so muß man mit den Citaten sehr vorsichtig sein, und ich halte Gyllenhal (der den Namen nach Olivier entlehnt hat) für den Einzigen, bei welchem man seiner Sache gewiß ist. Die ältern und brieflichen Benennungen des Käfers, *melanocephalus*, *limbatus*, *scrratus* u. a., sind daher ganz aufzugeben. *B. signatus* Duftschm. und *marginicollis* Dahl (zwei Benennungen, die im südlichen Deutschland öfters vorkommen) gehören, wie mich Exemplare des Berl. Mus. belehrten, ebenfalls hierher. — In einigen Gegenden heißt er auch schwarzer Wurm.



**CHARACTERISTIK.** 1,5-1,8" lang, sehr gedrunken und walzig. Fühlerkeule schief, stumpflich (T. XII. F. h.). Halsschild fast kuglig, mit ganzrandigem, gleichen Vorderrande, überall, jedoch am dichtesten vorn und in der nach hinten keilförmig sich verschmälernden Mitte mit wellenförmigen Höckern besetzt. Flügeldecken wenig mehr als zweimal länger als Halsschild, mit deutlichen Reihen stark genäherter Punkte und glatten Zwischenräumen, an der abschüssigen Stelle gewölbt und spitzig endend, neben der Nath nur undeutlich gefurcht. Farben allermeist abwechselnd dunkelbraun und hell gelblich-braun, besonders auf jeder Flügeldecke, 3 dunklere und 3 hellere abwechselnde Streifen bildend (daher der Name). Behaarung ziemlich stark. Männchen so zahlreich wie Weibchen und von diesen unterschieden durch stärkere Behaarung (besonders vorn) und vorzüglich durch tief eingedrückte Stirn.

**VORKOMMEN, LEBENSWEISE u. s. w.** Er gehört zu den gemeinsten Arten und kommt sehr weit nach Süden (Schweiz Hr. Heer) und nach Norden verbreitet vor, auch ganz gegen die Gewohnheit der meisten Borkenkäfer nicht bloß in einer Holzart, sondern in mehreren zugleich: Kiefer, Fichte, Tanne, Lärche. Ich halte mich nun auch fest überzeugt, daß der Käfer in der Birke lebt. So lange ich bloß die Angabe von Gyllenhal „in ligno Betulae“ kannte, hegte ich noch einen Zweifel, da sich wohl öfters kleine, die Entomo-Biologie betreffende Fehler des trefflichen Diagnosten finden. Ich konnte mir nicht denken, daß ein Borkenkäfer Nadel- und Laubholz zugleich bewohnen könnte. Und doch ist es so, wenn auch gewiß bis jetzt beispieillos zu nennen. Von Hrn. Hoffelder besitze ich durch die Waldbau-Gesellschaft zu St. Petersburg ein echtes Exemplar des *B. lineatus* und das Stück Birkenholz dazu, aus welchem der Käfer gekommen. Er kann also, wie wenige andre, in allen Ländern sein Vorkommen finden und geht bei uns, wo nur Kiefern sind, in diese, im Harze, wo er meist nur Fichten findet, in diese, im Schwarzwalde, wo die Weistanne vorherrscht, in diese und im Thüringer Walde in alle drei. Die Weistanne scheint er, wo ihm die Wahl bleibt, allen übrigen vorzuziehen. Nach den Erfahrungen Vie-ler, die ich über ihn gesammelt habe (Hh. Kellner, v. Schultes, Thiersch, Warnkönig), so wie nach meinen eignen, fliegt er schon sehr früh im Jahre, im Schwarzwalde schon gegen Ende des März oder im April und im Harze und Thüringer Walde so wie bei uns mit *Hyl. palliatus* zusammen. Es können wohl spätere Flüge vorkommen (s. Hartig's *Convers. Lex.* S. 111.), diese halte ich aber für ungewöhnlich spät entwickelte, wie ich denn in hiesiger Gegend i. J. 1836 auch einmal den Anflug erst gegen Ende des Mai beobachtete. Ungeachtet des frühen Anflugs wird die Brut doch erst spät fertig, gewöhnlich erst im August, so daß an eine zweite Generation nicht zu denken ist. Im Jahre 1838, welches sich durch sehr heiße Tage des Juni und Juli auszeichnete, waren die Käfer schon sämtlich zu Ende Juli's fertig, aber sie lagen, wie ich mich bei Untersuchung mehrerer Stämme überzeugte, noch ruhig in ihren Puppenhöhlen, und als ich im August wieder einige Stämme fallen ließ, wurden wieder eine Menge von Käfern von uns herausgemiselt. Meiner Meinung nach beweist das immer aufs Neue die Einfachheit der Generation. Bei uns greift er immer nur unterdrückte, schwache 15-20jährige Stangen an, die jedoch bis auf das Herz durchbohrt werden, oder beschädigtes älteres Holz, auch selbst die Klaftern. Herr Kellner will ihn ebenfalls nur in kränklichen Stämmen und frischen Stöcken gesehen haben. Nach Hrn. v. Schultes (v. Wedek. *N. Jahrb. d. Forstk.* H. 12. S. 146.) hingegen ginge er auch ganz gesunde Tannen an und verletzte die Fichten so, daß sie dem *typographus* leicht zur Beute würden. Auch Hrn. Thiersch (der mir selbst früher einmal Exemplare des *lineatus* sandte) darf man hier wohl anführen, denn obgleich er den von Bechstein beschriebenen *B. Laricis* (der nie ins Holz geht, wovon auch Bechstein nichts erwähnt) commentirt, so vermischt er doch unverkennbar damit die Schilderung der Lebensweise des *B. lineatus* (*Forstk.* S. 19), indem er sagt: „Im J. 1527 fand ich ihn an mehreren Orten schon am 16ten April in frisch gefällte Nutzhölzer eingeböhrt.“ Auch finden sich bei ihm noch andere hübsche Bemerkungen, aus denen hervorgeht, daß der Käfer den Nutzhölzern sehr verderblich werde, indem er sich bis zu 4" Tiefe einbohrt, daß die

Brut des laufenden Jahres nicht so leicht wieder anliegt u. s. f. Was er von der Brut unter der Rinde sagt, gehört nicht dahin, sondern wahrscheinlich zum *B. Laricis*. Die Gänge zeigen eine matte Schwärze, welche sich auch etwas in die Puppenhöhlen hineingezogen hat, und selbst bis ins benachbarte Holz streifenweise eindringt. Auf dem hier gegebenen (von Hrn. Saxen gezeichneten) Querschnitte eines Stammes sind die Horizontalschnitte (wenn man sich den Stamm stehend denkt) schattirt und die Vertikalschnitte hell. Der in 3 Arme verzweigte Gang stellt den (am Ende des rechten Armes tiefer in das Holz parallel den Markstrahlen eindringenden) Muttergang dar und die, von dem rechten (längsten), auf der verticalen Fläche (parallel dem Jahresringe) hin laufenden Arme nach oben und unten abgehenden Höhlen sind die Puppenhöhlen. Die in ihnen liegenden Käfer kehren, wie ich auch neuerlich wiederholt sahe, den After dem Muttergange zu, wogegen ich öfters Puppen fand, die die umgekehrte Lage hatten. Oft steckt der aus dem Holze hervorkommende Käfer in der Rinde, aber mit dem After voran (s. auch das Allgem. der Holzfresser S. 164. 165.). Von den grössern der beiden linken Arme steigen ebenfalls 2 Puppenhöhlen nach unten. Ausserdem fand sich noch eine andere Familie in der Nähe, deren Gänge aber nicht ganz gezeigt werden konnten. Sie werden aber durch die Öffnungen verständlich. Die auf den vertikalen Flächen zeigen die rechtwinklig durchschnittenen Muttergänge und auf den horizontalen die durchschnittenen Puppenhöhlen. Die Zahl der zu einer Familie gehörenden Brut ist schwer zu bestimmen. Sie muß aber doch oft sehr groß sein, denn ich habe ein Stück Fichtenholz vor mir, in welchem ein nur 10" langes Stück eines Mutterganges 10 Puppenhöhlen und 6 Eihöhlen zeigt, und an einem andern gehen von einem (parallel den Markstrahlen laufenden) Bohrloche auf einer Strecke von kaum 4" schon 3 Muttergänge mit Puppenhöhlen rechtwinklig ab, so daß zwischen je 2 derselben immer nur 2-3 Jahresringe als Scheidewände liegen. Sehr sonderbar sind die langen Canäle, welche ich an vielen Holzstücken parallel den beiden äußersten Splintringen durchgehen sahe. Ich vermuthete, sie sind von Käfern angelegt, welche aus dem Innern zurückkehrten.



VERWANDT ist *B. (Dermestes) domesticus* Linn. (*B. limbatus* Fabr., *Xyloterus dom.* Er.) (T. XIII. F. 12.) 4,7-4,9" lang, also meist etwas größer als der sonst sehr ähnliche *lineatus*, aber weniger gedrungener, mehr zugespitzte Fühlerkeule (besonders beim Männchen s. Taf. XII. F. g.), stärker geböckerten, in der Mitte des Vorderrandes etwas vortretend-ausgerandeten Halschild, etwas schwächer punktirte und an der abschüssigen Stelle neben der Nath deutlich stark gefurchte und deutlich zugespitzte, nie 6-linierte Flügeldecken zeigend, wenn auch abwechselnd dunkler und heller. Nie in Nadelholzern, sondern nur bis jetzt in Buchen gefunden, jedoch nur in gedrückten, nicht mehr wachsenden, hier aber oft in Menge, und dann neuerlich auch noch von Hrn. Zebe in Weisshornen mit *Colydium elongatum* zusammen entdeckt. Die Gänge, bis 4" tief, denen von *B. lineatus* ganz ähnlich, nur etwas stärker, fast 1" breit (s. auch S. 35. und S. 135.). Puppen (in 2" langen und 1" breiten Höhlen) mit dem After gegen die Gänge.



Ce

Ein vorzüglich schönes Exemplar eines aus Buchen geschnittenen Gangstückes ist später noch in Holz geschnitten und umstehend beigedrukt worden. Man sieht an demselben den ächten Character der Leiter-Hölgänge besser als an den Gängen des *Bostrichus lineatus* (s. S. 201 oben.). Bei diesem gehen die Leiterfiguren meist um die Jahrestinge herum, während sie hier bei *domesticus* dieselben durchschneiden und parallel den Markstrahlen liegen. Die Käfer stecken oft in der Rinde dicht unter der Epidermis, mit dem Kopfe gegen das Holz. Verwandlung erst im Herbst beendet. Käfer bleibt wahrscheinlich über Winter in den Gängen. Ob technisch schädlich? Zahl der Männchen zu den Weibchen wie 1:3.

**FÖRSTLICHE BEDEUTUNG UND BEGEGNUNG.** Der Käfer wird in der Regel nicht physiologisch schädlich, wohl aber sehr häufig technisch schädlich und zwar sehr schädlich. In Kiefern hat man über ihn noch keine großen Klagen vernommen, desto mehr in Fichten und Weisstannen. Die getödteten Kiefernstangen, welche ich untersuchte, waren immer zugleich von *Hylesinus palliatus* bewohnt. Im Schwarzwalde, wo alles Holz als Bauholz verworthen wird, oft aber nicht gleich verflößt werden kann und lange liegen muß, richtet er nach Hrn. Warnkönig's interessanten Mittheilungen großen Schaden dadurch an, daß er alles im Winter (sowohl bei Frost als bei Thauwetter) gefällte Bauholz, es mag entrindet oder nicht entrindet sein, angreift und die stärksten Weisstannen-Stämme wie Siebe durchlöchert, wodurch den Holzhändlern immer zu großem Tadel Veranlassung gegeben wird. Daher mag es gekommen sein, daß man dort schon seit den frühesten Zeiten die Salthiebe einführt. Werden die Tannen und Fichten nämlich im Saft gefällt und dann entrindet, so trocknen die Stämme, weil die Tage dann immer wärmer und länger werden, schneller aus und der Käfer findet in ihnen nicht den ihm angenehmen Grad von Feuchtigkeit. Auch mag, wie Hr. Pfeil (*crit. Bl. X. 1. S. 116.*) vermuthet, der harzige Überzug, welcher dann, wenn die wässrigen Theile des austretenden Saftes verdunstet sind, sich auf dem Stamme bildet, den Käfer abhalten. Jedoch hilft auch dies nicht, wenn man die Stämme an feuchten Orten liegen läßt oder ein sehr nasses Frühjahr eintritt. Um jedoch nicht gesetzwidrige Salthiebe vorzunehmen und doch dem Käfer entgegen zu arbeiten, bewirkte Hr. Warnkönig schon seit einigen Jahren die Fällung des Bauholzes, besonders theurer, schwerer Holländer so: daß er erst im Februar und März fällen und bis zum Saftetritte (welcher sich gewöhnlich, wenn das Holz in der Rinde liegen bleibt, einfindet) liegen liefs und dann schälte und behauen liefs. Auch Hr. v. Schultes (v. Wedek. *N. Jahrb. S. 146.*) theilt Erfahrungen mit, welche den Nutzen der Saftschälungen aufser Zweifel setzen. Die Holzhauer und manche Privatwaldbesitzer achten bei der Fällung noch auf die Mondveränderung, um gutes, dauerhaftes und zugleich dem Käfer nicht zugängliches Holz zu erhalten. Hr. Warnkönig stellte selbst Versuche an und überzeugte sich: daß Stammholz, welches im abnehmenden Monde (wobei es oft auf wenige Stunden ankommt) gefällt und aufgearbeitet wurde, schöner, ansehnlicher und dauerhafter blieb, und vom Käfer gar nicht oder doch viel weniger als andres Bauholz ergriffen wurde, welches in einer schlechten Zeit gefällt und aufgemacht worden war. Die Holzfällungen im Winter bei zunehmendem Monde zeigten sich also als die schlechtesten. Es erhellet daraus, daß als Vorbauungs- und Vertilgungsmittel gegen diesen Käfer gelten: Wegschaffen kränkelder Stämme und Stöcke bis zur Flugzeit, zeitige Durchforstungen und Verwahrung der gefällten Nutzhölzer. Ob man dies durch Verkohlung, Verflößung oder Abfuhr, durch Saftschälung oder durch Beizumern der Bauhölzer oder dergl. bewirkt, kann natürlich nur nach der Örtlichkeit und den Wirthschaftsverhältnissen bestimmt werden. Bedient man sich auch der Fangbäume gegen ihn, so reicht natürlich das Abhorken derselben nicht hin, sondern sie müssen, wenn die Brut drin sitzt, entfernt werden.

12. *B. monographus* Fbr. Höckriger Eichenholzkäfer. (Taf. XII. Fig. 5, 6.)

NAMEN. Nach dem Berl. Mus. (wo für ihn auch *erinaceus* steckt) ist dies der ächte *monogr.* Fbr. und nach Hrn. Germar's Exemplaren auch der Gyllenhal'sche. Ob es aber auch der Herbst'sche *tuberculosus* sei (der hinten auf jedem Flügel 2 spitze Höcker haben soll), wie gewöhnlich (auch auf dem Museum) angegeben wird, das bezweifle ich sehr. Herbst's *monographus* (T. V. S. 118.) ist aber auch ein andrer.

CHARACTERISTIK. Das Weibchen 1,5-1,6" lang, ganz walzig und sehr schmal (also mit den verwandten der schlankste unter allen echten Xylophagen). Halsschild sehr langwalzig, vorn plötzlich gerundet, hinten weitläufig und fein punktiert, vorn und in der knopfig erhabenen Mitte höckrig. Flügeldecken nur anderthalb Mal so lang als Halsschild, mit deutlichen Reihen dichtstehender Punkte und auch einer ziemlich dichten Punktreihe der Zwischenräume. Die abschüssige Stelle fast eben, mit mehreren Körnchen. Jederseits 2 kleinere obere und 2 untere sehr entfernte, gröfsere spitze, parallel der Nath und 3 bis 4 kleinere im Umkreise. Das Männchen (*B. cornutus* auct.) ist nur 1,4" lang, sehr gedrungen und mit vorn tief eingedrücktem, am Vorderrande eine hornähnliche, aufgeworfene Zuspitzung zeigenden, Halsschild, sonst dem Weibchen ganz ähnlich. Beide stets röthlich-braun, nie schwärzlich, stark behaart (besonders das Männchen).

VORKOMMEN, LEBENSWEISE u. s. w. Nach den zahlreichen von mir eingesammelten Nachrichten und meinen eigenen Erfahrungen über dies, in seiner Lebensweise gar wenig erforschte aber durch einen grofsen Theil Europas verbreitete Insect (Schweiz bis Schweden, Petersburg, Sibirien nach Hrn. Ménetriés) findet es sich nur in Eichen und zwar meist in Gesellschaft mit *B. dryographus*, mit *Colydium elongatum* und *Platypus cylindrus*, *Lymexylon navale*, wie S. 42 u. 43. schon erwähnt wurde. Die Vermuthung, dafs die beiden Bostrichen die Ureinwohner seien und die andern ihre Bohrlöcher, um in das Holz zu kommen, benutzen, gründet sich auf die Erfahrung: dafs diese beiden Bostrichen wohl ohne *Lymexylon* und *Colydium* allein vorkommen, letztere aber nie ohne erstere von mir gesehen wurden. Linné's Abbildung (S. 43.) zeigt dies ebenfalls. Die (wie mit No. 11 geschossenen) Bohrlöcher und Verzweigungen derselben so wie die Puppenhöhlen sind denen von *B. lineatus* ähnlich, haben aber meist noch mehr und schön dendritisch verzweigte Arme im Holze und sind mehr oder weniger schwarz. Seit mehreren Jahren habe ich keine solche rechtwinklig abgehende, kleine Puppenhöhlen wieder finden können, sondern nur immer dendritisch verzweigte Gänge, so dafs ich fast vermute, diese sei die rechte Bildung, und jene frühere Angabe beruhe auf einer Verwechselung. Da, wie gesagt, von ihnen der Anfang gemacht wird und die andern Holzinsecten erst später hinzukommen, so sind sie auch noch wichtiger als diese. In unsrer Gegend finden sie sich in manchen Jahren sehr häufig, im Forste an den Stöcken und von Rinden stellenweise entblösten Stämmen der Eichen, aber ganz besonders auf Holzplätzen, wo starke Wellen-Eichen verwahrt werden. Will man diese schützen, so mufs man sie, wie bei *Lymexylon* empfohlen ist, mit Theer überziehen. Auch die Auflösungen von Salzen, namentlich Pottasche, Soda, Kochsalz, wenn man sie nur von Zeit zu Zeit wiederholte, damit sie der Regen nicht ganz abwäscht, würden gute Dienste thun. Das Einräuchern mit Schwefel in besondern Häusern, welches auch bei *Lymexylon* von Linné empfohlen wurde, dürfte viel umständlicher sein. [Nachträglich verdient noch als seltne Ausnahme bemerkt zu werden: dafs Hr. Lieutenant Bartikow den Käfer auch einmal beim Einbohren in Buchen fand.]

VERWANDTE sind: 1) *B. dryographus* Er. (auch wohl für *micrographus* angesprochen) T. XII. F. 7, 8.), 1,3" lang, also stets kleiner als *monographus*, sonst demselben in der hellen Farbe, dem geknopften Halsschilde und der schlanken Form, ja selbst in der Lebensweise (die ich vollkommen übereinstim-

mend fand) ganz ähnlich, am meisten verschieden durch die mehr gewölbte, abschüssige Stelle der Flügel, wo anstatt der Körnchen nur jederseits 3, durch Furchen geschiedene Reihen von Höckerchen (die auslaufenden Zwischenräume) sich zeigen. Das kaum 1" lange (meines Wissens, wahrscheinlich wegen seiner Seltenheit noch gar nicht bekannte) Männchen wie *monographus* gehört und bis auf die stärkere Behaarung dem Weibchen ganz ähnlich. 2) *B. Saxesenii* (dem Clausthaler, um die Forstinsecten so verdienten Entomologen zu Ehren), 1-1,5" lang, also meist kleiner als *dryographus*, sonst demselben sehr ähnlich in der schlanken Form, dem geknopften (hinten aber ganz glatten) Halsschilde und der abschüssigen Stelle, letztere jedoch etwas flacher und mit viel deutlicheren, spitzeren, auch über die horizontale Fläche noch etwas fortsitzenden Höckerchen, welche hier auch nur die erste, dritte und zum Theil eine vierte Reihe vollständig haben, und an Statt der 2ten eine breite Furche lassen. Farbe allermeist schwarzbraun. Im Holze (s. S. 135.) sowohl der Nadelhölzer (Fichte, Kiefer) als auch der Laubhölzer (Buche, Birke, Pappel) und zwar bis nach dem südlichen Deutschland verbreitet (Schweiz, Ungarn, Bayern Hr. Waltl). 3) Der mehrmals und in verschiedenen Gegenden auf Kiefern gefangene *B. eurygraphus* Er., 2" lang, ziemlich gedrungen. Das Weibchen (T. XIII. F. 10.) mit fast viereckigem, sehr stark geknopften, vorn sehr stark enghöckrigem, hinten dichtpunktirtem Halsschilde und kaum anderthalbmal längeren Flügeldecken. Die Punkte der Reihen groß und sehr dicht. Die Zwischenräume breit und nur mit einzelnen, zerstreuten Pünktchen und daher, auch wegen gänzlichen Mangels aller Runzeln, sehr glatt erscheinend. Die zurückgedrückte Stelle vollkommen gewölbt und am Ende fast rechtwinklig absteigend, am obern Theile neben der Nath jederseits mit 2 starken Körnchen und mehreren sehr kleinen (von den Zwischenräumen herabsteigenden) drüber und drunter und im Umkreise. Das Männchen (T. XIII. F. 9.) 1,6" lang, mit vorn eingedrücktem und etwas gehörmtem Halsschilde und weniger gewölbt. Flügeldecken, sonst bis auf die stärkere (sogar sehr starke, bräunlich-gelbe) Behaarung und die etwas gedrungene Form, wie das Weibchen. — 4) Der 1,5" lange, bis jetzt nur im Lüneburgschen und in Bayern bemerkte *B. Pfeilii* (dem berühmten, um die Forstinsectenkunde verdienten Forstmanne zu Ehren), dem vorigen in der Form (welche nur ein wenig schlanker) und in dem geknopften Halsschilde sehr ähnlich. Halsschild aber vorn stark gerundet. Die Punkte der Flügelreihen klein, sogar hier und da flach und die Zwischenräume gerunzelt und ziemlich stark punktirt. Die zurückgedrückte Stelle flach, sehr schräg absteigend, am obern Theile neben der Nath jederseits mit 2 ziemlich starken Körnchen (Fortsetzung des natthständigen Zwischenraumes, welcher am Ende auch noch einige Körnchen hat) und einigen eben so starken der 3ten Reihe. Ganz schwarz, mit zahlreichen, langen, gelbbraunen Haaren. — [*B. longicollis* Gyll. ist bis jetzt noch nicht in Deutschland gefunden, scheint auch in Schweden selten zu sein, häufig in Asien.]

13. *B. dispar* Hellw. Ungleicher Buchenholzkäfer. (Taf. XIII. Fig. 13, 14.)

NAMEN. Hellwig muß doch schon Männchen und Weibchen, wie aus dem von ihm herrührenden Namen *dispar* hervorzugehen scheint, gekannt haben. Um so befremdlicher ist es, daß Herbst (V. S. 113.), welcher von ihm Exemplare erhielt, den Grund dieses Namens nicht zu kennen versichert. Wahrscheinlich erhielt er nur Weibchen. Nachher wurden aber Männchen und Weibchen für verschiedene Arten angesehen und *B. brevis*, *thoracicus*, *serratus* genannt. Bechstein's (*Forstins*. S. 216.) übrigens auch nur ganz kurz geschilderter (und daher wohl nicht von ihm selbst beobachteter) *B. brevis* gehört gewiß nicht hierher, denn unter Kiefernrinde dürfte weder Männchen noch Weibchen des *dispar* vorkommen.

CHARACTERISTIK. Das Weibchen 1,4-1,6" lang, sehr stark gedrungen und walzig. Halsschild kuglig, geknopft, hinten äußerst fein und eng punktirt, vorn stark höckrig. Flügeldecken nicht ganz anderthalbmal so lang als Halsschild, mit groben, tiefen Punkten der Reihen und zahlreichen Punkten der


nicht gerunzelten Zwischenräume. Die abschüssige Stelle ziemlich gewölbt und oben schräg absteigend, mit vertieften Punktreihen und erhabenen, fein gekörneltten Zwischenräumen. Dunkelbraun oder schwarz, stark behaart. Das dunkelbraune Männchen kaum 1" lang, äußerst stark gedrunen, fast kreisrund, sehr stark behaart, mit einer glatten Mittelstele am Hintertheil des nur sehr schwach geknöpften Halschildes und ganz und gar gewölbt, nur am äußersten Ende eine besondere abschüssige Stelle zeigend, Flügel.

VORKOMMEN u. s. f. Der Käfer lebt in verschiedenen Laubhölzern, gewöhnlich in Buchen und Birken und nach Hrn. Saxen wahrscheinlich auch in Eichen. In diesen ist er theils in Stöcken, theils in geworfenen Stämmen (namentlich einmal in Boizenburg mit *domesticus* zusammen), jedoch meist nur selten, besonders das Männchen (welches zu den seltensten Insecten in den Sammlungen gebört). Herr Schmidberger (*Obstbnz.* IV. S. 213 u. f.) fand ihn aber auch in lebenden, gesunden Apfel- und Pflaumenbäumen. An eine Verwechselung ist hier nicht zu denken, denn es passen Namen und Beschreibungen. Hr. Waltl versicherte mich auch noch von der Identität, und überdies fand Hr. Gregorius, einer meiner Zuhörer, auch bei uns kürzlich den Käfer in lebenden Apfelbäumen. Hr. Schmidberger hatte nur einmal vor mehreren Jahren einen Käfer dieser Art auf einem Apfelbaume bemerkt, als plötzlich viele derselben in seinen Garten einfielen. Woher sie gekommen, weiß er nicht, wahrscheinlich aber stammten sie aus den benachbarten Laubwäldern. Sie zogen die Apfelbäume allen übrigen vor, und zwar besonders die Topfbäume (wahrscheinlich weil diese viel höher, als die in den Rabatten wachsenden, standen), an welchen auch das scharfe Auge des geübten Gärtners keine Krankheit vorher hatte entdecken können. Von den Birnbäumen des Gartens war nicht ein einziger, und von den Pflaumenbäumen nur einer befallen. Am 3ten Mai wurde der Käfer beim Anbohren gefunden und im Juli waren die ersten und im August die letzten Käfer flugfertig. Der rinnende Saft verrieth den angreifenden Käfer und letzterer wurde sogleich ausgeschnitten. Trotz dem, daß die Wunde sorgfältig mit Baumwachs verklebt worden war, bahnte sich der Saft doch einen Ausweg und der Stamm welkte. (Ein merkwürdiger Beitrag zur Phytophysiologie!) Am andern Tage bohrten schon mehrere Käfer an anderen Stämmen. Wo dies zeitig genug bemerkt wurde und man die Käfer erhaschte, ehe sie bis auf den Splint gekommen waren, wurden die Stämme gerettet, waren aber verloren, so wie es zum Ausfluß des Holzsaftes (zumal aus mehreren Wunden) gekommen war. So waren 42 Bäume, alte und junge, angegriffen und 22 getödtet. Am liebsten hatten sie sich unterhalb eines Astes oder am Aste selbst, bisweilen auf der halbvernarbten Wunde eines abgeschnittenen Zweiges, oder auch mitten am Stamme, aber nie nahe an der Erde angebohrt. Im vergangenen Herbst habe ich endlich selbst Gelegenheit gehabt, durch Hrn. Heyer und Hrn. Radzay sowohl Eichen- wie Apfelstämme zu erhalten, welche von der Brut des Käfers bewohnt gewesen waren. Ich habe von beiden eine Zeichnung in natürlicher GröÙe entworfen und den beigesetzten Stock von Hrn. Vogel danach fertigen lassen. Das beinahe 1½" starke Eichenstämmchen zeigt nur ein Bohrloch, welches in einen fast durch das ganze Stämmchen hindurch gearbeiteten Gang führte. Seine 5 Arme verbreiteten sich nur nach oben und nach unten, ohne daß man einen Canal bemerkt hätte, der die Markstrahlen rechtwinklig durchschnitt. Diese letztere Bildung war bei den übrigen Eichenstämmchen vorhanden, so wie auch bei allen von mir untersuchten Apfelstämmchen. Das hier abgebildete 6-jährige, an welchem das eine abgeschnittene Stück zurückgeklappt erscheint, zeigt das complicirteste Gangsystem, überdies ist es auffallend, daß zu diesem zwei Bohrlöcher führen, welche auf der Rinde aber kaum 1" von einander entfernt sind, so daß es fast scheint, als hätten sich zwei, zugleich anbohrende Individuen zur Anlegung jener vereinigt.



Dicht unter den äußersten Holzfasern des letzten Jahrringes verzweigt sich schon der Bohrloch-Canal, was bei den Eichen, bei denen der Bohrcanal meist durch die beiden äußersten (4-5" starken, einen üppigen Wuchs anzeigenden) Jahrringe hindurch ging, nicht der Fall war. Der eine Zweig desselben läuft horizontal auf der Hirnfläche des 4ten, 5ten und 6ten Jahrringes herum und bildet fast einen geschlossenen Kreis (das äußerste Loch der rechten Seite ist sein Ende), und der andre geht horizontal bis ins Mark des Stämmchens (den Markstrahlen durch alle Jahrringe hindurch), wo er noch eine kurze gabelförmige Verzweigung bildet. Von beiden horizontalen Zweigen gehen vertikale Nebenzweige ~~von~~ oben und nach unten ab. Besonders lang und merklich geschlängelt ist derjenige, welcher von dem kreisförmigen nach unten führt und mit 5, die Köpfe nach unten richtenden, Käfern (2 Männchen und 3 Weibchen) vollgeproft war, als ich die Stämmchen ausschnitt. Alle übrigen, zahlreichen Stämmchen, welche ich Hrn. Heyer verdanke, stimmten im Wesentlichen mit diesem überein, d. h. der Bohrloch-Canal wandte sich gleich innerhalb der äußersten Jahrringe (rechts oder links) herum und durchschnitt diese fast ganz. Da sie grade die thätigsten Saft-aufführenden Gefäße enthalten, so mufs natürlich die Saftbewegung dadurch sehr wesentlich gestört werden. Die vertikalen Gänge zeigen keine so grofse Regelmäßigkeit, denn in einigen Stämmchen entfernen sie sich schon in den äußersten Jahrringen, in andern erst im Marke, bei noch andern finden sie sich an beiden Stellen. In einem Exemplare finde ich auch blofs den kreisförmigen Gang. In dieses hatten sich zwei Käfer in der Entfernung von fast 1" eingebohrt. Sollten sie die vertikalen Gänge vermieden haben, um sie nicht zu berühren? Früher hatte ich fest geglaubt, es müfsten sich, wegen der Ähnlichkeit der Käfer mit denen von *domesticus*, auch die Gänge so wie bei diesen verhalten und man könnte die kleinen, rechtwinklig abgehenden Puppenhöhlen postuliren. Es findet sich aber davon nichts und es giebt einen Beweis mehr, wie sehr man sich mit der Annahme von Analogien in Acht nehmen mufs. Die Verpuppung erfolgt hier also in den Muttergängen und zwar höchstwahrscheinlich in den vertikalen Verzweigungen. Man könnte auf den Gedanken kommen, dafs die letztern durch die Larven ausgefressen werden, allein Hr. Schmidberger bestreitet dies geradezu und es ist aus demselben ihm zu glauben, weil die Larven, noch dazu da ihrer immer nur wenige in einem Gangsysteme sind, an der (später zu beschreibenden) eigenthümlichen, in den Gängen verbreiteten Substanz genug zu zehren haben. Dagegen werden diese Gänge ganz bestimmt durch die Käfer, wahrscheinlich nach deren Auskommen, verlängert, denn ich fand das Ende eines Ganges, in welchem ein Käfer steckte, durch die helle, natürliche Holzfarbe von dem übrigen schwarzgefärbten Theile des Ganges verschieden, und Hr. Radzay schreibt mir überdies, er habe in einem Eichenstämmchen Puppen gefunden und als er nach 3 Wochen wieder nachgesehen habe, seien Käfer da gewesen, die tiefer ins Holz eingedrungen wären. Nach Hrn. Schmidberger sollen die Weibchen (am Ende des Einganges?) eine etwas erweiterte Kammer bereiten, 7-10 Eier in dieselbe legen, und dann eine neue machen, diese eben so belegen und so fortfahren (bis in den Juni) bis 30-40 Eier gelegt sind. Was die Kammer in meinen Stämmchen bedeuten soll, weifs ich nicht, vermute aber, dafs damit die vertikalen Hohlungen (die zur Legezeit gewifs kleiner sind) gemeint werden. Allerdings bemerke ich auch in einigen Eichenstämmchen am Ende des Bohrcanals eine kleine bauchige Erweiterung, die man selbst an unsrer Abbildung da finden könnte, wo der erste nach oben steigende vertikale und der abwärts steigende Gang sich entfernen. Wie sich die Larven in den Gängen bewegen, kann ich mir vorstellen, da ich etwas Ähnliches bei *Platypus* (s. dort) beobachtet habe. Hr. Radzay, der es wahrscheinlich so verstanden hat, als würden die 30-40 Eier in Einen Gang gelegt, schreibt mir in dieser Beziehung, dafs er niemals so zahlreiche Brut in den Stämmchen gefunden habe und dafs dieselben immer nur am Ende des Mutterganges und in seitwärts abgehenden Gängen gewesen sei. Die Puppenhöhlen hätten sich immer nur sehr vereinzelt mit einem ziemlich langen Eingang vom Muttergange aus, oder auch wohl unmittelbar daneben gefunden. Als solche sind an dem hier abgebildeten Eichenstämmchen vorzüglich die Enden der beiden

ersten aufwärts steigenden Gänge mir von Herrn Radzay bezeichnet worden. Die Puppenhöhlen der meisten übrigen Eichenstämmchen sind auffallend kurz — wahrscheinlich vermeidet der Käfer das Arbeiten im harten Holze —, neben dem einen Bohrcanal z. B. nur 4" lang. In dieser kann nur eine Puppe geruht haben, während in den meisten übrigen wahrscheinlich mehrere Puppen untereinander liegen. Die Begattung hat Hr. Heyer beobachtet und zwar, wunderbar genug, noch am 13. October in einer mit Holzspittlern gefüllten Dose. Die Begattung wird also auch wohl in der Freiheit außerhalb der Gänge geschehen, worauf auch Hrn. Saxen's Beobachtung hindeutet, welcher einst eine große Menge von Männchen auf einem Eichenstocke wie auf einem Brunstplatze versammelt fand. Im Wesentlichsten stimmen also jetzt alle Beobachtungen überein und die kleinen Verschiedenheiten, welche dieselben angeben, mögen in den Unterschieden der Holzart und dergl. liegen. Eben so wird sich auch Schmidberger's Ambrosia bald mehr aufklären. Nach ihm würde mit dieser, einer weißlichen Salzkruste ähnlichen Substanz, welche zur Ernährung der Larven diene, jedesmal der ganze Gang, bevor er die Brut aufnimmt, ziemlich dick überzogen. Diese Substanz beschreiben auch Hr. Heyer und Hr. Radzay und es ist an ihrem regelmäßigen Vorhandensein in den Gängen dieses seltenen Käfers nicht mehr zu zweifeln. Ich selbst habe sowohl in den Eichen- wie auch in den Apfelstämmchen noch Spuren einer solchen weißlichen Masse gefunden, nur freilich so eingetrocknet und selbst ein wenig beschimmelt, daß keine weitere genauere Untersuchung damit anzustellen war. Diese mag auch den Chemikern und Phytophysiologyen, die Zeit dazu haben, verbleiben. Hr. Schmidberger vergleicht sie mit einer Salzkruste, welche auf der Zunge zerfließt, jedoch ohne sonderlichen Geschmack. Hr. Wallt bemerkt in einem Briefe dazu, es scheine ein Gummi zu sein. Es ist wohl keinem Zweifel unterworfen, daß diese räthselhafte Masse, die, meines Wissens, noch in keinem andern Käfergange gefunden wurde, größtentheils von den ausgetretenen Holzsaften herrührt. Diese müssen natürlich aus den zerschnittenen Holzgefäßen in größter Menge in die Käfergänge ausströmen, da die letztern in den gesunden, vollsaftigsten — wie alle Beobachter einstimmig versichern — Stämmen angelegt werden und zwar zur Zeit des stärksten Saft-Aufstiegens. Auch ist nicht zu bezweifeln, daß diese Säfte bald in Gährung übergehen, was auch durch die Beobachtung des Hrn. Heyer bestätigt wird. Er schreibt nämlich, daß er bei dem Zerschneiden der untersuchten Apfelstämme im November das nicht bemerkt habe, was ihm im Sommer aufgefallen sei, nämlich den ihm entgegenströmenden angenehmen Weingeruch. Indessen ist es auch wahrscheinlich, daß der Mutterkäfer diesem ausgetretenen, allmählig in eine weinige Gährung übergehenden Saft noch abgenagte und mit Speichelsäften vermischte Holzfasern beimischt, wodurch die Substanz die Consistenz erhält. Einiger noch von Hrn. Schmidberger erwähnten Specialitäten (s. auch Kollar *schädlt. Ins.* S. 261-270.), als z. B. das allmähliche Ablegen der Eier und die darauf folgende allmähliche Entwicklung der Brut, das längere Verweilen des Weibchens in den Gängen etc., übergehe ich hier, da sie größtentheils auch in der Lebensweise der übrigen Bostrichen sich finden, daher ins Allgemeine gehören. — Alsdann habe ich noch einige, von Hrn. Heyer und Hrn. Radzay mitgetheilte, die forstliche Bedeutung des Käfers noch mehr erläuternde Bemerkungen hinzuzufügen. Die jungen Eichen, an welchen Hrn. Radzay das Gelbwerden der Blätter den Käfer verrathen hatte, waren schon wüchsige 4" starke Stämmchen, jedes wohl durch 6-7 Bohrlöcher verletzt. Auch Hr. Förster Steinhof hat im Solling eine Menge von Käfern aus jungen, wüchsigen Eichen erzogen. Eben so versichert Hr. Heyer, daß die von ihm zerschnittenen, schon Anfangs Juni bemerkten, Apfelstämmchen, welche in einer von allem wilden Gehölze entfernten Baumschule erwachsen waren, vollkommen gesund gewesen seien. Die entgegen gesetzte Aussage des Planteurs sei offenbar daher gekommen, weil derselbe befürchtet habe, man werde ihm





nichts mehr abkaufen, wenn es bekannt würde, daß seine besten Äpfelbäume wurmstichig seien. Herr Heyer bemerkt, daß die Stämme von oben bis unten, ohne Auswahl angebohrt gewesen seien. Dagegen stimmt Hrn. Radzay's Bemerkung mit der von Hrn. Schmidberger ausdrücklich gemachten: daß nie ein Bohrloch unmittelbar über der Erde zu sehen gewesen sei. Dies scheint also Regel zu sein. Es ließe sich vielleicht so deuten: Dem Käfer sind die unmittelbar aus der Wurzel aufsteigenden Holzsäfte, die doch in seiner Ökonomie offenbar eine wichtige Rolle spielen, noch zu roh und er wählt daher eine Höhe des Stammes für seine Brutgänge, in welcher die Säfte schon einen gewissen Grad von höherer Anshildung erlangt haben. Die Überwinterung scheint constant in den Gängen, besonders den vertikalen, Statt zu finden, denn ich habe in allen, von Hrn. Heyer mir übersandten, sowohl den ganz frischen als auch den trockneren, Käfer gefunden und zwar stets mit dem Kopfe abwärts vom Eingange gekehrt. In dem vorn offen dargestellten, abwärts steigenden Gänge der Abhildung wechselten die Männchen und Weibchen mit einander ab. Die Vertilgung des Käfers wurde nur durch sorgfältige Untersuchung aller Stämme möglich. War der ganze Stamm ergriffen, so brachte man ihn ganz fort, war nur ein Ast angebohrt, so wurde er abgeschnitten und entfernt. Auf diese Weise wurde dem Fortschreiten des Übels Einhalt gethan und im nächsten Jahr zeigte sich nur ein einziger Pflanzenbaum ergriffen und dieser war wahrscheinlich durch die an einem Apfelbaume im vorigen Jahre überschene Brut angesteckt.

#### Zweite Gattung.

#### *Hylesinus* Fabr. Bastkäfer. (Taf. VII.)

NAMEN. Der Name *Hylesinus* (von ὕλη Wald und εἰσέν ich beschädige) ist eben so wenig wie die Namen der meisten andern Gattungen bedeutungsvoll. Bastkäfer sie deutsch zu nennen, wäre, wenn deutsche Namen sein sollen, deshalb am passendsten, weil die Hylesinen nur auf dem Baste leben und unter ihnen bis jetzt weder eine in der Borke noch eine tief im Holze lebende Art bekannt wurde.

CHARACTERISTIK. Die Käfer werden (im Gegensatz gegen die Bostrichen) durchgreifend charakterisirt durch die Zweilappigkeit des 3ten Fußgledes (F. 1, g) so wie (gegen die *Eccoptogaster*-Arten) durch die hinten sehr stark oder doch merklich abschüssigen Flügel und den Hinterleib, dessen Unterseite entweder gar nicht oder nur sehr wenig und allmählig ansteigt. Nur 3 Arten (die aus Laubhölzern) nähern sich durch wenig abschüssige Flügel und merklich ansteigenden Hinterleib (aber nicht durch Fühlerbildung) *Eccoptogaster*. Der Kopf ragt, weil der Halsschild vorn stets eingeschnürt und zu eng ist, als daß er sich kapuzenförmig über ihn wölben könnte, stark hervor und hat eine kleine rüsselähnliche Verlängerung. Diese trägt die Fühler (s. Eintheil.), welche daher auch von den (also auch schwächer gebuchteten) Augen entfernt stehen. Die Flügeldecken sind oft mehr als zweimal länger als der Halsschild, hinten nur abschüssig, aber nie eingedrückt und gezahnt, stets mit deutlichen Punktreihen und punktirten oder gerunzelten Zwischenräumen. Die Vorderhüften meist deutlich durch einen Zwischenraum getrennt. (Ausführlich beschrieben ist *H. piniperda*.) Männchen und Weibchen allermeist äußerlich vollkommen gleich und sehr schwer unterscheidbar. Die Farben meist bei einer und derselben Art, je nachdem die Individuen frisch entwickelt oder älter sind, bald strohgelb, bald heller bald dunkler braun, nur bei *H. fraxini* und *vittatus* bunt. Die Larven denen der Bostrichen sehr ähnlich, nur im Allgemeinen vielleicht der Kopf derselben etwas stärker gewölbt, die Kopfschildgegend etwas schmaler und die Fußswülste weniger kuglig vorragend und schwächer behaart.

VORKOMMEN U. S. F. Die mir bekannten deutschen Arten sind sämmtlich, bis auf zwei, Nadelholzfresser. Sie gehen alle bis auf den Bast. Ihre Gänge theils Loth-, theils Stern-, theils Wagegänge, die

letztern mit Splintwiegen. Wahrscheinlich haben nur wenige eine doppelte oder auch nur eine andert-halbige Generation. Unter ihnen sind gar keine technisch-schädliche.

EINTEILUNG. Da die Gattung nicht so artenreich wie die vorige ist, so bedarf es auch keiner besondern Eintheilung derselben, höchstens dafs wir die Nadelholz- und Laubholzfresser trennen. Sieht man auf die feinem Unterschiede (Fühler und Mundtheile), so bieten sich allerdings hübsche Merkmale für kleinere Gattungen dar. Hr. Erichson hat deren 5 für die deutschen: *Polygraphus* hat eine feste Fühlerkeule (T.VII. F.12♂), alle übrigen dagegen eine vierringlige, und zwar wird *Dendroctonus* durch 5gliedrigen (F.3e) und *Hylurgus* durch 7gliedrigen Geißelfaden (F.9e) characterisirt. *Hylastes* (F.6e) und *Hylesinus* (F.5e) haben einen 7gliedrigen Faden, erstere eine fast herzförmige und letztere eine fast eiförmige Lippe.

#### A R T E N.

o Nur in Nadelhölzern lebende.

1. *H. (Dermestes) piniperda* Linn. (*Dendroctonus p.* Er.) Kiefern-zweig-Bastkäfer. (Taf. VII. Fig. 1.)

NAMEN UND VORKOMMEN. Die blossen Varietäten sind von Fabricius und Herbst für eigne Arten gehalten und *Hylesinus testaceus* und *Bost. testaceus* genannt worden. Deutsch heifst er gewöhnlich Waldgärtner, zweiter fliegender schwarzer Wurm. Den Namen Kapuzkäfer, verderbender Borkenkäfer, Schabkäfer, Verderber, wird nicht blofs das Wort Kiefern-, sondern auch Fichten- vorgesetzt, obgleich der Käfer nie an Fichten (III. Liebig, Saxen) sondern immer nur an Kiefern sich findet und nach Hrn. Wächter nicht einmal die mit Kiefern gemischten Fichten angeht. Hr. Warnkönig erzählt, dafs am 15ten März in einem Holzschlage von Fichten und Tannen auch 5 Kiefernstämmen gefällt und als Bauholz entriindet worden seien. Am 15ten bei grofser Wärme fand sich der Käfer zu Hunderten ein, aber nur auf den Kiefern und nicht einer auf den Fichten und Tannen. Sie bohrten sich dann in die Kiefernstöcke und einige Faugbäume. Da wird es also wohl mit dem Vorkommen in Fichten, wenn es auch Bechstein behauptet hat, nichts sein (wahrscheinlich eine Verwechslung mit *palliatus*) und man wird das Prädicat Fichten- eingehen lassen müssen. Eine Nachricht, welche ich kürzlich von zwei zuverlässigen jungen Forstmännern Hrn. Denicke und Rohde erhielt, beweist allerdings, dafs der Käfer auch ausnahmsweise die Fichte nicht scheut. Es waren aber nur 2 einzelne, in eine Fichte eingebohrte Exemplare, die sie in der Gegend von Grund gefunden hatten. Da hier die Kiefern der Ebne nicht weit sind, so lafst sich vermuthen, dafs die beiden Käfer hierher verschlagen worden seien. In der Mitte des hohen Harzes im Fichteneviere ist der Käfer auch bis jetzt noch nicht, trotz der eifrigsten Nachsuchungen, gefunden worden. Dafs der Käfer in Fichten-Triebe gehe, verneinen aber alle einstimmig, bis auf einen sehr unsichern Bericht, den Bechstein aus dem Harze erhalten haben will. Übrigens ist er, wie die meisten Borkenkäfer, sehr weit verbreitet und kommt nicht allein bis ins südliche Deutschland, sondern auch bis nach Schweden und Rußland hinauf vor. In England wurden auch die Triebe der *Scotch pines* hart von ihm mitgenommen (London Gard. Mag. Decbr. 1837. S. 623.). In Deutschland folgt er der Kiefer Schritt vor Schritt, wie ich mich selbst auf dem ganzen Wege vom nördlichen Westphalen und den Rheingegenden bis nach Würzburg und Bamberg hin überzeugte. Selten ist einmal eines von den kleinen Feldhölzern, in denen die Kiefer hier meist vorkommt, von ihm verschont geblieben.

CHARACTERISTIK. 1,7-2" lang. Der Kopf behaart, dick und gewölbt, an dem Scheitel sehr eng und fein-, an der Stirn weitläufig und ziemlich tief-punktirt. Der Rüssel ebenfalls weitläufig punktirt, fast kürzer als der Kopf und schmäler als derselbe, mit einer deutlichen scharfen Längsleiste bezeichnet, welche in einen ausgerandeten Vorsprung des Rüssels ausläuft. Augen länglich, niedergedrückt. Halsschild kaum


DD

länger als breit, nach vorn ansehnlich sich verschmälernd, am äußersten Ende etwas eingeschnürt und nicht breiter als der Kopf, überall weitläufig- und tief-punktirt und nur in der Mitte der Mittellinie etwas glatt, überall behaart und glänzend. Schildchen dreieckig, niedergedrückt, fein punktirt. Flügeldecken an der Basis etwas vorragend und gezähnt, fast etwas breiter als der Halsschild, kaum  $2\frac{1}{2}$  Mal länger als derselbe, walzig und am Ende stark gewölbt, überall punktirt-gestreift, die Punkte klein und durch ziemlich breite Brücken von einander getrennt. Die natbständige (erste) Reihe deutlich vertieft, die Zwischenräume schwach quer gerunzelt, jeder mit einer Reihe behaarter Höckerchen, die erste und dritte bis zur Spitze auslaufend, die zweite aber am Ende des horizontalen Theils der Flügeldecken aufhörend, so dafs an der abschüssigen Stelle der Flügeldecken der Raum zwischen der ersten und dritten Höckerreihe gefurcht erscheint. Die Unterseite des Körpers ziemlich weitläufig und unregelmäfsig fein punktirt, behaart. Die Füfse fein punktirt, behaart, mit am Ende erweiterten und am äußern Rande gesägten, fast dornsputzigen Schienen. Entweder ist das ganze Thier pechschwarz (mit Ausnahme der Fußglieder, der innern Mundtheile und der Fühler, welche immer mehr oder weniger hell bräunlich sind), oder Halsschild und Unterseite sind blofs schwarz, die Flügeldecken dagegen rüthlich-braun, oder (meist bei frisch entwickelten Individuen) das ganze Thier erscheint braungelb, mehr oder weniger des Strohgelben sich nähernd (mit Ausnahme der Augen und Oberkiefer, welche immer schwarz sind). Die Larve ist auf Taf. XIV. Fig. 15. vergrößert und Fig. 16 in natürlicher Gröfse abgebildet (der sehr stark vergrößerte Kopf mit den 3 ersten ausgeführten Ringen F. 17.) und die Vorderansicht der Puppe bei Fig. 15, an welcher jedoch in der ersten Ausgabe die in der Vorderansicht bemerkbaren Härchen des Kopfes, des Halsschildes, so wie der Kniegelenke vergessen waren.

**LEBENSWEISE.** Der Käfer ist bei uns und in den meisten übrigen Gegenden Deutschlands, da er gewöhnlich nur in der Ebne oder in Vorbergen lebt, einer der frühesten. Ich sahe ihn schon in den ersten Tagen des März schwärmen und auf frische Stöcke sich zahlreich niederlassen. Die wiederkehrende Kälte vertreibt sie dann noch einmal auf längere oder kürzere Zeit, bis sie im April, manchesmal schon in der Mitte des Monats, sich wirklich begatten und anbohren. Auch Hr. Warnkönig, der i. J. 1836 das Schwärmen schon im März beobachtete, fand erst in der Mitte des Mai Eier. Die Begattung wird, wie ich oft gesehen habe, draussen vollzogen und zwar so, dafs das Weibchen schon ganz in dem Bohrloche, zu welchem gern die Borkenrisse benutzt werden, steckt und das Männchen noch auf dem Stamme draussen sitzt. Liegendes Holz (besonders frisch gefällte Kiefern von mittlerem Alter), selbst im Winter geschlagenes und aufgestelltes Klatzerholz ziehen sie bei weitem dem stehenden und den Stöcken vor (s. forstl. Bed.). Auch abgebrochene, 12-20' hohe Stümpfe, welche nach Windfällen stehen bleiben, greifen sie gern an. Hr. Utsch bemerkte dabei, dafs sie die Ostseite stets vorzogen und zwar so bestimmt, dafs solche Stämme, die gerade in der Richtung von N. nach S. lagen, am liebsten vom Käfer gesucht wurden. Hr. Dr. Heyer (v. Wedek. *N. Jahrb. d. Forstk.* H. 10. S. 37.) macht die interessante Bemerkung, dafs die in den Haubergen (Rödern oder Rothecken) des Odeuwaldes durch Feuer beschädigten Kiefern von den Käfern allen übrigen Holze vorgezogen wurden. Er fand nämlich, dafs, wenn die Rödern ohne Vorsicht über Land gebrannt worden waren, und hierdurch die einzelnen übergehaltenen Kiefern vom Feuer gelitten hatten, solche Bäume schon nach einigen Tagen vom Käfer angebohrt wurden und nach kurzer Zeit vertrockneten. Diese grofse Neigung des Waldgärtners, angebranntes Kiefernholz anzufallen, bestätigten nicht nur weitere Versuche, welche Hr. Dr. Heyer dadurch anstellte, dafs er einzelne Kiefern mit flackernden Brennstoffen umgeben und bis auf halbe Schafthöhe rüsten liefs, sondern auch 2 jüngere Kiefernbestände, der eine von 12 und der andre von 17 Jahren, die zu Anfang des Sommers von einem Lauffeuer heimgesucht wurden, boten dieselbe Erscheinung dar. Denn sämmtliche Stämmchen durchs Feuer ihrer Nadeln beraubt und halb geröstet, wurden von dem Käfer, der sich schon wenige Tage nach dem Brande in großer Menge einfand,

meistens nahe am Boden angebohrt, also am dicksten Theile, wo diese geringen Stangen sich länger saftig erhalten haben würden. Die zwischen Holz und Rinde angelegten, dem ersteren immer etwas eingedrückten und mit Harz überzogenen Gänge, und zwar stets Lotigänge, sind meist grade, fangen mit einer kurzen Krümmung (der Fortsetzung des schräg oder gar gekrümmt durch die Rinde gehenden Bohrloches) an, und haben 1-4 Luftlöcher. Rammelkammer nicht vorhanden. Larvengänge bis 3" lang, äußerst gedrängt. Auf Taf. IX. Fig. 2. ist ein Rindenstück mit 2 Gängen und Fig. 3. ein Rindenstück mit dem Anfange eines Ganges

(oben an dem Bohrloche anfangend) neben welchem erst einige der zuerst gelegten Eier auskamen, abgebildet, und hierneben sind noch einige höchst sonderbare Gangmonstrositäten gezeigt, welche ich einst (jedoch nur als Seltenheit) an einer entrindeten Kiefer fand, die so dicht bedeckt war, daß die Gänge wohl wegen Mangel an Raum so sonderbare Formen erhalten haben mögen. Auf einer Länge von 2" fand ich um den halben Stamm herum über 100 Muttergänge. Meist hatten sich hier die Larven nur an einer Seite entwickelt und da zählte ich an einem 5" langen (wie es schien sehr normalen) Gange 56 Larven. Kommen im günstigsten Falle für den Käfer die Larven beider Gaughöhlen aus, so hat eine Familie auch wohl bis 120 Junge! Zur Verpuppung gehen die Larven in die Rinde, wie auch Fig. 2. an einigen Stellen zeigt. An sehr dünn berindeten Stellen fressen sie sich auch wohl eine flache Wiege in den Splint. Ihre Ausbildung erfolgt im Juli oder August, je nachdem sie durch das Wetter befördert oder verzögert wurde. Auch in einem und demselben Jahre sieht man die eine Familie im Juli, die andre erst im August anfliegen, wenn nämlich die eine früh anflug und die andre durch plötzlich ihr zuvorgekommenes kaltes Wetter verzögert wurde: so fand ich i. J. 1836 in der Mitte Mai noch ganz frische Gänge (\*). Hr. Hartig (*Jahresber.* S. 196.) fand sogar noch in der ersten Hälfte des Juli mit dem Legen beschäftigte Weibchen in frisch gefertigten, noch nicht vollendeten Muttergängen. Es würde also auch bei diesem Käfer (jedoch gewiß nur selten) die Reife der Brut bedeutend verzögert werden können. Solche Spätlinge mögen wohl zu der Annahme einer doppelten (ja dreifachen!) Generation Anlaß gegeben haben. Daß es solche nicht giebt, davon habe ich mich i. J. 1836 wieder bei Schwedt überzeugt. Am 2ten August, als Hr. Pfeil und ich den Fräts dort mit mehreren unser Zuhörer besuchten, fanden wir nur noch wenige, verspätete Familien unter der Rinde. Von ganz jungen Bruten war nirgends etwas zu finden. Noch sicherer wurden wir, als wir an den Schlägen die Randbäume, deren mehrere gefällt wurden, untersuchten. Alle Zweige waren mit Käfern gefüllt! Es ist also klar, daß sie in diese nach (früher oder später) vollendeter Brut gehen, um den Rest des Sommers in Ruhe zu leben. Vor Vollendung dieser Brut findet man sie daher auch immer sparsamer in den Trieben. Auch gehen bestimmt Männchen und Weibchen in dieselben. Ich fand selbst Ende April einmal ein Weibchen in denselben, welches noch Eier bei sich hatte. Hr. v. Pannwitz fand i. J. 1836 schon  $\frac{1}{2}$  den Käfer in den Trieben und ich sahe bei uns dieselben in der Regel schon im April mit frischen Bohrlöchern und Käfer darin. Der heftigste Streit



(\*) Im Jahre 1836 (welches die erste Entwicklung der Larven begünstigte, später aber sehr raube Tage brachte) erfolgte der Ausflug an mehreren Kiefernanghaumen  $\frac{1}{2}$ . Am  $\frac{1}{2}$  waren die Gänge schon bis 2" lang und zeigten 30-40 Eier. Den  $\frac{1}{2}$  finde ich die ersten jungen Larven, den  $\frac{1}{2}$  halbwüchsige Larven, den  $\frac{1}{2}$  fertige Puppen (i. J. 1834 den  $\frac{1}{2}$  die ersten Puppen), den  $\frac{1}{2}$  den Käfer meist schon von der Puppenhülle befreit, aber noch weiß und den  $\frac{1}{2}$  die ersten Flöglöcher. (Den  $\frac{1}{2}$  zugleich noch halbwüchsige Larven von dem Meisflögl.) — Thiersch beobachtete bei günstiger Witterung eine in 75 Tagen erfolgte Entwicklung.

hat sich aber jetzt darüber erhoben: ob der Käfer auch in den Trieben am Baume überwintere oder nicht? Hennert (*Raup. u. W. indr.* S. 57.) spricht bloß von den im Winter frisch abgestoßenen Kienzweigen. Bechstein aber sagt ganz bestimmt, daß er im Januar den Käfer in Kiefern-Zweigspitzen vor sich gehabt habe, und so wagte man nicht mehr daran zu zweifeln. Nur hier und da (z. B. *Allg. F. u. J. Z.* J. III. S. 267.) erhob sich eine Stimme dagegen, bis Hr. Forstmeister Eichhoff in Saarbrücken vor mehreren Jahren (*Allg. F. u. J. Z.* 1834. Jan.) sehr bestimmt nachwies, daß die Beobachtungen des Überwinterns in den Zweigspitzen am Baum auf Täuschung beruhen müßten. Seine Beobachtungen (\*) habe ich seitdem alljährlich wiederholt und bin nun vollkommen überzeugt: daß der Käfer wohl dann und wann in den Trieben unter den Bäumen (in welche er bei gelindem Wetter, wenn er sich etwa heraus macht, wohl sich wieder verkrochen haben könnte), aber nicht an den Bäumen zu finden ist. Ein einziges Mal habe ich noch spät im November einen Käfer in einem angebohrten Triebe gefunden, aber auch nur einen, obgleich ich sehr viele Bäume in der Nähe untersuchte, an welchen die frischen Löcher deutlich zeigten, daß sie noch nicht lange verlassen worden waren. Man suche nur an solchen Orten, wo im Sommer die Käfer in den Trieben häufig sind und man wird letztere leer finden, alsdann untersuche man das am nächsten befindliche hohe Holz und aller Zweifel wird schwinden, wenn man sie hier (nachdem nur das Moos etwas weggenommen ist) dicht über der Wurzel stecken sieht. Die Käfer verbergen sich hier nicht etwa bloß in den Rissen der Rinde, sondern sie bohren sich förmlich ein und stecken mit dem Rüssel entweder in der frischen Bastseicht oder sie reichen gar bis auf den Splint und verursachen hier misfarbige Flecke. Als ich einmal den Stock eines so bewohnten, mäßigen Stammes mit nach Hause brachte, schwärmen nach kurzer Zeit Hunderte von Käfern in der warmen Stube. Ich habe auf verschiedenen Holzplätzen schon öfters Stücke, besonders von starken Kiefern, gefunden, welche mit einer großen Menge von unregelmäßig gestalteten Gängen, in denen hier und da noch der todtte Käfer steckte, unterhalb des Wurzelknotens besetzt waren. Da der Käfer hier nicht gebrütet haben konnte, so mußten die Verletzungen von seiner Überwinterung herühren. Es ist schon oben erwähnt, daß die von Käfern bewohnten Triebe abgestoßen werden.

---

(\*) Herr Utsch, welcher diese Beobachtungen zuerst in seinem Reviere machte und Hrn. Eichhoff mittheilte, bemerkt dazu noch Folgendes: Im Winter findet man immer mehr Bohrlöcher als im Herbste und man ist daraus, so wie aus dem häufig zu findenden frischen Melde, berechtigt anzunehmen, daß die Käfer auch im Winter (wahrscheinlich bei gelindem Wetter) bohren. Vor allen zieht er die S. u. SW. Seite der Stämme vor, die er am liebsten im einzelnen Stande und am Rande der Bestände aufsucht. Gar wenige Ausnahmen finden sich in der Höhe von 3-4'. Hieran knüpft Hr. Utsch gleich seine Erfahrungen über den Aufenthalt des Käfers in den abgefallenen, hohlen Zweigspitzen. Bis zum 24. Februar des J. 1835 hatte man nichts in denselben finden können. Da erst traf der Förster Menzel im Stenweiler-Walde Käfer in den Trieben, berichtet aber auch zugleich, daß schon den 26. Februar so milde, freundliche Witterung eingetreten sei, daß die Käfer anfangen zu schwärmen. Jene schon den 24. in den Zweigspitzen vorgefundenen Käfer waren also offenbar Vorläufer dieses Schwarmes gewesen. Ferner sagt Hr. Utsch, daß Ende November 1835, als das Wetter nach einer Kälte von 12-14° wieder gelinde geworden war, die Käfer, obgleich sie schon die Winterquartiere an der O.-Seite der Stämme bezogen hatten, doch noch häufig in den durchbohrten, abgefallenen Zweigspitzen gefunden worden waren. Und zwar waren unter 100 Zweigen 67 leer, 22 enthielten 1 Käfer und die übrigen 2-3 Käfer. Einer dritten Erfahrung vom 10. Januar 1836 zufolge fanden sich, nachdem das Wetter gelinder geworden war und der Schnee wegthaut, unter 100 Trieben 77 leer, 17 mit 1 Käfer und die übrigen mit 2-4 Käfern. Viel neues, zu dieser Zeit am Stockende stehender Bäume entdecktes Bohrmehl bewies neue Arbeiten, vielleicht gar solcher Käfer, welche bisher in den Trieben geessen hatten. — Aus den v. Wedekind'schen *N. Jahrbüchern* (H. 10. S. 38.) ersehe ich, daß Hr. Forstmeister Dr. Heyer ebenfalls die Winterquartiere des *H. piniperda* beschreibt. Da er nichts von der ersten, durch die *Allg. Forst- u. Jagdzeitung* erfolgten Bekanntmachung dieser interessanten Erscheinung sagt, so scheint es, als sei die Entdeckung nun schon zum dritten Male gemacht worden. Hr. Heyer bemerkt, daß der Käfer dabei keinen Unterschied zwischen völlig abgestorbenen und ganz frohwüchsigen Kiefern (denen er aber dadurch durchaus nicht schade?) macht.

Solche sind entweder blofs Zweigspitzen kaum von der Länge eines Fingers, oder sie haben auch wohl 1-2 Nebenästchen. Dies ereignet sich am meisten an Stangenhölzern, doch auch an ältern, aber selten an solchen, die jünger als 10 Jahre alt sind. Hr. Rafsmann beobachtete sie am Rhein in 6jährigen Culturen. Einen bis drei Zolle von dem Knospenquirl entfernt, entweder an den vorjährigen oder selbst zweijährigen, oder an den diesjährigen schon verholzten Maitrieben — an wüchseigen Stämmen nur an der Seite, an kränklichen Kusseln jedoch auch am Kronentriebe —, bohrt sich der Käfer wagerecht ein und verursacht dadurch, wie auch an den beiden untersten Bohrlöchern der hier beigedruckten, Kronentrieb zeigenden, Figur zu sehen ist, Ausflufs von Harz, welches einen oedentlichen Wall vor dem Loche bildet. Sobald er bis aufs Mark gekommen ist, wendet er sich nach oben und frisst hier dasselbe auf eine längere oder kürzere Strecke aus, benagt auch wohl nebenher das benachbarte Holz. Zuweilen kehrt er bald wieder um, gewöhnlich geht er aber, besonders wenn er weit oben anbohrte, bis in die Endknospe und frisst diese auch noch aus. Seinen Ausgang nimmt er durch das Eingangsloch, oder er bohrt sich auch an einer andern Stelle (am vorliegenden Triebe dicht unter den Knospen) wieder heraus. Sind die angebohrten Triebe klein und dünn, wie die Seitentriebe an ältern Ästen, so brechen sie, vom Winde bewegt, an der Stelle des Bohrloches ab und fallen, oft noch mit dem darin sitzenden Käfer, herunter. Sind sie stärker und saftreicher, wie die frischen Kronentriebe, so bleiben sie stehen und die Natur sucht die ausgefressene Endknospe (trotz des fehlenden Markes) durch Entwicklung neuer Knospen aus den Nadelcheiden (wodurch der Trieb ein buschiges Ansehen erhält) zu ersetzen. Solche Gänge im Marke sind leer, während der von der *Tortrix Buoliana* verübte, ganz ähnliche Frafs sich immer durch den, in der Markröhre noch hangenden eigenthümlichen Koth der Raupe kenntlich macht. So befreite Kiefern nehmen bald ein so eigenthümliches Ansehen an, dafs man sie schon von weitem erkennt. Jüngere Stangen sind noch weniger entstellt, denn es ragt nur der Höhentrieb unverhältnismäfsig lang und dünn hervor, oder auch aus den Seitenästen gucken einzelne dicke Büschel auf laugen, kahlen Stängeln wie Thürnchen heraus. Ältere Bäume aber erkennt man gar nicht wieder, so sehr weichen sie in der Bildung der Krone von der ungestört im Schlufs erwachsenen, schön gewölbten Kiefer ab. Am meisten sind diesem Frafs des Käfers die Randbäume der Schläge, oder die an Holzplätze und Ablagen gränzenden Bestände ausgesetzt, auch findet er sich gern in jungen Beständen ein, worin ein Ausziehl alter Hölzer erfolgte und jene plötzlich blofsstellte (Hr. Pfeiffer). Es scheint, als wenn sie die jungen Schonungen, um hier ihr Hauptquartier zu nehmen, oft in weiter Entfernung aufsuchten. So bemerkte sie Herr Rafsmann (s. Pfeil's crit. Bl. X. 1. S. 91.) in einem jungen Kiefernorte im Kreise Kreuznach, und versicherte später auf mein Befragen, dafs ganz in der Nähe nur etwa 100 verkrüppelte, etwa 50jährige Stämme gewesen seien und mehrere, wo die Entwicklung hätte erfolgen können, erst in einer Entfernung von einer Meile. Wir haben hier nahe bei Neustadt unmittelbar hinter dem Schiefshause, etwa ein Dutzend alter Kiefern, welche nicht blofs deshalb sehr merkwürdig sind, weil sie den Frafs schon ungewöhnlich lange aushielten und einen ganz andern Wuchs dadurch erhielten, sondern auch, weil sie alle auf der Höhe stehen und, über das Laubholz hervorragend, gegen den Horizont vorzüglich abstechen. Einige haben die auffallendste Ähnlichkeit mit Cypressen, andre mit den beschnittenen Taxusbäumen, welche sonst in Kunstgärten Mode waren, und Herr Hylesinus ist daher gewifs nicht unpassend von Linné der *hortulani naturae famulus* genannt worden. Unser genialer Rösel gewann sie daher auch so lieb, dafs er sie, in einem schönen Bilde dargestellt, dem Werke verehrte. Das Titelblatt zeigt dasselbe. Die beiden Stämme am meisten links haben offenbar die sonderbarste Gestalt. Der Schaft



ist nur 10-15' hoch, der dicht beästete und wie mit der Gartenscheere beschnittene Gipfel aber 40-45! Die andern sind mehr ausgeästet und haben weniger langgezogene Gipfel. An einigen sieht man die äußersten Gipfel, hier und da auch ein Seitenästchen, wie einen Strauß von halb verdorrten Ästen hervorragen. Die letzten 4 Bäume rechts haben unten noch am meisten den Bau des Kieferschirms in den wagerecht ausgestreckten Ästen erhalten, wahrscheinlich weil sie erst später vom Käfer befallen wurden. Die meisten übrigen Stämme hatten hingegen gewiss schon von Jugend auf vom Käfer zu leiden. Man bemerkt auch hin und wieder an der Abholzigkeit und den Absätzen des Stammes, dafs dann und wann der Krontrieb (vielleicht durch *Tortrix Buoliana*) verloren gegangen ist und durch eine Seitenknospe ersetzt werden mufste. Ich habe später gefunden, dafs die Beschädigungen, welche der Käfer durch Zerstörung



der jungen Triebe in den Schonungen und Stangenhölzern anrichtet, häufig von Forstmännern nicht erkannt worden. Um daher die (vorher gegebene) Beschreibung solcher kranken Orte noch verständlicher zu machen, entschloß ich mich eine von Herren Mützel und Troschel bei Neustadt aufgenommene Zeichnung von Herrn Vogel in Holz schneiden und hier beidrucken zu lassen. Es ist eine Gruppe von Bäumen aus einer 12- bis 15-jährigen Schonung ausgewählt worden. 4 Stämme besonders haben das lange, gestreckte Ansehen bekommen und zeigen hier und da die charakteristischen Büschel, welche durch das Abfallen des Längentriebes und die denselben ersetzenden kleinen Nadelcheiden-Triebe entstanden sind. Die untere Hälfte dieser Stämme wird von niedrigen, buschigen Baumschlag zeigenden, Kieferchen verdeckt. Larven des *Hyl. piniperda* findet man, trotz Herbst (V. p. 107.), Bechstein und Lincker (I. S. 57.), nie in den Trieben (s. S. 45).

**FORSTLICHE BEDEUTUNG UND BEGEGNUNG.** Der Käfer gehört ohne Zweifel mit zu den sehr schädlichen Insekten, denn, wenn auch nur selten ganze Bestände

durch ihn zu Grunde gerichtet werden, so verursacht er doch so vielerlei andern Schaden, dafs der Forstmann bei seiner Häufigkeit in allen Kiefernrevieren stets ein wachsames Auge auf ihn haben mufs. Diese Beschädigungen sind, wie schon zum Theil bei Gelegenheit der Lebensweise erwähnt wurde, folgende: 1) Er zerstört die Triebe der Kiefer. Dadurch werden nicht allein junge Pflanzen und Stangenhölzer im Wuchse sehr zurückgehalten oder verküppeln ganz, sondern auch an alten Bäumen werden die tragbaren Zweige oder, wie Hr. Wittwer beobachtete, wohl selbst schon 6 Monat alte Zapfen tragende abgebrochen und die Samenerndte so wie die natürliche Besamung der Schläge leidet dadurch merklich. 2) Er schadet auch dem stehenden Holze dadurch offenbar, dafs er sich am Fusse desselben über Winter einbohrt. Da die Bohrlöcher bis auf den Bast gehen und hier den Lebensheerd des Baumes empfindlich berühren, so stirbt auch vielleicht mancher bei Überhandnahme des Insekts, ohne dafs man auf die wahre Ursache verfällt. 3) Hilft aber auch der Käfer, wie ich i. J. 1834 beobachtete, mehreren andern, namentlich dem *C. notatus*, dem *Hyl. ater* u. a. auf den Culturen junge Pflanzen, unter deren Rinde er lebt, zerstören. Was nun die schnelle Zerstörung stehender Bäume und sogar ganzer Be-

stände (\*) betrifft, deren oben schon erwähnt wurde, so ist diese allerdings selten und es dürften erst wenige sichere Fälle bei den Forstschriftstellern verzeichnet sein. So sagt Bechstein (*Forstins.* S. 192.) in einer Anmerkung: Im Meiningischen Forste Steinbach sei i. J. 1817 ein ganzer District von 30-40jährigen Kiefern durch den Käfer, welcher die Stangen in 6-7' Höhe angriff, dürre gemacht worden. Wenn auch häufig der Verdacht entstehen muß, Bechstein habe den Käfer mit andern verwechselt — schon deshalb, weil er ihn ganz gewöhnlich mit *typographus* zusammen unter Fichtenrinde gesehen haben will (wahrscheinlich war dies *palliatu*!) —, so ist doch in diesem Falle an der Identität des Insekts nicht zu zweifeln. So hat auch Hr. Eichhoff (*Allg. F. u. J. Z.* VI. S. 155.) Randbäume in Folge des Käferfraßes absterben gesehen. Im Jahre 1838 zerstörte der Käfer, nach Hrn. Burckhardt, im Solling 8-14zöllige Kiefern, und zwar in Gemeinschaft mit *Bostrichus bidens*, wobei sich *B. bidens* an den Kronen besonders auszeichnete. Auch Hr. Denicke jun. erzählte mir, daß er im Reviere Linsburg die Käfer, nachdem sie sich in den Windbrüchen des Winters 18 $\frac{3}{4}$  ungewöhnlich vermehrt hatten, gesunde Bäume habe anfallen und tödten gesehen. Einen sehr ansehnlichen Fraß, den ich selbst gesehen habe, beschreibt Hr. Pfeil (*crit. Bl. X.* 1. S. 87 u. f.). Er ereignete sich im Heinersdorfer Reviere (Forstinsp. Schwedt) in einem, an bedeutende Schonungsflächen gränzenden, über 400 Morgen großen Jagd 10- bis 50jähriger Kiefern, welche in der Planterwirtschaft aufgewachsen waren, und deshalb so ungleiches Alter zeigten. Auch enthielt der Bestand viele alte 120-150jährige überhaltene Eichen. Viele Kiefern waren offenbar dadurch unterdrückt und kränkeltnd geworden, hatten aber doch nicht herausgenommen werden können, weil dadurch zu große Lücken entstanden wären. Dies sowohl wie der schlechte, nur wenig lehmige, auf kiesigem Untergrunde liegende Sandboden erklärt die Empfänglichkeit dieses Holzes für Insektenfraß, obgleich ein solcher früher darin noch nicht statt gefunden hatte. Nun kamen die trocknen Jahre 1834 und 1835 (welche fast in ganz Deutschland Klagen über die Vermehrung dieses Käfers hervorriefen) und der Käfer fand Gelegenheit sich in den Klästern und Bauhölzern, welche als Deputathölzer für die Stadt Schwedt auf dem Reviere standen, ungeheuer zu vermehren. Kein Wunder also, daß er, nachdem die letztern entfernt worden waren, an das stehende Holz ging und zuerst die unterdrückten Stangen, später auch dominirende Stämme angriff. Gewöhnlich waren sie nur in Mannshöhe angegriffen, einzelne dagegen auch bis 10 und sogar bis 20' hinauf. Am Gipfel hatte er also nicht, wie man das gewöhnlich beim *typographus* bemerkt, angefangen. Au recht stark befallenen Stämmen zählten wir mitunter 100-120 Familien! Die unterdrückten Stangen waren größtentheils vernichtet. Die Stämme, an denen sich noch den 2ten August, als wir dort waren, Brut (also verspätete) zeigte, und zwar sowohl von *piniperda* als auch von *minor* (s. dort), waren noch nicht ganz abgestorben, sondern hatten noch grüne Wipfel. Obenher hatten sie meist noch grüne, unten aber schon ganz abgestorbene Rinde. An denjenigen, welche am stärksten und am frühesten befallen worden waren, zeigte sich sogar die Wurzel schon verwesend. Glücklicher Weise wiederholte sich der Fraß im folgenden Jahre nicht wieder, indem der Käfer einerseits durch den unfreundlichen Sommer nicht sehr begünstigt wurde, andererseits aber auch alles gethan wurde, was zur Abwendung fernerer Verluste geschehen konnte, wie ich aus Hrn. Gadow's Mittheilungen ersehe. Bis zum Ende des August 1835 war die Reinigung des ganzen befallenen Jagens bewirkt worden, d. h. alle beschädigte Stämme (welche dem Käfer zum Theil noch im folgenden Jahre einen bequemen Brutplatz darge-

(\*) Es fiel mir auf, daß ich den Käfer sehr selten bloß in einzelnen Bäumen brütend fand. Entweder er wählt gar kein stehendes Holz dazu, oder er befallt es gleich in ungeheuren Schwärmen. Es scheint nämlich, als wenn es oft nur den vereinigten Kräften vieler möglich wäre, einen Stamm zu überwinden. Höchst selten fand ich hier und da eine unterdrückte Kiefernstange, an welcher einzelne, darin gestorbene Käfer ihn vertrieben. Gewöhnlich war er darin aber gar nicht einmal mit seinem Gange fertig geworden, denn dieser fand sich ganz mit Harz angefüllt. Nur selten sieht man den Käfer darin erstickt, er muß sich doch bei Zeiten gerettet haben.



boten hätten), im Ganzen vielleicht  $\frac{1}{2}$  des ganzen Bestandes, wurden gehauen und weggeschafft. Ferner wurden die Klasterbölzer und Laubbölzer, welche man reichlich mit Brut besetzt fand, noch vor der gänzlichen Ausbildung derselben abgefahren, also wie Faugbäume behandelt. Ich habe diesen Fall absichtlich so ausführlich erzählt, weil er sehr lehrreich ist und zeigt, wie weit die Schädlichkeit des Käfers gehen kann, welches die ihn begünstigenden Umstände und die wichtigsten Vertilgungsmittel sind. Letztere sollen hier noch einmal im ganzen Umfange Platz finden. Die Vorbauung ist also auch hier die wichtigste Maasregel. Kann man für die Entfernung des dem Käfer angenehmen Brutmaterials sorgen, namentlich der frisch, und ganz besonders im Frühjahr und Sommer geschlagenen oder von Raupen befreiten Hölzer und der Stöcke, dann auch kränklicher, in der Durchforstung herauszunehmender Stämme, so wird man einen Übergang desselben unter die Rinde des stehenden Holzes nicht zu fürchten haben, und selbst wenn die Witterung und Unordnungen in der Waldwirthschaft, z. B. Streurechen [welches sehr disponiren soll (Liebich *Allg. F. u. J. Z.* Jahrg. 5. S. 90. Anmerk.)] ihn begünstigt, kann er sich nicht in besorglicher Menge vermehren. Treten diesen Maasregeln aber Schwierigkeiten entgegen, wie z. B. im Schwedter Reviere die lästige Aufbewahrung von Deputathölzern, unerwartete Überfüllung der Ablagen und Holzplätze, welche ich schon öfters als den Heerd der Verbreitung kennen lernte, und es tritt plötzlich ein Fraß ein, so werden folgende Vertilgungsmittel anzuwenden sein: 1) Wenn man den Beginn des Fraßes zeitig genug entdeckt, muß die Fällung der angegriffenen Stämme noch vor Ausbildung der Brut, also spätestens bis Ende Juni bewirkt werden. Die Erkennung hat hier weit mehr Schwierigkeit als beim *typographus*, weil *piniperda* viel seltener so schädlich auftritt und dann sehr plötzlich. Man wird die drohende Gefahr besonders nach der Menge der Käfer beurtheilen können, welche sich im Herbst in den Spitzen der Zweige und im Winter am Fusse der Stämme (gewöhnlich derselben, welche den Käfer in den Trieben beherbergten) zeigen, und an der Menge der im Winter unter den Stämmen liegenden abgebrochenen Zweigspitzen. Haben sich die Käfer schon in das stehende Holz eingebohrt, so bemerkt man dies am Bohrmehl (welches jedoch nicht so reichlich wie bei *typographus* herunterfällt) und an den Bohrlöchern, welche meistens aufsen von einem Harzwalle (s. Lebensw. Abbildung) umgeben sind und sich überdies in leicht zu übersehender Höhe finden. Die Spechte verrathen solche Stellen bald. 2) Ist die Entwicklung der Brut schon zu weit vorgeschritten, so ist es zwar gut, sogleich mit dem Wegräumen vorzugehen, weil doch noch eine Menge verspäteter Familien dadurch entfernt werden können, so dringend wie bei *B. typographus* ist es aber nicht, da der Käfer bestimmt nicht zum zweiten Male anfliegt, sondern nach dem Ausfluge die Zweigspitzen bezieht. Daher wird aber 3) auch die Fällung der Stämme, deren Zweige angegangen sind, im September von Nutzen sein. 4) Wird im März und April des folgenden Jahres die Fällung von Fangbäumen an Orten, wo man den Käfer weiß, äußerst wirksam sein. Mit dem Legen solcher Fangbäume kann man bis zur Mitte des Mai fortfahren. Später fliegen wenig oder gar keine Käfer mehr an und ganz gewiß nach dem Juni kein einziger mehr. Solche Fangbäume wird man, da es eine so wenig mühsame und kostspielige Arbeit ist, alljährlich, auch wenn der Käfer nicht in besorglicher Menge vorhanden ist, gut thun, zu legen. Unterdrückte und nicht brauchbare Stangen eignen sich am besten dazu. 5) Ist auch das Zusammenkehren und Verbrennen der Zweigspitzen, welche sich unter den Bäumen finden, empfohlen worden. Ich halte dies aber für eine Arbeit, deren Erfolg gar nicht mit dem dadurch verursachten Kraftaufwande im Verhältniß steht, denn im Winter, wo die meisten Triebe herunterbrechen, finden sich wenig oder gar keine Käfer darin, und im Sommer halten sich die Käfer, die etwa zufällig mit heruntergefallen (die meisten brechen nicht sogleich herunter) nicht lange darin auf. 6) Das ebenfalls empfohlene Abschneiden der befallenen Zweigspitzen ist noch mühsamer und eben so ungewiß, denn man kann es ja dem Triebe nicht ansehen, ob der Käfer grade darin sitzt. Oft öffnete ich ganz frisch angebohrte Zweige und der Käfer war doch schon wieder heraus! Bechstein behauptet zwar, es

sei einmal allein durch das Wegschneiden und Verbrennen der angegriffenen Zweige seinen Verheerungen Grenzen gesetzt worden, so wie auch schon einmal durch das Zusammenhaken der unter den Bäumen liegenden Triebe der Käfer vertilgt worden sein soll (*crit. Bl. X. 1. S. 59.*); allein ich glaube, daß dabei Täuschungen obgewaltet haben und daß man weder gründlich erforscht habe: in welcher Menge das Insect vor der Operation da gewesen sei, noch daß man recht überzeugt gewesen ist, es sei nach derselben verschwunden. Hr. Hartig (*Jahresber. S. 196.*) hat in vielen Trieben bis 8 Käfer gefunden. Wo man sich bei einer Probesuchung von so reichlichem Inhalte der unten liegenden Triebe überzeugt, da hat man allerdings Grund zum Sammeln der Triebe zu schreiten. Man wird jedoch nur selten Gelegenheit dazu finden, denn ich habe in der That immer nur sparsam die Käfer an der Erde gefunden und Hr. Hoffelder behauptet u. A. dasselbe (s. auch die Resultate der Untersuchungen des Hrn. Utsch S. 212.). 7) Als ein neues Mittel, den häufigen Zweig-Zerstörungen zu begegnen, würde ich die Anlage größerer, zusammenhängender Bestände an Stelle kleiner, isolirter Feldhölzer empfehlen. Ich habe mich in außerordentlich vielen Fällen überzeugt, daß solche schmale Streifen von Kiefern, wie man sie besonders im westlichen Deutschland häufig findet, fast immer den Käfer anlocken und denselben schon von fern durch den in der Abbildung angedeuteten spirrigen Wuchs verrathen. In dem berühmten Hauptmoor bei Bamberg springt dies recht grell in die Augen. So lange sich die Kiefern in einem schmalen Streifen an der Nürnberger StraÙe hinziehen, zeigen sie die Angriffe des Waldgärtner. So wie aber der Bestand breiter wird (was allerdings auch mit dem nun besser werdenden Boien zusammenhängt) und sich zu beiden Seiten der Hauptstraße ausbreitet, verschwinden die Spuren des Käfers gänzlich und man sieht nur das kräftigste, gesündeste Holz.

VERWANDT sind mehrere Arten, welche jedoch theils wenig in der Lebensweise von *piniperda* abweichen, wenigstens keine besonderen Vertigungsmassregeln erfordern, theils noch nicht häufig gefunden wurden, als 1) *H. (Dendroctonus) minor* Hart. (F. 2.), meist kleiner (1,6-1,9"), jedoch auch dann und wann bis 2,1" lang, aber constant verschieden dadurch, daß auch im zweiten Zwischenraume der Flügeldecken die Reihen der behaarten Höckerchen bis zum Ende der abschüssigen Stelle (welche hier daher auch nicht geführt erscheint) fortgeht, und noch leichter zu unterscheiden an den lappelartigen Wägengängen mit ziemlich langem Eingange [T. VIII. F. 4., den Abschnitt einer Kiefernstange von der Seite der zum Theil noch darauf liegenden, zum Theil schon (namentlich um den größten Gang herum) entfernten Rinde darstellend] und den unmittelbar aus der Splintwiege in grader Linie durch die Rinde dringenden Fluglöchern, welche wie mit No. 9 u. 10 geschossen aussehn. In Kiefern meist mit *H. piniperda* zusammen (so z. B. bei Schwedt in ungeheurer Menge) und mit diesem zugleich sich entwickelnd, jedoch gewöhnlich die schwächeren Gipfelpartien einnehmend, oder allein an ganz schwachen Stangen vorkommend und dieselben einzeln tödtend (wie ich hier mehrmals beobachtete), auch in Trieben, und zwar nicht bloß bei uns, sondern auch in den verschiedensten Gegenden Deutschlands, aus denen ich ihn schon erhielt. — 2) *H. (Dendroctonus) micans* Kug. (*H. ligniperda* Gyll., Hb., Pk.) (T. VII. F. 3.) 3-3,4" lang, also der größte unter allen echten Xylophagen, in der Gestalt dem *piniperda* am meisten ähnelnd und besonders verschieden durch sehr grob und eng punktirte, glattleistigen Halsschild, große Punkte der Flügel und häufige Höckerchen der ruznlichen Zwischenräume, sehr starke, fast zottige Behaarung u. s. f., ganz besonders aber durch den merkwürdigen Rinden-Familienang. Auf Taf. VIII. ist derselbe in mehreren Ansichten nach Zeichnungen von Hrn. Saxesen, dem ich auch die gründlichen folgenden Beobachtungen verdanke, dargestellt. Fig. 1. zeigt ein aus dem Stamme abgespaltenes Stück Fichtenholz, an welchem unten die Rinde gelassen wurde, um den durch die 6 Löcher bezeichneten, horizontalen oder schwach gebogenen (selten verzweigten) Verlauf des Mutterganges anzudeuten; oben aber wurde der Splint entblößt, weil die in Masse von unten nach oben fortrückenden Larven besonders tief in denselben fressen. In Fig. 2. dagegen ist das

E c

Rindenstück, welches den ganzen Frass bedeckte (also auch die Gegend der Bohrlöcher) von der Basal-  
 seite, welche auch durch den Frass zerstört wird, gezeigt. Die Bohrlöcher sind oft (wie aus dem äußersten  
 rechts in Fig. 1. zu sehen) mit dicken Harzgalen bedeckt. Fig. 3. zeigt wieder ein Holzstückchen, an wel-  
 chem man unten, wo die Rinde sitzen blieb, Fluglöcher und oben, wo sie weggenommen wurde, die in  
 dem Wurmehl gebildeten Puppenlager (theils noch voll, theils schon leer) sieht. Hr. Saxen fand sie  
 auf 1-40' Höhe und als Larven überwinternd stets in lebenden Bäumen, ohne daß diese aber, wenn sie  
 nicht noch von andern bewohnt gewesen wären, danach eingegangen wären. Die Stelle, wo die Käfer  
 ausliegen, verheilt und die Rinde bleibt noch lange darüber sitzen. Die Gänge füllen sich entweder ganz  
 voll Harz oder bleiben hohl. Überhaupt scheint eine gewaltige Harzabsonderung durch den Frass herbei-  
 gelockt zu werden, denn selbst das Wurmehl, welches die fressenden hinter sich herschieben, ist ganz  
 schmierig. Im J. 1837 fand Hr. Saxen einen alten, starken, zugleich von *Cerambyx fuscus* bewohnten  
 Stamm, der aber nicht eingegangen war, mit den Fluglöchern des Käfers besetzt, aber, merkwürdig genug,  
 nur auf Einer Seite in einem laugen Streifen. Im J. 1838 fand Hr. Burckhardt den Käfer auch im Solling,  
 aber auch als einen unschädlichen Käfer. Im September und October hatten sich in einer Fichte sowohl  
 an der Wurzel wie am Stamme alle Entwicklungsstufen gefunden. Einige Andeutungen bei Sierstorff  
 (*Wurmrocken*. S. 60.) zeigen deutlich, daß diesem das Insect schon bekannt gewesen ist. — 3) *H. (Hy-*  
*hurgus) ligniperda* Fbr., (*H. elongatus* Hb., *H. flavipes* Pnz.) (T. VII. F. 9.) fast ganz walzig und 2,4-2,6"  
 lang, sonst dem *piniperda* ziemlich ähnlich. Halsschild lang, grob und dicht punkirt mit deutlicher glatter  
 Mittellinie. Punktireihen der Flügel undeutlich, besonders von der vierten an mit den sehr dicht und  
 grob gerunzelten Zwischenräumen verlaufend. Abschüssige Stelle neben der Nath etwas eingedrückt und  
 mit dichtstehenden goldglänzenden Bürstenhaaren besetzt, auch der übrige Körper laug behaart. Nur in  
 Kiefern (bis nach Süddeutschland) und von mir nur schwärmend und auf gefällten Hölzern gefunden, über-  
 winternd und brütend aber nur an Stöcken, wo die dicken, stark mit Wurmehl vollgestopften und et-  
 was geschlängelten (meist sehr langen und daher gewiss von 2 vereinigten Familien herrührenden) Gänge  
 nach der Länge der Wurzeln herabsteigen und denen von *piniperda* ähneln. Im September fand ich noch  
 Larven und Puppen, aber gewiss der ersten Generation, da es an Stöcken sicher langsam geht. Nie in  
 jungen Kiefern und wahrscheinlich auch nie schädlich. — 4) *H. (Dendroctonus) pilosus* Kn. (T. VII. F. 4.)  
 1,1" lang, gestreckt. Kopf sehr klein. Zwischen Stirn und Rüssel weder Eindruck noch Leiste. Hals-  
 schild in der Mitte am breitesten, etwas länger als breit, vorn sehr wenig eingeschnürt, äußerst fein punk-  
 tirt, kaum geleistet, durch äußerst dichtstehende Schuppenhärchen ganz verdeckt. Flügeldecken mit fein  
 gezähneltem, erhobenem Basalrande, dreimal länger als der Halsschild und auch breiter als derselbe, deut-  
 lich punkirt-gestreift, hinten deutlich breiter werdend. Die Punkte viereckig. Die Brücken schmal und  
 glatt. Die Zwischenräume runzlich-feinpunktirt, jeder mit 1 Reihe kurzer, in Grübchen stehender gelb-  
 bräunlicher Borstenhärchen und vielen sehr kleinen Schuppenhärchen. Flügeldecken gelbbraun, Hals-  
 schild etwas dunkler. Unterseite und Kopf schwarz, mit Ausnahme der Fühler, welche bräunlich-gelb,  
 und der Füße, welche hellbraun sind. Einmal von mir in geworfenen Fichten und Lärchen im Harze in  
 Menge gefunden. — 5) *Hyl. rhododactylus* Marsh. (F. 13.) Dem *H. pilosus* sehr ähnlich, auch in dem  
 eigenthümlichen, hinten verbreiterten Flügelschnitte, aber verschieden durch eine viel größere und dickere  
 Fühlerkeule, ferner durch die lange, deutliche, nicht schuppenförmige Behaarung des längern und schmäl-  
 ern Halsschildes, so wie besonders durch die Flügeldecken, welche viel breitere Punktreihen und viel  
 schmalere Zwischenräume, auch viel längere, sehr dicke Borstenhaare auf denselben haben. Dunkelröth-  
 lich-braun. Von Hrn. Kellner auf Fichtenbäumen kriechend gefunden. — 6) *H. (Dendroctonus) minimus*  
 Fabr. (F. 5.) 0,6" lang, gedrungen, dem *pilosus* ähnlich, aber fast um die Hälfte kleiner, etwa von Gestalt  
 und Größe des *Bostr. Abietis*. Scheitel sehr fein quengerunzelt, matt. Stirn und der sehr kurze Rüssel

glatt, glänzend, mit Haaren, welche in der Mitte kürzer, an den Seiten etwas länger und zottiger sind. Halsschild nicht länger als breit, vorn plötzlich eingeschnürt, überall sehr fein gekörnelt und mit grauen Schüppchen bedeckt, kaum eine Mittellinie zeigend. Flügeldecken so breit wie der Halsschild und zwei und ein halb mal so lang, an der abschüssigen Stelle neben der Nath etwas eingedrückt. Die Punkte der Reihen viereckig, durch breite Brücken gesondert. Zwischenräume sehr schmal, äußerst fein gerunzelt, mit grauen sehr wenig borstenartig abstehenden Schüppchen bedeckt. Unterseite sehr fein punktiert und behaart. Füsse kurz. Farbe grauschwarz, nur das Ende der Schienen, die Fußglieder und Fühler hellbraun, meist auch die hintere Endigung der Flügeldecken heller durchscheinend. — Wahrscheinlich nur in Kiefern. Bei uns in Reisig (selbst bis 2" dicken Knüppeln) und lebenden Pflanzen ziemlich häufig, meist mit *B. bidens* (auch wohl mit *H. minor*) zusammen, in Sternängen, welche gewöhnlich nur 3, sehr selten 4 Arme und sehr weitläufige Larvengänge haben (T.IX.F.4.), so daß in einer Stern-Familie höchstens 50-60 Larven gefunden werden.

## 2. *H. (Hylastes) ater* Payk. Schwarzer Kiefernbastkäfer. (Taf.VII.Fig.6.)

CHARACTERISTIK. 1,6-2,1" lang, sehr lang gestreckt, ganz walzig, bis auf das vordere, etwas verschmälerte Drittheil des, viel längeren als breiten, kahlen Halsschildes. Die Punkte desselben ziemlich dicht und tief und die glatten Zwischenräume netzförmig-verzweigt. Nur in der Mitte eine feine glatte Mittellinie. Rüsselleiste sehr lang und deutlich und der über jedem Oberkiefer befindliche Eindruck sehr ansehnlich. Flügeldecken kaum doppelt so lang als Halsschild. Die Reihenpunkte durch breite Brücken gesondert und die Zwischenräume deutliche kleine borstentragende Grübchen zeigend. Die Borstenhärchen sehr fein, kurz aber sehr dicht stehend. Die Punktirung der Unterseite grob und weitläufig, beim Männchen noch gröber als beim Weibchen. Beim Männchen überdies der letzte Ring unten in der Mitte etwas eingedrückt, beim Weibchen eben oder schwach gewölbt. Farbe allermeist rein schwarz bis auf die Fühler, den vordern Halsschildrand, einen kleinen Schulterfleck, die Fußglieder und die Enden der Schienen, welche heller sind.

VORKOMMEN. So viel ich bis jetzt von Andern erfahren konnte und nach meinen eignen, sehr häufig wiederholten Beobachtungen nur in Kiefern. In Fichten wird man wahrscheinlich immer nur den so leicht zu verwechselnden *H. cunicularius* finden.

LEBENSWEISE, FORSTLICHE BEDEUTUNG UND BEGEGNUNG. Der Käfer hat höchstwahrscheinlich nur eine Generation, denn im Mai und Juni bemerkte ich die Brut desselben mehrmals noch wenig vorge-schritten und ein anderes Mal fand ich im September die eben entwickelten Käfer und daneben noch einzelne Puppen. Dies war in Stöcken, wo der Käfer in der Regel und zwar in geraden Wagegängen zu brüten scheint. In Kiefern-Stöcken habe ich ihn auch immer wieder brütend gefunden. Ob die Gänge aber Wagegänge sind, daran zweifle ich fast. Einmal wenigstens habe ich den Käfer ganz deutlich in Lothgängen bemerkt. Es ist gar nicht leicht darüber Gewissheit zu erhalten, weil die Käfer nach dem Auskommen überall hin fressen und die Gänge dadurch zerstören, oft auch wohl von andern Insekten, wie *Curculio Pini* u. dgl. darin unterstützt werden. Hr. Hartig (*Jahresber.* S.196.) fand im J. 1835 in der Mitte des August die Brut schwärmend und i. J. 1834 u. 1836 den Käfer in der Mitte des September gemeinschaftlich mit *Bostrichus Laricis* unter der Rinde von Kiefern-Klafterholz. Ich halte dafür, daß dieser Aufenthalt von der eben ausgekommenen Brut gesucht worden sei. Ausnahmsweise greift er jedoch auch die jungen 4-5jährigen Kiefern auf Culturen an und zerstört dieselben 1) im Sommer gemeinschaftlich mit *B. laricis* und *bidens* und mit *Curc. notatus* und 2) im Herbst und Winter mit *Hyl. angustatus*, *opacus* u. A. Ich habe ihn nämlich um diese Zeit und im Winter bei lauem Wetter auch fressend, dicht über dem Wurzelknoten gefunden. Die Käfer hatten hier nur unregelmäßig verzweigte (also keine Brut-) Gänge

ausgefressen. Eine Menge alter Kiefernstöcke waren in der Nähe und von ihnen war die Ansteckung ganz gewiss ausgegangen. Dafs der Käfer wenigstens zu den merklich schädlichen zu rechnen sei, ist klar, denn er zerstört nicht blofs in Gesellschaft anderer, sondern auch ganz allein junge Pflanzen. Diese sind sehr bald an den gelben Nadeln und der aufgetriebenen, harzig-unebenen Basis der Stämme zu erkennen. Die Wurzeln werden locker und man zieht die Pflanze leicht mit einer Hand aus. Die Vertilgung also wie bei *C. notatus* S. 144. An Fangbäumen hält er sich wohl einige Tage auf, wird auch selbst in Begattung hier getroffen und fängt auch an Gänge zu bohren, aber immer findet man dieselben nach einigen Tagen wieder verlassen, wahrscheinlich weil er harzigere (Stockholz-) Theile liebt. Hr. H. Pfeil brachte im Herbst Exemplare von der Insel Usedom in Pommern, welche sich in Kiefern-Zweigspitzen gefunden haben sollen. Bis jetzt ist die Beobachtung meines Wissens noch nicht wieder gemacht worden (s. *Leop. Carol. Akad.* Vol. XVII. P. I. S. 459.).

VERWANDT in Bildung und Lebensweise ist 1) der 1,4 - 1,5" lange *H. angustatus* Hb., welchen ich mit *H. ater* immer zusammen fand und der ebenfalls allermeist schwarz, ihm auch in dem ziemlich schmalen und vollkommen walzigen Bau sehr ähnelt, aber verschieden ist durch die völlige Glattheit, den Mangel der Rüsselleiste, dann durch eine, zwar nur sehr schmale aber ganz durchgehende, wirklich etwas erhabene Mittelleiste des grob und sehr eng- (daher auch runzlich-) punktirten Halsschildes, dessen Punkte auch Hörchen tragen, ferner durch stärkere und längere Haare der Flügel. Von diesem unterscheidet Hr. Erichson (Wiegw. *Arch.* S. 51.); 2) den mit den vorigen beiden stets zusammen lebenden *H. opacatus* Ill. (T. VII. F. 8.) und zwar besonders wegen der etwas gedrungeneren Gestalt und des Mangels einer Furche am Rüsselgrunde und der nicht aufgeworfenen Flügelbasis. 3) Den *H. attenuatus*, dem vorigen auch sehr ähnlich, aber stets höchstens 1,4" lang und schmaler, eine schwache Rüsselfurche, sehr breite glatte Mittelleiste des äufserst grob punktirten, etwas niedergedrückten Halsschildes, regelmäßige Borstenreihen der Flügelzwischenräume zeigend und an den Flügeln meist braunroth, am Halsschilde aber schwärzlich erscheinend. — 4) Den *H. linearis*, welcher dem *H. ater* am meisten ähnelt, aber nur 1,6" lang und noch schmäler ist, keine Rüsselleiste und einen langrunzlich-tiefpunktirten Halsschild hat. 5) *H. brunneus*, ebenfalls dem *ater* am meisten ähnelnd, auch in der Gröfse (1,9" - 2"), aber breiter, mit schmalerem Kopf und schmälerem, schwachgeleisteten Rüssel, kürzerem, ziemlich weitläufig und nicht runzlich-punktirten Halsschild und helleren Farben. Die beiden letzten die seltensten, gewifs aber auch, da die vorliegenden Exemplare aus unsern Gegenden sind, aus Kiefern.

### 3. *H. (Hylastes) cunicularius* Kn. (*H. scabrifrons* St.). Schwarzer Fichtenbastkäfer. (T. VII. F. 7.)

CHARACTERISTIK. 1,9-2,1" lang, dem *H. ater* äufserst ähnlich, auch schwarz, aber verschieden durch gedrungener Form. Rüssel breit mit schwachem Leisten. Halsschild nicht breiter als lang, eiförmig-kuglig, sehr grob und dicht punktirt, mit fehlender oder nur undeutlicher, glatter Mittelleiste. Die Flügel nicht viel mehr als doppelt so lang als Halsschild. Die Reihenpunkte gröfser und die Zwischenräume schmaler, auch die Brücken deutlicher. Die 3te und folgenden verlieren immer mehr an Tiefe und Deutlichkeit.

VORKOMMEN H. S. F. So viel wissen wir über diese, früher weder von einem Forstschriststeller noch von einem Entomologen besprochene, interessante Art, welche sehr verbreitet und auch oft sehr gemein sein mufs (Harz, Schwarzwald, Thüringen, Baiern), dafs sie in der Fichte lebt und wahrscheinlich auch nur in dieser brütet. Hr. Kellner hat sie eben so an jungen, abgestorbenen Fichten im vorigen Frühjahr in der Wurzelgegend fressend gefunden, wie wir es von *ater* an jungen Kiefern schilderten (s. auch S. 159.). Die mir zur Ansicht mitgetheilten Stämmchen sind 3- und 4jährig und der Frafs glich vollkommen dem von *ater*. Höchstwahrscheinlich brütet der Käfer auch in Stöcken wie *ater*, denn Hr. Saxen fand den

Käfer an Stucken-Malterbänken der Kohlplätze und fand auch selbst in den Gängen unter der Rinde alte abgestorbene Käfer und draußen munter herumschwärmende. Hr. Hartig (*Jahresber.* S. 197.) theilt als eine, diese Erfahrung noch mehr bestätigende Thatsache mit, daß unter den Papieren seines Vaters eine Tasche mit mehreren Exemplaren dieses Käfers sich gefunden und die Aufschrift geführt habe „an den Wurzeln junger Fichten fressend.“ Hr. Saxesen hat neuerlich einzelne Exemplare des Käfers am Einersberge an Fichtenstöcken bis 2' hoch über der Erde gefunden. Gewiß hatten sie hier nicht gebrütet. Auf Fichtenculturen hat man also auch auf diesen zu achten und die befallenen Pflanzen im Winter auszureißen. Das Stockroden wird dies unnöthig machen.

4. *H. (Hylastes) palliatus* Gyll. Gelbbrauner Bastkäfer. (Taf. VII. Fig. 10. Taf. XIV. Fig. 19-21.)

NAMEN. Man vermuthet, daß diese Art der als braune Varietät von Herbst angeführte *H. angustatus* sei. Hierher gehört auch nach dem Berl. Mus. der *H. marginatus* Duftschw. Ob Bechstein's *Bostr. abietiperda* dieser sei, ist nicht bestimmt zu ermitteln. Es wird aber gewöhnlich angenommen, auch von Hrn. Thiersch [von welchem ich den *palliatus* selbst erhielt, jedoch mit dem sehr verwandten *decumanus* (s. S. 222.) zusammen, worauf auch seine Bemerkungen (*Forstins.* S. 20.) hindeuten].

CHARACTERISTIK. 1,4-1,6" lang. Dem *H. ater* und dessen Verwandten ähnlich, aber gewöhnlich auf den ersten Blick durch seine mehr oder weniger hellbraune Farbe und sehr gedrungene, auch wegen der vordern Einschnürung mehr an *piniperda* erinnernde Gestalt kenntlich. Der schwach geleistete Rüssel durch eine starke Halbkreisfurche vom Kopfe getrennt. Halsschild nicht länger als breit, vorn stark eingeschnürt, dicht runzlich punkirt, mit deutlich hervorstehendem, aber nach vorn nur bis zur Einschnürung reichenden Leisten. Flügeldecken wenig mehr als 2mal länger als Halsschild, mit vorstehendem Basalrande und in Furchen vertieften Punktreihen, schmalen Brücken und schmalen, runzlichen Zwischenräumen. Die in deutlichen Grübchen stehenden Borstenhaare der Zwischenräume sparsamer und nur in 1 Reihe, die graugelben Schuppehärchen und kleineren Härchen dagegen überall dicht stehend.

VORKOMMEN. Nach den von mir in den verschiedensten Gegenden eingezogenen Erkundigungen (auch nach Hrn. Ménétris in Rußland) ist der Käfer geo- und phytographisch sehr verbreitet, denn er bewohnt Fichte, Weisstannen, Kiefern und Lärchen, ja scheut sich nicht, bei uns sogar unter Buchenrinde zu überwintern: etwas sehr Auffallendes, was mir noch bei keinem andern Nadelholzburkenkäfer vorgekommen ist. Schädlich scheint er jedoch nur der Fichte und Weisstanne zu werden, nicht aber der Kiefer. Er schwärmt sehr früh. Hr. Saxesen fand ihn schon gegen Ende des März, wo noch viel Schnee lag, mit *B. lineatus* zusammen fliegend, als von *B. typographus* und *Laricis* noch nichts zu sehen war. Bei uns erscheint er mit *H. piniperda* und *ater* zusammen. Nach Hrn. Thiersch und Warnkönig zieht er die im Schatten liegenden Hölzer bei seinen Angriffen vor und liebt ganz feuchte Rinden. Seine Gänge zeigt eine auf T. IX. F. 1. lithographirte Zeichnung von Hrn. Saxesen. Man sieht ein Stück Fichtenrinde von der Bastseite mit 2 Muttergängen. Diese sind bereits durch den Bast durchgedrungen. Die Eier müssen aber in der Rinde selbst abgelegt worden sein, denn man sieht, daß die Larven sich erst in einiger Entfernung von dem Muttergange bis auf die Splintfläche durchgearbeitet hatten. Unter Kiefernrinde habe ich die Muttergänge auch schon länger gesehen und mit zahlreicherer Brut besetzt, die nach Thiersch wohl bis auf 80 steigt. Umstehend sieht man auch von der Borkenseite die Fluglöcher einer Familie (wie mit No. 9 oder 10 geschossen), mit dem durchpunktirten Muttergange, von dem sie abstammten, wonach die Zahl der wirklich ausfliegenden Käfer sich auch nicht so hoch stellt.

FORSTLICHE BEDEUTUNG UND BEGEGNUNG. Sehr schädlich. Nach Bechstein haben die Käfer in gesunden Weisstannen von 60-80 Jahren, die sie in der Mitte ihrer Höhe auflogen, gehaust und viele Stämme getödtet. Darin liegt ein Beweis mehr, daß er wirklich den *palliatus* meint, denn was sollte sonst



Ähnliches Weistannen angreifen? Hr. Kellner ist sogar der Meinung, daß der Käfer nach dem *typographus* der schädlichste für die Fichte sei, und konnte sogleich am Rennstiege einige Stämme nachweisen, die in Folge seiner Angriffe trocken geworden waren. Auch Hr. v. Berg, Hr. Saxesen u.A. bestätigen dies. Obwohl er im Harze allgemein Astkäfer genannt wird, so glaubt Hr. Saxesen doch, daß dies Prädicat mehr dem *B. chalcographus* und *abietis* gebühre. Es fiel ihm besonders auf, daß der Käfer gern unmittelbar nach dem Fällen in Masse die Fichtenstöcke besiel und sich am Sägeschnitt in den Bast einbohrte. Der Forstmann hat daher auf diesen Käfer zu achten und, wenn sich derselbe in Klüften und Stöcken (wo er sich am liebsten hält) auffallend vermehrt, nicht ruhig zuzusehen. Bis jetzt kennen wir keine andern Mittel gegen ihn als die gegen den *typographus* (s. S. 154.) erwähnten.

VERWANDT sind 1) *H. (Hylastes) decumanus* Er. (T. VII. F. 11.), 2,1-2,6" lang, mit stark vertiefter Rüssel-Halbkreisfurche und kurzen, aber scharfen Leisten, sehr grob und dicht runzlich-punktirtem Schildchen. Die Punkte der in Furchen liegenden Flügelreihen rund und die Zwischenräume so wie die

Brücken gabelig-runzlich-gekörnelt. Grundfarbe dunkelbraun (seltner heller) ins Bräunlich-gelbe schillernd, wegen der Schuppenbärchen. In Fichten [Thüringer Wald (hier nur an den höchsten Bergen), Erzgebirge, Schlesien, auch im Harz von Hrn. Saxesen an Stöcken und von mir an liegenden Stämmen gefunden], gewöhnlich mit *H. palliatus*, auch wohl mit *B. autographus* zusammen. Muttergänge 2-3" lang, sehr breit. Larvengänge sehr bunt durcheinander. Letztere rührten nach Hrn. Kellner noch von vorjähriger Brut her (hätten also anderthalb- bis 2jährige Generation?). 2) *H. (Hylastes) trifolii* Müll., nur 1" lang, auch gedrungener als *palliatus* und verschieden durch vorn weniger eingeschnürten, äußerst dicht und fein-runzlich-punktirten und nur undeutlich geleisteten, stark behaarten Halschild und dicke und lange Borstenhaar-Reihen der Flügeldecken und helle Fühler. Die abschüssige Stelle hoch und fast senkrecht. Wahrscheinlich doch auch in Hölzern (Süddeutschland, Ost- und Westpreußen, Pommern).

5. *H. polygraphus* Linn. (*Polygraphus pubescens* Er.). Doppelsägiger Bastkäfer. Taf. VII. Fig. 12.)

NAMEN. Linné nennt schon einen *Dermestes polygraphus*, beschreibt diesen aber eben so wenig deutlich wie die meisten seiner Nachfolger, so daß auch höchstwahrscheinlich sehr Verschiedenes unter dem Namen ging. Hätte man doch auf die Doppelsägigkeit geachtet! Nach Hrn. Erichson gehört auch *H. pubescens* Fabr. hierher.

CHARACTERISTIK. 0,9-1,1" lang, ziemlich gedungen, vor allen ausgezeichnet durch die, jedes Auge in 2 gleiche Hälften theilende, behaarte Fortsetzung der Wange. Fühler (F. 12c) mit 4gliedrigem Geißelfaden und fester, behaarter, an der Basis noch ein kleines Gliedchen zeigender, schieß zugespitzter Keule. Halsschild in der Mitte am breitesten, vorn etwas verschmälert, kaum länger als breit, häufig und fein punk-

tirt, mit sehr feinen, unter den kleinen schuppenförmigen, graugelben Härchen verborgenen Längsleisten. Flügeldecken zweimal so lang als Halsschild, abschüssig, sehr fein runzlich-punktirt. Nur neben der Nath eine vertiefte Reihe und daneben nur Anfang und Ende einer zweiten. Zwischenräume mit einer Reihe sehr kleiner Höckerchen. Oben mit grau-bräunlichen Schuppenhärchen, unten mit gelblich-grauen Haaren. Die Grundfarbe schmutzig röthlich-braun.

VORKOMMEN u. s. f. In Fichteu und zwar sehr verbreitet, vom südlichen Deutschland (Hr. Walzl) bis Schweden und Ostpreußen. Seine Gänge sind zweiarmlige Wagegänge. Wenn sie auch nicht immer vollkommen wagerecht laufen, so sind sie doch nie ganz lothrecht. Meist sind sie stark geschlängelt und beide von einer großen Rammelkammer abgehende Arme messen  $1-1\frac{1}{2}$ " und sind fast  $0,5$ " breit. Die mehr oder weniger lothrechten Larvengänge zerstören den Bast in hohem Grade. Sehr oberflächliche Splintwiegen. Hr. v. Burgsdorf sandte mir im Sommer 1835 zahlreiche Exemplare, welche unter der Rinde theils stärkerer Stammabschnitte, theils kleiner Zweige mit *Bostr. abietis*, *pusillus* und *pygographus* zusammen lebten. Er hatte sich in allen jungen und etwas ältern (d. h. den in der IV., V., VI. Periode stehenden) sehr nachtheilig gezeigt. Die Stämme starben schon während des Fraßes und ganze Horste gingen so ein. Eben so erhielt ich von Hrn. Zebe den Käfer in Holzseichten von trocken gewordenen Fichteu. Hr. Feldjäger v. Erdmann fand ihn auf einer Harzreise bei Lautenthal in Fichtenpflanzen mit *B. abietis* zusammen. Nach Hrn. Burckhardt zerstörte er im J. 1838 theils mit *H. palliatus* zusammen, theils allein, eine erhebliche Anzahl guter Stämme. Im September und October war von beiden nur Brut (also wohl die zweite) vorhanden gewesen. Man muß daher sorgfältig auf ihn achten und wird ihn in der Regel gemeinschaftlich mit den andern vertilgen können, und zwar auf die bei *B. typographus* angegebene Weise.

•• Nur in Laubbölkern.

6. *H. crenatus* Fabr. Großer schwarzer Escheu-Bastkäfer. (Taf. VII Fig. 14.)

NAMEN. Da er wenig bekannt ist, so giebt es wohl nicht viel Namen für denselben. Panzer's *Bostr. crenatus* gehört aber bestimmt nicht hierher, sondern wahrscheinlich zu *H. decumanus*.

CHARACTERISTIK. 2-2,5" lang und bis 1,4" breit, also der gedrungenste unter allen. Rüssel sehr kurz und dick, mit einem schwachen, bis fast auf den Scheitel fortsetzenden Leisten. Halsschild so breit als lang, höckerig und nur ganz hinten schmal punktirt, in der Mitte mit ganz kurzer glatter Stelle. Flügeldecken mit stark erhabenem, gezähnelten Vorderrande (daher auch vertieften kleinen Schildchen), in der Mitte am breitesten, nach hinten allmählig verschmälert, nur wenig abschüssig (deshalb sowohl, wie auch wegen des aufsteigenden Hinterleibes *Eccoptogaster* ähnlich), mit stark vertieften, großen Punkten und äußerst stark gekörnt-runzlichen Zwischenräumen. Schwarz mit oben sehr kurzen und nur an der Unterseite längeren, goldgelben Haaren.

VORKOMMEN u. s. f. An Eschen (von Hrn. v. Pannewitz in Oberschlesien, Hrn. Erichson auf Rügen, Hrn. Walzl in Baiern und mir im Harze am kleinen Dambachskopfe gefunden). Ich sah ihn nur an Stücken, jedoch noch ganz frischen uralter Bäume. Seine Gänge sind kurze dicke, höchstens 1" lange (aber nur 2" breite) stets etwas — gekrümmte einarmige Wagegänge. Die Fluglöcher wie mit No. 5 oder 6 geschnitten. Die Bohrlöcher in der Tiefe der größten Risse schief. Rindenwiegen. Einigen Nachrichten aus Oberschlesien zufolge schien er dort gefährlich werden zu wollen. Schon den 6ten April hatte er sich in stehendes Holz eingebohrt.



7. *H. Fraxini* Fabr. Bunter Eschen-Bastkäfer. (Taf. VII. Fig. 15.)

NAMEN. Nach Hrn. Erichson ist *H. varius* bloß kleine Varietät und *H. melanocephalus* der ausgefärbte Käfer. Auch *Anthrribus pubescens* Fabr. gehört hierher.

CHARACTERISTIK. 1,4–1,6" lang, gedrungen. Halsschild viel breiter als lang, vorn zurückgedrückt, fein-höckrig, ohne Mittelsteife. Flügeldecken mit erhobenem Vorderrande, in der Mitte nicht breiter als vorn, nach hinten allmähig verschmälert und deutlich abschüssig, mit deutlichen, feinen Punktreihen. Die Zwischenräume mit einer Reihe kleiner Grübchen, jedes mit einem ganz kurzen Borstenhärchen. Hinterleib wenig ansteigend. Der ganze Körper matt und größtentheils mit kleinen, anliegenden bräunlich-gelben Schuppenhärchen bedeckt, welche auf den Flügeln hier und da Flecke der schwarzen Grundfarbe durchblicken lassen — daher bunt. —

VORKOMMEN UND LEBENSWEISE. In Eschen überall verbreitet vom südlichen Deutschland bis Schweden, Ostpreußen, Petersburg, Caucasus (Hr. Ménétrés). Im Harze und in Berliner Gärten (bei Hrn. Bouché) habe ich den Käfer selbst beobachtet. Die Generation ist gewiss nur einjährig, denn im Harze bemerkte ich bei 2000 Höhe (wo die Brut erst spät im Mai angefangen haben konnte) die Käfer im September noch nicht ausgeflogen. Selbst in Passau sahe sie Hr. Waltl erst Ende April schwärmen. Die Gänge sind doppelarmige Wagegänge, die aber an dünnen Ästen auch diagonal oder wohl gar lothrecht laufen. Der Eingang kurz. Auf T. VIII. F. 5. ist ein von einer etwa 20jährigen Esche (aus der Gegend des großen Dambachs-Kopfes im Harze) abgeschnittenes Holzstück dargestellt. Es zeigt, daß die Larven, welche gewöhnlich tiefe Furchen, sowohl im Splint wie im Baste nagen, erwachsen waren und auch schon hier und da angefangen hatten, sich in den Splint einzufressen. Haben dies alle gethan, so zeigt das Holz unzählige Löcher, in welchen die Puppen (die man jedoch auch ausnahmsweise auf dem Splinte oben auf liegend findet) mit dem Kopfe nach außen gewendet sind. Wenn sie ausfliegen wollen, bohren sie grade durch die Rinde und diese erscheint wie mit No. 9 oder 10 geschossen. Ich kenne kein Insekt, welches in so dicht beisammen wohnenden Familien frist. Oft sieht man Furchen an Furchen auf dem Splint und den Bast gänzlich in Wurmehl verwandelt. Daß dieser Käfer zu den sehr schädlichen gehört, hat kürzlich ein Fraß in Ostpreußen gezeigt. Hr. Rafsmann schreibt mir darüber im Sommer 1836: Der Käfer hatte fast alle nicht unbedeutenden Eschen in den beiden Oberförstereien Alt- und Neu-Sternberg seit einem Jahre befallen. Er liebt vorzugsweise die gesunden Stämme von geringer und mittler Stärke. Über den Fraß in Ostpreußen haben wir noch neuere Mittheilungen erhalten. Eine von Herrn Rafsmann ist in Pfeil's *crit. Bl.* (Bd. III. H. 2. S. 187.) abgedruckt und mit einer Bemerkung von mir begleitet. Es ist mir nämlich noch nicht vorgekommen, daß der Käfer, wenn er wirklich im Stamme brütet, nicht auch die Basthaut durchdringen sollte, eben so wenig wie ich gesehen habe, daß er den Splint bis auf das ältere Holz zerstört. Es kommt wohl vor, daß der Käfer bloß in der eigentlichen Rinde sitzt, wie ich das auch in Hrn. Bouché's Garten sahe (s. S. 160. Anmerk.). Dann brütet er aber auch bestimmt nicht daselbst, sondern zieht nach einiger Zeit wieder ab. Die größte Tiefe, bis zu welcher ich den Käfer in den Splint eindringen sah, beträgt höchstens  $\frac{3}{4}$ ! Hr. Rafsmann fand im J. 1837 bei einer wiederholten Revision auch nicht einen einzigen (?) lebenden Käfer mehr, indem, wie er sagt, sämtliche in ihrem Winteraufenthalte (der Stammrinde) befindlichen Exemplare todt Hüllen waren. Sollte der Käfer so empfindlich sein, daß der anhaltende Winter ihn hier hätte tödten können? Er berichtet, daß nur wenige vom Käfer ergriffene, stehende Eschen ganz eingegangen wären, während mehrere kränkelten, die meisten jedoch — wenigstens scheinbar gesund — fort vegetirten. Allenthalben bemerkte man, wie sich die vom Käfer und den Spechten zerstörten Rindenstellen regenerirten. Ein noch späteres Schreiben von Hrn. v. Burgsdorf enthält ebenfalls einige beachtenswerthe Zusätze zur Lebensweise des Käfers, den wir

auch noch ferner sorgfältig beobachten müssen. Ich ersehe daraus nämlich, daß der Hr. Oberförster Froemming zu Neu-Sternberg den Käfer auch in der dickern Rinde der Aspen (*Populus tremula*) gefunden haben will, was mir indessen noch der Bestätigung zu bedürfen scheint. Auch wird darin nachgewiesen, daß dem Käfer auch durch Fangbäume begegnet werden könnte. Denn, wenn derselbe auch, wie alle Nachrichten dies übereinstimmend angeben, am liebsten die gesündesten Stämme befallt, so geht er doch nichts desto weniger auch ganz abgestandene an und selbst das eingeschlagene Kastenholz. Als Beweis dafür wird Folgendes angeführt. In einem Schlage des Alt-Sternberger Forstes wurden im Winter 1835-36 durch Holzdiebe drei Eschen gefällt, deren Stammenden von den Wipfeln mittelst der Säge getrennt und verkauft wurden. Die 3 Wipfel, welche liegen blieben und keine Spur des Käfers im Winter bemerken ließen, wurden im Mai 1836 so stark angebohrt, daß man sie als Fangbäume benutzen konnte. Die 15-20jährigen Stämme, in welchen ich ihn im Harze beobachtete, waren entweder ganz von ihm besetzt oder nur die Äste. Hr. Feldjäger Wiese erzählte mir, daß in seiner (Elb-) Gegend oft über Unbrauchbarkeit der Eschenäste (welche zu Sensen sehr gesucht werden) wegen Wurmfraßes geklagt würde. Bis jetzt kennen wir keine andre Begegnung als die schleunige Entfernung oder das Abhorken der befallenen Stämme, welche, wenn die Brut begünstigt wurde, sonst ganze Reviere anstecken. Da der Käfer spät ausliegt (gewiss nirgend vor der Mitte des Juli) und die Gegenwart der Brut sich bald durch Welken der Stämme oder einzelner Äste, wie durch die Bohrlöcher verräth, so wird man noch in dem Fraßsommer dazu schreiten können.

VERWANDT ist *H. vittatus* Fabr., kaum 1" lang, auch ziemlich schmal, aber stark gewölbt, mit grau-weißen, bräunlich-gelben und dunkelbraunen, mosaikartigen (häufig bleichen oder abgeriebenen) Flecken, welche besonders auf den Flügeln einige Stufenzeichnungen bilden und die Nath hinter dem Schildchen wie einen Rhombus einschließen. — Ob auch in Eschen?

### Dritte Gattung.

#### *Eccoptogaster* Hb. Splintkäfer. (Taf. X.)

NAMEN. Von *εκκεῖν* ausschneiden oder unterbrechen (nämlich die grade Linie des Hinterleibes γὰρ). Der sonst auch wohl für diese Gattung gebräuchliche Name *Scolytus* ist, da er zugleich einer Raubkäfergattung (*Onophron*) gehört, zu verlassen.

CHARACTERISTIK. Die Käfer von allen unterschieden durch den ansteigenden, oft sogar rechtwinklig eingedrückten Hinterleib und die nicht abschüssigen Flügel (s. T. X. F. 2.). Der nach unten stark gewölbte, große Kopf wird von dem vorn verengten, punktierten, stark gewölbten, nie geleisteten Halschilde nicht ganz aufgenommen und hat eine Rüsselspur. Fühler (T. X. F. 4 e) kurz. Keule zusammengedrückt, fest, undeutlich 5gliedrig, länger als der 6gliedrige Geißelfaden. Augen lang und schmal, niedergedrückt, vorn stark gebuchtet. Flügel höchstens 1 $\frac{1}{2}$ mal länger als Halsschild, fast viereckig, an den Seiten gewölbt, aber nicht nach hinten (nicht abschüssig) und daher kaum den Hinterleib deckend. Der Anfang (öfters auch das Ende) der Nath so wie das große dreieckige Schildchen vertieft. Die Vorderhüften meist deutlich durch einen Zwischenraum getrennt. Schiene zusammengedrückt, am Außenrande ganz, an der Spitze hakig und 3tes Fußglied sehr groß, 2lappig (F. 4 g). Farben mehr dunkel als hell, gewöhnlich glänzend röthlich-braun, wenigstens an den Rändern. Behaarung oben stets sparsamer, unten dichter, meist glänzend bräunlich-gelb. Männchen mit vertiefter, stark büstenartig-gelbhaarer (beim Weibchen etwas gewölbter) Stirn und eingedrücktem, stark borstenwimprigen (beim Weibchen fast ver-

Ff

tikalen und, so wie die ganze meist schwächer behaarte Unterseite, gröber und dichter punktierten) letzten Hinterleibsringe und im Tode meist dahinter vorragender Ruthe. Die Larven (T. XVI. 25, 27. von *E. intricatus*) sehr gedrunken, die 3 ersten Ringe am meisten gewölbt, besonders der erste, welcher 4 dreieckige, dunklere, hornige Schildchen trägt, von denen 2 und 2 auch wohl durch ein Querschildchen vorn zusammenhängen. Behaarung ausnehmend schwach, meist ganz fehlend. Kopf auffallend lang und schmal (F. 27.). Fühleranlagen sehr deutlich. Puppen (F. 26. von *E. intricatus*) kurz und gedrunken. Kopf groß mit fast parallel gelagerten dickkeuligen Fühlern. Schienen gekrümmt. Unterflügel lang, die Oberflügel überragend. Hinterleib eingedrückt. Behaarung äußerst schwach. Dornhöcker am Rücken kurz.

VORKOMMEN u. s. f. Höchstwahrscheinlich nur in Laubbölzern. Bechstein's und Anderer Angaben vom Vorkommen in Nadelbölzern sind unzuverlässig. In keiner Gattung treffen wir so viele Waggänge (aber nie doppelarmige) und so häufig Splintwiegen, als in dieser. Zum Anbohren wählen sie gern große Risse der Borke. Hr. Waltl sah bei *E. intricatus*, das Männchen und Weibchen bei der Begattung in grader Linie, *anus* gegen *anus* gekehrt standen (wie Falter). Nach dem Ablegen pflegt das Weibchen bis in das Bohrlöch zurückzukehren und hier, den Eingang mit dem Hinterleibe verschließend, zu sterben. Da sie bisher wenig beobachtet waren, so kennen wir die forstliche Bedeutung derselben und die Begegnung noch nicht hinlänglich. Indessen haben die wenigen, in neuesten Zeiten gemachten Erfahrungen schon einige sehr und merklich schädliche unter ihnen nachgewiesen. Der, besonders in Rüstern und Eichen (wo die wichtigsten Splintkäfer sich halten) wirtschaftende Forstmann hat daher auf sie so gut wie auf Borkenkäfer zu achten, und im Falle sich Trockniss irgendwo zeigt, sogleich die frisch angebohrten Stämme mit der Brut zu entfernen. Es wäre wichtig bei einem großem Fraße die Anwendung von Fangbäumen zu versuchen, die man in Schatten werfen könnte, um das schnelle Austrocknen zu verhindern. Natürlich sie dürften nicht zu früh, sondern müssen grade zur Schwärmzeit gefällt werden.

#### A r t e n .

♦ Hinterleib (wenigstens beim Männchen) an der Unterseite mit Höckerchen oder Zähnchen.

#### 1. *E. Scolytus* Hb. (*Hylesinus Scolytus* Fbr.) Großer Rüstern-Splintkäfer. (Taf. X. Fig. 4.)

CHARACTERISTIK. 1,9-2,7" lang. Stirn und Rüssel ohne Leiste. Halsschild merklich breiter als lang, fein und gleichmäßig, in der Mitte fast verschwindend-punktiert. Flügel sehr wenig länger als Halsschild, hinten merklich verschmälert, mit etwas vorgezogener Spitze. Punktreihen ziemlich vertieft. Zwischenräume sehr breit und mit zahlreichen, meist 2, öfters bis 3 Reihen bildenden Punkten. Nath nur an der Basis niedergedrückt. Hinterleib stark eingedrückt. Der 3te und 4te Ring am Hinterrande (bei beiden Geschlechtern) in der Mitte mit einem Wärtchen und der 2te, 3te und 4te an den Seiten gezähnt. Flügel und Beine meist rötlich-braun oder schwarz gefleckt; Kopf, Halsschild und Unterseite dagegen größtentheils schwarz.

VORKOMMEN u. s. f. In Rüstern (*Ulmus campestris* und *suberosa*) und wahrscheinlich auch nur in diesen gemein, denn erst eine einzige Beobachtung (von mir selbst im Kesten-Thale an den Bode-Klippen des Thaleschen Revieres angestellt) kennt ihn in Eschen, aber sehr verbreitet, denn sowohl in Böhmen, Oestreich (Feistm. I. 359.) und Bayern, als auch im nördlichen Deutschland bis Schweden und Rußland, sogar in England ist er nachgewiesen. Im Lödderitzer Revier fand ich ihn schon im J. 1835 in einigen, aus unbekannten Gründen vertrockneten, starken Rüstern, und im J. 1836 sah ihn Hr. v. Meyerinck noch mehr um sich greifen, so daß einzelne Baumgruppen ganz zerstört wurden; es wäre auch vielleicht ein noch ausgedehnterer Fraß entstanden, wenn ihn nicht die raue Witterung des Sommers unterdrückt

hätte. Er griff hier ganz gesunde große Bäume an. Diese waren oft völlig bedeckt mit den Gängen und wurden vom Specht, der sogar tief ins Holz hackt, hier und da gänzlich abgeborst. Die Gänge (T. XI. F. 1.) sind kurz und breit, meist mit 2, immer in der Tiefe der Risse liegenden Bohrlöchern, lothrecht und die Larvengänge laufen verworren durch einander, so daß oft der ganze Bast in Wurmhehl verwandelt wird. Die Wiege meist in der Rinde, zuweilen auch im Splinte. Als ich die kurzen, von mir abgebildeten Muttergänge beschrieb, standen mir nur wenige gute Rindenstücke zu Gebote. An den meisten hatten die ausgekommenen Käfer so bunt durch einander laufende Gänge gefressen, daß man nichts mehr mit Bestimmtheit erkannte. Später erhielt unsre Sammlung durch Hrn. v. Meyer rück die vortrefflichsten Gang-Exemplare, theils auf dem Baste, theils auch auf dem Holze abgedrückt. An diesen sah ich denn ganz bestimmt, daß die Abbildung dennoch ganz charakteristisch sei, indem die allermeisten Muttergänge kaum 1" lang, sehr selten bis 2" lang sind (wie die Eccoptogastern mit Lothgängen meist solche nur kurz zu haben scheinen mit Ausnahme von *destructor*). Nur sind in den meisten Exemplaren die Larvengänge zahlreicher, anfänglich dichter und später sich weiter verbreitend und zierlicher geschlängelt (ganz so wie in Fig. 3, welche sich nur durch geringere Größe unterscheidet, so wie dadurch, daß die Muttergänge im Verhältnisse zur geringen Größe des Käfers doch etwas länger erscheinen). Gewöhnlich ist nur 1 Bohrloch vorhanden, seltner 2 und dann gehen sie meist so schief durch die Rinde, daß man sie nicht so offen sieht wie in Fig. 1. Taf. XI. Die vorher an der Esche erwähnten Exemplare saßen im Stocke eines starken Baumes und verhielten sich hier auf die bei *Hyl. crenatus* angegebene Weise, indem sie aus dem abgestorbenen Rindentheile allmählig in den frischen vorrückten. Die Muttergänge waren nur ganz kurze Lothgänge (also wieder den so eben aus der Rüster beschriebenen entsprechend). — Über dies bis jetzt so wenig besprochene Insekt haben wir neuerlich auch aus dem Auslande interessante Nachrichten erhalten, welche immer mehr beweisen, daß dasselbe zu den beachtenswertheiten Laubholz-Insekten gehört. Mitgetheilt sind dieselben von Westwood (in *London's Garden. Mag. Aug. 1838. S. 363 u. f.*) und von Audouin, Mr. Spence u. A. (in *London's Arboretum Britann. in einem Separat-Abdrucke S. 3 u. f.*), und zwar aus verschiedenen Gegenden Frankreichs, Belgiens und Englands. Im Kensington-Garten mußten die schönsten Rüster gefällt werden. Im J. 1825 wurde eine ganze Ulmen-Allee im Camberwell-Grove durch das Insekt vernichtet. Zu Dünkirchen, Calais, Boulogne sur Mer, Montreuil, Rouen, Havre de Grace, Caen, St. Lo, Granville u. a. f. befanden sich Hunderte von jungen Bäumen im Absterben, und ein großer Theil der jungen Rüster in den Boulevards von Brüssel fing schon an, in Folge der Käferangriffe schwach zu werden. Die Brutzeit, wie sie einmal angegeben wird, scheint mir etwas spät zu sein. Im Juli sollen sich die Weibchen erst eingebohrt und (20-50) Eier gelegt haben. Gegen den September wären die Larven ausgeschlüpft gewesen und die Käfer hätten sich erst im nächsten Mai entwickelt. (Im Lödderitzer Reviere waren die Gänge im September allermeist schon von den Käfern verlassen und nur wenige der letztern, noch seltner einzelne Larven und Puppen fand man zu dieser Zeit.) Die Hauptsache, um die es sich handelte, war auch hier die Frage: „geht der Käfer nur kranke oder auch gesunde an?“ Die competentesten Richter, Hr. Audouin, Mr. Spence u. Westwood entschieden sich für die Gesundheits-Annahme und verstärken die Partei der Gesundheitsvertheidiger bedeutend. Im J. 1828 soll sich sogar in der Zeitung von Cambridge ein Streit zwischen Mr. Denson sen. und Mr. J. Deck von Cambridge entsponnen haben, in Folge dessen Mr. Denson Versuche in seinem Garten anstellte um die Krankheit der angestochenen Bäume zu beweisen. Es ging diesem aber wie vielen andern, d. h. man entgegnete dem Experimentator: er habe Recht, daß der *Scolytus* seine Eier nie in gesunde Bäume lege, aber eben so richtig sei die Behauptung derer, welche annehmen, daß der Käfer auch gesunde Bäume angehe, daß also allerdings keine gesunden Bäume durch die Eierablage getödtet würden! In Brüssel wurden auch sogar, auf diese Gesundheitstheorie gestützt, 20-30 starke Stämme und mehrere jüngere, die schon mit Brut be-

setzt waren, sogleich gefällt. In den Boulevards von Brüssel bestrich man einen großen Theil der jungen Rüstern, welche bloß Käfer in der Rinde, aber noch nicht Brut enthielten, mit Steinkohlentheer (*coal-tar*), weil man mit Recht hoffte, daß die schon vorhandenen Käfer in der Rinde ersticken, die neu hinzukommenden sich aber vor dem unangenehmen Geruch des Theers scheuen würden. Man wollte dies 1-2 Jahre hinter einander wiederholen. Resultate sind noch nicht bekannt geworden. Hr. Kollar (*schüdl. Ins.* S. 275.) berichtet auch, daß Hr. Forstrath Binder v. Krieglstein die von dem Käfer befallenen zahlreichen Rüstern auf den Donauinseln, namentlich im Prater, sogleich habe fällen lassen und daß nur dadurch einem weitern Umsichgreifen vorgebeugt worden sei.

VERWANDT sind: 1) *E. destructor* Ol. (F. 1-3.) 2,3-3" lang (also der größte). Rüssel mit kurzer Längsleiste. Halsschild kaum länger als breit, vorn gebuchtet, ziemlich fein punktirt. Zwischenräume der Flügel nur mit einer Punktreihe. Nath bis zur Spitze vertieft. Hinterleib stark (fast rechtwinklig) vertieft, beim Männchen der 3te Ring mit starker Warze und der 4te mit stark vortretendem, mitten gebuchten Hinterrande. Glänzend schwarz. In Birken eben so verbreitet wie der vorige (im Harze bis 2000' hoch), jedoch, wie es scheint, immer nur einzelne, unterdrückte (20-40jährige) Stämme tödtend. Die Lothgänge desselben sind die größten (bis 4" lang) unter allen (T.XI.F.2.) und durch eine Menge von Luftlöchern ausgezeichnet, welche man schon von außen am Stamme oft in einer Reihe stehen sieht. Larvengänge sehr zahlreich. Rindenwiegen. 2) *E. multistriatus* Marsh. (F.11.). 1,3-1,6" lang, mit einem großen wagerechten Zapfen am 2ten Ringe des stark eingedrückten Hinterleibes. Halsschild ziemlich stark punktirt. Die Zwischenräume der Flügel mit Punkte, welche eine fast eben so starke Reihe wie die Punktreihen bildet, daher vielgestreift erscheinend. Braun. In der Rüste, welche er entweder allein oder in Gesellschaft des *E. Scolytus* angreift. Er zerstört sie ganz oder nur einzelne Äste derselben. Gänge (T.XI.F.3.) äußerst feine und zierliche, wenig in den Splint greifende, 6" bis 3" lange, gerade oder wenig geschlängelte Lothgänge ohne Luftlöcher. Fluglöcher wie mit No. 11. geschossen. — 3) *E. pygmaeus* Hb. (F.6.) (*Hyl. pygmaeus* Fabr.), 1,2" lang, sehr gedrungen, mit in der Mitte höckerig vorragendem Hinterrande des vorletzten Hinterleibsringes des Männchens. Halsschild fast kuglig, sehr fein punktirt. Die Punkte der Flügelreihen nicht stark, die der Zwischenräume fein, sparsam, eine Reihe bildend. Flügel hell rothbraun. Fühler gelblich-braun.

•• Hinterleib ohne Höckerchen oder Zahnchen.

2. *E. intricatus* Koch (*E. pygmaeus* Gyll.). Eichen-Splintkäfer. (Taf.X.Fig.9.)

CHARACTERISTIK. 1,3-2" lang. Zwischenräume der Flügel schmal, mit einer Reihe starker Punkte und außerdem auch wohl noch einigen verlorren. Zwischen diesen und den Punktreihen viele diagonale Runzeln, daher glanzlos. Die Nath nur dicht hinter dem Schildchen vertieft, ohne Spur von begleitender, vertiefter Rinne. Halsschild fast breiter als lang, ziemlich stark und dicht, und an den Seiten sehr stark fast runzlich punktirt, auf der Mitte schwächer und feiner.

VORKOMMEN u. s. f. In der Eiche und zwar außerordentlich verbreitet von Frankreich durch Bayern (Waith) bis Schweden und Curland (Hr. Haffelder). Er gehört zu denen, welche sich oft in besorglicher Menge zeigen, denn, nicht allein die Nachrichten von anonymen Holzzerstörern in Eichen [Hrn. Wächter (S.338.) wurde berichtet, daß viele junge, gepflanzte, 20jährige Eichen durch einen Borkenkäfer getödtet worden seien und in Blankenburg hörte ich von einem, dort in der Nähe vorgefallenen Schaden] deuten auf ihn, sondern er wird auch schon mit dem Namen als arger Zerstörer bezeichnet. Hr. Audouin zeigte der *société philomatique* an: daß in dem *bois de Vincennes* 50,000 Stämme 25-30jähriger Eichen, welche vom Käfer angegangen waren, hätten gefällt werden müssen. Auch bei uns habe ich

ihn, jedoch nur auf den Holzplätzen bemerkt. Von dem, höchstens 1" langen und 1" breiten Wagegange gehen höchstens 30-40 Larvengänge nach oben und unten ab (bis 3,5" breit). Splintwiegen sehr oberflächlich. Neuerlich haben sich die Nachrichten über die Schädlichkeit dieser Art noch vermehrt. Wenn der Herr Baron Feisthamel also auch behauptete, daß die berührt gewordene Trockniss von Vincennes der außerordentlichen Dürre des Jahres 1835 beizumessen und der *Eccoptogaster* nur secundäre Ursache der Eichen-Trockniss sei, so wird diesem doch nicht Glauben geschenkt von Hrn. Westwood (in London's *Gard. Mag.* Aug. 1838. S. 364), welcher noch hinzufügt, daß er im Juli 1838 im Jardin des Plantes zu Paris von Hrn. Audouin auf einen schönen jungen Eichenstamm (wahrscheinlich von *Quercus lusitanica*) aufmerksam gemacht worden sei, welcher durch den *Eccoptogaster* (oder *Scolytus pygmaeus*, wie er hier genannt wird) getödtet war. Der Käfer hatte sich in der Gegend der Astachsel eingebohrt (s. dort den Holzschnitt) und war, wie Hr. Audouin meinte, von einem benachbarten Holzplatze hergekommen. Noch mehr Beweise! Im J. 1838 fand ich den Käfer selbst im Forstorte Rauschenlagen am Solbrig in jungen Eichen-Heistern. Hr. Burckhardt beobachtete ihn ebenfalls und schreibt mir darüber: „In unsern ausgedehnten Eichenpflanzungen kommt er in reicher Menge vor, bisher jedoch ohne großen Nachtheil. Er wird in den meisten trocknen und halbtrocknen Stämmen gefunden, oft in 12-15 Exemplaren. Nur einmal fand ich ihn in einer Gruppe (etwa 30) zwar noch grünender, aber (auf zu feuchtem Boden) kränkelnder Eichenpflänzlinge, denen er sogleich den Tod brachte. Großen Verdacht erweckte er außerdem in einer schlecht ausgeführten Eichenpflanzung eines Gemeindewaldes.“ Ferner fanden ihn Hr. Saxesen und Hr. Pape neuerlich am Harze in jungen Eichen (s. die Bemerkungen am Ende der Bupresten). Hr. Saxesen macht dabei die Bemerkung, daß man an vielen Stämmen bloß Bohrlöcher gefunden habe, welche vom Käfer wieder verlassen worden wären. Die Stämmchen waren etwa nur bis  $\frac{2}{3}$  der Höhe von der Wurzel an befallen. In Oberschlesien wurde der Käfer ebenfalls in jungen Eichen von Hrn. Radzay gefunden. Es ist daher als etwas Unerhörtes zu betrachten, was Hr. Suffrian über ihn schreibt. Er fand ihn nämlich in den Jahren 1832 und 1833 in zahlloser Menge an den Pappeln auf der Chaussee zwischen Magdeburg und Egelu und vom Winde auf die Erde geworfen. Sollte der durch einen Windstofs in diese holzarne Gegend verschlagene Käfer die Pappeln befallen haben, um nur wenigstens auf Bäumen zu ruhen?

VERWANDT sind: 1) *E. Pruni* (F. 5.) (\*). 1,5-2" lang. Halsschild so breit wie lang, hinten etwas eingeschnürt, fast abgerundet-viereckig, fein und zierlich weitläufig punktiert. Flügel hinten anscheinlich verschmälert, mit kleiner Vorspitze. Zwischenräume sehr breit, mit einer Reihe von Punkten, welche aber schwächer als die sehr breitbrückigen Punktreihen, daher glänzend. Nath nur an der Basis vertieft. Hinterleib etwas eingedrückt. Meist dunkel schwarzbraun. An Pflannenbäumen, lieber die Äste als den Stamm befallend. Eine sehr sonderbare Abweichung in der Holzwahl zeigte der Käfer im Harze. Wir fanden ihn hier nämlich auf der Herbst-Excursion 1838 gegen Ende Septembers im Lauterberger Reviere in einem liegenden Rüsterstamme, wo die schönen 1" langen, ganz graden Lothgänge mit 30-40 (wie in Fig. 3. Taf. XI. zierlich geschlingelten) Larvengängen, in welchen die Larven noch fraßen, besetzt waren. Später fand ich den Käfer wieder an armsdicken, jungen Apfelbäumen. Die Muttergänge waren zwar ziemlich lothrecht, aber nie ganz grade, sondern stets bogig gekrümmt. Der von Hrn. Hammerschmidt

(\*) Von dieser Art glaube ich noch eine (*E. Pyri*) unterscheiden zu müssen, um so mehr, als das Vorkommen von Wage- und Lothgängen in Äpfeln, Ebereschen und Pflaumen auf 2 verschiedene, hier wohnende Arten schließen läßt. Diese neue Art ist zwar dem *E. Pruni* äußerst ähnlich, hat aber einen längern, vorn allmählig sich verschmälern Halschild und ganz besonders schmalere Zwischenräume mit einer Reihe von Punkten, welche den Punktreihen an Stärke fast gleich kommen. Auch erscheinen sie mehr gefurcht vertieft, hier und da ist auch wohl eine Rinne und die Flügel daher weniger glänzend. Hierher nur aus Ebereschen und aus (getödteten, stanken) Apfelbäumen gezogene Exemplare.

an Pflaumenbäumen aufgefundenen Käfer ist wahrscheinlich auch mein *E. Pruni*. Ein eigner Zufall, das Hr. Hammerschmidt, der doch von meiner nicht früher publicirten Benennung nichts wußte, ihn ebenfalls *Pruni* nennt. Hier gäbe es also nur eine Auctoren-, aber nicht eine Namen-Collision. 2) *E. rugulosus* Koch (Fig. 10.) (*E. punctatus* Mus. Berol., *Scolytus haemorrhous* Ulr.) 1-1,3" lang. Halsschild äußerst stark und dicht punktiert. Zwischenräume äußerst schmal, mit einer der Punktreihe vollkommen gleichenden Reihe sehr grober Punkte. Die Flügel daher dicht punktiert-gestreift-rundlich und glanzlos, überall mit Börstchen. Hinterleib gewölbt-aufsteigend. Meist dunkel bräunlich-schwarz. In verschiedenen Gegenden [Ulm, Linz, Hanau (Hr. Walzl), Gotha, Dessau, Berlin, Oberschlesien (Hr. v. Pannewitz)] in Pflaumen- und Apfelbäumen, jedoch nur an den Ästen oder an sehr schwachen Stämmchen (s. auch Schmidb. *Obstb.* IV. S. 230.) in 1-2' langen, zuweilen von einem Quergange durchkreuzten Lothgängen hausend, welche sammt den dichten Larvengängen stark ins Holz greifen. Hr. Heyer fand ihn auch mit *B. dispar* zusammen in Apfelbäumen. Splintwiegen (T. XI. F. 4.). Äste und Stämme sterben ab. — 3) *E. Carpini* Er. (F. 8.). 1,6 bis 1,8" lang. Halsschild fast etwas breiter als lang, ziemlich stark punktiert. Flügel hinten kaum verschmälert. Die Zwischenräume mit eben so starken Punktreihen wie die Reihen und beide öfters in einander laufend, nicht überall ganz parallel. Hinterleib eingedrückt. An Weißbuchen hier und da in einzelnen, kränklichen Bäumen am Stamme in Wägebüngen. Die Larven fressen vor der Verpuppung ziemlich weit im Splinte auf und ab. — 4) *E. castaneus* Koch (*Bostrichus Scolytus* Pnz.) (F. 12.). 1,6" lang. Am meisten dem *intricatus* in der Gestalt ähnelnd. Halsschild äußerst fein und dicht punktiert, daher stark glänzend. Flügelreihen schwach. Zwischenräume sehr groß, mit einer Reihe feiner, weitläufiger Punkte. Hellrothbraun sind Flügel, der vordere und zum Theil auch der hintere Halsschildrand, die beiden ersten Hinterleibsringe und die Ränder der folgenden, Beine und ein Theil der Brust; Fühler gelbbraun. 5) *E. noxius* And. (F. 7.). 1,4" lang, dem *E. carpini* äußerst ähnlich, aber etwas gestreckter, besonders hinten schmaler. Halsschild vorn fast so breit wie hinten, nur am äußersten Rande verschmälert. Punkte der Zwischenräume und der Reihen sehr regelmäßig parallel.

#### Vierte Gattung.

#### *Platypus* Hb. Kernkäfer. (Taf. X. Fig. 13.)

CHARACTERISTIK. Die Käfer durch die langen, dünnen, ganzen Fußglieder hinreichend unterschieden. Kopf breiter als der ganz walzige, enge Halsschild und daher in denselben gar nicht zurückziehbar. Fühler (F. 13 c) kurz. Keule fest, zusammengedrückt, eirund. Geißel aus 4 sehr kurzen, aber breiten Gliedern bestehend. Schaft sehr lang, abgerundet-viereckig, beim Männchen etwas länger und schmaler, beim Weibchen mit etwas stärker vorspringendem Innenwinkel (Mundth. s. S. 157.). Augen gewölbt, vorstehend. Flügeldecken punktiert-gestreift, an der abschüssigen Stelle beim Männchen (F. 13 l) 4zählig, beim Weibchen (F. 13.) zahnlos. Die Larven (T. XIV. F. 28-31.) hinten (F. 31.) senkrecht abschüssig und eben. Kopf stark gewölbt. Der erste Ring oben außerordentlich stark gewölbt, mit braunen, feinen Hornleisten. Luftloch- und Unterwülste mit einem Hürchen und mit deutlichen, dunkler gefärbten Knöpfchen, welche wiederholten Luftlochreihen ähneln. Bis auf Kopf und Afterglied, welche behaart sind, nackt. Die Puppen (F. 32.) sehr walzig, mit vielen Haaren und Dornenhöckern an den Knien, dem Kopfe und Rücken. — Hierher die einzige Art

#### *P. cylindrus* Hbs. Eichen-Kernkäfer. (Taf. X. Fig. 13.)

CHARACTERISTIK. 2,4-2,5" lang, vollkommen walzig, dunkelbraun, beim Weibchen zuweilen auf jedem Flügel ein braunrother Fleck (*Cylindra bimaculata* Duftsch.)

VORKOMMEN u. s. f. Weder in Schweden noch in Rußland, also nicht so weit nach Norden verbreitet. In Eichen, sowohl Stöcken als stehenden Bäumen, welche noch berindet sind. Die Gänge gehen mehrere Zoll tief in das Holz und verbreiten sich hier mit ihren kleinen Puppenhöhlen nach allen Richtungen, ähnlich wie bei *B. lineatus*, *monographus*, oft schöne dendritische Zeichnungen machend. Sobald man die Gänge anhaut, kommen die Larven in denselben mit großer Hast hervor und bewegen sich wellenförmig vor- und rückwärts. Hr. Zebe sahe sie auch in denselben und glaubt, daß die Puppenhöhle erst kurz vor der Verwandlung gegraben wäre (s. S. 165.). Der Käfer verringert den Werth der Nuthölzer, besonders da, wo er mit *monographus* und *dryographus* zusammen vorkommt. Es scheint sogar, als tödte er Stämme. Hr. v. Meyerinck der Sohn erzählte mir nämlich von einem Truppe 60-70jähriger Eichen, welche er bei Lödderitz auf einer Hütung eingegangen getroffen und überall Käfer und Larven darin gefunden habe. Man kann ihn, da bloßes Abborken nichts hilft, nur durch Entfernung des ganzen befallenen Stammes vertilgen.

NACHTRAG. So eben beim Druck dieses Bogens erhalte ich noch von Herrn Heer seinen *Bostrichus Cembrae* und kann nicht unterlassen, hier noch Einiges über ihn anzuführen. Er unterscheidet sich allerdings von den meisten Exemplaren des *B. typographus* durch etwas gestrecktere Form, hinten ziemlich grob punktirten Halsschild, eine vollständige Punktreihe der Zwischenräume und runzlich-punktirte, glänzende (nicht matte, feinpunktirte) schräger abschüssige Stelle der Flügeldecken, allein bei genauerer Musterung meiner ganzen Vorräthe von *typographus* finden sich Exemplare genug (meist kleine), welche dieselbe Bildung und Übergänge zu denselben zeigen und die sicher alle aus Fichten herrühren. Das Vorkommen des Käfers in der Zirbel ist indessen auffallend und verdient alle Beachtung (s. auch Heer *obs. ent.* p. 28 sq. Tab. V.).

## Zweite Unterfamilie der unechten Holzfresser.

Unechte nennen wir sie (s. auch S. 156.), weil sie die dem Kerne der Familie gemeinsamen Kennzeichen — ungegliederte Föhlerkeule, Carculionenähnliche Mundtheile, heinlose Larven und regelmäßige Gänge — nicht theilen und, was für den Forstmann das Wichtigste ist, fast immer nur in abgestorbene Hölzer gehen, in lebende gar nicht oder nur als Schmarotzer in fremden Gängen, oder vielleicht nur unter gewissen Umständen einmal eipen lebenden Stamm abgeben. Es kann daher hier nur nebenbei von einigen geredet werden, die in irgend einer Hinsicht bekannt geworden sind. *Colydium elongatum* F. abr. [der 2-3" lange und nur 0,5" breite, ausgezeichnet tief gefurcht-flügelige, glänzend dunkelbraune und zuweilen rothschultrige Käfer (T. X. F. 15.) ist mit vergrößertem Föhler (15e), Ober- (15b) und Unterkiefer (15c), Lefze (15a) und Lippe (15d) abgebildet und die fast 4" lange und 0,5" dicke, 10 schwarze Äugelchen, Ägliedrige deutliche Föhler, ganze Unterkiefer mit Ägliedrigen Tastern, Anobien ähnliche Lippen, mit Ägliedrigen Tastern zeigende, 6einige, schmutzig weiße, merklich behaarte Larve, welche besonders durch 2 am letzten Ringe nach oben gebogene Hornhaken ausgezeichnet ist, sammt der Puppe von vorn und von hinten, T. XIV. F. 34, 35.] ist stets mit den berüchtigtsten Eichenholz-Zerstörern zu finden (s. S. 42 und S. 203. bei *B. monogr.*). Die Hauptgänge ziehen sich parallel den Markstrahlen und dann auch wieder plötzlich um die Jahrringe herum, dann perpendikulär u. s. f. *Apato capucina* F. abr. (*Dermestes capucinus* Linn.) [der 2,5-6" lange, schwarze aber mit ziegelrothem Hinterleibe und rothen unregelmäßig grob punktirten Flügeldecken gezeirte Käfer (F. 14.) ist mit vergrößerten Zergliederungen abgebildet und seine 6einige, fast ganz (selbst bis auf die Mundtheile) Anobien ähnliche, rein weiße Larve F. 33.] ist noch viel unbedeutender, denn sie kommt selten so häufig vor und ist auch immer nur in abgestorbenem Holze der eichenen Stöcke, Lagerhölzer, Zaunpfähle (nach Hrn. Walzl auch in Nadelhölzern) u. s. f., deren Zerstö-



rung [welche der von *A. tessellatum* abgebildeten (S. 51.) ganz ähnlich ist] ihr Bechstein (*Forstins.* S. 215.) besonders übel genommen hat. Die übrigen machen sich noch weniger bemerklieh und wir können sie dreist sämmtlich auf das Register der unmerklich schädlichen, wenn auch sehr schönen und den Hauptschmuck der Sammlungen ausmachenden Käfer bringen. Hr. Hartig (*Jahresber.* S. 184.) vermifst hier noch die Gattung *Cucujus* Fabr. (ausgezeichnet durch den papierähnlich dünnen Körper) und *Lycus* Fabr. (an dem schmalen tief eingedrückten Halsschild und der 2gliedrigen Fühlerkeule kenntlich). Die kleineren Arten der ersteren, welche ich (wie *C. testaceus*, *nonilis* und *brunneus*) stets nur unter todtten Rinden fand, sollen nach Hrn. Hartig in Zapfen leben, und *Lycus contractus* und *canaliculatus* findet man in von Rinde entblößtem, todtten Holze der Eichen, Pappeln, Weiden u. A. Sie nehmen, meines Erachtens, selbst unter den unmerklich schädlichen den letzten Platz ein, theils wegen ihrer geringen Größe, theils auch, weil sie meist nur selten sind.

### Dritte Familie.

#### Bockkäfer. (*Cerambycina*.)

Der NAME rührt von Linné's Gattung *Cerambyx* her. Andere nennen sie auch *Longicornia*.

CHARACTERISTIK. Der Verein mehrerer der (S. 113.) wesentlichen Merkmale: gestreckter Körper, ansehnliche Größe, lange Fühler, weisse oder gelbe, beinlose oder sehr kurzbeinige Larven, so wie das Leben in den Gewächsen und der Mangel an Muttergängen unterscheiden sie von allen übrigen Tetrameren gleich. Die Mundtheile der Käfer zeigen, *Spondylis* ausgenommen, viel Übereinstimmung. Lefze (T. XVI. F. 2a) abgerundet-viereckig. Oberkiefer (F. 2b) stark, hornig, aufsen gewölbt, innen geböhlt, spitzig, zahnlos oder mit (beim Männchen oft auffallend stärkern) Zähnen am Kaurande. Unterkiefer (F. 2c) mit kurzem, hornigen Stamm und 2lappiger Lade. Die Lappen am Ende behaart und gewimpert: der äussere grösser als der innere. Taster 4gliedrig, kurz oder mässig, selbst zuweilen lang. Lippe (F. 2d) meist herzförmig, ausgerandet, mehr oder weniger geknickt. Taster 3gliedrig, mässig. Das letzte Glied der Lippen- und Kieferntaster oft abgestutzt und am Ende eingedrückt. Bei *Spondylis* ist die Lefze sehr klein, die Unterkiefer zwar noch zweilappig, aber sehr dünn und kurz und mit sehr langen Tastern und ganz horniger, innen nicht gelappter Lippe. Die Männchen haben meist viel längere Fühler als die Weibchen, sind aber selten auffallend kleiner. — Die Larven (T. XVI. und XVII.) gestreckt, meist walzig, seltner etwas plattgedrückt. Kopf flach oder nur wenig gewölbt. Fühler 3-4gliedrig, meist klein. Kopfschild (T. XVI. F. 2k) quer, abgestutzt. Lefze rundlich mit starken Borstenhaaren. Oberkiefer dick und stark. Unterkiefer mit 3gliedrigen und Lippe mit 2gliedrigen Tastern. Kaulfläche mit starken Borstenhaaren. Körperringe stark abgeschnürt und daher oft perlschnurförmig (besonders bei ganz erwachsenen): der erste der grösste, der zweite und dritte viel kleiner, dann die folgenden wieder grösser, gegen das Ende aber allmählig abnehmend. Das erste Luftloch am zweiten Ringe das grösste und etwas niedriger als die des 4ten bis 11ten Ringes. Auf der Mitte der Ober- und Unterseite vom 4ten Ringe, oder schon vom 2ten und 3ten an bis zum 10ten Ringe gerunzelte, warzige Erhabenheiten (Haftscheiben), welche besonders auf der Unterseite sehr regelmässig gekerbt sind oder 2-3 parallele, durch tiefe Furchen geschiedene Wülste zeigen und die Füsse, welche entweder ganz fehlen oder nur sehr klein, 4gliedrig sind, zu ersetzen scheinen. — Die Puppen mit vom Kopfe bogig abgehenden und hinter die Füsse sich lagernden, oft dann noch von der Brust wieder in die Höhe steigenden Fühlern, kurzen, selten bis über die Hälfte des Kör-

pers reichenden, sich verdeckenden Flügeln, springligem Hinterleibe, Afterdornen und Dornenhöckern am Rücken, Kopfe u. s. w.

VORKOMMEN u. s. f. Entwicklung wahrscheinlich nur in Holzgewächsen, wenn auch die Käfer manchmal ausschliesslich an Kräutern sich halten, so z. B. habe ich selbst aus Buchen *C. Verbasci* gezogen. Auch scheinen sie ausschliesslich auf die Stamm- und Asttheile und nicht auf Früchte, Blätter und dergl. angewiesen zu sein. Man bemerkt sogar meist eine große Bestimmtheit in der Auswahl der Holzarten und kein einziger lebt in Laub- und Nadelholz zugleich (gegen Bechstein). Die Mütter legen ihre Eier an die Rinde (s. *C. linearis*) oder schieben sie auch wohl mittelst einer langen Legeröhre durch Ritzen und Spalten bis zum Splint. Sie sind zu groß, als daß sie selbst hinein könnten. Muttergänge finden wir also nicht, sondern bloß Larvengänge, welche an ihrer verschiedenen Breite schon kenntlich, entweder unter der Rinde bleiben oder auch in das Holz gehen. Die Wiege ist oft bei einer und derselben Art (z. B. *C. Aedilis*) bald in der Rinde, bald im Splinte. Es scheint als wenn die Jahreszeit darauf Einfluß hätte, denn die im Herbst sich verpuppenden gehen in den Splint, die dagegen im warmen Sommer erst zur Verpuppung gelangenden bleiben gleich unter der Rinde, z. B. *C. sanguineus*. Die Fluglöcher sind selten rund, meist quer oval und haben sowohl auf dem Splinte wie auf der Rinde meist nur an einer Seite einen scharfen Rand. Die Generation ist meist 1jährig, zuweilen auch wirklich 2jährig, mit denselben Abänderungen, wie bei den Rüsselkäfern (S. 116.) angegeben. Die Flugzeit im Juni und Juli. Einige schlüpfen auch schon früher aus und fliegen schon vor dem Winter. Die Bockkäfer haben meist ein keckes widersetzliches, beißiges Wesen, richten sich auch wohl vorn auf, tragen die Fühler wie Bockshörner und bringen durch Bewegung der Brust und des Hinterleibs ein pfeifendes Geräusch (Geigen) hervor. Die Menge, in welcher viele Arten am Holze erscheinen, ist oft sehr groß, daher sind sie wenigstens als täuschende interessant. Eigentlich schädliche giebt es nur wenige unter ihnen, indem die meisten mit faulenden Stöcken, gefällten oder sehr anbrüchigen Dämmen, Klaftern oder dergleichen sich begnügen. Nur wenige derselben gehen auch zugleich lebendes Holz an. Die dagegen regelmäßig in lebendem Holze sich findenden müssen auch stets wieder lebendes für ihre Brut haben. Über die Begegnung im Allgemeinen läßt sich auch nur sagen, daß Entfernung alles absterbenden oder abgestorbenen Holzes, besonders wieder der Stöcke, der Sammelplatz von allem Ungeziefer, das beste Mittel gegen viele, wenn auch nicht gegen alle, ist.

EINTHEILUNG. Wollen wir sie wie die Rüsselkäfer im Linné'schen Sinne eintheilen, so erhalten wir nur 3 oder (wenn wir die nicht zu billige Unterbringung der kurzflügeligen bei *Necydalis* berücksichtigen) 4 Gattungen: *Cerambyx* Linn., *Leptura* Linn. und *Spondylis* Fabr. Die letztere, durch die kürzesten (den Halschild nicht überragenden) etwas gesägten Fühler (s. T. XVII. F. 12.) so wie durch kurzfüßige (F. 12.) Larven (welche sie sammt den sehr stark gedornen Puppen F. 12 c. *Callidium* noch mehr nähern) ausgezeichnet, ist bis jetzt nur in einer Art (*buprestoides*), welche ganz schwarz und 6-10" lang ist, bekannt. Diese ist zwar äußerst gemein und fliegt im Juli und August überall im Walde oder auf Holzhöfen, wo faulende Stöcke und Klaftern von Kiefern sich finden, in denen sie (selbst bis zu den tiefsten Wurzelendigungen hin) hausen, umher, ist jedoch noch nie schädlich geworden. Die andre Gattung, *Leptura*, ausgezeichnet durch halsschneidliche Verdünnung des wenig aufgetriebenen Kopfes, faden- oder borstenförmige, mäße Fühler, fast kegelförmigen Halschild und hinten anscheinlich verschmälerte Flügel, ist zwar sehr reich an Arten [bei Linné noch reicher deshalb, weil sie mehrere Arten der Gattung *Cerambyx* (namentlich *Clytus*) aufnehmen mußte], unter diesen kommen aber nur einige (*L. rubro-testacea* das Männchen (F. 9.) 6" lang und das Weibchen (F. 10.) 8" lang und *L. 4-fasciata* bis 9" lang (F. 11.) in solcher Menge und am Holze vor, daß der Forstmann aufmerksam auf sie wird. Ein größeres Interesse, wegen entschiedener Schädlichkeit, erregt nur allein die



Hrn. Pfeil's Jagdhaue befallen sahe) jedoch schon im 3ten bis 5ten Jahre. Auch scheint er ältere Stämme nur bis zum 20sten Jahre zu befallen, wahrscheinlich weil ihm später die Rinde zu fest und dick wird. An einer Menge, 2-3' über der Wurzel abgesägter Schwarzpappelstämme sahe ich dies sehr schön. An einem, T.XVIII F.6. dargestellten verkleuerten Abschnitte sieht man recht deutlich, in welchem Alter die Stämme am meisten zu leiden haben. Die Larvengänge sind hier quer durchschnitten und erscheinen daher rundlich. Fig. 5 dagegen zeigt ein 5jähriges Stämmchen nach der ganzen Länge des Fraßes durchschnitten, in natürlicher Gröfse. An der rechten Seite war die Larve eingedrungen, hatte zuerst den kleinem Gang in den äußern Jahrringen gefressen und war dann in den Kern gegangen, um sich, nachdem alles mit abgenagten Spänchen gut verwahrt worden war, zu verpuppen. Die Puppe liegt gestürzt und trägt am Afterende noch die abgestreifte Larvenhaut. Links unten war das Loch dicht über der Erde, zu welchem die Spänchen während des Fraßes herausgeschafft wurden. Die Generation ist bestimmt 2jährig, denn ich fand stets im Herbst erwachsene und junge Larven zusammen. Daraus ergibt sich die forstliche Bedeutung und Erkennung. Der Käfer gehört, wo er in Menge vorkommt und man Werth auf die Pappeln legt (an Wegen, in Gärten, Plantagen), zu den sehr schädlichen, indem viele Stämme (oft von mehreren Larven zugleich) so durchwühlt werden, daß sie vom Winde umgebrochen werden. Sind sie dagegen geschützt, oder bleiben noch Holzlagen genug, die den Baum tragen, verschont, so sterben sie nicht ab, wie man wohl aus einer starken Beschädigung, die noch dazu den Stamm im vollen Wachsthum betrifft und eine Menge Saft entzieht, glauben sollte (*Bostr. dispar* tödtet doch durch viel geringere Verletzung!). An den hier gefällten Pappeln sahe man deutlich, daß, wenn sie in die Zwanziger kommen, die Gefahr vorüber ist. Erkennen wird man den Fraß der Larven an den, oft noch ganz feuchten Häufchen bräunlich-gelber Spänchen, welche sich am aufgetriebenen Fulse des Stammes, wo man denn auch bei genauerer Untersuchung ein Loch finden wird, sammeln, oft schon Anfangs April, da wo die Larven überwinterten. Oft kränkeln auch in der ersten Zeit die Bäume merklich, indem die jungen Triebe absterben oder die Blätter sich rollen, aber bald erholen sie sich wieder und nie sahe ich einen auf dem Stamme trocknen. Begegnen kann man ihnen am besten durch Sammeln. Wenn man im Juni und Juli durchgeht und jeden Stamm einige Male tüchtig anstößt, fallen alle Käfer herunter und können, da sie groß sind, leicht gesammelt werden. In Gärten und Plantagen wird man selbst die Mühe nicht scheuen, die Bäume mit einem dünnen Lehmteige bis an die Äste (in welche sie nicht gehen) hinauf zu bestreichen. Das ist nicht kostspielig, leicht ausführbar und schützt, wie ich aus Erfahrung weiß, gewiss.

2. *C. (Saperda) populneus* Linn. Gelbstreifter Aspe-Bockkäfer. (Taf. XVI. Fig. 5.)

CHARACTERISTIK. Der Käfer 5-6" lang und  $1\frac{1}{2}$ " breit, mit borstenförmigen Fühlern, welche so lang sind als der Körper (beim Männchen und Weibchen), bräunlich-schwarz und bräunlich-gelben (bei einer Var. mehr weißlichen) feinen Härchen, welche jederseits am Halsschild einen Längsstreifen und auf jedem Flügel 4 in Längsreihe stehende Flecken bilden. Die fuslosen Larven (F. 5 u. c) bis 11" lang und 1,8" breit, der von *Carcharias* sehr ähnlich, nur noch walziger und auch gelb. Die Puppe bis 7" lang, schmal.

VORKOMMEN u. s. f. Ziemlich von derselben Verbreitung wie der vorige und ebenfalls in Pappeln, ja wie es scheint auch nur in einer Art, der Aspe (*Populus Tremula*) und gewiss nicht in Birken (Beechstein). Ich habe die Brut immer nur in jungen Stämmen von 2-6 Jahren gefunden, sowohl in Samenpflanzen als in Wurzelbrut, häufiger am Stamme als an den Ästen. Später habe ich die Beschädigungen der Käfer auch an ziemlich starken Bäumen, wo sie die meisten der fingersdicken Zweige besetzt hatten, gefunden. Das schadet aber natürlich viel weniger als das Vorkommen an den Stämmchen der Wurzelbrut. Wenn die Käfer im Mai und Juni fliegen, sieht man sie an solchen häufig in Begattung. So dünn die Rinde auch

ist, so zeigt sie doch schon kleine Risse und in diese legt das Weibchen wahrscheinlich, oder es nagt auch eine (später wulstige) Stelle aus, um hier zu legen. Die Larve frisst sich dann gleich bis ins Holz und macht hier ähnliche, nur etwas mehr spiralförmig gewundene und dunkler gefärbte Gänge wie *C. Carcharias*, wodurch eine merkliche Aufreibung entsteht. Nach 2 Jahren schlüpfte der Käfer durch ein zirkelrundes, wie mit No. 3 oder 4 geschossenes Loch. Auf T. XVIII. zeigt F. 3. den Abschnitt eines 4jährigen Stämmchens, in welchem die beiden Fluglöcher und Aufreibungen die eben verlassenen Wohnungen zweier Käfer (mehr als einen sahe ich in solcher Beule nicht) andeuten. F. 4. giebt einen ganz ähnlichen, auch von 2 Larven bewohnten, Abschnitt, welcher oben noch die Puppe zeigt, unten aber die verlassene Wohnung nebst dem das Flugloch enthaltenden Deckel. Die schwarzen Rindenflecke zeigen die Stelle, an welcher die Fraßspänchen herausgeschafft wurden. An einem Stämmchen zählte ich einmal auf  $1\frac{1}{2}$  Höhe 8 Knollen übereinander! Der Käfer ist daher merklich schädlich, indem, wie Hr. Pfeil (*crit. Bl.* Bd. XI. H. 1.) sagt, eine Menge Aspenstämme zur Erziehung gutwüchsigen Holzes ganz unbrauchbar gemacht werden. Begegnen kann man ihnen nur zur Flugzeit durch Sammeln der Käfer, welche man mit den Händen von den Stämmen nehmen oder in einen Schirm klopfen kann, oder durch Ausschneiden der befallenen, an den Knollen kenntlichen Stellen.

### 3. *C. (Saperda) linearis* Linn. Haseln-Bockkäfer. (Taf. XVI. Fig. 6.)

CHARACTERISTIK. Der Käfer bis 6" lang und kaum 1" breit, schwarz mit gelben Beinen. Die fufalose, hell dottergelbe, schwach behaarte Larve (F. 6c) bis 12" lang und nicht über 1" breit! Der vier-eckige Schild des ersten, sehr großen, Ringes am Hinterrande mit sehr starken Wörzchen.

VORKOMMEN u. s. f. In Haseln und gewiss nie in faulen Fichten und Kiefern (Bechstein S. 244. wahrscheinlich nach dem *bes. Forstm.* I. 68.). Der Käfer fliegt im Mai und Juni und ist sehr flüchtig. Im J. 1836 wurde ich Ende Juli in einem kleinen Niederwalde auf die Haseln aufmerksam, deren junge Triebe ein kränkliches Aussehen hatten. Sowohl an Hauptästen wie an Nebenästen fand sich etwa  $\frac{1}{2}$ " unter der Spitze (2-3" über der Astachsel) eine kleine, schwärzliche benagte Stelle von 2-3" Länge. Von dieser führten 1-2 feine Löcher in die Markröhre, in welcher die junge (höchstens 4 Wochen alte) Larve schon 6-8" hinaufgestiegen war. Im Herbst welken dann die Blätter früh und man erkennt selbst im Winter an den verkümmerten Knospen den im Innern verborgenen Feind. T. XVIII. F. 1. zeigt einen solchen Trieb. Der ausgehöhlte Theil desselben ist in Fig. 2. durchschnitten, mit der Larve dargestellt, welche nach unten gekehrt ist und im nächsten Jahre in den gesunden Theil geht, auf die Weise (da die Generation 2jährig) oft bis in die 2-3jährigen Äste vordringend und den Haseln dadurch öfters merklichen Schaden zufügend. Die Vertilgung ist nur durch Abschneiden der befallenen Triebe möglich. Der Käfer ist zu flüchtig, als daß er sich sammeln ließe.

VERWANDT sind eine Menge an Hölzern lebender Arten, von denen mehrere sogar in lebenden Bäumen schon gefunden wurden. Die seltneren und nur an stark anbrüchigen Stämmen (namentlich Pappeln) vorgekommen übergehe ich, um nur einer Art zu erwähnen, welche Hr. Schlottbauer in großer Menge auf dem Spitzhorn fand und von welcher er vermuthet, daß sie sich hier in den jungen Trieben ähnlich, wie *C. linearis* in Haselschüssen, entwickeln. Die Käfer wurden nur auf dem *Acer platanoides* gefangen und nicht nur die andern Gebüsche, sondern sogar die in der Nähe befindlichen Sträucher von *A. Pseudo-Platanus* waren von ihnen nicht besucht. Es ist dies *C. (Saperda) scalaris* F., bis 7" lang und auf einen Blick kenntlich an der schönen grünen Farbe, welche durch viele schwarze Flecke, besonders treppenförmige, gezackte Zeichnungen der Flügeldecken geziert ist.

4. *C. (Callidium) luridus* Fabr. Zerstörender Fichten-Bockkäfer. (Taf. XVII. Fig. 2)

CHARACTERISTIK. 5-7" lang, mit rundlichem, gedrückten, sparsam punktirten, glänzenden, schwach gefurchtem Halsschild und sparsamen, wenig erhabenen, zuweilen kaum bemerkbaren Flügelrippen. Fühler des Männchens fast so lang als der Körper, des Weibchens kürzer. Schwarz ist Kopf, Halsschild, Schildchen, Brust und größtentheils Hinterleib, meist auch die zuweilen braunen Flügel. Der äußerst nahe verwandte *C. fuscus* Fabr. ist nur etwas schlanker, hat einen eng punktirten und tief gefurchten, vorn rothrandigen Halsschild und braune Flügel. — Larve 1" lang und fast 2" breit, fast walzig. Kopf nicht sehr breit, ziemlich gewölbt, mit geringen Unebenheiten. Fühler klein, 3gliedrig, neben dem Kopfrande, den Oberkiefern genähert. Letzte rundlich, sehr stark behaart. Oberkiefer am Innenrande mit 2 Zähnen. Unterkiefer und Lippe behaart. Der erste Leibesring fast halbmondförmig, uneben, mit schwach angedeuteter Mittelfurche und 2 seitlichen. Haftscheiben vom 4ten an gerunzelt. Beine sehr klein. Behaarung kaum mit bloßen Augen sichtbar. Kopf braun, sonst weiß, nur Oberseite des ersten Ringes bräunelnd. — Puppe 6-8" lang. Zwischen Halsschild und Fühlern ein ansehnlicher Zwischenraum. Schienen absteigend oder horizontal. Unterflügel verborgen. Nackt, nur an den Fühlergliedern einige längere Dornenhöcker, und an den Kniegelenken, am Rücken des Halsschildes und des Hinterleibes nur ganz kleine, scharfe Dornenhöckerchen und an den letzten Hinterleibsgliedern einzelne Härchen.

VORKOMMEN u. s. f. *C. luridus* und *fuscus* sind beide in Fichten einheimisch, und kommen vielleicht auch in Kiefern einzeln vor. Die zahlreichen Larven, welche ich in eingehenden Fichten des Boitzenburger Schlossgartens fand, gehörten höchstwahrscheinlich dieser Art an. *C. luridus* sehr häufig und *C. fuscus* etwas seltener. Ihr Fraß war wahrscheinlich Bechstein und Thiersch bekannt, wurde aber verkannt (s. S. 239.). Hr. Saxen begleitete die über sie im Harze angestellten, nun folgenden, Beobachtungen mit schönen Zeichnungen (s. T. XIX.). Anfänglich machen die Larven unregelmäßige, sehr breite, mit Bast- und Splintnägeln wurstförmig gefüllte Gänge unter der Rinde (F. 1.) und verpuppen sich entweder (im Sommer) auch in derselben, oder graben sich (wenn sie überwintern müssen) in das Holz (F. 3.), den Eingang hinter sich mit Spinnchen verstopfend. Die Verpuppung geschieht viel häufiger im Holze. Einen besonders langen, in 2 Absätzen heruntersteigenden Gang zeigt F. 2. Hier ist noch ein Theil des Holzes mit Rinde bekleidet und diese zeigt 3 ganze und ein durchschnittenen, unmittelbar aus dem Holze hervorkommendes Flugloch. Flugzeit Juni und Juli. Zu diesen Beobachtungen fügt Hr. Saxen noch folgende neuere, die beiden Arten auch in der Lebensweise scheidenden: Im Herbst und Frühling sperrte er etliche, in Splintwiegen liegende Larven (s. Taf. XIX. F. 3.) ein und erzog daraus *C. luridus*. Dagegen lieferten die in denselben Frühlinge an stehenden Bäumen und an Stöcken in Rindenwiegen gefundenen Puppen den *C. fuscus*. Die Abbildungen Fig. 1-3 auf Taf. XIX. gehören also sämmtlich zu *C. luridus*. Beide Insecten gehören zu den merklich schädlichen, da sie auch stehende, gesunde Bäume angreifen und dieselben tödten. Gewöhnlich sind diese auch noch von andern Insekten besetzt, und sie bald zu entfernen wird doppelt nöthig.

VERWANDT sind viele, auch im Holze, jedoch nur abgestorbenem, lebende Arten und unter ihnen besonders häufig: 1) *C. (Callidium) sanguineus* Linn. (T. XVII. F. 3.) 2½-5" lang, sehr gedrungen, oben blutroth, in Weiße- und Rothbuchen unter der Rinde fressend und hier oder im Splint verpuppt. — 2) *C. (Callidium) fennicus* Linn. (T. XVII. F. 4.). 2½-6" lang, schlank, stahlblau, mit mehr oder weniger Braunroth, in Eichen und Buchen, den Bast oft ganz in Wurmehl verwandelnd. — 3) *C. (Callidium) bojulus* Linn. (T. XVII. F. 4.). 3,5-8" lang, ziemlich gestreckt. Braunschwarz, mit weiß zottigem, ein Paar glänzende, kahle Höckerchen zeigenden Halsschilde und weißfleckigen Flügeln (oft abgerieben), mehr in Häusern (Kiefern-Dalken und Meubles) als im Freien.

5. *C. Heros* Fabr. Großer Eichen-Bockkäfer. (Taf. XVI. Fig. 3.)

**CHARACTERISTIK.** Der Käfer bis  $1\frac{1}{2}$ " lang (und dadurch vorzüglich von dem ganz ähnlichen, 9-12" langen, in Eichen und Buchen lebenden *C. Cerdus* Linn. unterschieden). Schwarzbraun. Die Larve (F. 3 c von oben und 3 d von unten) bis fast 3" lang. Kopf klein, flach, wenig vorragend. Fühler 3gliedrig, mit Griffelfortsatz. Erster Ring abgerundet-viereckig, flach. Haftscheiben oben sehr ansehnlich. Beine außerordentlich klein. Gelblich-weiß und nur dunkler, rötlich der vordere und seitliche Rand des ersten Ringes, die Luftlöcher, Beine, Mund- und Kehlgegend. Behaarung schwach, am sparsamsten auf dem Kopfe und der Unterseite. Puppe (F. 3 c)  $1\frac{1}{2}$ " lang, ganz weiß.

**VORKOMMEN u. s. f.** Der Käfer ist überall in Deutschland, wo es Eichenwälder giebt, scheint aber nicht weit nördlich zu gehen und in Rußland ganz zu fehlen (Schweden selten Gyll.). Der Käfer geht nur an lebende Eichen und benutzt anbrüchige Stellen, um an das Holz zu legen. Die Larven durchwühlen es dann mit von außen hörbarem Knarren nach allen Richtungen und die geschlängelten, bald quer durch alle Jahrringe, bald von oben nach unten laufenden Gänge werden zuletzt bis  $1\frac{1}{2}$ " breit. Die Verpuppung erfolgt im Herbst oder auch im Frühjahr in einer am Eingange mit feinen Holzspänchen, und hier mit einer papierähnlichen Masse verstopften Höhle, welche zwar nicht ausgepolstert aber äußerst glatt benagt und bewundernswürdig gehöhlt ist. Aus dieser gelangt der Käfer selbst aus der Tiefe des Holzes in den breiten Larvengang und so ins Freie, meist im Juni oder Juli. Bei Tage lauern sie hinter dem Flugloche und ziehen sich, wenn man sie fassen will, sogleich zurück, am Abend aber kommen sie hervor und gehen an den Stämmen feuchten Stellen nach. Mit einer Laterne kann man sie leicht fangen. Der Käfer gehört zu den merklich schädlichen. Die Bäume gehen sogar, wenn viele Larven zugleich darin leben, ein und wenigstens verlieren sie als Nutz- und Brennholz an Werth, obgleich der Tischler die großen Löcher in den Brettern eher verstopfen oder ausschneiden kann, als die kleinen, durch Bostrichen oder Anobien gefressenen. Um die Käfer zu vertilgen, müßte man hauptsächlich die bewohnten Eichen im Winter entfernen. Das Sammeln der Käfer ist zu schwierig. Es scheint, als wenn man diesen unangenehmen Gast nicht immer von außen bemerken könnte. Hr. Heyer schreibt mir nämlich, daß einst in seiner Nähe ein Müller einen Eichenstamm zu einer Radwelle gekauft habe, welcher ganz gesund ausgesehen habe. Nachdem aber derselbe bewaldrechtet worden sei, hätte man zwei völlig ausgebildete Käfer daraus hervorgezogen. Die Larven hatten indessen nur ein Paar Zolle tief und in geringem Umfange gefressen, so daß der Brauchbarkeit des Stammes kein Abbruch geschehen war. Im Winter 1838-39 wurden in der Nähe von Neustadt auf der Mönchsheide eine Menge alter, überständiger Eichen gefällt, welche in einem hohen Grade von den Larven des Käfers durchfressen worden waren. Man sah wenige Kloben, welche nicht die ungeheuren, meist schwarzen, in allen Richtungen umherlaufenden Gänge gezeigt hätten. Auch diese Beobachtung, so wie eine ähnliche von Herrn v. Meyerinck dem Sohne mir mitgetheilte, ergab, daß der Käfer die Verpuppung häufig noch vor Winter übersteht. Es fanden sich Käfer mit noch weichem Hinterleibe und auch ganz erhärtete. Dennoch ist nicht wahrscheinlich, daß diese vor dem Juni ausgeflogen wären, da die Sommerwärme gewiß nur allmählig bis zu ihrer meist tiefgehenden Puppenhöhle dringt und sie zum Auskriechen einladet. In unsern Neustädter Eichen fanden sich Gänge noch im Kern, bis 1' tief im Holze, vor, und die Löcher derselben in den Kloben hatten, da wo sie in schiefer Richtung getroffen waren, oft 3" Länge und über  $\frac{1}{2}$ " Breite!

Unter den VERWANDTEN wäre nur noch *C. moschatus* Linn. (7"-13" lang, metallisch-grün T. XVI. F. 1.) zu nennen, weil er sich in lebenden, aber stark anbrüchigen Weiden, auch nach Bechstein in Obstbäumen findet. Die Nähe des Insekts verräth ein ziemlich durchdringender, nicht unangenehmer Moschusgeruch.

6. *C. (Rhagium) Indagator* Fabr. Kurzhörniger Nadelholz-Bockkäfer. (Taf. XVII Fig. 5.)

CHARACTERISTIK. 6-8" lang. Fühler borstenförmig, nur wenig über den gedornen Halschild hinausragend. Schultern sehr stark vorspringend. Flügel hinten etwas verschmälert. Oben grau-weiß, auf den stark gerippten Flügeln mit 2-3 undeutlichen schwarzen Binden. — Larve 14" lang und fast 2" breit, ziemlich flach. Kopf sehr breit und flach (F. 5a'), mit geringen Unebenheiten auf der Oberfläche. Fühler sehr klein, vom Oberkieferende ziemlich entfernt, auf dem Kopfrande selbst. Oberkiefer am Innenrande mit 3 starken Zähnen. Unterkiefer lang behaart. Lippe stark behaart. Der erste Leibesring quer viereckig, groß. Haftscheiben stark gerunzelt, vom 4ten Ringe an. Beine klein. Unterhalb der Lufldächer kleine Wülste vom 4ten Ringe an. Behaarung sehr stark. — Puppe bis 9" lang. Halsschild breit und daher auch nur ein sehr kleiner Zwischenraum zwischen ihm und den Fühlern. Fühler bis zum 2ten Fußpaare reichend. Drittes Fußpaar stark ansteigend. Alle Theile, nur mit Ausnahme der Flügel, mit kurzen, lange Borsten tragenden Dornhöckern. Die meisten in kleinen, symmetrisch geordneten Gruppen stehend. Unterflügel verborgen.

VERWANDT ist der 8-10" lange, zwei röthlich-braune Flügelbinden zeigende (zwischen welchen eine schmale, schwarze, die in einen großen schwarzen Fleck nach aufsen ausläuft) *C. Inquisitor* Linn. und der 8-11" lange, rostrothe Binden (zwischen welchen eine sehr breite schwarze Binde) zeigende *C. mordax* Fabr.

VORKOMMEN. *C. Inquisitor* und *C. mordax* sollen nach Bechstein und Thiersch an Nadelhölzern vorkommen und das Holz durchwühlen. Ich habe sie aber beide immer nur an Laubhölzern gesehen und zwar den *Inquisitor* unter der Rinde abständiger Buchen und den *mordax* in noch lebenden, anbrüchigen Eichen. Ich vermute daher, daß jenen Angaben nicht bloß Verwechslungen dieser Arten, sondern auch noch andrer zum Grunde liegen. Die neuesten Beobachtungen, welche ich wieder zu machen Gelegenheit hatte, so wie die Nachrichten von Hrn. Heyer, bestätigen dies immer aufs Neue. Herr Thiersch hat eine doppelte Verwechslung begangen: einmal daß er das, durch seine halb rothen, halb schwarzen, durch ein Paar schiefe gelbrothe Querbinden gezielte Flügeldecken ausgezeichnete, 6-9" lange *Rhagium bifasciatum*, welches wahrscheinlich in Kiefernstöcken lebt (an welchen es Hr. Heyer in copula fand, während es nach Hrn. Kellner auch über den ganzen Thüringer Wald verbreitet ist), für *R. mordax* abbildet (wie auch Hr. Hartig a. a. O. S. 199 meint), und dann, daß er den Fraß von *Callidium* für den des *Rhagium* beschreibt. Was tief im Holze gesehen wurde, wird *C. luridus* gewesen sein, und was sich unter der Rinde fand, *C. indagator*. Der letztere ist in Kiefern sowohl wie in Fichten gemein, am häufigsten in Stöcken, selbst der jüngsten Stangen, und in vertrockneten Bäumen und Klästern. Die Gänge unter der Rinde (T. XIX. F. 4. nach Hrn. Saxsen's Zeichnung) sind sehr breit und mit einem dunkelbraunen Wurmehl gefüllt. Zuletzt umgibt sich die Larve mit einem zierlichen Kranze von Spänchen und verpuppt sich in der Mitte derselben mit dem Rücken gegen die Rinde gekehrt (F. 5.). Sobald der Käfer ausgekommen ist (zuweilen schon im Herbst, meist aber erst im Mai und Juni), dreht er sich um und gräbt sich das Flugloch, aus welchem er zuerst mit dem Kopfe wie aus einem Fenster hervorsieht. Unter so bewandten Umständen dürfte also auch die von jener angegebene hohe forstliche Bedeutung für diese *Cerambyces*, die nur unmerklich schädlich genannt werden können, nicht gelten. Durch das zeitige Stockroden und Entfernen alles todtten Holzes aus dem Forste wird man ihrer ganz los werden, da sie ganz gesundes Holz gewiss nicht angehen.

ANHANG. Die in der analytischen Tabelle No. 3, 4, 6, 8. angegebenen Gattungen der Bockkäfer sind sämtlich unmerklich schädlich. Da sie jedoch von Bechstein beschrieben sind und wegen ihrer Häufigkeit im und am gefällten Holze dem Forstmanne auffallen, ausnahmsweise vielleicht auch einmal



Nutzhölzern schädlich werden, so sollen sie hier kurz characterisirt werden: 1) *C. (Clytus) arcuatus* (*Lep-tura arcuata* Linn.) 6-8" lang und bis 2,6" breit, schwarz mit 4 gelben Bogenbinden und 2 Flecken auf jedem Flügel, im Buchen- und Eichenholze. Es scheint, als wenn auch andere Arten von *Clytus* schädlich werden könnten. So soll z. B. der meist bis 8" lange, dunkelbraune, grau bestäubte, mit aschgrauen Halbmonden und Fleckchen gezierte *C. Hoffmanni* F. nach Hrn. Saxen an gefällten, aber völlig gesunden Buchen unter der Rinde und in tiefen Holzgängen nicht selten vorkommen. Hr. Schlotthauber fand den Käfer zu Dutzenden an Aspenstämmen von 1' Dicke, die frisch gehauen aber nicht entrindet vom Frühjahr bis zur Flugzeit des Käfers gelegen hatten. Bechstein (*Forstinsect*. S. 247.) führt auch noch den dem *arcuatus* ähnelnden, aber nur höchstens 5" langen, *C. Arietis* Linn. als im Holze lebend auf. Jedenfalls leben alle Arten im Holze, wahrscheinlich die meisten aber nur in todtm. 2) *C. (Lamia) Aedilis* Linn. (T. XVI. F. 2.) 4,5-7" lang und 2,7" breit, äußerst langhörnig, grau mit etwas dunklern Flügelbinden und 4 schmutzig-gelben, quergereiheten Halsschildfleckchen, fuflosen, kleinköpfigen, 10-11" langen Larven (F. 2b), in Kiefern äußerst gemein, auch in Fichten (Hr. Saxen) in sehr breiten, mit bunten aus Bast- und Splintspänen gemischten Abzagseln verstopften Gängen, meist schon im Herbst fliegend, geht auch zuweilen tief ins Holz und schadet dann den zu lange liegenden Bauhölzern. — 3) *C. (Lamia) Textor* Linn. 12,5" lang und 5" breit, schwarzbraun, in Aspen. — 4) *C. (Prionus) Faber* Linn. 19-23" lang und bis 8,6" breit, schwarz oder braun, mit (beim Weibchen) ganz oder (beim Männchen) nur stellenweise gerunzeltem 2dornigen Halsschild und 6heinen, über 3" langen (*Heros*-ähnlichen) Larven, in Kiefern, neben denen man später die Puppen in Erdhöhlen findet. — 5) *C. (Prionus) coriarius* Linn. 13-15" lang und bis 6" breit, mit 6dornigem, nicht gerunzeltem Halsschild, gewöhnlich nur in Laubhölzern (Eichen, Birken, Buchen), doch auch in Fichten und Kiefern. — 6) *C. (Molorchus) dimidiatus* Fabr. (*Necydalis minor* Linn.) 3-4" lang, mit 2 gelben Streifen auf den braunen Flügeln, in Fichten, sogar lebenden, und zwar in trocknen Zweigen zu Hunderten (Hr. Saxen). — 7) *C. (Molorchus) abbreviatus* Fabr. (*Necydalis major* Linn. bis 13" lang, im Buchenholze. — Es dürfte hier noch der, ebenfalls zu einer besondern, kleinen Gattung (*Pogonocherus*) gehörige *C. fascicularis* Schb. (*fasciculatus* Fbr.), welcher höchstens etwas über 3" lang ist und sich durch gerundete stumpfe Flügeldecken und eine weisse (vorn) und schwarze (hinten) dicht hinter einander liegende schiefe Querbinde an der vordern Hälfte derselben auszeichnet, zu nennen sein. Ich habe ihn sehr oft aus Kiefern-Reisig, in welchem die Larve im Winter ausgewachsen zu finden war, mit *Bostrichus bidens* und *Curculio violaceus* zusammen erzogen, und Hr. Saxen fand ihn in frischen Fichtenreisern mit lebendem *B. chalcographus* zusammen.

#### Vierte Familie.

#### Blattkäfer. (*Chrysomelina*.)

Der NAME nach Linné's Gattung *Chrysomela*.

CHARACTERISTIK. Die pag. 113. angegebenen wesentlichen Merkmale: kurzer, gedrungener, stark gewölbter Bau, geringe Gröfse, kurze Fühler, langbeinige dunkle oder bunte Larven, lassen, wenn wir noch dazu die Lebensweise nehmen, keine Verwechselung mit irgend einer Tetramerenfamilie zu. Genauer characterisirt man: die Käfer. Kopf klein, mit ganzen oder stark gebuchteten, meist stark vortretenden Augen. Lefze (T. XX. F. 3a) quer oder rundlich, gebuchtet oder ausgerandet. Oberkiefer (3b) stark, sehr breit, spitz mit Zähnen. Unterkiefer (3c) mit einem, deutliche Nähe zeigenden Stamme und 2lappiger Lade; der innere Lappen hautartig, gewimpert, der äufsere 2gliedrig, am Ende stark behaart. Taster

4gliedrig, mäfsig: das letzte Glied das längste, pfriemförmig. Lippe (3d) aus einem hornigen, ausgerandeten, außen stark gekielten, innen mit einem in der Mitte vorspringenden Hautlappen verwachsenen Stücke bestehend. Taster 3gliedrig, mäfsig: das letzte Glied das längste, pfriemförmig. Halschild quer, schmaler als Flügeldecken. Flügeldecken selten mit stark vorspringenden Schultern und häufiger hinten breiter als mit parallelen Seiten, unregelmäfsig oder reihig-punktirt. Beine kurz und dick, zuweisen Springbeine. Das 3te Fufsglied grofs, 2lappig. Die Larven meist lanzettförmig. Kopf (T. XX. F. 3a, 6a) klein, in der Mitte flach oder vertieft, an den Seiten gewölbt, mit deutlichen Äugeln hinter den kleinen, 3gliedrigen, am Kopfrande ziemlich weit hinter den Oberkiefern stehenden Fühlern. Kopfschild gesondert. Letze (F. 3a) rundlich oder quer, ganz oder gebuchtet. Oberkiefer (3E) ziemlich schwach, oben gewölbt, gezähnt. Unterkiefer (3γ) mit deutlich gesonderter, kurzer, innen gehöhlter, gewimperter Lade und 4gliedrigen, die Lade überragenden, sehr sparsam behaarten Tastern. Lippe (3δ) fleischig, klein, mit einzelnen Wimpern. Taster 2gliedrig, kurz, unbrhaart, auf einer hornigen Basis. Die 3 ersten Leibesringe durch Gröfse, Form, Warzen- und Schildbildung ausgezeichnet. Der letzte Ring mit wulstigem, querspaltenen, im Leben nach unten gerichteten und als Nachschieber dienenden After. Das 1ste Luftloch am 2ten Ringe nahe dem Vorderrande desselben, die übrigen etwas höher auf einer kleinen Scheibe mit wulstigen Hornrändern vortretend. Füfse stark, hornig, mit stark gekrümmten, einfachen, spitzen, von breiter, horniger Basis entspringenden Hornhäkchen. Die Puppen sehr gedrunen, denen der Coccinellen im Allgemeinen ähnlich.

VORKOMMEN u. s. f. Sie leben nur von der Blattsubstanz und nicht von der Holzfaser (vielleicht mit Ausnahme von *pinicola*, s. dort). Im J. 1838 wurde ich nicht wenig überrascht, als ich auf der Reise eine Larve von *Cladius Eucera*, welche ich in eine Schachtel mit Käfern der *C. Tremulae* zusammengespart hatte, von den letztern aufgezehrt fand. Es fanden sich an Statt der Larve nur kleine gelbe Krümel, wahrscheinlich der Koth der Käfer, vor. Wahrlich eine auffallende Hindeutung auf die Verwandtschaft der Chrysomelen mit den Coccinellen! Es giebt weit mehr Arten auf Kräutern, Gräsern u. dergl. als auf Holzgewächsen, und die Zahl der forstlich wichtigen ist daher für eine so grofse Familie beschränkt zu nennen. Die allermeisten leben auf Laubbölzern, meist auf bestimmten Arten und gewöhnlich nur an jungen Pflanzen, selbst Keimlingen. Unter diesen wenigen giebt es aber recht schädliche, indem nicht blofs ihre Larven fressen, sondern auch die Käfer. Sie fangen nicht vom Rande der Blätter an, sondern in der Mitte, und wissen das Parenchym zwischen den Rippen und Adern so geschickt herauszunagen, dafs die Blätter oft auf das Wunderbarste skeletirt werden. Die Käfer sitzen zerstreut, die Larven aber oft in Familien, sogar regelmäfsige Colonnen bildend und so vorrückend. Zur Verpuppungszeit trennen sich auch die geselligsten und befestigen sich entweder mit der abgestreiften Larvenhaut an den Blättern (*Populi*) oder gehen in die Erde (*Alni*). Sie legen eine grofse Menge Eier und des Weibchens Hinterleib schwillt gleich nach oder noch während der Begattung ausserordentlich stark auf. Die Bewegungen der Käfer sowohl wie der Larven sind träge. Erstere retten sich bei Berührung der Zweige dadurch, dafs sie herunterfallen, jedoch sind sie darin nicht so empfindlich wie die Rüsselkäfer.

BEGEGNEN kann man ihnen nur durch Sammeln. Dies hat aber keine Schwierigkeit, da die meisten Arten grofs sind und leicht auf den Blättern gesehen werden können. Die Käfer fallen nicht so schnell wie die Rüsselkäfer herunter, und man kann daher in kurzer Zeit eine grofse Menge derselben auf den Fangschirm klopfen und nachher tödten. Am besten ist es, dies im Mai und Juni vorzunehmen, ehe die Weibchen abgelegt haben. Im Herbst erscheint der Käfer zum zweiten Male und dann kann man es wiederholen. Die Larven lassen sich nicht so leicht abklopfen. Wenn man diese sammeln wollte, müfste man die Blätter, auf denen sie sitzen, abbrechen. Vielleicht wäre auch bei meh-

fh

rerer Arten das von Herrn Bouché (S. 243. bei *Haltica oleracea*) angeführte Mittel anwendbar, natürlich nur auf Saatkämpen.

EINTHEILUNG. Schon Linné machte aus den Blattkäfern mehrere Gattungen, aber nur eine: *Chrysomela*, enthält die forstlich wichtigen. Später ist denn auch diese Gattung, wie *Curculio*, *Cerambyx* u. A. in mehrere kleinere Gattungen zerfällt worden, die wir hier, da sie wenigstens als Abtheilungen beim Bestimmen nützlich sind, analytisch geben, die wenigen übrigen, für uns unwichtigen Blattkäfergattungen (*Cassida*, *Lema* u. s. f.) ganz übergehend.

<i>Chrysomela</i>	Fühler fadenförmig, dicht beisammen, zwischen den Augen	{	mit verdickten Hinterschenkeln (springen) . . . . . 1. <i>Haltica</i> Ill.
			mit nicht verdickten Hinterschenkeln (springen nicht) 2. <i>Gallereua</i> Geoff.
	Fühler fadenförmig oder allmählig verdickt, entfernt, vor den Augen	{	Fühler allmählig verdickt, Körper länglich- oder rundlich-eiförmig . . . . . 3. <i>Chrysomela</i> Linn.
			Fühler fadenförmig, Körper walzig
			Fühler lang, nicht gesägt . . . 5. <i>Cryptocephalus</i> Fb.

#### A r t e n .

##### 1. *C. (Haltica) oleracea* Linn. Grofser Spring-Blattkäfer. (Taf. XX. Fig. 8.)

NAMEN. Der deutsche Name Erdflöth wird zwar am häufigsten für diese Art gebraucht, jedoch auch für andre kleinere, in der Lebensweise verwandte Arten.

CHARACTERISTIK. 1,8-2,1" lang, stahlblau oder metallisch-grün, unregelmäßig fein punktiert, mit hinten quergefurchtem Halsschild.

VORKOMMEN u. s. f. Das Insect ist durch das ganze mittlere und nördliche Europa sehr gemein und als Erdflöth bekannt. Der Käfer überwintert an der Erde, unter Blättern u. dergl. oder auch in Baumpflanzen und springt, wenn man ihn hier auffindet und einige Zeit in der warmen Hand hält, sogleich davon. Im Frühjahr begatten sie sich und das Weibchen legt eine große Menge kleiner bernsteingelber Eier auf einen Haufen zusammen. Ich fand es schon im April an Haselknospen beschäftigt. Im Mai erscheinen die Larven und fressen bis in den Juni oder Juli. Die Verpuppung, welche in der Erde erfolgt, geht in 10-14 Tagen, je nachdem das Wetter warm oder kühl ist, vorüber und die Käfer kommen dann gleich hervor und fressen mit den noch übrigen Larven gemeinschaftlich, später allein. Die Verpuppung scheint ausnahmsweise an den Blättern zu erfolgen. Hr. Heyer klopste am 6. August 1828 von Eichen eine Menge goldgelber, kleiner Puppen, aus welchen sich den 16. bis 18. August *C. oleracea* entwickelte. Besonders bemerkenswerth ist der Fraß. Dies Insect kommt nämlich nicht allein auf den verschiedensten Laubbäumen, besonders Sträuchern von Haseln und Eichen vor, sondern auch auf Gemüsearten und allerlei Blumenpflanzen, am liebsten auf den jungen Saamenpflanzen, die dadurch verwüdet werden. Die Eichenblätter, von welchen Herr Heyer die Puppen klopste, waren durch die Larven so stark skeletirt, daß die Stämme auf ganze Strecken wie abgestorben aussahen. Die Bedeutung ist daher für Garten und Feld oft sehr groß und auch im Forste werden sie wenigstens merklich schädlich zu nennen sein. Um Gotha hatten sie einst die aus Mittelwald bestehenden Feldhölzer, besonders den Eichen-Unterwuchs befallen, und ganze Districte von 50 Acker sahen wie halb verdorrt aus (Hr. Kellner in *Allg. F. u. J. Z. V.*

247.). Die Vertilgung geschieht durch Abpflücken der von den Larven besetzten Blätter. Die Käfer lassen sich, da sie springen, nicht sammeln. Hr. Bouché (*Gartenins.* S. 30.) empfiehlt auf Saatbeeten das Besprengen mit Wermuthaufguss (eine Handvoll auf 1 Eimer kochenden Wassers, welches dann 12 Stunden stehen muß), oder auch das Eintauchen der zu versetzenden Pflanzen in einen solchen, oder auch in Ermangelung dessen Tabacksbrühe (2 Pfd. auf 1 Eimer). In Gärten soll Reinlichkeit, d. h. das Entfernen alles unnützen Krautes, Laubes u. dergl., weil die Käfer in demselben überwintern, am besten thun. Anhaltenden Regen können weder Larven noch Käfer vertragen. Sie lieben überhaupt Wärme und sonnige Stellen sehr. Auch Hr. Kollar (*Schüdl. Ins.* S. 152.) bemerkt dies mit dem Beispiel: dafs Pflanzenbeete, mit vielen Blumen besetzt, wenig von den Käfern zu befürchten haben. Hier wird auch wieder des Bouché'schen Mittels mit grossem Lobe erwähnt, jedoch in etwas verschiedener Anwendung. Hr. Prediger Wundram soll nämlich entdeckt haben, dafs wenn man die Pflänzlinge in einem Keller oder an einem kühlen Orte in den völlig erkalteten Wermuthaufguss 6-8 Stunden taucht, aber so dafs nur die Blätter bis zum Stengel (also ohne die Wurzel) hineinkommen, diese, nachdem sie verpflanzt wurden, nicht mehr von den Springkäfern befallen werden. Sollten bald nach der Verpflanzung heftige Regengüsse die Bitterkeit wieder abgespült haben, so würde man die Pflanzen noch einmal besprengen müssen. Auch ein anderes hier mitgetheiltes Mittel ist selbst im Grofsen ausführbar. Man soll den aus kalkartigen Steinen auf der Chaussee befindlichen Staub an einem sonnigen Tage zusammenfegen und an trocknen Orten aufbewahren. Sobald sich Erdlöcher eingefunden haben, bestreut man, wenn es in einer Nacht stark gethaucht hat, die jungen, nassen Pflänzchen so sehr, dafs sie wie bepudert aussehen. Trocknet dieser Staub nun vollends an, so sind die Käfer wie weggezaubert. Tritt gleich darauf Regen ein, der den Staub wieder abspült, so muß das Bestreuen wiederholt werden. (Gewöhnlicher Chausseestaub, wenn er auch grade nicht aus kalkhaltigen Gesteinen entstanden sein sollte, würde wohl dieselben Dienste thun?)

VERWANDT sind: 1) *C. (Haltica) Helzines* Fabr. (T. XX. F. 11.). 1,5-1,6" lang. Flügeldecken metallisch-grün oder blau, mit starken Punktreihen und glatten Zwischenräumen. Halsschild meist kupferroth, zuweilen auch wie die Flügel. Fühler und das hintere Fufspaar halb, die beiden vordern ganz rüthlich-gelb. Mehr auf Weiden doch auch Pappeln. 2) *C. (Haltica) nitidula* Linn. Bis 2" lang. Farben fast wie bei vorigem. Flügel mit schwächeren Punktreihen und zum Theil punktirten, zum Theil runzlichen Zwischenräumen. Auf Pappeln, Weiden (auch Aspen?) meist mit vorigem schädlich, häufig (Saxen). — 3) *C. (Haltica) flexuosa* Pnz. (F. 12.). 1-1,4" lang, schwarz, mit gelber, mehr oder weniger stark geschwungener Flügel-Längsbinde und nicht rein gelbbraunem ersten Fühlergliede [dadurch von der sehr nahe verwandten gradhändigen *C. nemorum* Linn. (welche nach Hrn. Saxen allein auf Hölzern leben soll) verschieden]. Auf mancherlei Saamenpflanzen häufig. Nach Hrn. Westwood (*London's Garden. Mag.* Mar. 1837. S. 101 u. f.) ist das böse Turnips-Insect (*the Turnip Flea-Beetle*) die *C. (Haltica) nemorum*. Man ging hier von der Ansicht aus, die Eier würden an die Saamen gelegt und es müßte das Einweichen derselben in Salzwasser helfen. Obgleich man einen günstigen Erfolg zu haben glaubte, so beweist Hr. Westwood doch, dafs dies auf Täuschung beruhe und dafs die Eier dennoch auf Blätter abgelegt würden. Die von der *Entomological Society* dieserhalb gestellten Preisaufgaben dürften jetzt bereits Beantwortungen erfahren haben. Hr. Westwood (a. a. O. p. 105.) meint, die ganze Verwandlung ginge in wenigen Wochen vor sich, so dafs die Käfer, welche die Brut im nächsten Jahre setzen, schon in diesem Jahre erscheinen. Es werden mehrere Mittel, von denen sich wohl Wirksamkeit erwarten läßt, genannt, aber sie sind offenbar nicht im Grofsen anwendbar (Ausbreiten von Hollunder-Ästen, Überstreuen von gelöschten Kalk, Stoppelbrennen).

2. *C. (Galleruca) Caprea* Linn. Gelbbrauner Birken-Blattkäfer. (Taf. XX. Fig. 5.)

CHARACTERISTIK. 2 $\frac{1}{2}$  lang, länglich-eiförmig, stark gewölbt, unregelmäßig punktiert, kahl, oben schmutzig gelbbraun (seltener ganz dunkel) und nur schwarz das Schildchen, mehrere Flecke des Halsschildes, Kopf und Basis und letzte Hälfte der Fühler. Unterseite schwarz und auch größtentheils die Beine. Die Larve (F. 5 c) der von *C. Populi* sehr ähnlich und nur verschieden durch etwas kürzere Beine, weiter von einander entfernte Rückenschildchen, welche auch kleiner sind und auch auf dem 9ten Ringe noch nicht ganz in Einen Fleck verschmelzen.

VORKOMMEN u. s. f. Das Insect lebt auf verschiedenen jungen Laubbölzern, besonders gern auf Birken und Saalweiden (*Salix Caprea*). Bei uns findet es sich meist nur einzeln. Im Harze beobachtete ich es i. J. 1832 in ungeheurer Menge (s. Pfeil's crit. Bl. VII. 1. S. 89.). Es war im September und wir fanden nur den Käfer, der größtentheils als frisch ausgekommener zu erkennen war. Die Larven, von denen sich keine Spur auf den Blättern mehr fand, waren also wahrscheinlich schon seit mehreren Wochen zur Verpuppung in die Erde gegangen. Der junge, befallene Birkenort war hart mitgenommen und an vielen Stämmchen war nicht ein gesundes Blatt mehr. Viele gingen ganz ein, andre kränkelten noch lange. Im J. 1838 sind wieder, wie Hr. Pfeil mir erzählte, eine Menge junger Birken durch die Käfer und die Larven gänzlich zerstört worden. Es würden sich diese Zerstörungen noch mehr erklären lassen, wenn man die, bei nahe verwandten Arten bemerkte, Eier-Ablage auch bei dieser annehmen könnte. Hr. Hartig (*Convers. Lex.* S. 333.) beobachtete nämlich *C. Fiburii*, die oft den Schneeballen (*Fiburnum Opulus*) im Freien sowohl wie im Garten arg zusetzt. Der Käfer frisst Löcher in die jungen Triebe bis auf die Markhöhle, legt in jedes 4-12 Eier und verklebt die Öffnung mit den Nagespähnen. Man trifft diese Eiernöhlen meist zu 6-24 in gerader Linie am Triebe entlang dicht neben einander stehend. Hier überwintern die Eier, bis sich aus ihnen im Mai die Larven entwickeln und auf den Blättern erscheinen. Das Insect ist demnach wohl sehr schädlich zu nennen und man hat Ursach mit der Vertilgung zu eilen (s. S. 241.). Trockne Witterung und sonnige Lage scheinen sie hauptsächlich zu begünstigen und häufige Regen und frühe Nachfröste ihnen sehr zu schaden.

3. *C. (Galleruca) Alni* Linn. Blauer Erlen-Blattkäfer. (Taf. XX. F. 6.)

CHARACTERISTIK. Der Käfer 2,5-3" lang, eiförmig-länglich, unregelmäßig punktiert. Dunkel stahlblau. Die Larven (F. 6 c) 5,5" lang und 1,1" breit (ausgestreckt, lebend gemessen). Kopf ziemlich flach, an der Stirne sogar etwas vertieft. Dicht hinter den kurzen Fühlern jederseits nur ein sehr kleines Äugelchen (F. 6 b). Jeder Körperring mit einer sehr deutlichen Querrfurche, vor und hinter welcher 2 glänzende (aus 2 länglichen Wärtchen bestehende) behaarte Querleisten. Luftlöcher am Grunde der aus- und einziehbaren Kegelwarzen und unter denselben noch eine behaarte Warze, weshalb die Seiteuränder des Leibes von oben wie gezähnt erscheinen. Letzter Ring mit einer grünen, den After umschließenden Haftseheibe. Dunkelschwarz, ins Grünliche stechend, sehr glänzend. Behaarung ziemlich stark. Puppe (F. 6 c, und 6 h während dem die Larvenhaut platzt) 2,5" lang und 1,3" breit, sehr weich und zart (wie wahrscheinlich alle Erdpuppen) und hellgelb. Der ganze Rücken sammt den Rändern des Hinterleibes, der Aftergegend, Kopfoberseite und den Kniegelenken mit steifen, langen Haaren.

VORKOMMEN u. s. f. Überall [von Süddeutschland (Hr. v. Bulmerincq, Hr. Waltl) bis Schweden und durch ganz Rußland (Hr. Ménétrés)] höchst gemein, auf Erlen, in unserm Fortgarten auf *Alnus glutinosa* und *incana*, selbst auf allen fremden cultivirten. Die Larven saße ich immer nur an diesen fressen, die Käfer jedoch auch im Frühjahr, wenn sie eben die Winter-Quartiere verlassen hatten, auf Weiden und Pappeln. Larven und Käfer skeletirten die Blätter. Die Larven, welche beinahe wie Spau-

nerrauhen kriechen, benagen in den ersten Wochen bloß die Epidermis und später, wenn sie größer sind, fressen sie das ganze Diachym heraus (s. T. XX. F. 6 x, wo auch ein legendes Weibchen zu sehen). Sie erscheinen im Mai und Juni (das Weibchen trägt sich oft sehr lange mit den Eiern herum) und fressen dann bis in den Juli und August. Man findet sie dann ganz oberflächlich in der Erde verpuppt, so daß man sie leicht ausscharrten kann. Im August und September finden sich die Käfer schon wieder auf den Erden ein und fressen dann, so lange es nicht friert, oft bis Ende Oktobers, und überwintern unter den abgefallenen Blättern. Sie sind deshalb für diese Holzgattung als sehr schädlich zu bezeichnen, besonders auf Saatkämpfen, wo eine Menge Pflanzen, welche zuletzt ganz braun aussehen, eingehen oder kränkeln. Vertilgung durch Sammeln (s. S. 241.).

4. *C. (Galleruca) pinicola* A. n. d. (*Luperus p.* Geoff.) Schwarzer Kiefernblattkäfer. (Taf. XX. Fig. 9, 10.)

CHARACTERISTIK. Länglich, wenig gewölbt. Halsschild breiter als Kopf. Flügeldecken äußerst schwach gerunzelt, auch kaum punktiert (und dadurch besonders von der deutlich punktierten *C. flavipes* Gyll. unterschieden): Beim 1,8-1,9" langen Weibchen die Flügel bräunlich-schwarz, der Halsschild gelb, beim 1,4" langen Männchen beide bräunlich-schwarz. Schienen und Fußglieder ganz, Schenkel grüsten-theils und an den Fühlern die 3-4 ersten Glieder gelb.

VORKOMMEN u. s. f. Bis jetzt nur wenig in Deutschland beobachtet und als schädlich nur von Thiersch (*Forstsk. S. 27.*) aufgeführt. Dieser beobachtete den Käfer bei 2000' Höhe in einer Kiefernfaat vom kräftigsten Wuchs. Der Käfer benagt im Sommer die Basthaut der neuen Jahrestriebe und im August und September, wenn ihm diese zu hart wird, auch die Nadeln. Die Eier soll das Weibchen in die Knospen (?) der nun kränkenden Triebe legen. Im September quillt aus solchen Knospen das Harz und unter dem Schutz desselben frist die Larve und verpuppt sich (?). Viele hundert Zweige verloren so theils die Gipfel, theils die Spitzen der Seitenästchen. Als Begegnung wird das Ausreißen des Unkrautes und Ausbreiten desselben unter den Kiefern empfohlen (\*). Eine nahe VERWANDTE Art, *C. (Luperus) rufipes* F., der *pinicola* sehr ähnlich, aber bis 2,5" lang, ganz dunkel stahlblau und nur rothgelb an den Beinen und den 4-5 ersten Fühlergliedern, soll nach Hrn. Schmidberger (*Kollar schüdl. Ins. S. 260.*) den Obstbäumen, namentlich Apfelbäumen, durch Befressen (Durchlöchern) der Blätter, welche sie oft den grössten Theil des Sommers ganz bedeckten, sehr verderblich werden.

5. *C. Populi* Linn. Rother Pappelnblattkäfer. (Taf. XX. Fig. 4.)

CHARACTERISTIK. Der Käfer 4,2-5,5" lang, länglich-eiförmig, stahlblau mit gelbrothen nur an der äußersten Spitze blauen Flügeldecken (die nur 3,4-4,1" lange *C. Tremulae* Fabr. (F. 3.) allein durch den Mangel der blauen Spitze der Flügel, die auch etwas mehr gelblich, unterschieden). Die Larven beider (s. Taf. XX. F. 3 c) 4-5" lang und bis 1,6" breit. Hinter den Fühlern 4 größere, im Viereck gestellte kugelige Ägelchen und außerdem noch 2 sehr kleine außerhalb derselben. Grundfarbe schmutzig-weiß. Zwei Seitenhöcker des 2ten und 3ten Körperringes schneeweiß. Kopf und Beine, ein mehr oder weniger

(\*) Fernere Beobachtungen über dies so wenig bekannte Insekt wären sehr wünschenswerth. Hr. Thiersch hat dieselben, seinem (S. 29.) gegebenen Versprechen zuwider, nicht geliefert und auch meine schriftlich an ihn gerichteten Wünsche nicht befriedigt. Wahrscheinlich hat sich das Insekt also nicht wieder so häufig gezeigt. Ich vermute, daß bei dem von ihm beschriebenen Fraße mehrere Wickler-Larven thätig gewesen sind (besonders *Tortrix Ruotiana*, auf welche vieles paßt) und daß die eigentlichen Larven der *Chrysomela* nicht in der Knospe leben, auch nicht so spät fressen, wie dort angegeben ist. Verwechselungen sind hier leicht möglich und sehr zu entschuldigen. Hr. Meyer hat den Käfer auch schon ziemlich häufig von Kiefern geklopft, ohne aber seine Lebensweise näher beobachten zu können.

großer Fleck des Rückens, des 1sten Ringes und viele regelmässig gestellte Flecke und an jeder Seite des ganzen Leibes eine Reihe Höcker, glänzend schwarz. Feine Haare nur an Kopf und Beinen und den meisten schwarzen Flecken. Die schwarzen Luftlöcher, welche kleiner als die übrigen Flecke sind, unbehaart. Die Puppe (F. 36) bräunlich-gelb und schön bunt gefärbt durch sehr regelmässig symmetrisch gestellte schwarze, eckige Flecke und Punkte. Die Oberflügel gerundet, von der Mittellinie entfernt, die Unterflügel zum Theil nicht verdeckend.

VORKOMMEN u. s. f. Beide Käfer (*Populi* und *Tremulae*) kommen meist unter einander und in gleich großer Menge, überall auf jungen Aspen, besonders auf rasch und üppig aufgeschossener Wurzelbrut vor, und diese geht danach oft auf ganze Strecken ein. Beim Anblicke eines Taf. XXI. Fig. 6. dargestellten, von Käfern und Larven skeletirten Blattes wird sich Jeder einen Begriff von den Verwüstungen dieser Insecten machen, welche wohl sehr schädlich genannt werden können. Sie verrathen sich schon in einiger Entfernung durch einen eigenthümlichen, unangenehmen Geruch, welcher dadurch vermehrt wird, daß die Larve einen milchweißen Saft aus den Kegelwarzen treten läßt (besonders beim Anfassen). Die Larven fressen vom Mai und Juni bis in den August und verpuppen sich an den Blättern. Die Puppe befestigt sich mittelst der abgestreiften Larvenhaut und hängt gestürzt, wie dies uns mehrere junge Larven T. XX. F. 3x zeigen. Vertilgen kann man sie nur durch Sammeln (s. S. 241.).

VERWANDT sind: 1) *C. aenea* Linn. (T. XX. F. 13.). 3-3,5" lang, eiförmig. Halsschild an den Seiten nicht verdickt. Flügeldecken unregelmässig punktirt. Die beiden letzten Hinterleibsringe am Rande bräunlich-roth. Metallisch blau oder grün, stark glänzend, die grünen zuweilen mit etwas Kupferschiller. Birken (Gyllenhal) und Erlen (Saxesen) stark zerfressend. Im J. 1838 hatte ich selbst Gelegenheit, den Fraß des Käfers und der Larven am südlichen Harz auf starken Erlen zu sehen. Die Blätter waren allein von diesem Insect bewohnt und es hatte dieselben sehr stark skeletirt. Es waren mehr Käfer als Larven und Puppen zu finden und die Generation dürfte wie bei *C. Alni* sein, welcher die ganz schwarzen Larven auch ähnelt. — 2) *C. Fütellinae* Linn. (T. XX. F. 7.). 2-2,1" lang, länglich, nicht stark gewölbt. Flügeldecken reihig-punktirt. Seiten des Aftergliedes unten rüthlich. Metallisch-bräunlich-grün, selten blan, stark glänzend. Auf Weiden, oft sehr häufig und die Blätter zerfressend. — 3) *C. viminalis* Puz. (10-punctata und *viminalis* Linn.). 3" lang, länglich eiförmig, schwarz mit brauner Fühlerbasis, jedoch viel häufiger oben gelbbraun, mit einem breiten Halsschildfleck, 2-10 Flügelstellen und Schildchen, welche schwarz sind. An Weiden. 4) Die ganz ähnliche aber rothbeinige *C. rufipes* Gyll. dagegen immer an Pappeln (Saxesen), (nach Schmidberger auch an Obstbäumen). 5) Im Harze auch die etwas kleinere, gelbbeinige und gelbköpfige ähnliche *C. dispar* Pk. (*pallida* Linn.), Ebereschen abfressend.

ANHANG. Die in der analytischen Tabelle sub No. 4, 5 angegebenen kleinen Gattungen der Blattkäfer sind theils nicht häufig, theils nur auf unwichtigen Hölzern, theils in der Lebensweise den schon beschriebenen so ähnlich, daß wir sie hier nur kurz beschreiben: 1) *C. (Chythra) quadripunctata* Linn. (T. XX. F. 2.). 3-5" lang, schwarz, grau-weichhaarig mit gelb-rothen, 4 schwarze Flecke zeigenden Flügeldecken. Die Punkte der Oberseite deutlich und ziemlich groß und tief: die des Halsschildes zahlreich und nur in der Mittellinie etwas sparsamer und schwächer, die der Flügeldecken hier und da regelmässige Reihen bildend. Bei uns selten. Fliegt nach Hrn. Erichson schon im Mai und frisst nach Bechstein (Forstins. S. 199.) und Anders (Liebich *Allgem. F. u. J. Z.* Bd. II. S. 16.) auf Weisdoru, Haseln, Weiden (besonders Saalweiden), Aspen und Birken, und nach Hrn. Saxesen auch auf Erlen. Hr. Heyer hat sie in seiner Gegend immer nur an Eichen gefunden, eben so wie Hr. Suffrian sie in Westfalen bei Arnberg hin und im Siegenscheu auf den niedrigen Eichen in den Haubergen bis in den August hinein

fand. Sie soll wenigstens merklich schädlich werden können, wenn sie in Menge auf jungen Schlägen erscheint und die jungen Loden der Wurzelbrut von Birken, Saalweiden und Aspen befrisst. Diese knikeln an der Spitze davon ein oder verdorren auch wohl ganz und müssen abgeschnitten werden. Sammeln der Käfer halb (\*). 2) *C. (Cryptocephalus) Pini* Linn. (T. XX. F. 1.). 1,7-2,2" lang gedrungen. Kopf und Halsschild äußerst dicht und ziemlich grob punktirt. Flügeldecken unregelmäßig punktirt. Bis auf die Augen und die letzte Fühlerhälfte, welche schwarz sind, alles bräunlich-gelb, die Ränder meist etwas heller und der Halsschild etwas mehr röthelnd. Auf Kiefern und Fichten hier und da häufig. Der Käfer erscheint im Herbst und frisst an den Nadeln, jedoch nur so unbedeutend, daß man ihn als nur unmerklich schädlich ansprechen kann.

---

(\*) Es ist wahrscheinlich, aber nicht ganz bestimmt, auch nicht einmal aus Gyllenhal sicher zu ermitteln, daß diese die ächte Linné'sche Art sei, denn es giebt noch eine höchst ähnliche. Bei genauerer Betrachtung unterscheidet sie sich durch vollkommene Glätte des (auch nur sehr schmal gerandeten) Halsschildes, des Schildchens und durch sehr schwache, weitläufigere Punkte der Flügel, wobei auch der größere Glanz der Oberseite kommt. Sie ist schon von Creutzer unterschieden, kann aber seinen Namen: *fasciata*, der nach Hrn. Erichson einer Fabricius'schen Art aus Guinea zukommt, nicht behalten, und würde besser *laeviuscula* heißen. Sie mag indessen mit der 4-punctata zuweilen zusammen fressen, denn ich habe sie bei uns, wo sie gewiß die häufigste ist, auch auf Saalweiden gesehen. Gewöhnlich scheint sie jedoch Kräuter und Gräser anzugehen. Bei uns fraß sie auf *Brachypodium*, Herr Saxen auf *Euphorbia* und Herr Apotheker Hornung bei Aschersleben auf allerlei Kräutern. Sie fliegt erst im Juli und August. Herr Soffrian bemerkte sie stets nur auf Haseln und nur ein einziges Mal auf *Scabiosa arvensis* an den Blumen. Gewiß ist es auch nur eine Ausnahme, daß sie nicht an Holzgewächsen vorkommen. Übrigens fand ich alljährlich auf derselben Stelle auf Saalweiden die Käfer bei Freienwalde, obgleich es auch Haseln genug in der Nabe gab.





# Druckfehler.

Seite	Zeile	von	Seite	Zeile	von
3	10	unten statt „ <i>lingula</i> “ lies „ <i>ligula</i> “.	106	21	oben statt „jedem“ lies „allen“.
5	26	oben vor „Wurmern“ fehlt „mit“.	114	21	oben statt „Spitze“ lies „Spitzen“.
10	7	oben vor „dritten“ ist einzuschalten „zweiten und“.	115	17 u.	unten statt „ <i>Cassonius</i> “ lies „ <i>Cossonus</i> “.
18	7	oben hinter „kleinere“ fehlt „Schilder“.	133	1	unten statt „in welchem“ lies „in welchen“.
20	10	unten statt „(l. 11. g.)“ lies „(l. 11.)“.	130	18	unten vor „Birken“ setze „alte“.
28	8	unten statt „vorspringenden Vorderwinkeln“ lies „...gendem... Winkel“.	142	10	unten statt „1 K“ lies „1 k“.
29	5	oben vor „andere“ fehlt „eine“.	156	6	oben statt „abschüssigen“ lies „abschüssige Flü- gelecken“.
29	10	oben statt „ $\frac{1}{2}$ L“ lies „ $\frac{1}{2}$ “.	157	3	oben statt „1 d“ lies „1 d“.
29	13	unten hinter „untere“ fehlt „Paar“.	163	20	unten hinter „lassen“ fehlt „können“.
30	4	unten ist „derselben“ zu streichen.	164	1	unten statt „denarischen“ lies „dendritischen“.
31	1	oben statt „ <i>Staphilinus</i> “ lies „ <i>Staphylinus</i> “.	165	4	unten statt „Daim“ lies „Damm“.
32	8	oben hinter „vorletzte“ ist einzuschalten „ist“.	169	12	oben statt „ <i>B. Abietis</i> “ lies „ <i>B. typographus</i> “.
33	16	oben statt „14 C“ lies „14 B“.	174	15	oben anstatt „11.“ lies „11.“.
33	2	unten statt „6 $\frac{1}{2}$ L“ lies „6 $\frac{1}{2}$ “.	175	10	oben hinter „Luft“ und vor „Stamine“ setze statt ) ein Komma.
42	24	oben hinter „schon“ fehlt „war“.	177	24	oben vor „der Menge“ lies „theils wegen“.
45	14	oben vor „zweilappiger“ fehlt „und“.	179	8	unten hinter „kommen“ fehlt ).
51	8	unten statt „von einer“ lies „vor einer“.	188	1	unten statt „4“ lies „4“.
53	17	oben statt „Kammhorn-Nagekäfer“ lies „Kamm- horn-Bohrkäfer“.	189	14	oben statt „dichten“ lies „dichter“.
56	10	oben hinter „(Schilde)“ ist einzuschalten „be- kleidet ist“.	195	20	oben statt „Wegegänge“ lies „Wagegänge“.
59	8	oben statt „Larve nur“ lies „Larven nur“.	206	7	oben statt „von oben“ lies „nach oben“.
61	15	unten statt „ <i>ha-tulifera</i> “ lies „ <i>ha-stulifera</i> “.	209	7	oben statt „12 a“ lies „12 e“.
63	15	unten statt „von den Füßen bedeckt“ lies „von den Flügeln bedeckt“.	209	9	oben statt „5 e“ lies „15 e“.
68	27	oben statt „Kerne“ lies „Krone“.	210	41	oben anstatt „Schachthöhe“ lies „Schafthöhe“.
75	10	unten hinter „Beglattung“ fehlt „(im Mai)“.	222	35 36	oben anstatt „ <i>polygraphus</i> “ lies „ <i>poligraphus</i> “.
81	29	oben hinter „Krahen“ setze „auf“.	226	2	oben statt „T. X.“ lies „T. XIV.“.
85	4	oben statt „verschlossen“ lies „verschlossenen“.	231	4	unten statt „F. 15.“ lies „F. 14.“.
96	19	unten statt „5 c“ lies „5 e“.	232	11	unten statt „2 A“ lies „2 K“.
98	13	unten hinter „übrigen“ setze „Glieder“.	238	5	unten statt „ $\frac{1}{2}$ “ lies „ $\frac{1}{2}$ “.
			239	9	unten hinter „ist“ statt ) setze ( .

## Berichtigung der Kupfertafeln.

- Taf. III. statt „Fig. 19 K“ setze „19“ und statt „Fig. 5 a“ setze „5 d“; denn auf dieser Tafel sind alle Füße und deren Glieder ausnahmsweise nicht mit g, sondern mit d bezeichnet.
- Taf. IV. statt „Fig. 11 A“ setze „11 a“.
- Taf. XVI. statt „Fig. 2 K“ setze „2 a“.

Zur Erleichterung des Bestimmens und Auffindens dienen die folgenden drei tabellarischen Übersichten.

## No. I. Übersicht der Abtheilungen des Systems des 1<sup>sten</sup> Bandes.

	Seite.
Erste Abtheilung Dreigliedrige mit der einzigen Gattung <i>Coccinella</i> (einschließlich <i>Scymnus</i> ) . . . . .	17- 20
Zweite Abtheilung Fünfgliedrige . . . . .	20-107
mit der ersten Fam. Laufkäfer . . . . .	21- 30
— — — und der 1sten Gatt. <i>Cicindela</i> . . . . .	26- 28
— — — 2ten — <i>Carabus</i> . . . . .	28- 30
mit der 2ten Fam. Kurzflügler und der einzigen Gatt. <i>Staphylinus</i> . . . . .	30- 34
mit der 3ten Fam. Keulenhörnige und der Gatt. <i>Clerus</i> . . . . .	34- 37
— — <i>Silpha</i> . . . . .	37
— — <i>Corynetes</i> . . . . .	37
mit der 4ten Fam. Sägehörnige . . . . .	37- 71
und der 1sten Gatt. <i>Cantharis</i> . . . . .	37
2ten — <i>Lymexylon</i> . . . . .	39- 44
3ten — <i>Anobium</i> . . . . .	44- 53
4ten — <i>Ptilinus</i> . . . . .	53- 54
5ten — <i>Elater</i> . . . . .	54- 55
6ten — <i>Buprestis</i> . . . . .	55- 71
mit der 5ten Fam. Blatthörnige . . . . .	71-107
und der 1sten Gatt. <i>Melolontha</i> . . . . .	72-102
2ten — <i>Cetonia</i> . . . . .	103-104
3ten — <i>Trichius</i> . . . . .	104-105
4ten — <i>Lucanus</i> . . . . .	105-107
Dritte Abtheilung Ungleichgliedrige mit der einzigen forstlich wichtigen Gattung <i>Lytta</i> . . . . .	107-111
Vierte Abtheilung Viergliedrige . . . . .	112-247
mit der 1sten Fam. Rüsselkäfer . . . . .	113-156
und der 1sten Gatt. <i>Apoderes</i> . . . . .	116-117
2ten — <i>Curculio</i> . . . . .	118-156
mit der 2ten Fam. Holzfresser . . . . .	156-232
und der ersten Unterfamilie: der echten	
Holzfresser . . . . .	156-231
und der 1sten Gatt. <i>Bostrichus</i> . . . . .	166-208
2ten — <i>Hylesinus</i> . . . . .	208-225
3ten — <i>Eccoptogaster</i> . . . . .	225-230
4ten — <i>Platypus</i> . . . . .	230-231
und der 2ten Unterfamilie: der unechten	
mit den Gatt. <i>Colydium</i> und <i>Apatha</i> . . . . .	231-232
mit der 3ten Fam. Bockkäfer und der einzigen Gatt. <i>Cerambyx</i> . . . . .	232-240
mit der 4ten Fam. Blattkäfer und der einzigen Gatt. <i>Chrysomela</i> . . . . .	240-247



# Bedeutung.

## Sehr schädliche.

## he (täuschende) oder noch näher zu bestimmende.

	Seite	Taf. Fig.	Seite	Taf. Fig.	Seite	Taf. Fig.
<i>Bostrichus bidens</i>	191-194	XII. 11, 12	50	II. 15	<i>Cetonia aenea</i>	103
— <i>chalcographus</i>	191	XII. 13, 14	46-49	II. 16	— <i>aurata</i>	103
— <i>curvidens</i>	190-191	XIII. 1, 2	52		— <i>marmorata</i>	104
— <i>dispar</i>	204-208	XIII. 13, 14	51-53	II. 20	<i>Chrysomela flexuosa</i>	XX. 12
— <i>dryographus</i>	201	XII. 7, 8	48	II. 15	— <i>Helixina</i>	XX. 11
— <i>Laricis</i>	188-190	XII. 3	49-50	II. 17	— <i>nitidula</i>	213
— <i>lineatus</i>	199-202	XIII. 11	52		— <i>Pini</i>	217
— <i>monographus</i>	201-204	XII. 5, 6	52		<i>Colydium elongatum</i>	XX. 1
— <i>stenographus</i>	186-188	XII. 2	47	II. 13	<i>Cossonus chloropus</i>	X. 15
— <i>typographus</i>	169-186	XII. 1	52		— <i>crassirostris</i>	155
<i>Buprestis angustula</i>	60	II. 3	241	X. 14	— <i>lignarius</i>	155
— <i>nociva (viridis)</i>	63-65	II. 7	116-117	IV. 5	<i>Cucujus testaceus</i>	232
— <i>tenuis</i>	60	II. 1	117		<i>Curculio Abietis</i>	V. 2
<i>Cerambyx Carcharias</i>	243-245	XVI. 4	180	XIII. 4	— <i>aterrimus</i>	125
<i>Chrysomela Alni</i>	244-245	XX. 6	199		— <i>glauca</i>	138
— <i>Capreae</i>	244	XX. 5	196	XII. 9, 10	— <i>lineatus</i>	129
— <i>Populi</i>	245-246	XX. 4	199	XIII. 18	— <i>piniphilus</i>	145
— <i>Tremulae</i>	245	XX. 3	189	XIII. 5	— <i>varius</i>	119-120
<i>Curculio notatus</i>	142-145	V. 1	231		<i>Daytes coeruleus</i>	IV. 6
— <i>Pini</i>	129-138	IV. 11	197	XIII. 15	<i>Ecoprogaster castaneus</i>	X. 12
<i>Ecoprogaster intricatus</i>	228-230	X. 9	194		— <i>noxius</i>	X. 7
— <i>Scolytus</i>	226-228	X. 4	201	XIII. 12	— <i>pygmaeus</i>	X. 6
<i>Hylesinus Fraxini</i>	221-225	VII. 15	204	XIII. 9, 10	<i>Elater sanguineus</i>	229
— <i>minor</i>	217	VII. 2	197		— <i>tessellatus</i>	55
— <i>pallidus</i>	221-222	VII. 10	199	XIII. 19	<i>Hylesinus attenuatus</i>	220
— <i>piniperda</i>	209-219	VII. 1	197		— <i>crenatus</i>	VII. 11
— <i>poligraphus</i>	222-223	VII. 12	201		— <i>decumanus</i>	VII. 9
<i>Lymexylon navale</i>	41-44	II. 23, 24	199		— <i>ligniperda</i>	217
<i>Melolontha Hippocastani</i>	91-95	III. 1	204	XII. 4	— <i>linearis</i>	VII. 1
— <i>solitarius</i>	96-98	III. 5	189	XIII. 20	— <i>pilosus</i>	VII. 13
— <i>vulgaris</i>	74-95	III. 1, 2	199		— <i>rhododactylus</i>	218
			194	XIII. 7, 8	— <i>Trifolii</i>	222
			63-64		— <i>vittatus</i>	225
			64-65	II. 8	<i>Leptura rubrotestacea</i>	XVII. 9, 10
			59	II. 9	— <i>quadrifasciata</i>	XVII. 11
			60	II. 11	<i>Lyctus canaliculatus</i>	232
			62		— <i>contractus</i>	232
<i>Cantharis</i>	37		240	II. 6	<i>Lymexylon dermestoides</i>	II. 25, 26
<i>Carabus</i>	30	I. 1-11	240		<i>Lucanus caraboides</i>	40-41
<i>Cicindela</i>	27	I. 12	240	XVI. 2	— <i>Cervus</i>	106
<i>Clerus</i>	36	I. 17	240	XVII. 5	— <i>parallelipipedus</i>	III. 19
<i>Coccinella</i>	20	I. 15, 16	240		<i>Melolontha agricola</i>	III. 8
<i>Corynetes</i>	37		217	XVII. 1	— <i>brunnea</i>	III. 16
<i>Silpha</i>	37		215		— <i>graminicola</i>	III. 6
<i>Staphylinus</i>	33	I. 13, 14	240		— <i>ruficornis</i>	III. 11
			240		— <i>variabilis</i>	II. 22
			240		<i>Ptilinus costatus</i>	54
			237	XVII. 1	<i>Ptinus Fur</i>	53
			240		<i>Scarabaeus nasicornis</i>	107
			239-240	XVII. 5	<i>Sinodendron cylindricum</i>	XVII. 12
			239		<i>Spondylis buprestoides</i>	107
			239	XVII. 7	<i>Trichius Eremita</i>	333
			238	XVII. 6	— <i>hemipterus</i>	105
			237		— <i>nobilis</i>	105
			246	XVII. 3	— <i>octopunctatus</i>	105

## Nützliche.



# No. III. Nahrungspflanzen.

## An Nadelhölzern und zwar:

An der Kiefer (*Pinus sylvestris* L.)  
in oder an Nadeln, Blumen oder Früchten.

- Chrysomela pini* Bl.
- *pinicola* Bl.
- Curculio atomarius* Bl.
- *geminatus* Bl.
- *glauco* Bl.
- *incanus* Bl.
- *indigena* Bl.
- *lineatus* Fr.
- *mollis* Bl.
- *notatus* Fr.
- Melolontha fulva* Bl.
- *Hippocastani* B.
- *solitatis* Bl.
- *vulgaris* B.
- *ruficornis* Bl.

in oder an Pflanzen oder schwächern Baumtheilen.

- Anobium molle* R.
- *nigrum* M.
- *Pini* M.
- Bostrichus bidens* S.
- *Laricis* und *suturalis* L.
- *pygmaeus* St.
- Euprestis 4-punctata* Lrv.
- Cerambyx fascicularis* Lrv.
- Curculio violaceus* Lrv.
- *notatus* Lrv.
- *Pini* Bl.
- Hylesinus ater* und *angustatus* L.
- *minor* W.
- *piniperda* L.

in oder an Stämmen.

- Anthrabus varius* Gil.
- Bostrichus acuminatus*?
- *cineereus* R.
- *Laricis* und *suturalis* L.
- *lineatus* L.H.
- *Saxenii* HF.
- Euprestis flavo-maculata* Lrv.
- *8-guttata* Lrv.
- *Mariana* Lrv.
- Cerambyx Aedilis* Lrv.
- *indagator* Lrv.
- Cossonus chloropus* R.
- *crassirostris* R.
- Curculio Abietis* Lrv.
- *notatus* Lrv.
- *Pini* Lrv.
- *piniphilus* Lrv.
- Hylesinus ligniperda* L.
- *minor* W.
- *palliatu* L.
- *piniperda* L.
- *stenographus* L.

An der Fichte (an der Birke (*Betula*)  
an Nadeln, Blt an Blättern  
Frücht.

- Trichus dispar* GH.
- *lineatus* L.H.
- Anobium abietinum* — *ysomela aenea*
- *Abietis* Fr. — *Cepreae*
- *angusticollis* ? — *4-punctata*
- *longicorne* Fr. — *fulva* *Betulae*
- Chrysomela Pini* Bl. — *Betuleti*
- Curculio ater* — *coeruleocephalus*
- *atomarius* — *Coryli*
- *Coryli* Bl. — *Coryli*
- *mollis* Bl. — *incanus*
- Melolontha vulgaris* — *violaceus*
- *viridicollis*
- *lunata* *brunnea*
- in oder an Pfl. — *Frischi*
- schwächern Ba. — *Hippocastani*
- *vulgaris*

*Bostrichus Abietis* I in oder am Stamme

- *chalcographus*
- Cerambyx fascicularis* *Betuleti* Lrv.
- Curculio ater* — *Fagi* Lrv.
- *varius* Gil. — *coprogaster* *Scolytus* L.
- *violaceus* L. — *canus* *parallelipipedus* H.
- Hylesinus cunicular* — *an der Erle (Ahnus)*
- *poligraphus*

*Obrium tessellatum* H.

in oder am Stamme

- Anobium emarginat* — *Alni* Bl.
- *molle* R. — *4-punctata* Bl.
- Bostrichus autographus* *Betuleti* Bl.
- *Laricis* und — *Lepathi* Bl.
- *lineatus* L.H. — *Pini* Bl.
- *pygmaeus* — *Pyri* Bl.
- *pusillus* R. — *viridicollis* Bl.
- *Saxenii* H. — *Melolontha argentea* Bl.
- *typographus*

*Cerambyx Aedilis* I an der Ruster (*Ulmus*)

- *indagator* L.
- *luridus* Lrv.
- Curculio Hercyniae* — *multistriatus* L.
- Hylesinus decumant* — *Pruni* L.
- *micans* RF.
- *palliatu* L.
- *pilosus* ?
- *poligraphus*

an der Hasel (*Corylus*)

- *roderes* *Coryli* Bl.
- *rambux* *linearis* M.
- *ysomela olivacea* Bl.
- *4-punctata* Lrv.
- Curculio Betuleti* Bl.
- *Coryli* Bl.
- *glandium* Fr.
- *micans* Bl.
- *nucum* Fr.
- *venosus* Fr.
- *Melolontha horticola* Bl.

an der Linde (*Tilia*)

- *aprestis* *rutilans* Lrv.
- *Bostrichus Tiliae* ?
- *Curculio Betuleti* Bl.
- *Melolontha vulgaris* Bl.
- *Trichus Eremita* H.

an Pappeln (*Populus*)  
an Blättern

- Chrysomela Helixines*
- *Populi*
- *Tremulae*
- *4-punctata*
- *rufipes*
- Curculio Betuleti*
- *Populi*
- *viridicollis*
- Lyta vesicatoria*
- Melolontha brunnea*
- *Fulva*
- *Hippocastani*
- *solitatis*
- *horticola*
- *vulgaris*

in oder am Stamme

- Bostrichus cryptographus* R.
- *Saxenii* HF.
- Cerambyx Carcharias* Lrv.
- *populeus* Lrv.
- Cossonus linearis* H.
- Ptilinus costatus* H.
- Ptilinus pectinicornis* H.

an der Weide (*Salix*)

- Chrysomela Capreae* Bl.
- *4-punctata* Bl.
- *viminalis* Bl.
- *Vitellinae* Bl.
- *Helixines* Bl.
- *nitidula* ?
- Cossonus linearis* H.
- Curculio Lapathi* Bl.
- *Populi* Bl.
- Cerambyx motacilis* Lrv.
- Melolontha fruticosa* Bl.
- *horticola* Bl.
- *solitatis* Bl.
- Ptilinus costatus* H.
- *pectinicornis* H.
- Trichus Eremita* H.

am Obst und Wein

- Bostrichus dispar* GH.
- Chrysomela rufipes*
- Curculio Alliarum* Bl.
- *Bacchus* Bl.
- *Betuleti* Bl.
- *geminatus* Bl.
- *laevigatus* Bl.
- *pomorum* Fr.
- *sulcatus* Bl.
- Eucopogaster Pruni* L.
- *rugosus* L.
- Melolontha horticola* Bl.
- *hippocastani* Bl.
- *vulgaris* Bl.
- Trichus Eremita* H.
- *hemipterus* H.


B. bedeutet Blumenfresser  
Bl. — Blatt- und Z  
Fr. — Fruchtfresser  
GH. — Gabelholzgang  
Gil. — in Gallen lebend  
M. Markfresser  
R. Rindenkafer (s. S. 164.)  
R. Rinden-Familiengang (s. S. 166.)  
S. Sterngänge (s. S. 165.)  
W. Wegegänge (s. S. 165.)











**Coccinella**

15 septempunctata  
16 bipunctata

**Clerus**

17 formicarius

**Carabus**

1 coriaceus 2 hortensis 3 violaceus  
4 granulatus 5 cephalotes 6 rostratus  
7 niger 8 auro-inteus 9 agilis 10 + maculatus 11 Sycophanta

**Cicindela**


12 campestris

**Staphylinus**

13 erythropterus  
14 olens



*Schweilige, meist fliegende Käfer, v. v. v.*



**Buprestis**

1. tenuis 2. cyaneus 3. angustula.  
4. Betuleti 5. laevis 6. rugicollis.  
7. nociva 8. Fagi. 9. integrissima. 10. qu.  
11. punctata 12. mariana.

**Ptilinus**

21. pertinacioris 22. costatus.

**Lymexylon**

23. 24. navale. 25. 26. dermestoides.

**Lytta**

27. vesicatoria.

**Anobium**


13. molle. 14. Pini. 15. Abietis. 16. longicorne.

17. angusticollis. 18. nigritum. 19. abietinum.

20. tessellatum 20. emarginatum.

Repts. F. v. d. H. v.





Trichius

17. nobilis,

Lucanus

11. paratrichopodus.

Melolontha

1, 2. vulgaris, 3. Hippocastani, 4. Fullo, 5. solstitialis, 6. ruficornis,


7. fruticola, 8. agricola, 9. horticola, 10. Frischii, 11. variabilis.

12. braunae, 13. ruficula, 14, 15. argentea, 16. graminicola.

Cetonia

18. aurata.



*Schullube Käfer.***Curculio**

1. Coryli. 2. Betuleti. 3. violaceus. 4. incanus. 5. varius. 7. micans. 8. ater. 5. Coryli.


9. viridicollis. 10. argentatus. 11. Pini. 12. atomarius. 13. Lapathi. 14. Fagi.

**Apoderes.**





*Schäffele's Rüssel- & Käfer.*  
vergrößert.




**Curculio**

1. *lucorum*, 2. *abietis*, 3. *piccae*, 4. *hercyniae*, 5. *glandium*,

6. *venosus*, 7. *druparum*, 8. *pomorum*, 9. *indigena*.



10. *micum*.



Gänge, Puppenhöhlen und Fluglöcher von *Cureulo*

*notatus* (1 in Pflanzen u. 2 Zapfen der Kiefer), *Berytus* (3-5 in u. unter Fichtensrinde), *Piceae* (6-9 in u. unter Kieferstammrinde).





**Hylefinus**

1. piniperda. 2. minor. 3. micans. 4. pilosus. 5. ater. 6. cunicularius. 7. apacus. 8. ligniperda.  
9. palliatus. 10. decumanus. 11. poligraphus. 12. rhododactylus. 13. crenatus. 14. fraxini.



Gänge von *Hylesinus*

Fig 1-3 micans (unter Pichtentrinde) Fig 4 minor (unter Kiefernrinde) Fig 5 Fraxini (auf Eschenholz.)






Gänge von *Hylesinus*

1. *palliatus* (unter Fichtentrinde), 2. 3. *piniperda* (unter Kiefernrinde), 4. *minimus* (auf Kiefernholz).







**Apathe**

1. Capucina.

**Eccoptogaster**

1. 3. destructor. 4. Scolytus 5. Pissus pygmaeus.

7. noxius. 8. Carpini. 9. intricatus. 10. rugulosus.

11. multistriatus. 12. castaneus.

**Platypus**

13. cylindrus.

**Colydtum**


15. elongatum.



**Gänge von *Eccoptogaster***

1. *Scolytus* (unter Ulmenrinde), 2. *destructor* (unter Birkenrinde), 3. *multistriatus* (unter Ulmenrinde), 4. *rugulosus* (auf Flaumenholz).






1. *B. typographus*. 2. *B. stenographus*. 3. *B. Laricus*. 4. *B. fituralis*. 5. 6. *B. monographus*.

7. *B. B. dryographus*. 8. 9. *B. bicolor*. 10. 11. *B. bidens*. 12. 13. 14. *B. chalcographus*.



*Schädliche Rinden und Holz-Täfer.  
Pestschäfer.*

Carl Lat. XII.



1. 2. *B. curvidens*. 3. *B. ptyographus*. 4. *B. acuminatus*. 5. *B. bispinus*. 6. *B. rufographus*. 7. 8. *B. villosus*. 9. 10. *B. curygraphus*.

11. *B. lucatus*. 12. *B. domesticus*. 13. 14. *B. dispar*. 15. *B. cinereus*. 16. *B. pusillus*. 17. *B. Abietis*. 18. *B. binodulus*.

19. *B. grandatus*. 20. *B. Tiliae*.

*Carl Lat. und Lat. XII.*





*Larven und Puppen schaltlicher Holz- und Rinden-Täfer.*

Vol. 10. 1875




Fig. 1. 14. Bostrichus. 15. 24. Hylcinus. 25. 27. Eccoptogaster. 28. 32. Platypus. 33. Apat.


34-35. Colydium.



Gänge von *Bostrichus*

1. *chalcographus* u. *typographus* (unter Pichtentrinde). 2. *Laricis* (unter Kiefernrinde), 3. *curvidens* (unter Weifstannentrinde).






*Cerambyx*

1. *moschatus*. 2. *Aedilis*. 3. *Heros*. 4. *Carcharias*. 5. *populneus*. 6. *linearis*.





*Leptura*  
9. 10. rubro-testacea.  
11. quadristriata.

*Cerambyx*  
1. fennicus 2. luridus. 3. sanguineus. 4. bajulus. 5. indigator.  
6. mordax. 7. inquisitor. 8. arcuatus.


*Spondylis*  
12. buprestoides.

*H. Pilsbry ad nat. del. et sc.*



Gänge, Puppenhöhlen und Fluglöcher von *Cerambyx*

1. 2. *linearis* (in *Haseln*), 3. 4. *populneus* (in *Aspen*), 5. 6. *Carcharias* (in *Pappeln*).




Gänge von *Cerambyx*

1. 3. *luridus* (im Pflasterende u. Holz.) 4. 5. *indagator* (unter Pflasterende.)








**Chrysomela**

Fig. 1. Pini. 2. quadripunctata. 3. Tremulae. 4. Populi. 5. Capreae. 6. Alni. 7. Vitellinae. 8. oleracea.

9. 10. pinicola. 11. Helixinis. 12. flexuosa. 13. aenea.





Gänge und Fraß von

1. *Anobium emarginatum* (in Fichtenrinde) 2, 3. *Buprestis nociva* (an Buchenstammchen) 4. *Buprestis Fagi* (unter Buchenrinde)  
5. *Bostrychus bicolor* (unter Buchenrinde) 6. *Chrysomela Populi* (am Aspenblatte)







